



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines


Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>




Per. 3976 d.844


950

$$= \psi 3. \frac{23}{2}$$

$$= \psi 1. 1$$
$$= C. ACAD. 1.$$



SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.



JAHRGANG 1882.

ZWEITER HALBBAND. JUNI BIS DECEMBER.

**STÜCK XXVII—LIV MIT SIEBEN TAFELN, DEM VERZEICHNISS DER EINGEGANGENEN DRUCK-
SCHRIFTEN, NAMEN- UND SACHREGISTER.**


BERLIN, 1882.

VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

**IN COMMISSION IN FERD. DÜMLER'S VERLAGS-BUCHHANDLUNG
HARRWITZ UND GOSSMANN.**

SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

XXVII—LIV.



JUNI BIS DECEMBER 1882.

**MIT SIEBEN TAFELN. DEM VERZEICHNISS DER EINGEGANGENEN DRUCK-
SCHRIFTEN, NAMEN- UND SACHREGISTER.**

BERLIN, 1882.

VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

**IN COMMISSION IN FERD. DÜMMLER'S VERLAGS-BUCHHANDLUNG
HARRWITZ UND GOSSMANN.**

I N H A L T.

	Seite
WATTENBACH: Beiträge zur Geschichte der Mark Brandenburg aus Handschriften der Königlichen Bibliothek	587
BURMEISTER: Nothropus priscus, ein bisher unbekanntes fossiles Falthier (Taf. XI)	613
ROTH: Zur Kenntniss der Ponza-Inseln	623
BLAKE: Über die elektrische Neutralität des von ruhigen elektrisirten Wasserflächen aufsteigenden Dampfes	635
G. KIRCHHOFF: Zur Theorie der Lichtstrahlen	641
VIRCHOW: Über den Schädel des jungen Gorilla (Taf. XII)	671
LINDEMANN: Über die LUDOLPH'sche Zahl	679
VOIGT: Die Theorie des longitudinalen Stosses cylindrischer Stäbe	683
FUCHS: Über lineare homogene Differentialgleichungen, zwischen deren Integralen homogene Relationen höhern als ersten Grades bestehen	703
TOBLER, Antrittsrede	713
WATTENBACH, Antrittsrede	717
DIELS, Antrittsrede	718
MOMMSEN, Antwort auf die Antrittsrede der HH. TOBLER, WATTENBACH und DIELS	721
LANDOLT, Antrittsrede	723
E. DU BOIS-REYMOND, Antwort auf die Antrittsrede des Hrn. LANDOLT	728
STEINER'scher Preis. Beurtheilung der eingegangenen Bewerbungsschriften	731
Ertheilung des Preises für 1882 an HH. NOETHER und HALPHEN	735
Neue Preisfrage für 1884	735
Preisfrage der philosophisch-historischen Classe für 1885	736
Preisfrage der Charlotten-Stiftung für 1883	737
CHEESMAN: Über die Messung von Wechselströmen durch Anwendung eines Galvanometers mit schräg gegen die Windungsebene gestellter Nadel	741
MUNK: Über die Stirnlappen des Grosshirns	753
WEBER: Über den Kupakshakaucikāditya des Dharmasāgara. Streitschrift eines orthodoxen Jaina, vom Jahre 1573	793
DAMES: Über den Bau des Kopfes von Archaeopteryx	817
KRONECKER: Die Subdeterminanten symmetrischer Systeme	821
HELMHOLTZ: Zur Thermodynamik chemischer Vorgänge. Zweiter Beitrag. Versuche an Chlorzink-Kalomel-Elementen	825
WESTERMAIER: Untersuchung über den Bau und die Function des pflanzlichen Hautgewebes (Taf. XIII)	837
LEPSIUS: Nochmals über die Babylonische halbe Elle des Hrn. OPPERT	847
PRINGSHEIM: Neue Beobachtungen über den Befruchtungsact der Gattungen Achlya und Saprolegnia (Taf. XIV)	855
PETERS: Über eine neue Gattung und Art der Vipernattern Dinodipsas angulifera, aus Südamerica (hierzu Taf. XV)	893
MENDELSSOHN: Untersuchungen über Reflexe	897
VOGEL: Über LOCKYER's Dissociationstheorie	905
A. KIRCHHOFF: Über die von Thukydides benutzten Urkunden	909

	Seite
CURTIVS: Die Griechen in der Diaspora	943
SIEMENS: Über das Leuchten der Flamme	961
WEBSKY: Über eine Methode, den Normalenbogen, um welchen eine Krystallfläche von einer ihr sehr nahe liegenden Zone absteht und ihre krystallographische Lage zu bestimmen	967
— GERLAND: Nachtrag zu LEIBNIZENS und HUYGENS' Briefwechsel mit PAPIN	979
PETERS: Über Sphaeronycteris toxophyllum, eine neue Gattung und Art der frugivoren blattnasigen Flederthiere, aus dem tropischen America (hierzu Taf. XVI)	987
LEPSIUS: Nachträgliches zu der Mittheilung über die babylonische Halbelle des Hrn. OPPERT vom 19. October d. J.	991
— ZACHARIAE VON LINGENTHAL: Zur Geschichte des Authenticum und der Epitome Novellarum des Ante- cessor Julianus	993
FRITSCH: Bericht über eine Reise zur Untersuchung der in den Museen Englands und Hollands vorhan- denen Torpedineen	1007
— DROYSSEN: Zum Finanzwesen des Dionysios von Syrakus	1013
ZELLER: Über die Lehre des Aristoteles von der Ewigkeit des Geistes	1033
KRONECKER: Über die Composition Abelscher Gleichungen	1059
OBERBECK: Über die Phasenunterschiede elektrischer Schwingungen.	1065
LIPSCHITZ: Untersuchungen über die Bestimmung von Oberflächen mit vorgeschriebenen, die Krümmungs- verhältnisse betreffenden Eigenschaften	1077
HIRSCHFELD: Bericht über die Ergebnisse einer Bereisung Paphlagoniens	1089
— KRABBE: Über die Beziehungen der Rindenspannung zur Bildung der Jahrringe und zur Ablenkung der Markstrahlen	1093
PETERS: Über Opisthoplus degener, eine neue Gattung und Art der Schlangen mit ganz eigenthüm- licher Bezeichnung	1147
KRONECKER: Die kubischen Abelschen Gleichungen des Bereichs $(1 \equiv 31)$	1151
— CHUN: Über die cyklische Entwicklung und die Verwandtschaftsverhältnisse der Siphonophoren (hierzu Taf. XVII)	1155
— NÖLDEKE: Elohim, El (אלהים, אל)	1175
DROYSSEN: Zum Münzwesen Athens	1193
Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften	(1)
Namensregister	(31)
Sachregister	(37)

VERZEICHNISS

DER

EINGEGANGENEN DRUCKSCHRIFTEN.

ERSTES VIERTELJAHR.

(Die Schriften, bei denen kein Format angegeben ist, sind in Octav.)

- Leopoldina. Amtliches Organ der K. Leop. Carol. Deutschen Akademie der Naturforscher.*
Heft XVII. N. 23. 24. Dec. 1881 u. Titel. Heft XVIII. N. 1. 2. 3. 4. Halle a. S.
1881. 1882. 4.
- Sitzungsberichte der philos. philol. und hist. Classe der K. b. Akademie der Wissenschaften
zu München.* 1881. Bd. II. Heft III. IV. München 1881.
- Sitzungsberichte der math. phys. Classe der K. b. Akademie der Wissenschaften zu München.*
1882. Heft I. München 1882.
- Nachrichten von der K. Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg August's Universität
zu Göttingen.* N. 14—16. 1881. Göttingen.
- Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft.* Jahrg. XIV. N. 19. Jahrg. XV. N. 1.
2. 3. 4. Berlin 1882.
- Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft.* Bd. XXXIII. Heft 3. Berlin 1881.
- Publication des Königl. preuss. Geodätischen Instituts.* W. SEIBT, *Präcisions-Nivellement
der Elbe.* 2. Mittheilung. Berlin 1881. 4. — *Das Hessische Dreiecksnetz.* Berlin
1882. 4.
- Preussische Statistik.* LXI. *Die Bewegung der Bevölkerung, mit Einschluss der Wande-
rungen, im preussischen Staate während des Jahres 1880.* Berlin 1882.
- Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft.* Jahrg. XVI. Heft 2. Jahrg. XVII.
Heft 1. Leipzig 1881. 1882.
- Die Fortschritte der Physik im Jahre 1877.* Jahrg. XXXIII. Abthl. 2. Berlin 1882.
- Landwirthschaftliche Jahrbücher.* Bd. XI. (1882.) Heft 1. Berlin 1882.
- Verhandlungen des Naturhistorisch-medicinischen Vereins zu Heidelberg.* N. F. Bd. 3.
Heft 1. Heidelberg 1881.
- Jahresbericht des Vereins für Naturwissenschaft zu Braunschweig für das Geschäftsjahr
1880/81.* Altenburg 1881.
- XXVIII. Bericht des Vereines für Naturkunde zu Cassel über das Vereinsjahr vom 18. April
1880 bis dahin 1881.* Cassel 1881.
- Mittheilungen aus der Zoologischen Station zu Neapel.* Bd. 3. Heft 1. 2. Leipzig 1881.
- Ergebnisse der Beobachtungsstationen an den deutschen Küsten über die physikalischen Eigen-
schaften der Ostsee und Nordsee und die Fischerei.* Jahrg. 1881. Heft VI. Juni.
Berlin 1881. 4.
- Elektrotechnische Zeitschrift.* Jahrg. III. 1882. Heft I. II. III. Berlin 1882.
- Schriften der Universität zu Kiel, aus dem Jahre 1880/81.* Bd. XXVII. Kiel 1881. 4.
31 Dissertationen der Universität Kiel. 1880. 1881.

(2)

- Sitzungsberichte der physikalisch-medizinischen Societät zu Erlangen.* Heft 13. Erlangen 1881.
Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde. Bd. 7. Heft 2. Hannover 1882.
- Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin.* Jahrg. 1881. Berlin 1881.
Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinen-Wesen. Bd. XXIX. Lief. 2. Bd. XXX. Heft 1 und Atlas Taf. I—IV. Berlin 1881. 1882. 4. u. Fol.
- 151—157. *Publication des litterarischen Vereins in Stuttgart (Tübingen).* Tübingen 1881.
Württembergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichte. Jahrg. IV. 1881. Heft I. II. III. IV. Stuttgart 1881.
- Verzeichniss der Mitglieder des Kaiserl. Deutschen Archäologischen Institutes.* Januar 1882.
Neues Lausitzisches Magazin. Bd. 57. Görlitz 1882.
- Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde.* Jahrg. 33. 34. Wiesbaden 1880. 1881.
- Anzeiger für Kunde der Deutschen Vorzeit.* N. Folge Jahrg. 28. 1881. Nürnberg. 4.
27. *Jahresbericht des germanischen Nationalmuseums.* Nürnberg 1881. 4.
- Internationale Fischerei-Ausstellung in Berlin im Jahre 1880. Italienische Abtheilung.* Berlin.
- Erwerbungen der Stadtbibliothek 1881.* Jan.-März. (Bremen).
- Monumenta Germaniae historica. — Auctorum antiquissimorum T. V. P. 1. — Jordanis Romana et Cetica. Rec. TH. MOMMSEN.* Berolini 1882. 4.
- Monumenta Germaniae historica. — Diplomatum Regum et Imperatorum Germaniae. T. I. P. II. Ottonis I. Regis diplomata Hannoverae.* 1882. 4.
- *J. STEINER'S *Gesammelte Werke.* Bd. II. Herausgegeben von K. WEIERSTRASS. Berlin 1882. 2 Ex.
- **Die Althochdeutschen Glossen. Gesammelt und bearbeitet von E. STEINMEYER u. E. SIEVERS.* Bd. II. Berlin 1882. 2 Ex.
- Bericht über die im Jahre 1881 den Herzogl. Sammlungen zugegangenen Geschenke.* Gotha 1882. 4.
- A. CONZE, C. HUMANN, R. BOHN, *vorläufiger Bericht über die Ergebnisse der Ausgrabungen zu Pergamon 1880—1881.* Berlin 1882. Fol.
- R. STURM, *über reciproke und mit ihr zusammenhängende Verwandtschaften.* Leipzig 1882. Sep. Abdr.
- Roczniki towarzystwa przyjaciół nauk Poznańskiego.* T. XI. Poznań 1881.
- G. MAREK, *Mittheilungen aus dem landwirthschaftlich-physiologischen Laboratorium und landwirthschaftlich-botanischen Garten des landwirthschaftlichen Instituts der Universität Königsberg.* Heft 1. Königsberg i. Pr. 1882.
- LEIBNIZENS *Briefwechsel mit dem Minister von BERNSTORFF und andere LEIBNIZ betreffende Briefe und Actenstücke aus den Jahren 1705—1716. Mit einer Einleitung herausgegeben von R. DOEBNER.* Hannover 1882. Sep. Abdr.
- A. KERBER, *die Höhe der Erdatmosphäre.*
— —, *Refractionstheorie auf geometrischer Grundlage und Fortsetzung.* Leipzig 1882. Sep. Abdr.
- G. VOM RATH, *Erdbeben von Ischia vom 4. März 1881. Zustand des Vesuv im März 1881. Ein Besuch des Vultur. Krystallform des Cuspidin.* Bonn 1881. Sep. Abdr.
- R. CLAUSIUS, VI. *Über die theoretische Bestimmung des Dampfdruckes und der Volumina des Dampfes und der Flüssigkeit.* 1881. Sep. Abdr. — 2. Aufsatz. 1881. Sep. Abdr.
- J. SOMMERBRODT, *über eine bisher nicht gekannte wichtige Einrichtung des menschlichen Organismus.* Tübingen 1832.
- H. SCHEFFLER, *Das Wesen der Elektrizität, des Galvanismus und Magnetismus.* 2. Suppl. zum 2. Theile der Naturgesetze. Leipzig 1812.

- Sitzungsberichte der math. naturwissensch. Classe der K. Akademie der Wissenschaften in Wien.* Jahrg. 1881. N. 26—28 u. Register. Jahrg. 1882. N. I. II. III. IV. V. Wien 1881. 1882.
- Mittheilungen der K. K. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale.* Bd. VIII. Heft 1. Wien 1882. 4.
- Jahrbuch der K. K. Geologischen Reichsanstalt.* Jahrg. 1881. Bd. XXXI. N. 2. 3. 4. Berlin 1881.
- Verhandlungen der K. K. Geologischen Reichsanstalt.* Jahrg. 1881. N. 1. 8—15. Wien 1881.
- Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien.* Bd. XI. (Der neuen Folge Bd. I.) Heft 1. 2. Wien 1881. 4.
- Medizinische Jahrbücher.* Herausgegeben von der K. K. Gesellschaft der Aerzte. Jahrg. 1881. Heft III. IV. Wien 1881.
- Abhandlungen der K. Böhmisches Gesellschaft der Wissenschaften vom Jahre 1879 und 1880.* Folge VI. Bd. 10. Prag 1881. 4.
- Sitzungsberichte der K. Böhmisches Gesellschaft der Wissenschaften in Prag.* Jahrg. 1880. Prag 1880.
- Jahresbericht der k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften.* Ausgegeben am 10. Mai 1879 — am 3. Juni 1880. Prag 1879. 1880.
- Decem registra censuum bohemia compilata aetate bellum Husiticum praecedente.* Prag 1881.
- Übersicht der akademischen Behörden u. s. w. an der K. K. Universität zu Wien für das Studienjahr 1881/1882.* Wien 1881. 4.
- Carinthia. Zeitschrift für Vaterlandskunde u. s. w. in Kärnten.* Jahrg. 71. 1881. Klagenfurt.
- Autobiographie du Docteur médecin Ami Boué.* Vienne, Novembre 1879.
- Erdélyi Múzeum.* 1. 2. Sz. IX. évtolyam. 1882. Pest 1882.
- P. TOPINARD, *Az Anthropologia Kézi Könyve, fordítottak Pethő, G. és Török, Aurél.* Budapest 1881.
- L. MADERSPACH, *Magyarország Vasércz — Fekhelyei.* Budapest 1880. 4.
- L. ÖRLEY, *Az Anguillulidák Magánrajza (Monographie der Anguilluliden).* Budapest 1880. Sep. Abdr.
- E. RECLUS, *A Föld., II Ac Óceán. — A Léghör. — Az Elet.* Budapest 1880.
- Népszerű Természettudományi Előadások gyűjteménye.* Kötet III. IV. Budapest 1880. 1881.
- ERISMANN, *Népszerű Egészségtan fordította Imre J.* Budapest 1880.
- G. SCHENZL, *Beiträge zur Kenntniss der erdmagnetischen Verhältnisse in den Ländern der Ungarischen Krone.* Budapest 1881. 4.
- O. HERMAN, *Ungarns Spinnen-Fauna.* Budapest 1878. 4.
- Rad jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti.* Knjiga LVIII. Zagreb 1881.
- Viestnik hrvatskoga Arkeologičkoga Društva.* Godina IV. Br. 1. Zagreb 1882.
- S. DUBRAWSKI, *der Slavische Interrogativsatz.* Stryj. 1881.
- Proceedings of the Royal Geographical Society and Monthly Record of Geography.* Vol. IV. N. 1. 2. 3. 1882. London.
- The Journal of the Chemical Society.* N. CCXXX. Jan. 1882. N. CCXXXI. Febr. 1882. N. CCXXXII. March 1882. and Supplementary Number, cont Title-pages, proceedings and Indexes. 1881. Vols. XXXIX and XL. London.
- Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.* Vol. XLII. N. 2. 3. 4. Dec. 1881. Febr. 1882. London.
- Proceedings of the London Mathematical Society.* Vol. XII. N. 178. 179. 180. 181. London 1881.
- The scientific Proceedings of the Royal Dublin Society.* Vol. II. P. VII. Vol. III. P. I—IV. Dublin 1880. 1881.

(4)

- The scientific Transactions of the Royal Dublin Society.* XIII. XIV. Dublin 1880. 1881. 4.
Proceedings of the Philosophical Society of Glasgow 1880/81. Vol. XIII. N. 1. Glasgow 1881.
The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. New Series.
Vol. XIV. P. 1. London 1882.
Proceedings of the Royal Physical Society. Session 1880—81. (Vol. VI, P. 1.) Edinburgh.
Journal of the Royal Microscopical Society. Ser. II. Vol. II. P. 1. Febr. 1882. London.
The Annals and Magazine of Natural History. Ser. V. Vol. 8. N. 43—48. July-Dec. 1881.
London.
Catalogue of the Birds of the British Museum. Vol. VI. London 1881.
Journal and Proceedings of the Royal Society of New South Wales, 1880. Vol. XIV.
Sydney 1881.
1881. Victoria-Reports of the Mining Surveyors and Registrars. — Quarter ended
30th Sept. 1881. N. 29. Melbourne. Fol.
Memoirs of the Geological Survey of India. — Palaeontologia Indica. Ser. II, 1—4,
11. 12. Ser. XI. Pts. 1. 2. Ser. XII. Calcutta 1880. 4.
Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. N. IX. Novbr. 1881. Calcutta 1881. 8.
Bibliotheca Indica. Old Series. N. 243. New Series N. 469. 470. 471. 472. Cal-
cutta 1881. 1882. 8. New Series. N. 467. 468. Calcutta 1881. 4.
Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. I. P. II., N. IV. 1881. Calcutta 1881.
Memoirs of the Geological Survey of India. Vol. XVI. P. 2. 3. Calcutta 1880.
Records of the Geological Survey of India. Vol. XIII. P. 3. 4. XIV. 1880. 1881.
Calcutta.
A Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the North-Western Provinces. P. VI. Allaha-
bad 1881.
A Catalogue of Sanskrit Manuscripts existing in Oudh for the year 1880. Prepared by
Pandit Devi Prasāda. Fasc. XIII. Allahabad 1882.
The Melbourne University Calendar for the Academic years 1881—82. Melbourne 1881.
WM. FORD STANLEY, *Experimental Researches into the properties and motions of Fluids.*
London 1881.
E. L. HICKS, *a Manual of Greek historical Inscriptions.* Oxford 1882.
G. BIDDELL AIRY, *Account of observations of the Transit of Venus, 1874, Dec. 8.*
London 1881. 4.
J. H. II. GUILLEMARD, *On the Endemic Haematuria of hot Climates.* London 1882.
Rājendralāla Mitra, *Notices of Sanskrit Mss.* Vol. V. P. II. N. XV. Vol. VI. P. I.
N. XVI. Calcutta 1880. 1882.
Comptes rendus hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences. 1881. Sem. 2.
T. XCIII. N. 25. 26. 1882. Sem. 1. T. XCIV. N. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. 11. 12. Paris 1881. 1882. 4.
Tables des Comptes rendus des Séances de l'Académie des Sciences. Sem. I. 1881. P. XCII.
Paris 1881. 4.
Bulletin de l'Académie de Médecine. Sér. II. T. X. N. 52. Sér. II. T. XI. N. 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Paris 1881. 1882.
Bulletin de la Société mathématique de France. T. IX. N. 4. 5. T. X. N. 1. Paris
1881. 1882.
Bulletin de la Société géologique de France. Sér. III. T. 8. 1880. N. 6. Paris 1879
à 1880.
Bulletin de la Société zoologique de France pour l'année 1881. Part. 3. 4. 5. Paris 1881.
Journal de l'École polytechnique. T. XXX. Cah. 49. Paris 1881. 4.
Annales des Mines. Sér. VII. T. XIX. Livr. 3. T. XX. Livr. 4. 1881. Paris 1881.

- Mémoires de la Société des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux.* Sér. II. T. IV. Cah. 3. Paris 1881.
- Revue scientifique de la France et de l'Étranger.* Sér. 3. T. 28. N. 27. T. 29. N. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Paris 1881. 1882. 4.
- Revue mensuelle d'Astronomie populaire.* Publ. par C. FLAMMARION. Année 1. N. 1. Mars 1882. Paris 1882.
- Polybiblion.* — *Revue bibliographique univ.* Part. litt. Sér. II. T. XV. Livr. 1. 2. 3. Part. tech. Sér. II. T. XIII. Livr. 11. 12. Paris 1881. 1882.
- Bulletin de la Société de Géographie commerciale de Bordeaux.* Année 9. Sér. II. N. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bordeaux 1882.
- Société de Géographie.* — *Compte rendu des Séances, Janv., Fév., Mars 1882.* Paris.
- Liste des Membres de la Société de Géographie au 31 décembre 1881.* Paris 1882.
- Annales des Ponts et Chaussées.* — *Mémoires et Documents.* Sér. VI. Cah. 12. Dec. 1881. Sér. VI. Cah. 1. Janv. 1882. Paris.
- Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéologie religieuse des Diocèses de Valence etc.* Année II. Livr. 2. 3. (8. 9.) Nov., Dec. 1881. Janv., Févr. 1882. Montbéliard 1882.
- Bulletin de l'Union géographique du Nord de la France.* Année II. 1881. N. 14. 15. 16. Douai.
- Annales du Musée Guimet.* T. II. III. Paris 1881. 4.
- Revue de l'histoire des religions.* Année II. T. III. N. 3. T. IV. N. 4. 5. Paris 1881.
- Recueil des Notices et Mémoires de la Société archéologique du Département de Constantine.* Sér. II. Vol. X. 1879—1880. Constantine 1881.
- Oeuvres complètes d'AUGUSTIN CAUCHY.* Sér. I. T. 1. Paris 1882. 4.
- YVON VILLARCEAU, *Remarques à l'occasion du Mémoire de MM. Loewy et Périgaud sur la flexion des lunettes.*
- —, *Théorie de la flexion plane des solides, et conséquences relatives, tant à la construction des lunettes astronomiques, qu'à la réglementation de ces appareils, pour les affranchir des déviations de l'axe optique produites par la flexion.* Paris 1881. 4. Extr.
- G. PERROT & CH. CHIEPIEZ. *Histoire de l'art dans l'Antiquité.* Paris 1882.
- Cte. G. DE LA MOUSSAYS, *des Vibrations harmoniques.* Paris.
- HERSART DE LA VILLEMARQUÉ, *le passage breton de la farce de Paterlin.* Quimper 1881. Extr.
- Atti della R. Accademia dei Lincei Anno CCLXXIX.* 1881—82. Ser. III. Transunti. Vol. VI. Fasc. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Roma 1881. 1882. 4.
- Accademia Pontificia de' Nuovi Lincei. Anno XXXV.* — Sess. I. II. III. Roma 1881. 1882.
- Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino.* Vol. XVII. Disp. 1 (Nov.—Dec. 1881). Torino.
- Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere.* — *Rendiconti.* Ser. II. Vol. XIII. Milano 1880.
- Memorie del Reale Istituto Lombardo di Scienze e lettere.* — *Classe di Lettere e Scienze morali e politiche.* Vol. XIV—V. della Serie III. Fasc. II. Milano 1881. 4.
- Atti della Società Toscana di Scienze Naturali.* Proc. verb. Vol. III. Novbr. 1881.
- Atti della Società Italiana di Scienze naturali.* Vol. XXIII. Fasc. 3. 4. Milano 1881.
- Atti della fondazione scientifica cagnola.* Milano. Vol. VI. P. II. Anni 1873—78.
- Annali di Agricoltura* 1879. N. 11. 1880. N. 25. Roma 1880.
- B. BONCOMPAGNI, *Bullettino di bibliografia e di storia delle Scienze matematiche-fisiche.* T. XIV. Gennaio-Febbr.-Marzo-Aprile 1881. Roma 1881. 4.
- E. BETTONI, *storia della Riviera di Salò.* Vol. I—IV. Brescia 1880.
- G. OMBONI, *dei fossili triasici del Veneto.* Venezia 1882. Estr.
- Catalogo della Collezione di Insetti del R. Museo di Firenze.* — *Coleotteri.* Ser. 2a. Firenze 1879.

(6)

- L. AGENO e T. BEISSO, *del sistema commissurale centrale dell' Encefalo umano*. Genova 1881. 4.
- A. COSTA, *Relazione di un viaggio nelle Calabrie per ricerche zoologiche*. Napoli 1881. 4. Estr.
- —, *sul deposito di Argilla con avanzi organici animali nel tenimento di fondi*. Napoli 1880. 4. Estr.
- A. T. TOZZETTI, *Sostanze alimentari all' esposizione di Londra nel 1862*. Firenze 1867. 33 Brochüren. Sep.-Abdr.
- G. CAVANNA, *Elementi per una bibliografia italiana intorno all' Idrofauna, agli allevamenti degli animali acquatici e alla Pesca*. Firenze 1880.
- Mémoires de l'Académie Imp. des Sciences de St. Pétersbourg*. Sér. VII. T. XXIX. N. 1. 2. 3. St. Pétersbourg 1882. 4.
- Bulletin de l'Académie Imp. des Sciences de St. Pétersbourg*. T. XXVII. Feuilles 26—36. St. Pétersbourg 1882. 4.
- Bulletin de la Société Ouralienne d'amateurs des sciences naturelles*. T. VII. Livr. 1. Pétersbourg 1881. 4.
- Nouveaux Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou*. T. XIV. Livr. 2. Moscou 1881. 4.
- Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou*. Année 1881. N. 2. Moscou 1881.
- Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga*. XXIV. Riga 1881.
- Acta Horti Petropolitani*. T. VII. fasc. 11. St. Petersburg 1881.
- Observations météorologiques, publ. par la Société des Sciences de Finlande*. Vol. VII. Année 1879. Helsingfors 1882.
- H. WILD, *Annalen des physikalischen Central-Observatoriums*. Jahrg. 1880. Theil 1. II. St. Petersburg 1881. 4.
- E. REGEL, *Descriptiones plantarum novarum et minus cognitarum*. Fasc. VIII. Petropoli 1881.
- Verhandelingen der K. Akademie van Wetenschappen. Afd. Natuurkunde. Deel XXI*. Amsterdam 1881. 4.
- Verslagen en Mededeelingen der K. Akademie van Wetenschappen. Afd. Natuurkunde. Rk. 2. Deel XVI. Afd. Letterkunde. Rk. 2. Deel X*. Amsterdam 1881.
- Jaarboek voor 1880*. Amsterdam.
- Catalogus van de Boekerij der K. Akademie van Wetenschappen, gev. te Amsterdam. Deel III*. St. 2. Amsterdam 1881.
- Tria Carmina latina*. Amsterdam 1881.
- Processen-Verbaal*. 1880/81.
- Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*. Deel XL. Ser. 8. Deel 1. Batavia 1881.
- Archives Néerlandaises des Sciences exactes et naturelles*. T. XVI. Livr. 3. 4. 5. Harlem 1881.
- Programma van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem voor het Jaar 1881*. 4.
- Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Deel XLII*. St. 1. Batavia 1881.
- Notulen van de Algemeene en Bestuursvergaderingen van het Bataviaasch-Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Deel XIX*. 1881. N. 2. Batavia 1881.
- Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie*. Volg. IV. Deel V. St. 2. 'sGravenhage 1881.
- Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Deel XXVII*. Aft. 1. 2. 3. Batavia 1881.
- Annales du Jardin botanique de Buitenzorg*. Vol. I. II., P. 1. Batavia, Leide 1876, 1881.
- Observations made at the magnetical and meteorological Observatory at Batavia*. Vol. V. P. I. pp. 1—64. 1879 and 1880. P. II. pp. 65—128. P. III. pp. 128—192. P. IV. pp. 192—256. P. V. pp. 256—320. Batavia 1881. 4.

- Archives du Musée Teyler.* Sér. II. Vol. I. P. 2. Haarlem 1881.
- P. A. BERGSMA, *Regenwaanemingen in Nederlandsch-Indië.* Jaarg. II. 1880. Batavia 1881.
- F. K. GINZEL, *Neue Untersuchungen über die Bahn des Olbers'schen Cometen und seine Wiederkehr.* Haarlem 1881. 4.
- Öfversigt af Kongl. Vetenskaps Akademiens Förhandlingar.* 1881. Ärg. 38. N. 6. 7. Stockholm 1881.
- Förteckning på Svenska Arbeten och Uppsatser i Meteorologi publicerade 1856—1881.* Upprättad af C. G. FLINEMAN. Stockholm 1881.
- Tromsø Museums Aarsberetning for 1880.*
- Tromsø Museums Aarshefter IV.*
- Beretning om Tromsø Museums Virksomhed i Aaret 1879.* Tromsø 1879. 1881.
- Bidrag till Sveriges officiella statistik. B. Rättsväsendet. Ny foljd. XXII, 1. 2. 1879.*
- C. Bergshandteringen.* 1880. *N. Jordbruck och Boskapsskötsel.* 1881. *S. Allmänna Arbeten.* 9. 1880. Stockholm 1881. 4.
- H. HILDEBRAND HILDEBRANDSSON, *Observations météorologiques faites par l'expédition de la Vége.* Stockholm 1882. Extr.
- J. SPÄNGBERG, *Entomologisk Tidskrift.* Bd. I. Häft 3. 4. Stockholm 1881. 1882.
- Bulletin de l'Académie Royale des Sciences.* Année 50. Sér. 3. T. 2. N. 11. 12. Bruxelles 1881.
- Annuaire de l'Académie Royale des Sciences de Belgique.* 1882. 48^e. année. Bruxelles 1882.
- Annales de la Société Géologique de Belgique.* T. VII. 1879—1880. Liège 1879—81.
- Publications de la Commission géodésique Néerlandaise.* — I. J. A. C. OUDEMANS, *détermination à Utrecht, de l'Azimut d'Amersfoort.* La Haye 1881. 4.
- Mémoires de la Société Royale des Sciences de Liège.* Sér. II. T. IX. Bruxelles 1882.
- Preudhomme de Borre.* 7 Extr. Bruxelles 1880—81.
- VAN ERTBORN, *Texte explicatif du Levé géologique de la planchette de St. Nicolas, de Tamise, avec la collaboration de M. P. COGELS.* Bruxelles 1880.
- Levé géologique des planchettes XV, 2, 3, 5, 6, feuille XV.* 2 Bl. Fol.
- H. VALENTINER, *Bidrag til Rumcurvernes Theori.* Kjøbenhavn 1881. Diss.
- Das Schweizerische Dreiecknetz herausgegeben von der Schweizerischen geodätischen Commission.* Bd. I. Zürich 1881. 4.
- XI. Jahresbericht der historisch-antiq. Gesellschaft vom Graubünden.* Jahrg. 1881. Chur.
- L. RÜTIMEYER, *Beiträge zu einer natürlichen Geschichte der Hirsche.* Th. I. Zürich 1880 und 1881. 4.
- R. WOLF, *Astronomische Mittheilungen.* LIV. Dec. 1881. Zürich 1882.
- E. PLANTAMOUR, *Resumés météorologiques de l'année 1880 pour Genève et le Grand Saint-Bernard.* Genève 1881. Extr.
- M. PH. PLANTAMOUR, *des mouvements périodiques du Sol.* Genève 1881. Extr.
- Historia e Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa.* — *Classe de Sciencias moraes, politicas e bellas-lettas.* Nova Serie. T. V. P. 1. Classe de Sciencias math., physicas e naturaes. N. Ser. T. V. P. I. II. Lisboa 1878. 1879. 1881. 4.
- Boletim da Institucion libra de Ensenanza.* Año VI. Dic. 1881. Madrid.
- Sessão publica da Academia Real das Sciencias de Lisboa em 9 de junho de 1880.*
- Boletim da Sociedade de Geographia de Lisboa.* Ser. II. N. 7. 8. Lisboa 1881.
- Documentos remetidos da India ou livros des Monções.* Publicados da Academia Real das Sciencias de Lisboa e sob a direcção de R. A. de Bulhão Pato. T. I. Lisboa 1880. 4.
- Jornal de Sciencias mathematicas physicas e naturaes.* N. XXIV, XXIX. Dec. 1878 — Dec. 1880. Lisboa 1878—1880.
- Conferencias celebradas na Academia Real das Sciencias de Lisboa acerca dos descobrimentos e colonisações dos Portuguezes na Africa.* Conferencia IV. Lisboa 1880.

(8)

- A tabula de bronze de Aljustrel lida, deduzida e commentada em 1876. Memoria apresentada á Academia Real das Sciencias de Lisboa por S. P. M. ESTACIO DE VEIGA.* Lisboa 1880. 4.
- J. S. RIBEIRO, *Historia dos estabelecimentos scientificos litterarios e artisticos de Portugal.* T. VIII. IX. Lisboa 1879. 1881.
- D. DE BARROS ARANA, *Vida e viagens de Fernão de Magalhães. Trad. do hespanhol de F. de Magalhães Villas-Boas.* Lisboa 1881.
- Panegyrico de Luiz de Camões lido na sessão solemne da Academia Real das sciencias de Lisboa em 9 de junho 1880 pelo Secretario geral J. M. LATINO COELHO.* Lisboa 1880.
- Demosthenes. A Oração da Corôa. Versão do original grego precedida de um estudo sobre a civilização da Grecia por J. M. LATINO COELHO.* Ed. II. Lisboa 1880.
- WILLIAM SHAKESPEARE, *Hamlet. Trad. de BULHÃO PATO.* Lisboa 1879.
- J. S. RIBEIRO, *Don Pedro Calderon de la Barca rapido esboço da sua vida e escriptos.* Lisboa 1881.
- Conde DE FICALHO, *Flora dos Lusíadas.* Lisboa. 1880.
- Analele Acadomiiei Romane.* Ser. II. T. II. *Sessiunea generala a anului 1880.* — *Sectiunea II. Discursuri, Memorie si Notite.* Bucuresti 1881. 4.
- Register zu Mittheilungen des deutschen Archäologischen Institutes in Athen.* Bd. I—V. Athen 1881.
- Revista Euskara.* Año IV. N. 42. Dic. 1881. Pamplona 1881.
- Transactions of the New York Academy of Sciences.* 1881—1882. (Oct. 1881). New York.
- The American Journal of Otology.* Vol. IV. N. 1. January 1882. Boston.
- Annals of the New York Academy of Sciences.* Vol. II. N. 1—6. March 1880—June 1881. Vol. I. N. 14. *Index and Contents.* 1879. New York.
- Report of the Proceedings of the Numismatic and Antiquarian Society of Philadelphia for the year 1881.* Philadelphia 1882.
- Astronomical and Meteorological Observations made during the year 1876 at the U. S. Naval Observatory.* P. II. Washington 1880. 4.
- Engineer Department, U. S. Army. — Report upon U. S. Geographical Surveys West of the one hundredth Meridian in charge of first Lieut. G. M. WHEELER.* Vol. VII. Archaeology. Washington 1879. 4.
- The Electrician.* Vol. I. N. 1. Jan. 1882. New York. 4.
- Scientific Proceedings of the Ohio Mechanic's Institute.* Vol. I. N. 1. January 1882. Cincinnati, Ohio 1882.
- The American Journal of Science.* Ser. III. Vol. XXIII. N. 133. 134. 135. New Haven 1882.
- American Oriental Society. — Proceedings.* New Haven. Oct. 26. 1881.
- Proceedings of the Boston Society of Natural History.* Vol. XX. P. IV. Vol. XXI. P. I. Boston 1880. 1881.
- H. PHILLIPS, *Remarks upon a coin of Sicyon.* Philadelphia 1882. Sep. Abdr.
- —, *a pre-historic Epic.* Philadelphia 1882. Extr.
- JOHN HOPKINS *University Circulars.* N. 13. Baltimore 1882. 4.
- Bulletin of the Museum of comparative Zoology at Harvard College.* Vol. VI. N. 12. Vol. IX. N. 1—5. Cambridge. June—Dec. 1881.
- Annual Report of the Curator of the Museum of comparative Zoology at Harvard College to the President and Fellows of Harvard College, for 1880/81.* Cambridge 1881.
- The Journal of the Cincinnati Society of Natural History.* Vol. IV. N. 4. Dec. 1881. Cincinnati.
- The Canadian Journal: Proceedings of the Canadian Institute.* New Series. Vol. I. P. 2. Toronto 1881.
- A. S. PACKARD, *Scolopendrella and its position in Nature.* 1881. Washington Extr.

VERZEICHNISS

DER

EINGEGANGENEN DRUCKSCHRIFTEN.

ZWEITES VIERTELJAHR.

(Die Schriften, bei denen kein Format angegeben ist, sind in Octav.)

- Leopoldina. Antlliches Organ der K. Leop. Carol. Deutschen Akademie der Naturforscher.*
Heft XVIII. N. 5—10. Halle a. S. 1882. 4.
- Abhandlungen der philos.-philol. Classe der K. b. Akademie der Wissenschaften.* Bd. XVI.
Abth. 2. — *Hist. Classe.* Bd. XVI. Abth. 1. München 1881. 82. 4. 2 Ex.
- Sitzungsberichte der K. b. Akademie der Wissenschaften zu München. Math.-physik. Classe.*
1882. Heft II. III. *Philos.-philol. Classe.* 1882. Heft I. München 1882.
- Nachrichten von der K. Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-August's Universität.*
1882. N. 1—13. Göttingen.
- Abhandlungen der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.* Bd. XXVIII. Göttingen 1882. 4.
- Preisschriften. Gekrönt und herausgegeben von der Fürstl. Jablonowski'schen Gesellschaft zu Leipzig.* N. XV. der hist.-nationalökonomischen Section. Leipzig 1882.
- Jahresbericht der Fürstl. Jablonowski'schen Gesellschaft.* Leipzig, im März 1882.
- Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft.* Bd. XXXIII. Heft 4. Berlin 1881.
- Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft.* Jahrg. XV. N. 5. 6. 7. 9. Berlin 1882.
- Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen im preuss. Staate.* Bd. XXIX.
Dritte statistische Lieferung. Bd. XXX. Heft 2 u. Atlas. Bd. XXX. Taf. V—VIII.
Berlin 1882. 4. u. fol.
- Landwirthschaftliche Jahrbücher.* Bd. X. (1881.) Supplement. Bd. XI. (1882.) Heft 2. 3.
Berlin 1882.
- Berliner Astronomisches Jahrbuch für 1884 mit Ephemeriden der Planeten 1—220 für 1882.*
Berlin 1882.
- Verhandlungen des Vereins für naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg.* 1877.
Bd. IV. Hamburg 1879.
- Wissenschaftlicher Jahresbericht über die Morgenländischen Studien im Jahre 1879.* Leipzig 1881.
- Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.* Bd. XXXVI. Heft 1. Leipzig 1882.
- Verhandlungen des botanischen Vereins der Provinz Brandenburg.* Jahrg. XXI. XXII.
XXIII. 1879. 1880. 1881. Berlin 1880. 1881. 1882.
- Schriften der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg.* Jahrg. XXI. 1880.
Abth. II. Jahrg. XXII. 1881. Abth. 1. 2. Königsberg 1881. 1882. 4.
- Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig.* Neue Folge Bd. V. Heft 3.
Danzig 1882.

(10)

- Elektrotechnische Zeitschrift.* Jahrg. 3. 1882. Heft IV. V. VI. Berlin 1882.
- Abhandlungen.* Herausgegeben von der *Senkenbergischen naturforschenden Gesellschaft.* Bd. XII. Heft 3. 4. Frankfurt a. M. 1881. 4.
- Bericht über die Senkenbergische naturforschende Gesellschaft.* 1880 — 1882. Frankfurt a. M. 1882.
- Jahrbücher der K. Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt.* N. Folge. Heft XI. Erfurt 1882.
- Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichte.* Bd. VII. Heft 3. Hannover 1882.
- Sitzungsberichte der naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig.* Jahrg. VIII. 1881. Leipzig 1882.
- Programm der Sophien-Realschule über das Schuljahr 1881 — 1882 nebst einer wissenschaftlichen Beilage.* Berlin 1882. 4. 3 Expl.
- Jahresbericht der Andreas-Realschule.* Berlin 1882. 4. 4 Expl.
- No. 106. *Amtliches Verzeichniss des Personals und der Studirenden auf der Albertus-Universität zu Königsberg i. Pr. für das Sommer-Semester 1882.* Königsberg.
- Mittheilungen des Deutschen Archaeologischen Institutes in Athen.* Jahrg. VII. Heft 1. Athen 1882.
- Mittheilungen aus der Zoologischen Station zu Neapel.* Bd. III. Heft 3. Leipzig 1882.
- Mittheilungen der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens.* Heft 25. Dec. 1881. Heft 26. Februar 1882. Yokohama. 4.
- Publication des K. Preuss. Geodätischen Institutes.* — M. Löw, *astronomisch-geodätische Ortsbestimmungen im Harz.* — A. FISCHER, *der Einfluss der Lateralrefraktion auf das Messen von Horizontalwinkeln.* Berlin 1882. 4.
- J. J. BAEYER, *Zur Entstehungsgeschichte der europäischen Gradmessung.* Berlin 1862. 4.
- Das Rheinische Dreiecksnetz.* Heft III. *Die Netzausgleichung.* (Publication des K. Preuss. Geodätischen Instituts.) Berlin 1882. 4.
- Astronomische Nachrichten.* Bd. 101. Kiel 1882. 4.
- Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft.* Jahrg. XVII. Heft 2. Leipzig 1882.
- TH. VON OPPOLZER, *Syzygien-Tafeln für den Mond.* — Publication der Astronomischen Gesellschaft XVI. Leipzig 1881. 4.
- Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik.* Bd. XI. Jahrg. 1879. Heft 2. 3. Berlin 1881. 1882.
- Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg.* Jahrg. 38. Stuttgart 1882.
- Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande.* Heft LXX. LXXI. LXXII. Bonn 1881. 1882.
- Publicationen der K. Universitäts-Sternkarte zu Leipzig.* Heft I. Leipzig 1882. 4.
- W. C. H. PETERS, *Naturwissenschaftliche Reise nach Mossambique.* Zoologie III. Amphibien. Berlin 1882. 4.
- A. ENGLER, *Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Pflanzenwelt.* Th. I. II. Leipzig 1879. 1882.
- , *Monographie der Gattung Saxifraga L.* Breslau 1872.
- L. BECKER, *Untersuchungen über die allgemeinen Störungen der Feronia.* Inaug. Dissert. Bonn 1882. 4.
- R. CLAUDIUS, *über die verschiedenen Maasssysteme zur Messung elektrischer und magnetischer Grössen.* 1882. Sep. Abdr.
- Urkunden der Stadt Göttingen aus dem XVI. Jahrhundert.* — *Beiträge zur Geschichte von Braunschweig-Lüneburg 1500 — 1533* von A. HASSELBLATT und G. KAESTNER. Göttingen 1881.

- F. Freih. VON RICHTHOFEN, *China*. Bd. II. Berlin 1882. 4.
- W. PERTSCH, *die Arabischen Handschriften der Herz. Bibliothek zu Gotha*. Bd. IV. Heft 1. Gotha 1882.
- W. FIEDLER, *Cyklographie oder Construction der Aufgaben über Kreise und Kugeln*. Leipzig 1882.
- A. VON REUMONT, *kleine Schriften*. Gotha 1882.
- GEORG VON DER GABELNTZ & A. B. MEYER, *Beiträge zur Kenntniss der melanesischen, mikronesischen und papuanischen Sprachen*. Leipzig 1882. Sep. Abdr.
- A. B. MEYER, *Abbildungen von Vogel-Skeletten*. Lief. II. III. Dresden 1881—1882. 4.
- W. BLASIUS & A. NEHRKORN, *Beiträge zur Kenntniss der Vogelfauna von Borneo*. Braunschweig 1881. Sep. Abdr.
- —, *Neuer Beitrag der Vogelfauna von Borneo*. Braunschweig 1882. Sep. Abdr.
- —, *Die Neuauftellung des Herz. naturhistor. Museums zu Braunschweig*. Braunschweig 1879.
- —, *Vortrag über naturwissenschaftliche Vereine und Institute der civilisirten Welt*.
- —, *Mittheilungen über den botanischen Garten zu Braunschweig*. Braunschweig 1880. Sep. Abdr.
- **The Vinaya Pitakam*. Edit. by H. Oldenberg. Vol. IV. London 1882. 2 Ex.
- Sitzungsberichte der math. naturw. Classe der K. Akademie der Wissenschaften in Wien*. Jahrg. 1882. N. V—XIII. Wien.
- Jahrbücher der K. K. Central-Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus*. Jahrg. 1878. 1880. N. Folge Bd. XV. XVI. Theil I. Wien 1881. 4.
- Abhandlungen der K. K. Geologischen Reichsanstalt*. Bd. XII. Heft III. (R. HOERNES & M. AUGER, die Gasteropoden.) Wien 1882. 4.
- Verhandlungen der K. K. geologischen Reichsanstalt*. 1882. N. 1—7. Wien 1882.
- Jahrbuch der K. K. geologischen Reichsanstalt*. Jahrg. 1882. Bd. XXXII. N. 1. Wien 1882.
- Mittheilungen der K. K. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale*. Bd. VIII. Heft 2. Wien 1882. 4.
- Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien*. Bd. XI. Heft III. IV. Wien 1882. 4.
- Jahrbuch des naturhistorischen Landes-Museums von Kärnten*. Heft XV. Klagenfurt 1882.
- Bericht über das naturhistorische Landes-Museum von Kärnten* 1880. 1881. Klagenfurt 1881. 1882. Sep. Abdr.
- Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn*. Bd. XIX. 1880. Brünn 1881.
- Schriften des Vereines zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien*. Bd. XXII. Vereinsjahr 1881/82. Wien 1882.
- F. SEELAND, *Diagramme der magnetischen und meteorologischen Beobachtungen zu Klagenfurt*. 1876 bis Nov. 1878. Dec. 1878 bis Nov. 1880. Dec. 1880 bis Nov. 1881. Klagenfurt. 4.
- Lotos. Jahrbuch für Naturwissenschaft*. N. Folge. Bd. II. Prag 1882.
- Astronomische, magnetische und meteorologische Beobachtungen an der K. K. Sternwarte zu Prag im Jahre 1881*. Jahrg. 42. Prag. 4.
- M. A. BECKER, *Harnstein in Niederösterreich. Mit Unterstützung des Hrn. Erzherzogs Leopold herausgegeben*. Th. I. Die geologischen Verhältnisse. Wien 1882.
- —, *Album von Harnstein. Illustrationen zu Harnstein in Niederösterreich, sein Gebiet und das Land im weiteren Umkreise*. Wien 1882. Fol.
- F. KROČAK, *die Heilung der Tuberculose*. Brünn 1882.
- Öffentliche Vorlesungen an der K. K. Universität zu Wien im Sommer-Semester 1882*. Wien 1882.

(12)

- Monumenta Hungariae Historica.* — III. oszt. *Monum. Comit. Regni Hung.* ED. FRANKÓI. VII.
— III. oszt. *Monum. Comit. Regni Hung. Transylv.* ED. SZILÁGYI. VII. Budapest 1881.
E. LANFRANCONI, *Rettung Ungarns vor Überschwemmungen.* Budapest 1882. Fol.
— —, *über die Wasserstrassen Mittel-Europas und die Wichtigkeit der Regulirung des
Donaustromes.* Budapest und Wien 1880. 1881. Deutsch, franz., ungarisch. Fol.
DR. HEINZE'S *Anklageschrift »Hungarica« im Lichte der Wahrheit.* Pressburg u. Leipzig 1882.
P. HUNFALVY, *Ungarische Revue.* 1881. Heft 3—12. 1882. Heft 1—3. Leipzig in
Commission 1881. 1882.
Rad jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti. Krjiga LIX. LX. LXI. Svozak I.
Zagrebu 1881. 1882.
Viestnik hrvatskoga arkeologickoga Društva. Godina IV. Br. 2. Zagrebu 1882.
- Report of the British Association for the advancement of Science, held at York in August
and September 1881.* London 1882.
Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. Session 1880—81. Vol. XI. N. 108.
Edinburgh.
Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Vol. XXX. Part I. Edinburgh 1881. 4.
Proceedings of the Royal Geographical Society and Monthly Record of Geography. Vol. IV.
N. 4. 5. 6. London 1882.
Journal of the Chemical Society. N. CCXXXIII April, CCXXXIV May, CCXXXV
June 1882. London.
Proceedings of the London Mathematical Society. N. 182. 183. 184. 185. London 1882.
Memoirs of the Royal Astronomical Society. Vol. XLVI, 1880—81. London 1881. 4.
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Vol. XLII. N. 5. 6. 7. London 1882
Transactions of the Zoological Society of London. Vol. XI. P. 6 and
General Index to the Transactions of the Zoological Society of London. Vol. I. to X.
(1835—79.) London 1881. 1882. 4.
Proceedings of the scientific meetings of the Zoological Society of London for 1881. P. IV.
London 1882.
Journal of the Royal Microscopical Society. Ser. II. Vol. II. P. 2. 3. London 1882.
Catalogue of the Batrachia Salientia and ecaudata in the Collection of the British Museum.
Ed. 2 by G. A. BOULENGER. London 1882.
*Philosophical Society of Glasgow. Reports relative to exhibition of apparatus for the utilization
of Gas, Electricity &c.* Glasgow 1882.
W. K. CLIFFORD, *Mathematical papers.* Edit by R. TUCKER, with an introduction by H.
J. S. SMITH. London 1882.
*The Sacred Books of the East. Translated by various oriental scholars and edited by J. MAX
MÜLLER.* Vol. VIII. XII. XIII. XVI. Oxford 1881. 1882.
Records of the Geological Survey of India. Vol. XIV. P. 2. 3. 4. Calcutta 1881.
Memoirs of the Geological Survey of India. Fossil flora of the Gondewanas. Vol. III. p. 3.
Salt-Range Fossils. Ser. XIII. Vol. I. p. 3. Calcutta 1881. 1882. 4.
Vol. XVIII, p. 1—2. 3. Calcutta 1881.
A Manual of the Geology of India. P. III. V. BALL, *Economic Geology.* Calcutta 1881.
Journal of the Asiatic Society of Bengal. Extra Number to P. I for 1880. Vol. LI.
N. 1. Calcutta 1880. 1882.
Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. N. II. Febr. 1882. N. III. March 1882.
Calcutta 1882.
Bibliotheca Indica. New Series. N. 394. 395. 474. London 1881. Calcutta 1882.
A. C. L. CARLLEYLE, *Report of tours in the Central Doab and Gorakhpur in 1874—75
and 1875—76.* Vol. XII (Archaeological Survey). Calcutta 1879.

- The Madras University Calendar 1882—83.* Madras 1882.
- Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic Society* 1880. New Series. Vol. XV. 1881. XVI. P. 1. Shanghai 1881. 1882.
- Report of the Council of the North China Branch of the Royal Asiatic Society, for the year 1881.* (Journal, N. Series, Vol. XVI, P. 2.) Shanghai 1882.
- The Chronicle of Joshua the Stylite.* With a translation into english and notes by W. WRIGHT. Cambridge 1882.
- J. W. L. GLAISHER, *on RICCATI'S equation and its transformations.* London 1881. 4. Extr. 1882 Victoria. *Reports of the Mining Surveyors & Registrars. Quarter ended 30th December 1881.* N. 4. Melbourne. Fol.
- Eucalyptographia.* — F. VON MUELLER, *a descriptive Atlas of the Eucalypts of Australia and the adjoining Islands.* Melbourne 1882. 4.
- W. A. HASWELL, *Catalogue of the Australian Stalk- and sessile-eyed Crustacea in the Australian Museum.* Sydney 1882.
- Comptes rendus hebdomadaires des seances de l'Académie des Sciences.* 1882. Sem. 1. T. XCIV. N. 13—25. Paris 1882. 4.
- Tables des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences.* 1881. Sem. 2. T. XCIII. 4.
- Procès-verbaux des séances de 1881 du Comité international des poids et mesures.* Paris 1882.
- Société des Ingenieurs civils. Mémoires et compte rendu des travaux.* Sér. IV. Année 35. Cah. 1. Janv. 1882. Paris 1882.
- — *Séances-visites à l'exposition d'électricité.* Pag. 57—184. Paris 1882.
- Bulletin de la Société mathématique de France.* T. X. N. 2. 3. 4. Paris 1882.
- Annales des Ponts et Chaussées. — Mémoires et documents.* Sér. VI, Cah. 2. 3. 4. Paris 1882
- Bulletin d'histoire ecclesiastique et d'archéologie religieuse des Diocèses de Valence etc.* Année II. — Livr. 4. (X.) 1882 Mars-Avril. Montbéliard 1882.
- Bulletin de la Société de Géographie.* 1881 Oct. Nov. Déc. Paris 1882.
- Compte rendu des seances de la Société de Géographie.* 1882. N. 7. 8. 9. 10. 11. Paris 1882.
- Bulletin de la Société de Géographie commerciale de Bordeaux.* Année IX. Sér. II. N. 7. 8. 10. 11. 12. Bordeaux 1882.
- Bulletin de l'Académie de Médecine.* Sér. II. T. XI. N. 14—20. 22—25. Paris 1882.
- Polybiblion. — Revue bibliographique universelle.* Part. litt. Sér. II. T. XV. Livr. 4. 5. 6. — Part. techn. Ser. II. T. VIII. Livr. 1—5. Paris 1882.
- Revue scientifique de la France et de l'étranger.* Sér. III. Sem. 1. T. 29. No. 13—25. Paris 1882. 4.
- Bulletin de l'Union géographique du Nord de la France.* Année II. N. 17. 18b. Année III. N. 19—22. Douai 1881. 1882.
- La Médecine contemporaine.* Année 23. N. 12. Paris 1882.
- MOIGNO, *Actualités scientifiques.* Sér. II. N. 50. Paris 1880.
- G. PERROT & CH. CHAPIEZ, *Histoire de l'art dans l'antiquité. T. I. L'Egypte.* Sér. V. Livr. 41—50. Sér. VI. Livr. 51—60. Paris 1882.
- VIVIEN DE SAINT-MARTIN, *nouveau Dictionnaire de Géographie universelle.* Fasc. 18. Paris 1882. 4.
- J. CARVALHO, *loi des nombres premiers.* 1881. Extr.
- A. DE TILLO, *Notice sur le Congrès des Géographes allemands à Halle (12—14. avril 1882).* Paris.
- C. SCHOEDEL, *Mémoire sur les origines de l'écriture alphabétique. s. l. e. a.* Extr.

(14)

- Atti della R. Accademia dei Lincei Anno CCLXXIX. — 1881 — 1882.* Serie III. Transunti. Vol. VI. Fasc. 9. 10. 12. Roma 1882. 4.
- Atti dell' Accademia Pontificia dei Nuovi Lincei.* Anno XXXIV. Sess. IV. V. 1881. Roma 1881. 4.
- Accademia Pontificia dei nuovi Lincei.* Anno XXXV. Sess. IV. V. Roma 1882.
- Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino.* Vol. XVII., disp. 2—5. Torino 1882.
- Atti della Società Veneto-Trentina di Scienze naturali residente in Padova.* Vol. VII. Fasc. II. Anno 1881. Padova 1882.
- Bullettino della Società Veneto-Trentina di Scienze naturali.* T. II. N. 2. Padova 1882.
- Atti della Società di Scienze naturali. Processi verbali.* Vol. III. pag. 29—91. 1882.
- Bollettino della Società Geografica italiana.* Ser. II. Vol. VII. 1882. fasc. 3. Roma 1882.
- B. BONCOMPAGNI, *Bullettino di Bibliografia e di Storia delle Scienze matematiche e fisiche.* T. XIV. Maggio, Giugno, Luglio 1881. Roma 1881. 4.
- Bullettino di Archeologia cristiana.* Ser. III. N. II. III. IV. Roma 1881.
- Giornale della Società di Letture e Conversazioni scientifiche di Genova.* Anno VI. fasc. III. Genova 1882.
- Giornale della Società di Letterature e Conversazioni scientifiche di Genova.* Anno VI. fasc. I. II. Genova 1882.
- Résolutions votées par le Congrès géologique international.* 2^e. Session — Bologne 1881.
- Bollettino della Società Adriatica di Scienze naturali in Trieste.* Vol. VII. Trieste 1882.
- Pubblicazioni del Reale Osservatorio di Brera in Milano.* N. XX. Milano 1882. 4.
- Osservazioni meteorologiche eseguite nella R. Specola di Brera da P. FRISIANI e da E. PINI.* Anno 1881. Milano. 4.
- G. V. SCHIAPARELLI, *Osservazioni astronomiche e fisiche sull' asse di rotazione e sulla topografia del pianeta Marte.* Mem. seconda. Roma 1881. 4. Sep. Abdr.
- —, *Osservazioni sulla topografia del pianeta Marte a Milano coll' equatoriale durante l'opposizione 1881—1882.* Roma 1882. 4. Estr.
- G. MARTA, *Origine della famiglia Marta.* Venezia 1873. Estr.
- F. BETTONI, *la Nobiltà Bresciana.* Brescia 1882. Estr.
- A. TODARO, *Hortus botanicus Panormitanus.* T. II. Fasc. 2. Panormi 1879. Fol.
- G. KREITNER, *Report of the third International Geographical Congress.* Venice 1881.
- A. GHERARDI, *Statuti della Università studio Fiorentino dell' anno MCCCCLXXXVII. (Documenti di storia italiana.)* Firenze 1881. 4.
- SPIRIDIONE DE' MEDICI DILOTTI, *I dialetti greci ed il neo-Ellenismo.* Palermo 1876. Sep. Abdr.
- —, *Causa mossa dai verbi ἔρχουαι e πέρχω all' anomalia ed irregolarità . . .* Corfu 1882.
- Mémoires de l'Académie Imp. des Sciences de St. Pétersbourg.* Sér. VII. T. XXX. N. 1. 2. St. Pétersbourg 1881. 1882. 4.
- Bulletin de l'Académie Imp. des Sciences de St. Petersbourg.* T. XXVIII. N. 1. St. Pétersbourg 1882. 4.
- Mélanges biologiques, tirés du bulletin de l'Académie Imp. des Sciences de St. Petersbourg.* T. XI. Livr. 2. 3. 4. St. Pétersbourg 1881. 1882.
- Sitzungsberichte der Naturforscher-Gesellschaft bei der Universität Dorpat.* Bd. VI. Heft 1. 1881. Dorpat 1882.
- Archiv für die Naturkunde Liv-, Esth- und Kurlands.* Serie II. Bd. IX. Lief. 3. 4. Dorpat 1881.
- Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou.* Année 1881. N. 3. Moscou 1882.

- Nachrichten der mit der Moskauer Universität vereinigten K. Gesellschaft der Freunde der Naturgeschichte, Anthropologie und Ethnographie.* Th. 34 Heft 2, Th 35, Abth. I. Heft 4, Th. 37, Suppl. II. Th. 41, Heft 1. Th. 42. Moskau 1880. 1881. 1882. 4. (Russ.)
- TH. BREDICHIN, *Annales de l'Observatoire de Moscou.* Vol. VIII. Livr. 1. Moscou 1882. 4.
- E. R. v. TRAUTVETTER, E. L. REGEL, C. J. MAXIMOWICZ, K. J. WINKLER, *Decas plantarum novarum.* Petropoli 1882. 4. Sep. Abdr.
- Notiser ur Sällskapet Pro Fauna et Flora Fennica Förhandlingar.* N. S. Häft 5. Helsingfors 1882.
- K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Månadsblad.* Årg. 9. 10. 1880. 1881. Stockholm 1881. 1882.
- Bihang till Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar.* Bd. VI. Häfte 1. Stockholm 1880—1882.
- Anglosachsiska Mynt. Ordnade och beskrifna af* BROR EMIL HILDEBRAND. *I. Svenska Kongl. Myntkabinettet.* N. Upplaga. Stockholm 1881.
- H. HILDEBRAND HILDEBRANDSSON, *Bulletin mensuel de l'Observatoire météorologique de l'Université d'Upsal.* Vol. XIII. Année 1881. Upsal 1881—82. 4.
- Översigt over det K. Danske Videnskabernes Selskabs Forhandling og dets Medlemmers Arbejder i Aaret 1881.* N. 3. 188. 2. N. 1. Kjöbenhavn.
- Mémoires de l'Académie Royale de Copenhague.* Sér. VI. Classe des Sciences. Vol. I. N. 5. Kjöbenhavn 1881. 4.
- JAN KOPS & F. W. EEDEN, *Flora Batava.* Afl. 253. 254. 255. 256. Leyden. 4.
- Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.* Deel XLIII. Leiden 1882.
- Annales du Jardin botanique de Buitenzorg, publ. par* M. TREUB. Vol. III. P. I. Leide 1882.
- Bijdragen tot de Taal-Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie.* Volg. IV. Deel V. St. 3. 'SGravenhage 1881.
- Regenwaarnemingen in Nederlandsch Indie.* Jaarg. 3 1881. door P. A. BERGSMAN. Batavia. 1882.
- Observations made at the Magnetical and Meteorological Observatory at Batavia.* Vol. V. Batavia 1882. Fol.
- Publications de la Section historique de l'Institut R. G. D. de Luxembourg.* Année 1881. XXXV (XIII). Luxembourg 1882.
- Bulletin de l'Académie Royale des Sciences de Belgique.* Année 51. Sér. III. T. 3. N. 1—4. Bruxelles 1882.
- Commission Royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de la Belgique. — Procès-verbaux des séances.* Vol. VI. Cah. VIII. Bruxelles 1882.
- Procès-verbaux des séances de la Société Royale malacologique de Belgique.* T. XI. Année 1882. Bruxelles.
- Annales de la Société entomologique de Belgique.* T. 25. Bruxelles 1881.
- M. CH. MONTIGNY, *nouvelles observations sur les effets de la foudre sur des arbres placés près d'un fil télégraphique.* Bruxelles 1882. Extr.
- A. DUMONT, *Mémoires sur les terrains crétacés et tertiaires, éd. par* M. MOURLON (*Musée R. d'histoire naturelle de Belgique*). T. 1. 2. 3. 4. Bruxelles 1878—1882.
- E. DUPONT, *sur l'origine des calcaires devoniens de la Belgique.* Bruxelles. Extr.

(16)

M. G. DEWALQUE, *sur l'origine des Calcaires devoniens de la Belgique*. Bruxelles 1882.
M. J. PLATEAU, *une petite illusion*. Bruxelles 1882. Extr.

Mittheilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern aus dem Jahre 1881. Heft II. N. 1018—1029. Bern 1882.

Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft in Aarau 1881. 64. Jahresversammlung. Jahresbericht 1880/81. Aarau 1881.

Archives des Sciences physiques et naturelles. Sept. 1881. Genève 1881.

Mémoires de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève. T. XXVII. p. 2. Genève 1882. 4.

Beiträge zur geologischen Karte der Schweiz. Lief. 23 nebst Karte. Bern 1881. 4. und 1 Bl. Fol.

Bulletin de la Société Vaudoise des sciences naturelles. Sér. II. Vol. XVIII. N. 87. Lausanne 1882.

Schweizerische meteorologische Beobachtungen. Jahrg. XVIII. 1881. Lief. 1. 2. 3. 4. Zürich. 4.

R. WOLF, *Astronomische Mittheilungen*. LV. April 1882.

D. PEDRO DE MADRAZO, *Résumen de los acuerdos y tareas de la Real Academia de la Historia*. 1879—1880, 1880—1882. Madrid 1880. 1882.

Revista Euskara. Año V. N. 1. 2. 46. 47. Pamplona 1882.

Bulletin de Correspondance Hellénique. Année VI. Athènes et Paris.

Πράξεις τῆς ἐν Ἀθήναις ἀρχαιολογικῆς ἐταιρείας ἀπὸ Ἰανουαρίου 1881 μέχρι Ἰανουαρίου 1882 ἐν Ἀθήναις 1882.

Analele Academiei Romane. Ser. II. T. III. Sect. I. Bucuresci 1882. 4.

Observations météorologiques faites à Braila, pendant les années 1879 et 1880. Bucuresci 1882. 4.

Memoirs of the American Academy of Arts and Sciences. Centennial Volume. Vol. XI. P. 1. Cambridge 1882. 4.

Archaeological Institute of America. — *Third annual report of the Executive Committee, on the American School of classical studies at Athens 1881—82*. Cambridge 1882.

The American Journal of Science. Ser. III. Vol. XXIII. N. 136. April 1882. N. 137. May 1882. N. 138. Juni 1882. New Haven 1882.

Journal of the American Oriental Society. Vol. XI. N. 1. New Haven 1882.

American Journal of Mathematics. Vol. IV. N. 2. 3. Baltimore 1881. 4.

Bulletin of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College in Cambridge. Vol. IX. N. 6. 7. 8. Cambridge 1882.

The Journal of the Cincinnati Society of Natural History. Vol. V. N. 1. Cincinnati 1882.

Iowa Weather Bulletin for October & November 1881. N. 101. 102. Central Station, I. W. S. 1881.

Report of the Iowa Weather Service for the months of May—Dec. 1879. Jan.—April 1881. By Dr. G. HINRICHS. Des Moines, Iowa, 1880. 1881.

The American Journal of Otology. Vol. IV. N. 2. Boston 1882.

A. S. PACKARDY, *Notes on the early larval stages of the fiddler Crab, and of Alpheus*. Washington 1881. Extr.

— —, *On a Cray-fish from the Lower Tertiary Beds of Western Wyoming*. Washington 1881. Extr.


1882.
XXVII.

SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

8. Juni. Sitzung der philosophisch-historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. CURTIUS.

Hr. WATTENBACH las: Beiträge zur Geschichte der Mark
Brandenburg aus Handschriften der Königlichen Bibliothek.
Die Mittheilung folgt umstehend.



Beiträge zur Geschichte der Mark Brandenburg aus Handschriften der Königlichen Bibliothek.

Von W. WATTENBACH.

Wie wenig es möglich ist, dafs der werthvolle Inhalt einer Handschriftensammlung genügend ausgebeutet wird, wenn nicht genaue Verzeichnisse derselben veröffentlicht sind, das ist mir recht deutlich entgegengetreten, nachdem ich es übernommen habe, eine Beschreibung der lateinischen Handschriften der hiesigen Königlichen Bibliothek auszuarbeiten. Es sind natürlich nicht gerade grosse Entdeckungen zu machen; die vorhandenen handschriftlichen Verzeichnisse und für Geschichte des Mittelalters der von BETHMANN in Pertz' Archiv VIII, 823—855 mitgetheilte Auszug haben die wichtigeren Handschriften hinlänglich bekannt gemacht. Aber mancherlei, was doch auch nicht ohne Bedeutung ist, entzieht sich der Beachtung, wenn die Bände nicht einzeln genau gemustert werden, und so bin ich jetzt auf eine Gruppe von Handschriften aufmerksam geworden, welche aus dem alten Bisthum Brandenburg stammen, als solche aber nach den vorliegenden Angaben nicht zu erkennen waren, und daher für die Geschichte fast ganz unbenutzt geblieben sind, obgleich sie für das 15. Jahrhundert eine recht reiche Ausbeute darbieten.

Die Geschichte des Hochstifts Brandenburg hat mit grosser Sorgfalt PHILIPP WILHELM GERCKEN beschrieben (1766 qu.) und dazu die Urkunden des Archivs benutzt, auch viele derselben abdrucken lassen, welche in RIEDEL's Codex diplomaticus Brandenburgensis wiederholt sind. Die Urkunden aber, welche in den Archiven aufbewahrt wurden, sind weit entfernt, eine irgend genügende Anschauung der Vergangenheit zu gewähren, und man forscht daher jetzt mit grossem Eifer nach den anderen Schriftstücken, Correspondenzen, Mandaten u. dgl., welche als nur von vorübergehendem Werth nicht ins Archiv, sondern nur in die Registratur aufgenommen wurden, und nur in besonderen Glücksfällen auf unsere Zeit gekommen sind. Um so wichtiger aber sind für uns die Hülfsbücher der Kanzleien, in welchen solche

Schriftstücke als Muster zusammengestellt wurden, und welche, wie z. B. die kürzlich von TADRA veröffentlichte *Cancellaria Arnesti archiepiscopi Pragensis*, das ganze Geschäftswesen vollständig übersehen lassen. Für die Brauchbarkeit der einzelnen Stücke als geschichtlicher Documente kommt es dann wesentlich darauf an, wie viel von dem speciellen Inhalt belassen ist oder wie weit man das vorliegende Actenstück in die Gestalt einer abstracten Formel gebracht hat. Immer aber ist es schon ein nicht gering anzuschlagendes Zeugniß für die Ordnung des Geschäftsganges, wenn überhaupt eine solche Arbeit unternommen wurde.

Was mir nun von Material dieser Art sich darbot, enthalten die Handschriften Lat. fol.

- (A) 169, ein Miscellanband, welcher am Schluss f. 210—235 ein ursprünglich besonders foliirtes Convolut von Urkunden und Formeln, meistens aus der Zeit des Bischofs HENNING VON BREDOW (1407—1413), enthält. Gercken hat die Handschrift, welche schon damals der Königlichen Bibliothek gehörte, benutzt, aber nur wenige Stücke daraus entnommen.
- (B) 170, eine von dem Notar Henning Silen angelegte Sammlung kanonistischen Inhalts, welche auf Bl. 249—287 eine sehr reichhaltige Formelsammlung enthält, die größtentheils aus Acten des Brandenburger Officialats geschöpft ist. Die Sammlung fällt in die Zeit des Bischofs STEPHAN BODEKER (1422—1459), greift aber bis in den Anfang des Jahrhunderts zurück.

Ausserdem sind noch in einigen Handschriften zerstreute Documente enthalten.

Indem ich die Hoffnung ausspreche, daß einige für jene Zeiten charakteristische Mittheilungen aus diesem Material nicht unwillkommen sein werden, bemerke ich, daß ich mich auf Auszüge beschränke, weil, dem Zweck der Sammler entsprechend, in der Regel die in jener Zeit schon sehr umständlichen Formalien vollständig gegeben sind, die Daten dagegen und die meisten Namen fortgelassen; die ausgehobenen Stücke aber gebe ich im ursprünglichen Wortlaut. Der Text ist meistens sehr correct, ganz augenfällige Fehler von geringer Bedeutung, wie sie hin und wieder vorkommen, habe ich stillschweigend verbessert.

Das älteste Actenstück, welches mir vorgekommen ist, gehört in die Zeit des Bischofs DIETRICH VON SCHULENBURG, der von allen Brandenburger Bischöfen am längsten sein Amt bekleidet hat, von 1349 bis 1393. Sein Anfang fiel in die unruhvolle Zeit des falschen Waldemar, und auch nach dessen Beseitigung wurde der Zustand noch nicht viel besser, namentlich nach Karls IV. Tod wieder ein

ganz anarchischer. Unsere Urkunde zeigt uns ein Beispiel der gewaltsamen Selbsthülfe, welche damals üblich war. Der Pfarrer in Rottstock in der Mittelmark war gestorben, einer Kirche, deren Patronat dem Herzog von Sachsen-Lüneburg gehörte, und nun machten sich Hermann Gertz, Vogt zu Belzig, und der Junker (armiger) Arnold von Ziesar mit einem grossen Aufgebot von Bauern der umliegenden Dörfer auf und raubten das Pfarrhaus sammt der Kirche aus. Anlaß dazu gab der von den Patronen damals erhobene Anspruch auf den Nachlaß verstorbener Pfarrer.

In Folge dieser Gewaltthat wurden die betheiligten Personen vorgeladen von dem durch den Bischof von Brandenburg eingesetzten Executor der Statuten des Provinzialconcils, zu deren Aufrechthaltung zum Schutz gegen Raub und Gewaltthat der Bischof sich dem Erzbischof von Magdeburg verpflichtet hatte.¹⁾ Dieser Executor war, wie es scheint (denn der Eingang des Mandats ist abgeschnitten), der Pfarrer der Katharinenkirche in der Neustadt Brandenburg. Da alle Vorladungen erfolglos blieben, wurde gegen alle betheiligten Personen der Kirchenbann verhängt und alle betreffenden Pfarrer bei Strafe des Bannes beauftragt, denselben den verurteilten Personen bekannt zu machen und in ihren Kirchen Sonntags bei der Messe zu verkündigen.

Wie weit dieses Mandat (vom 10. September 1376) befolgt worden ist, wissen wir nicht; dergleichen Aufträge waren für die armen Dorfpfarrer nicht nur unangenehm, sondern auch gefährlich, und in vielen Fällen ähnlicher Art hat die Furcht vor materieller Gewaltthat die Oberhand gewonnen. Half auch ein solcher Bannfluch nicht, so folgte die Verhängung des Interdicts für alle Orte, wo die Gebannten sich aufhalten würden. Das Mittel war gewiß nicht unwirksam, aber verhärtete Sünder trotzten auch ihm. Wir werden auch später in einer Klage des Havelberger Clerus gegen seinen Bischof den Vorwurf finden, daß er den Kirchen durch unvernünftigen Zwang zur Beobachtung des Interdicts vielen Schaden zufüge, selbst aber in seinen Kirchen es nicht beobachte. Da nun die kirchlichen Mittel weiter nicht reichten, so sollte man denken, daß sie in diesem Umfang nur im äußersten Falle angewandt wären, allein das ist durchaus nicht der Fall: schon bei bloßen Zahlungsrückständen wird der Bann als gewöhnliches Rechtsmittel gebraucht, und er hat natürlicher Weise dadurch sehr viel von seiner ursprünglichen Furchtbarkeit verloren.

In dem vorliegenden Falle kennen wir den weiteren Verlauf der Sache durch einen Schiedsspruch vom 14. Februar 1377 (Riedel I. 8, 311),

¹⁾ 1364, bei Riedel I. 8. 285.

welcher diesen und einen ganz ähnlichen Fall in Wittenberg schlichtete. Der Raub soll allerdings zurück erstattet werden, von der in obigem Mandat geforderten Genugthuung aber ist keine Rede. Vielmehr muß der Bischof seinen Pfarrer aufgeben. Er hat in seinen Synodalstatuten von 1380 c. 17 verordnet, oder vielmehr nur eine Satzung der Provinzialstatuten eingeschränkt:

Prohibeantur ecclesiarum prelati et alii quilibet se intromittere de bonis et rebus decedentium clericorum. Alioquin ea vice presentacione sint privati et ad episcopum loci juxta provinciale statutum eo tempore devolvatur. (Gereken's Stiftshistorie S. 621. Daraus Riedel I, 8, 327.)

Nach diesem Grundsatz war er auch jetzt verfahren und hatte den in dem Mandat schon genannten Konrad Palmedach eingesetzt, allein nach dem Schiedspruch soll dieser die Pfarre auflassen und der Bischof sie dem verleihen, welchen der Herzog präsentiren wird.

Allerdings werden ähnliche Gewaltthätigkeiten den Herzogen und ihren Vögten für die Zukunft verboten, aber die bischöfliche Autorität kann durch diese Vorgänge nicht gewonnen haben.

Bisher war nur dieser Schiedspruch bekannt; dergleichen Urkunden wurden im Archiv verwahrt. Aber auf das dadurch erledigte Mandat hat man keinen Werth gelegt, während vom geschichtlichen Standpunkte gerade Schriftstücke dieser Art von vorzüglichem Werthe sind, weil sie, wie auch in dem hier vorliegenden Falle, die genaueren Umstände erst zu unserer Kenntniss bringen. Zufälliger Weise hatte das zuerst ausgefertigte Exemplar einige Mängel, welche durch Zusätze am Rande beseitigt sind; im Abdruck sind diese durch eckige Klammern bezeichnet. Das dadurch unbrauchbar gewordene Pergamentblatt ist verwandt worden, um es auf den Hinterdeckel einer Handschrift (Lat. f. 173) zu kleben, deren kanonistischer Inhalt auf Beziehungen zum Officialat hinweist. Oben und am Rande rechts wurde bei dieser Benutzung ein Streifen abgeschnitten; dabei ging der Anfang der ersten Zeile verloren und ein nicht bedeutender, auch wohl nicht immer gleich großer Raum am Ende einer jeden Zeile; dieser ist im Abdruck durch runde Klammern bezeichnet. Einige Beschädigungen haben ausserdem einzelne Worte unlesbar gemacht. Ich lasse die Urkunde hier folgen:

..... ecclesia parrochiali beate Katherine
virginis in nova Civitate Brand. executor statutorum provincialium
sacri co(ncilii) vicarius(?) a Rev. in Christo patre et domino, domino
Theod. Episcopo Brand. per Civitatem et dioc. Brand. deputatus,

Honorabilibus et discretis viris (in)torp¹, Mordicz, Grabow, Lotde, Tyczow, Kulbas, Jezerik prope Brýssen, in Werbeke et Lüderstorp magna, ecclesiarum parrochialium presbiteris (.) eorum vices gerentibus, necnon capellanis et altaristis in Belcz. ac aliis quibuscunque divinorum Rectoribus Civitatis et dioc. Brand. ad quos presentes per (venerint) Sinceram in domino caritatem.

Quia Hermannus Ghertz, Capitaneus seu advocatus in Beltz, et Arnoldus dictus de Sejeser armiger, (. . . .) Illustris principis domini Wenceslai, ducis Saxonie et Luneburg., patroni ecclesie in Rostok prope Brügghe Brand. dioc. necnon villani de torp, Mordicz, Grabow, Lotde, Tyczow, Kulbas, Jezerik prope Brýssen, in Werbeke et Lüderstorp magna, cum quibusdam (aliis) sibi in hac parte complicibus, domino . . pie memorie olim Rectore ejusdem ecclesie in Rostok noviter defuncto, Ecclesia adhuc va(cante) ecclesiam et dotem(?) in Rostok contra decreta statutorum provincialium spoliare presumpserunt, et de rebus mobilibus in ipsa ecclesia inventis se (. . .) easque violenter deduxerunt et absportaverunt, per nos certis termino et loco peremptorie citati, ad videndum et audien(dum) probari et declarari notorietatem super hujusmodi spoliacionis facto, et allegandum, dicendum et [legitime] probandum, quare ad penas statut(.) delicto juxta formam dictorum statutorum contra eos procedere non deberemus. Termino adveniente, ad requisicionem discreti viri Con(radi) Rectoris predictae ecclesie in Rostok per dominum nostrum Theodr. Episcopum Brand. predictum juxta decretum dictorum statutorum canonice (. . . .) prefatos Hermannum capitaneum seu advocatum in Belcz et Arnoldum de Sejeser armigerum Necnon predictarum villarum villan(os) singulos et eorum in hac parte complices non comparentes, eciam usque in crastinum expectatos, ipsorum et cujuslibet alterius eorum, ex (. . .) auctoritate qua fungimur et presentibus reputamus contumaces, et in penam hujusmodi eorum contumacie fore proc(.) et presentibus declaramus, Testibus pro parte predicti Conradi Palmesdach productis, receptis et juratis ac diligen(ter) eorum attestacionibus publicatis et aliis super notorietate necessariis, predictos Hermannum Gercz et Arnoldum de Sejeser (et dictos) villanos, necnon ipsorum in hac parte complices, et quemlibet eorum [quos dictum spoliū et ipsarum rerum deduccionem et

¹⁾ An beiden Stellen ist der Anfang nicht zu lesen; die übrigen Orte sind Mörz, Grabau, Lütze, Tiezow, Kulbatz, Jezerig, Trenenbrietzen, Werbeken, Lüdersdorf, Belzig, Rottstock, Brück, Ziesar.

asportacionem invenimus notorie perpetrasse] tamquam presumptuosos et notorios spoliatores et ab(sportatores) in penam in dictis provincialibus statutis contentam et expressam incidisse, atque contra ipsos et quemlibet eorum tamquam contra (pre)sumptuosos spoliatores et absportatores procedendum fore, necnon ipsam spoliacionem et rerum mobilium in dote pre(dicta) abductionem fore notorias [et quod de eis publica vox est et fama in locis ubi perpetratae sunt et in locis ibidem vicinis] declaravimus et presentibus declaramus in hiis scriptis. Nos igitur vobis omnibus et sin(gulis ad quos) noticia presencium pervenerit quocumque relatu, predicta auctoritate qua fungimur, sub excommunicacionis pena, quam in vos et quemlib(et vestrum, sex) tamen dierum canonica monicione premissa, in dei nomine ferimus in hiis scriptis, si hujusmodi nostrum mandatum ad mi(.) seu neglexeritis cum effectu adimplere, districte precipiendo mandamus, quatenus vos aut alter vestrum, conjunctim (aut singuli ac)cedatis, quo propter hoc fuerit accedendum, et Hermannum Ghertz ac Arnoldum de Sejeser predictos, necnon vil(larum predictarum) villanos, ac ipsorum quemlibet, sub competenti testimonio vice nostra moneatis, quos et nos presentibus sic monemus (ut infra decem) et octo dies a recepcione presencium continuos, quorum sex primos pro prima, alios sex pro secunda, et reliquos sex ultim(os pro tercia) et canonica monicione ac peremptorio termino ipsis et cuilibet eorum ad subsequencia prefigimus, dicto Conrado Palmeda(ch presbitero) Ecclesie parochialis sepedicte, res spoliatas seu eorum estimacionem restituant, ac de dampnis injuriis et interesse sa(tisfaciant) cum effectu. Alioquin sepedictos Hermannum Ghertz et Arnoldum Sejeser ac predictarum villarum villanos quos exc(ommunicavimus) et exnunc ut extunc in dei nomine excommunicamus in hiis scriptis, singulis diebus dominicis in ecclesiis vestris an(.) infra missarum sollempnia, hora consueta, excommunicatos publice nuncietis coram plebe, donec aliud in hac par(te receperitis) in mandatis.

Reddatis litteram hanc, qui requisiti fueritis, sub appensis vestris sigillis in signum executionis.

Dat. (.) Anno domini Millesimo ccc^{mo} lxx^{mo} sex^o, feria quarta proxima post festum Nativitatis S. Marie virginis, nostri (.) presentibus appenso.

Sehr wenig ist aus der Zeit des Bischofs HEINRICH VON BODENDICK (1395—1406) bekannt, doch können wir aus dem oben erwähnten alten Formelbuch des Stifts (B) einige Documente beibringen, welche

die Fortdauer des höchst unsicheren Zustandes und das Vorkommen arger Gewaltthätigkeit zeigen. Sie sind glücklicher Weise mit den Namen und Jahreszahlen darin aufgenommen (f. 262).

Vor dem bischöflichen Official erschien W. clericus Verdensis als Procurator des Herrn Cunrad, Pfarrers in Berghe (der Name kommt an verschiedenen Orten der Mark vor) und klagte:

quod nuper de Anno domini M^occcc^o.j^o. Mensis Octobris, ipso die b. Kalixti (Oct. 14) predictus Martinus (Hakenberg, armiger, ist er vorher genannt) cum suis in hac parte conplicibus ausu sacrilego, dei timore postposito, contra deum et justiciam et ecclesiasticam libertatem, dotem seu habitationem dicti domini Cunradi in dicta Berghe hostiliter armata manu invasit; ibique pecora sua, videlicet sex equos, xij jumenta, xx porcos etc. et alias res et utensilia domus ibi repertas ausu temerario spoliaverunt et in spoliis (sic) abduxerunt, ac horreum suum fructibus plenum conbuserunt Et deinde Anno domini M^occcc^o ij^o Mense Aug. ipsa die decollacionis sancti Joh. Bapt. (Aug. 29) idem Martinus Hakenberg cum suis in hac parte conplicibus ipsum dictum dominum Cunradum quattuor equos et duas vaccas contra deum et justiciam, ut premittitur, rapientes depredarunt.

Der Pfarrer schätzt seinen Schaden auf hundert Schock böhmischer Groschen 'pro quibus hujusmodi injurias rapinas incendia et dampna pati nollet nec sustineret, set potius si haberet commode tantum dare' ein Zusatz, der sich in ähnlichen Fällen überall findet. Er bittet deshalb, den Thäter für verfallen in die Strafen der Magdeburger Provinzial- und Brandenburger Synodalstatuten zu erklären, und zur Zahlung der hundert Schock zu verdammen und durch Kirchenstrafen dazu anzuhalten.

Was daraus geworden ist, erfahren wir nicht, es folgt aber sogleich eine zweite ähnliche Klage von dem Procurator des Pfarrers Johann Luderstorpp in Grunow gegen eine nicht näher bezeichnete Elisabeth, welche den Pfarrer noch obendrein arg beschimpft hatte:

quod de Anno domini M^occcc^o iij^o proximo preterito circa festum b. Bartholomei (Aug. 24) predicta Elisabeth rea ausu sacrilego, dei timore postposito, contra ecclesiasticam et ecclesiasticarum personarum libertatem domum seu habitationem dicti domini Johannis eo absente violenter animo injuriandi intravit, ibique dimidium chorum avene, quem tunc temporis in valore dimidie Sexagene gr. boh. estimavit fuisse et estimat, et unum porcum, quem ad tres florenos renenses et ultra estimavit in valore fuisse tunc temporis, inibi repertum ausu temerario contra deum et justiciam rapuit et rapiendo abduxit. Quibus ut pre-

mittitur non contenta ipsa predicta Elisabeth, mala malis accumulando, de Anno domini M° etc. in vigilia Symonis et Jude Apostolorum (Oct. 27) contra predictum dominum Johannem maximis insultacionibus et clamoribus et in hec verba vel eis in effectum similia, licet tamen mendose et contra veritatem prorupit, dicens injuriose ipsum filium meretricis, vulgarisando ut verbis suis utar: 'Gy synt eyn kotezen sealk eyn stayer eyn koppe setter vnde noch vele erger', pluribus fide dignis audientibus.

Dieser Pfarrer schätzt seinen Schaden auf vierzig Rheinische Gulden, möchte aber ebenfalls lieber eben so viel von seiner Habe verlieren, als solche Gewalt und Beschimpfung erdulden. Kurz vorher stehen in derselben Sammlung (fol. 260^b) Formen für Zeugenaussagen (Quedam forme posicionum), welche wir auch hierher ziehen dürfen.

Vor dem Brandenburger Official fordert der Procurator des Clerikers Johannes Osterraden, cler. Brand. die Beantwortung gewisser Klagepunkte, welche er alle zu beweisen erbötig ist, durch Joh. Schulten, Bürger in Treuenbrietzen (opidanum in Britezen), nämlich 1) dafs sein Client eines guten Rufes sich erfreut, 2) dafs er Cleriker ist und sich immer ehrbar gekleidet und gehalten hat, 3) der eigentliche Klagepunkt:

quod de Anno domini etc. circa festum b. Laur. sepedicto Johanni in publica platea dicta dy Steynstrate pacifice constituto prefatus N. in hac causa reus animo injuriandi temere et presumptuose ipsum Johannem clericum invadens, nullis demeritis exigentibus, per crines ipsum accipiens et acriter ipsum trahendo ipsos evellens in non modicam lesionem offensam et ecclesiastice libertatis prejudicium palam et manifeste (das Verbum fehlt).

Item ponit quod multidictus N. non saciatus huius injuriis traccionibus, predicto Johanni, mala malis accumulando, crimen furti imposuit injuriose in hec verba vel eis in effectum similia, quod ei furatus esset duo lintheamina, videlicet lodicem et duos calceos, in quibus fuerunt grossi circa alteram dimidiam Sexagenam, repetendo ab eo clamorosis verbis multis audientibus tanquam a fure sua bona deperdita ut asserit, palam et manifeste.

Ferner dafs Johannes seinen Schaden auf 30 Rhein. Gulden schätzt und dafs die ganze Sache notorisch ist.

Fehlt es nun hier an jeder Zeitbestimmung, so führt uns in der folgenden die offenbar fehlerhafte Zahl 1306 auf das Jahr 1406. Hier klagt vor dem Official der Brandenburger Cleriker Mauricius Wentzlow gegen Hinrich Schulten und verlangt Antwort darauf, dafs 1. er guten Leumund habe. 2. clericus in majoribus ordinibus constitutus sei, die Tonsur und geistliche Kleidung trage, 3.

quod dictus Hinricus eo tempore quo infra ponitur, videlicet Anno domini currente M^occc^ovj^o feria secunda post Elisabeth, animo injuriandi eundem Mauricium actorem, nullo demerito exigente, cum magno baculo dorsum suum indecenter (?) et capud suum percussit, manus violentas in eum presumptuose iniciendo, in ecclesiastice libertatis et personarum ecclesiasticarum prejudicium et ejusdem Mauricij et persone sue non modicam lesionem et offensam.

Item quod predictus Hinricus, mala malis accumulando, sepe dictum actorem (et) suam famam bonam denigrando prorupit in hec verba vel eis in effectum similia, dicens eum injuriose esse filium meretricis,¹⁾ vulgarisando 'ga an cynen galgen' quam idem Mauricius de honestis parentibus originem (sic).

Schätzung 30 Gulden. Hier haben wir also eigentlich die Klageschriften, welche nur gleich so eingerichtet sind, daß auch die Zeugen über die angeführten Positionen verhört werden können. Was vielleicht diese zu Ungunsten der Kläger auszusagen gehabt haben mögen, wissen wir nicht; die öffentlichen Beleidigungen aber, welchen Cleriker ausgesetzt waren, und deren Bestrafung also nicht sehr gefürchtet zu sein scheint, treten uns auch in manchen anderen Stücken entgegen. Noch bedenklicher aber ist, daß gegen eine vom Bischof verlangte Bede sein eigener Clerus sich sehr nachdrücklich auflehnte, und in einer Appellationsschrift das ungünstigste Bild von der Verwaltung des Bischofs entwarf. Diese Schrift, welche aus A. f. 225 von Gereken (S. 642, daraus Riedel I, VIII, 380) aufgenommen ist, hat zu der Überschrift 'Appellacio contra Subsidium caritativum exigendum' den wenig späteren Zusatz 'per iniquitatis filium quendam episcopum'. Es war die traurige Zeit des Markgrafen Jobst, eine Zeit äußerster Schwäche der Regierung und völliger Zuchtlosigkeit des Strauchritterthums, wie sie uns ENGELBERT WUSTERWITZ geschildert hat, und deshalb dürfen wir uns auch nicht wundern, daß gleich darauf eine ganz ähnliche Schrift gegen den Havelberger Bischof folgt, dem noch weit ärgere Dinge nachgesagt werden. Es ist ein Notariats-Instrument über die Appellation an den Papst, ausgestellt für den Clerus der Probstei von Havelberg, der alle Kollegen im ganzen Sprengel zum Anschluß auffordert. Die Schilderung des mannigfaltigsten Mißbrauchs der Amtsgewalt ist zu merkwürdig, als daß wir sie übergehen dürften, wenngleich der Umfang etwas beträchtlicher ist. Der Clerus also, dessen genauere Bezeichnung am Eingang mit dem Datum fortgelassen ist, klagt, daß der jetzige Bischof

¹⁾ Auffallend ist, daß in beiden Fällen diese lateinisch ausgedrückte Injurie den deutschen Wörtern nicht entspricht.

inconsueta et indiscreta onera, nullo jure admissa, ymmo potius vetita, in non modicum ecclesiarum ecclesiasticarumque personarum, eciam et prefate prepositure prejudicium olim in curia Havelbergensi inducta, ac gravius cum ipse ejusdem curie officialis foret superinducta et dilatata, non minuere nec restringere nititur, verum magis ampliare, suosque per curiales hactenus sinebat sinitque ampliari, Ita quod jam ad beneficia ecclesiastica, precipue curam animarum habencia, canonice presentati raro sine immoderate et indebite pecunie exactione et extorsione pro Institutionum litteris instituuntur, pro cujus exactionis colore inconsueta registra minus juste conficta et confecta allegantur. Nec beneficiorum permutationes de causis de jure admissibilibus absque pecunie questu admittuntur, Nec presbiteris, maxime ecclesiarum rectoribus egrotantibus more solito providetur, Nec id obnixius petentibus ydonei coadjutores deputantur, Nec absencie a beneficiis ecclesiasticis justis et probabilibus ex causis conceduntur, exactionesque immoderate pro crismatis et olei perceptione eciam ultra rationabilem operarum pensacionem fieri permittuntur: Non attendens quod Episcopi nichil de jure petere a subditis debeant, nisi per canones illud sibi debitum esse ostendant, quodque in hiis prescribere nequeant, que contra jus commune usurpant, secundum canonica documenta. Et quod lamentabilius est, ecclesiasticorum beneficiorum et injurie varie ac notorie invasiones irrecuperabilesque desolaciones necnon ecclesiasticarum personarum inopie, mendicaciones ac impertinentes sustentaciones ab eo et suis conniventibus obtutibus dissimulantur.

In cujus eciam curia mendosi detractores mendaciorumque suggestores attentius quicquid omnino (animis?) quam veritatis relatores arduorumque negotiorum et impedimentorum sibi et beneficiis incumbencium expositores audiuntur.

Nec idem dominus noster gratanter trutinat, qualem sibi exuberantem subvencionem sue diocesis ecclesiastice persone, eciam religiose, debitorum ac paupertatum sarcinis pregravate, ad provisionis et consecracionis sue impensas nuper exhibentes immoderatum, inconsuetum, inolitum ac minus caritativum subsidium ultra decimam ad octavam extensum contra jura ac felicis recordacionis Benedicti pape xxij constitutionem censuris ecclesiasticis compulsi expagaverunt. Insuper impietates impietatibus accumulans accumularique sinens, anno presenti permisit et permittit, nomine suo factum ratum habuit et ratihabet, quod Curie sue Officiales, plures pauperes presbiteros ullos (ullorum?) eciam victuum et vestituum notorie expertes, ad loca et castra campestria, in quibus

jura hactenus reddi non solebant ac causas judiciales agi oppido inconueniens est, ad eaque accessus, in quibus status, et a quibus recessus corporibus rebusque insecure evidenter existunt et discriminosi, ubi nec copia advocatorum, notariorum, testium, assessorum seu aliorum partibus reis et earum causis necessariorum, aut hospicia secunda et oportuna reperiuntur, per varias personas oretenus, sine litteris citatoriis causarumque expressione de quibus sic citati divinare nequeunt, aliasque minus canonice contra consuetum antiquum et laudabilem curie Havelbergensis, ymmo et aliorum iudiciorum ecclesiasticorum diocesis Havelbergensis statum citari mandavit et fecit. Nonnunquam in arduis etiam causis comparandi terminos vix ad unum diem naturalem, nonnunquam ad duos vel ad tres dies, viarum distantiis et discriminibus citatorumque incommodis minime pensatis, inhumaniter restringens, per consequens taliter citatis periculosiores consulendi sequae legitime defendendi quadam capciosa subtilitate auferens facultatem. Qui etiam viam (?) cum difficultate comparantes vix et raro ad presenciam ipsius Officialis, obyecciones ipsius audituri innocenciasque eorum allegaturi quibant pervenire. Set plures eorum causas citacionum per se aut medias personas ut plurimum laicas, cum clericorum copia desit, investigantes, non causas pro causis animosius reddens aut reddi faciens, inquit dominum suum et se pecunias eorum habere velle. Nonnunquam etiam turpes occasiones et improbabiles audens allegare, necnon hujusmodi sue injuste voluntati non acquiescentibus alios comparandi terminos, nimium etiam artatos, ad loca aliqua notorie vel evidenter minus secunda assignare presumebat, eosque multipliciter a laicis etiam parvorum statuum subsanari, exacerbari comminationibusque terreri permittens, eorum plures aleo per se et alios fastidians, ut ultra posse ac demeritorum exigenciam, nulla infamia previa, non confessi, non convicti, juris ordine non servato nec aliquo foro iudiciali ordinato, ac alias cum multiplici modi et forme excessu pecunias in terminis nimium artatis contra vires eorum promittere et exsolvere percussi sunt et percelluntur. Nonnulli vero salutari digni correccione, non socia caritate nec salutis sparso semine solum pecuniariter corriguntur, ac nichilominus in suis enormitatibus absque reformatione voluptari (sic) permittuntur, sicque salutaria statuta ad solius pecunie questum injustaque gravamina convertuntur, ac alia aguntur que canonum obviant institutis et de radice procedere videntur avaricie et cupiditatis.

Ceterum prefatus dominus noster decedencium clericorum, etiam administraciones non habencium, bona vel saltem eorum

partem, eciam beneficiorum suorum intuitu non acquisita, contra jura et laudabiles consuetudines hactenus in dioc. Havelb. servatas, nunc in beneficiorum vacancium et successorum in eisdem, nunc in heredum legittimorum, nunc in legativorum, nunc in creditorum prejudicia, nunc in ultimarum voluntatum coartamina et defraudamina, diversis quesitis coloribus nisus est et nititur usurpare, ymmo in nonnullis dioc. sue locis sibi soli usurpavit seque de futuris usurpacionibus inprovide jactavit atque jactat. Ex quibus laicis in clericos eorumque bona malignandi audacia prebetur clericalisque status nimium obfuscatur. Cum tamen redditus episcopales divino munere jam adeo pullularunt, precipue ex oblationibus que a xvj annis hactenus in villa Wilsnak provenere et inpresenciarum proveniunt, quod potius pii pastoris more clericis sue dioc. quam ipsi sibi, subveniret.

Insuper idem dominus noster intentis desideriis merito debens affectare subditas sibi ecclesias et ecclesiasticas personas locupletes habere et ab injustis exaccionibus et abstraccionibus liberas permanere, nichilominus earum invasores, spoliatores, depauperatores, ymmo et ecclesiarum possessionumque earum incendiarios nonnumquam procrastinare, ad opidum suum W. (Wittstock) et castra sua receptare, confovere ad mensam suam, de quo mage dolendum est ad divina admittere, quo jure nescitur, non veretur. In se non redarguens pro quo in alios rigorosius animadvertere non onittit. Et sic, heu heu! unde jura, defensiones et consolaciones surgere deberent, contra canonum et legum sanctiones, injurie, offensiones et merores quasi irrefragabiliter surrexerunt et nascuntur, et unde tribulacionibus involutis monita prodire deberent salutis, cumulacio prodit gravitatis. Insuper sepius prohibito quosdam beneficiatos et eorum vicesgerentes ad irrationabilem ymmo et injustam ecclesiaticorum interdictorum observacionem in ipsorum grave prejudicium, animarum periculum scandalumque plurimorum coartat, que per se equa vicissitudine minime servat nec in ecclesia sua aut aliis ecclesiis locorum ad mensam suam episcopalem spectantium servari facit. Ex quibus premissis prejudicia, injurie, incommoda, dampna non modica nobis provenere ac verisimiliter graviora provenient in futurum. Quibus variis aggravaminibus eciam totus Havelbergensis dioc. et Civitatis Clerus ecclesiasticeque persone vix bono modo, ymmo nullomodo, nisi speciali et exuberanti sancte sedis apostolice gracia subsidente et succurrente poterit refragari. Quia igitur de preteritis et presentibus ad futurum, de malis ad pejora presumatur, oportunum cautumque sit, ut futuris occurratur periculis, et non ab re pro notabili relatu habeatur:

Tunc tua res agitur, paries cum proximus ardet:

Timentes verisimiliter etc.

Mit dem Citat aus Horaz (Ep. I, 18, 84) hat die Beredsamkeit ihren Höhepunkt erreicht, der Schluss ist einfach geschäftsmässig; sie appelliren an die Römische Curie und den Papst, und verlangen apostolos.

Von diesen Verhältnissen war bis jetzt gar nichts bekannt; es ist aber geschichtlich nicht ohne Bedeutung, dass wir ein solches übles Verhältniss zwischen dem Bischof und seiner Geistlichkeit gerade im Havelberger Sprengel vorfinden, wo seit 1383 das angebliche Wunder der blutenden Hostien zu Wilsnack eine grosse Wallfahrt zu Stande gebracht hatte, während sehr angesehene kirchliche Persönlichkeiten sich vergeblich bemühten, dem von ihnen klar durchschauten Unfug ein Ende zu machen. Die Einträglichkeit der Wallfahrt wird auch hier erwähnt, man sieht aber auch, dass diese reichen Einkünfte in engem Kreise blieben. Vielleicht erklärt sich eben daraus die heftige Erbitterung. Die erwähnten sechzehn Jahre können nicht vom ersten Anfang an gerechnet sein, denn schon war OTTO VON ROHR Bischof (1401—1427), und hatte eine ansehnliche Beisteuer zu seiner Inthronisation erhalten. Eines längeren Zeitraumes, um ihn erst kennen zu lernen, bedurfte es jedoch nicht, denn er wird hier ausdrücklich als der frühere Official bezeichnet, und als solcher erscheint er schon 1385: eben in dieser Thätigkeit hatte er sich so verhasst gemacht, und man sah bald, dass er ein gleiches Verfahren auch als Bischof zu üben fortfuhr.

Wir wissen nun nicht, ob wirklich in Rom die Klage angebracht ist; wir wissen auch nicht, ob der übrige Clerus dem von der Probstei ausgehenden Angriff sich angeschlossen hat, und ob die Beschuldigungen begründet sind. Doch wird man schwerlich glauben können, dass diese so anschaulich ausgemalten Klagepunkte ganz aus der Luft gegriffen sind, und sicher bleibt immer eine sehr tiefgehende Erbitterung gegen den Bischof von Seiten mindestens eines ansehnlichen Theiles seines Clerus.

Derselbe Bischof Otto begegnet uns noch wieder in einem anderen Actenstück (B. f. 266). Er hatte von König Sigismund, der von ihm anticipando schon Kaiser genannt wird, einen jener so wenig willkommenen Aufträge erhalten, nämlich den Herzogen von Mecklenburg ein Citationsmandat zu insinuiren, und entschuldigt sich, da ihm die Ausführung nicht gelungen war, mit folgendem Schreiben:

Serenissimo ac invictissimo principi et domino, domino Sigismundo, Romanorum Imperatori semper augusto ac Ungarie etc. Regi, Otto miseratione divina Episcopus Ecclesie Havelbergensis, humilium munus oracionum.

Gloriosissime majestati vestre instanter aperire desidero, quod ab consecucionem amplioris (sic) vestre regie majestatis, licet senex et valitudinarius Castrum Wredenhagen in dioc. mea situm, ad illustres dominos, dominos Johannem et Albertum duces Magno-politanos, in litteris vestris regiis nominatim expressos, spectans, in quo eciam domicilium habent et larem foveant, personaliter accessi, Et ab Ebel Treskow Ketelhuth et aliis repertis in eodem castro existentibus et habitantibus, an predicti domini duces in predicto castro existerent inquisivi. Qui quidem illico responderunt et dixerunt, quod presentes in eodem castro non existerent. Quo audito protestacionem feci, quod per me non staret, quin litteras regias michi presentatas, in quibus predicti domini duces ad instanciam insignis domini, domini Baltasaris de Werse (l. Werle) ad comparandum in Curia Imperiali coram serenitate vestra quadragesima die ab insinuacione dictarum regiarum litterarum per me facta continue computando proxima citantur, duabus manibus eisdem dominis presentarem, si ipsorum presencias personaliter habere potuissem. Set quia non potui nec ad alia eorum castra michi tutus patet accessus, predictarum regiarum litterarum tenores prenominitis familiaribus dictorum dominorum ducum in eodem castro existentibus et ipsum inhabitantibus exposui, ipsisque ibidem existentibus sepedictas litteras realiter exhibui, qui tamen ipsas recipere recusaverunt. Quare easdem, facta prius dictorum familiarium super matura predictarum regiarum litterarum custodia, respectu et presentacione predictis dominis ducibus facienda requisicione diligenti, ibidem dimisi, Requirens notarium publicum infrascriptum, ut michi super hiis presentes litteras sua subscriptione publicaret, unumque vel plura publicum seu publica conficeret instrumentum seu instrumenta. In quorum testimonium presentes litteras sigillo meo cum subscriptione notarii et testium roboratas feci communiri.

Acta sunt hec ante portas predicti castri Wredenhagen Anno a nativitate etc.

Es folgt noch ein notarieller Attest; das Datum fehlt; es ist aber ein Schiedspruch vom Jahre 1416 bekannt (Riedel B. 3, 252), durch welchen der Streit der betheiligten Parteien beigelegt wurde, und das Mandat gehört vermuthlich in die vorhergehende Zeit. Doch wir verlassen nun die Havelberger Diöcese und wenden uns wieder der Brandenburger zu, wo es an unerfreulichen Zuständen auch nicht fehlte. Ja, der Nachfolger des Bischofs Heinrich, HENNING VON BREDOW (1407—1413), welcher bis dahin Domprobst gewesen war, ist sogar nach der Magdeburger Chronik gleich nach seiner Inthronisation an

Barbara Tag 1407 von Johann Treskow und Wipert von Barby, Magdeburger Stiftsvasallen, überfallen und bis Georgi gefangen gehalten. Vom päpstlichen Stuhl erhielten die Thäter nach Angabe derselben Chronik gegen Geld Absolution. Engelbert Wusterwitz, dessen Chronik freilich nicht vollständig erhalten ist, scheint die ganze Sache gar nicht erwähnt zu haben, die als ein gewöhnlicher Zwischenfall in den so häufig feindlichen und bis zu offenem Kriege sich steigenden Beziehungen beider Bisthümer erscheinen mochte.

Urkunden vom Bischof Henning fand Gercken nicht und theilt eben deshalb aus dem uns hier vorliegenden Cod. Lat. f. 169, f. 218 von ihm ein scharfes Mandat gegen die Zuchtlosigkeit seines Clerus mit (S. 650, Riedel I, VIII, 387) und ein zweites gegen die angeblichen Wunder, welche ein Weib bei Freienwalde verrichtete (S. 652, Riedel I, VIII, 388). Ich habe aber auf einem vereinzelt Blatt mit Formeln zu Procuratorien in Cod. Lat. f. 174, f. 112^b das einzige Document gefunden, welches sich auf seine Vergewaltigung bezieht. Hierin nämlich erklärt der Bischof im Juli 1408, dafs er die Magister Hartung Molitoris, Heinrich Gherpstedde, Johann Grameko und Johann de Symea bevollmächtigte, als seine Procuratoren vor dem Papst oder dessen Penitentiar zu erscheinen, und einzuwilligen

quod Strennui Armigeri, videlicet Johannes et Rudingerus dicti Treskow, Drewes et Tilo dicti Amelunk, Petrus Liveknecht et ceteri, Havelb. et Brand. dioc., ac ipsorum complices, qui pridem de anno domini M^occcc^o vij^o, xxiiij mensis Augusti dictum Reverendum patrem dominum Henninghum Episcopum in suis et Ecclesie sue negociis equitantes cum suis non nullis familiaribus captivarunt, spoliaverunt, vulnerarunt, ac captivum vulneratum cum rebus spoliatis ad ipsorum castra et receptacula violenter deduxerunt et contra ipsius voluntatem captivum et incarceratum ad nonnullos menses et dies detinuerunt, Excommunicati, suspensi, interdicti ac inhabilitati occasione premissorum, qualitercunque eciam declarati et denunciati publice per judices, conservatores et executores tam apostolica quam ordinariis auctoritatibus —

dafs diese, so weit es auf die Einwilligung des Bischofs ankomme, die Absolution erhalten könnten, indem er ihnen alle ihre Unthaten verzeihe; auch dafs die Absolution ihnen in partibus, speciell in Magdeburg ertheilt werde, wenn sie die Reise nach Rom nicht unternehmen könnten. Vom Datum ist nur übrig: 'Datum in Castro etc.' Da nun hier der 24. August als der Tag des Ueberfalls angegeben ist, so wird Barbara (4. Dec.) im Chron. Magd. ein Versehen anstatt Bartholomei sein.

Von dem päpstlichen Schisma empfand man hier zu Lande nicht viel, da der Concilspapst anerkannt wurde, doch machten der Charakter und die Lebensweise Johanns XXIII. es schwierig, den Gehorsam gegen ihn durchzusetzen und dafs es doch auch in der Mark Brandenburg nicht ganz an Widerspruch gefehlt hat, zeigt uns ein strenges Mandat des Bischofs Henning (Cod. Lat. fol. 174 f. 123), in welchem er sich gewaltig für ihn ereifert. Er verkündet darin seinem ganzen Clerus, dafs er bereits den Bannfluch nebst verschärften Sentenzen verkündet habe

contra nonnullos infructuosos palmites, pestiferos et nocivos hereticos et scismaticos, videlicet Nicolaum Kletitz, Nicolaum Louwenberg, Bussonem Ratenow, Georgium Vilitz, Alheidem Kath. Gulkens, Barbaram de Luckow, dictam Juttam cecam, Kerstinam et Katherinam sustrardas vagabundas cum suis geniminibus et complicibus.

Obgleich das nun in gehöriger Form geschehen, actenmäfsig verhandelt und überall verkündet ist, weigern sie sich doch, den Papst Johann XXIII. anzuerkennen:

ad unitatem tamen sancte matris ecclesie redire Sanctissimumque in Christo patrem et dominum, dominum Johannem vigesimum tercium solum unicum et indubitatum universalem pastorem ovium Jesu Christi nobiscum recognoscere recusantes.

Es scheint nicht, dafs ein anderes Vergehen ihnen zur Last gelegt wird, aber an kräftigen Schimpfwörtern fehlt es deshalb nicht. Damit sie also nicht weiteren Anstofs erregen:

Ne igitur dicti indurati scismatici, pestiferi et inveterati scismaticis nutritores, defensores, fautores, approbatores et manutentores pertinaces necnon heretici notorii et a fide devii, sanctam universalem ecclesiam dei notorie cum sua incorrigibilitate, contumacia et pertinacia evidentibus notoriis et manifestis tandem scandalizare valeant —

wird weitere Bedrohung und endlich Interdict für jeden Ort, wo und so lange sie sich dort aufhalten und noch drei Tage nach ihrer Entfernung verhängt. Vorzüglich aber wendet sich schliesslich der Bischof gegen den Pfarrer in Rathenow, welcher hinter der ganzen Sache zu stecken scheint und des Bischofs Sentenzen verachtet. Er citirt

dominum Thidericum plebanum in Ratheno, dictorum hereticorum, scismaticorum et excommunicatorum receptorem, hospitem, fautorem, et contra nostros processus alias contra dictos hereticos eorumque participes, de quibus supra, juxta canonicas sanxiones fulminatos collectorem —

am Freitag nach Galli und Lulli soll er sich dem Gericht an gewohnter

Stätte stellen und Gründe, wenn er welche hat, angeben, weshalb nicht auch er als derselben Strafe verfallen zu betrachten sei,

pro et ex eo quod ipse contra nostram expressam inhibitionem in nostre sentencie delusionem, in periculum anime sue, cum Bussone Ratheno, Nicolao Cruger (der fehlt oben) et Georgio Vilitz per nos ex officio nostro pro heresi notoria et scismate indurato excommunicatis, aggravatis et a Christifidelium participatione juxta canonicas sanctiones exclusis, temere et de facto participavit ipsosquē collegit et in domo sua tenuit, nutrit et hospitavit, et hodie tenet, nutrit et hospitavit.

Gegen diesen Pfarrer also wird vorgegangen werden, er mag nun erscheinen oder nicht. Gefürchtet scheint er sich nicht zu haben und ob der Bischof seiner mächtig geworden ist, wissen wir nicht, es ist jedoch keineswegs mit Sicherheit vorauszusetzen.

Das übrige noch recht reichlich vorhandene Material möge für eine andere Gelegenheit aufbewahrt bleiben; nur auf die oben erwähnte Wallfahrt nach Wilsnack erlaube ich mir hier noch einmal zurückzukommen. Sie war 1383 nach einer feindlichen Heimsuchung und Verbrennung des Ortes mit Hülfe von angeblich blutenden Hostien in Gang gebracht und spielt eine hervorragende Rolle bis in den Anfang des sechzehnten Jahrhunderts. Hunderte von Wallern kamen aus Böhmen, Ungarn und Polen, von allen Seiten strömte das Volk herbei, darunter viel Gesindel, und bald regte sich unterschiedener Widerspruch. Der Anstifter, damaliger Ortspfarrer, hatte im Minoritenconvent in Magdeburg seinen Betrug selbst eingestanden und sich zur Aufbringung einer ähnlichen Wallfahrt erboten, die aber noch viel grösser und einträglicher ausfallen würde, weil er die Sache jetzt besser verstehe. Man wies ihn jedoch ab und schon 1412 wurden vom Magdeburger Provincialconcil aus dem Bischof Otto verfängliche Fragen vorgelegt. Je mehr dann die damals sehr bedeutsam gerade in Magdeburg hervortretende reformatorische Bewegung an Kraft und Umfang gewann, desto ernstlicher wurden die Bemühungen, dem Unfug ein Ende zu machen. Die Bischöfe aber, welche grossen Vortheil davon hatten, setzten einen unerschütterlichen passiven Widerstand entgegen, folgten keiner Einladung noch Vorladung, und wir erfahren so wenig von ihnen, dafs jene oben mitgetheilte Nachricht über die Geldgier des Bischofs Otto und die Erbitterung des Clerus gegen ihn in der That willkommen erscheinen muss. Sehr entschieden trat Nicolaus von Cues gegen die Sache auf, während dagegen Capistran sich dafür erklärte und die Minoriten seinem Vorgang folgten. Als es endlich gelungen war, den Bischof etwas in die Enge zu treiben, entschied 1453 eine päpstliche Bulle zu seinen Gunsten, und der

Widerspruch musste verstummen. Doch erstarb er nicht ganz, und es ist unverkennbar, daß die ganze, in vielen Schriften lebhaft behandelte Angelegenheit viel beigetragen hat zu der erbitterten Stimmung gerade der eifrigst kirchlich gesinnten Gemüther gegen dergleichen römische Machtsprüche und die Beförderung des grössten Aberglaubens.

Diese ganze, in hohem Grade lehrreiche Geschichte ist kürzlich sehr eingehend behandelt worden von dem Oberpfarrer ERNST BREEST zu Wilsnack (Märkische Forschungen XVI, Berlin 1881), mit Benutzung eines reichen handschriftlichen Materials. Ich kann dabei jedoch eine Bemerkung nicht unterdrücken, die Rüge eines Lesefehlers nämlich, den ich seit Jahrzehnten bei jeder Gelegenheit, doch ohne allen Erfolg, bekämpfe. Es ist die Auflösung der Abkürzung *qm* durch *quum* anstatt durch *quoniam*. Ueberall, auch in sonst hervorragenden Schriften, begegnet man demselben, was um so unbegreiflicher ist, weil nicht nur die constante Schreibung im Mittelalter *cum* ist, sondern auch in denselben Abdrücken an allen übrigen Stellen dieses *cum* sich findet. Wenn nun in der vorliegenden Schrift ein Tractat wiederholt nach den Anfangsworten 'Quum olim' citirt wird, so konnte noch zweifelhaft sein, ob nicht die Orthographie der Handschrift verändert sei. Wenn wir aber S. 269 das Citat lesen: 'Plura etiam mala satis evidentior dicuntur vigere in Romana curia, vero quum non corriguntur ab ecclesia, tamquam approbate excusantur', so werden wir auf solchen Zweifel verzichten, und vollends, wenn wir auch S. 298 lesen: 'contra quos communis nominatio loci militat, quum dicitur ad sacrum sanguinem'; 'male custoditur, quum perire permittitur.' In nächster Nähe steht 'cum reperiatur.' Gerade die verschiedene Construction müsste einen aufmerksamen Herausgeber sofort auf die richtige Lesung *quoniam* führen, allein die Erfahrung zeigt leider, daß es vielmehr eine Ausnahme ist, wenn dieser Fehler nicht gemacht wird. Deshalb also bitte ich zu entschuldigen, daß ich auch hier diesen geringfügigen, aber in seiner Wirkung doch nicht unbedeutenden Umstand nicht unerwähnt gelassen habe.

Übrigens hat der Verfasser sich in vielen Bibliotheken und Archiven mit gutem Erfolg nach Materialien umgesehen und nur die mir jetzt vorliegenden Berliner Manuscripte sind ihm entgangen, wie sie denn auch in der That nach den bis jetzt vorhandenen Verzeichnissen nicht zu finden waren. Deshalb werde ich jetzt schliesslich noch über einen Tractat berichten, dessen Inhalt er allerdings S. 252 — 254 mittheilt nach einem Manuscript der Wolfenbütteler Bibliothek, aber, wie es scheint, enthält dieses nicht den ersten Theil. Ich nehme auch davon Anlaß den Wunsch auszudrücken, daß doch bei Benutzung

ungedruckter Schriften immer Anfang und Ende angegeben werden möge.

Dieser Tractat findet sich im Cod. Lat. f. 171 f. 281 nach Schriften von anderem Inhalt von gleichzeitiger Hand eingetragen. Im Jahre 1475 nämlich hatte die Wallfahrt, die in der nächst vorhergehenden Zeit unbedeutend gewesen zu sein scheint, plötzlich aus unbekannter Ursache einen unerhörten Aufschwung genommen, den uns mit den lebhaftesten Farben KONRAD STOLLE in seiner Thüringisch-Erfurter Chronik (ed. Hesse S. 128) geschildert hat; eine Nachricht, welche Hrn. Breest entgangen ist. Es entstand eine förmliche Epidemie, und namentlich liefen Hunderte von Kindern mit, so wie sie auch 1457 nach Mont-Saint-Michel gelaufen waren (s. Anzeiger f. Kunde d. deutschen Vorzeit XVI, 164). Die Erfurter schlossen ihre Thore fest zu, ließen keinen dieser Haufen ein, und entzogen sich dadurch glücklich dieser Calamität. Auf diese Erscheinung nun bezieht sich die erwähnte Schrift, welche auf die damals schon in weiter Ferne liegende Entstehung der Wilsnacker Wundergeschichte nicht eingeht. Der Anfang lautet:

Circa cursum plurimorum simplicium ad locum vulgariter dictum Ad sacrum cruorem, qui incepit circa festum S. Viti Martiris hoc anno 1475, de tribus videndum est, scilicet de principio motivo, hoc est de causa, de prodigio significativo, hoc est de significacione, et de remedio consultivo, hoc est de consultacione.

Zuerst werden nun 'pluribus ex currentibus diligenter examinatis' die Motive untersucht, die guten und die schlimmen:

Mala autem causa fit multipliciter, videlicet ex avaricia pro questu, ex curiositate videndi nova loca etc. aut experiendi quid hic cursus pretendit, vel eciam ex impaciencia et vindicta, ut quia offensi a suis, ut servi a dominis, filii a parentibus, uxores a maritis et sic de aliis. Causa autem non deliberativa, ut ipsi currentes dicunt, est quidam impulsus subitus et coactivus. Et hic impulsus in quibusdam fiete pretenditur, et in quibusdam vere sentitur. Fiete pretenditur quia fallaciter assignant sui cursus non causam pro causa, et hec fallacia laicorum pro chdolor hiis diebus plurimos depravat. Vere autem sentitur et provenit aut ex nature interna proprietate, quia visis aliis currere et eorum attentis calamitatibus ipsi naturaliter compaciuntur, aut ex celorum influencia aut elementorum continencia aut spirituum honorum vel malorum agitancia etc. Circa istum pulsum coactivum sciendum: licet fortiter moveri possunt, simpliciter tamen nequaquam conpelluntur, quia voluntas libera cogi non potest, quia

fecit deus hominem rectum ab inicio et reliquid eum in manibus consilii sui. Et probatum est ex eo quod multi dicentes se omnino cogi, sapienter informati vel benivolenter exhortati vel eciam valenter redarguti, insania deposita se liberatos et quietos fatebantur. Ut autem specialius explicentur cause prefati cursus. sciendum: euntibus quibusdam ad Welsnak ante messem, quia tunc dies longiores et minus occupati, moti sunt alii vel ex aliis euntibus peregrinatum vel ex penuria panis, que frequenter major est ante messem in illis diebus, quando annus precedens fuit infecundus et aridus. Deficientibus igitur pluribus in pane nec valentibus a vicinis accomodare vel amicis, erubescences mendicare in patria, ad tegendam verecundiam cum tota domo sua statuerunt peregrinando mendicare, usque quo messis panem daret, tollerabilius reputantes extra patriam mendicare quam apud notos. Sic factum est ut turme irent et in eis pueri: hoc videntes alii admirantes quesierunt, cur pueri irent. Illi volentes excusare dixerunt: ex quodam impulsu coactivo. His ergo compassi plures et ipsi moveri ceperunt. Commota quippe sunt omnia viscera eorum, videntes turmas plures et cantus audientes, quia inter alia animalia terre homo naturaliter est compassivum. Quod autem aliqui plus moti, ymmo ita fortiter commoti sunt quod quiescere non possent, vel est et fuit ex debilitate nature vel ex influencia celesti vel dispositione tenebri (cerebri?) ex qualitate elementorum que ad hoc cometica est (nämlich von dem Kometen des J. 1472 beeinflusst), vel ex impulsione et agitatione spirituum, qui secundum beatum Leonem circueunt et perambulant totam terram, omnes complexiones discucientes, omnium mores ventilantes, ut inveniant qualiter temptent. Multis igitur sic vehementer motis vel a natura vel ex temptationibus, alii fingentes similiter talem necessitatem eodem modo dixerunt se cogi, licet aliam haberent causam deliberativam, scilicet questum, impacienciam, curiositatem, vanitatem, et sic de aliis. Sic factum invenitur, ut tanta multitudo turmatim currerent.

Nach diesen lehrreichen Aufschlüssen über die Motive der Pilger wird der Zweifel berührt, ob der gute Geist überhaupt einen Antheil daran habe, da dieser doch vor allem die Ordnung in der Kirche verlange, hier aber jeder ohne Erlaubniss davon laufe. Ferner spreche dagegen die Beschaffenheit der Führer

quia duces turmarum communiter inveniuntur ribaldi et questores. Item reperiuntur impacientes, blasfemantes, maledicentes, mencies contra eos qui eis contradicunt vel eos bono zelo informare volunt: non sunt autem talia a spiritu sancto.

Sie berufen sich freilich auf das Vorbild der Maria, der Maria Magdalena, der Kinder, die zum Heiland gebracht werden, aber das wird einzeln als nicht zutreffend widerlegt. Auch die Wunder helfen nichts, denn die angeblichen Wunder der Flagellanten sind als Lügen erwiesen und so verhält es sich auch jetzt

sicut quod plebanus apud S. Johannem in Erfordia contradicens/ insanus factus esset. Item guardianus in Magdeborch cecus et quidam clericus furiosus etc. Item de mortuis ostensis dixit decanus id est prepositus monialium ad S. Laurencium in Magdeborch, quod vidit eos habere vividum colorem. Et tamen ostensi fuerunt eciam mortui et (sic) Thuringia infra castra de Saxenborge constat quod fallacia fuit in facto vel per potum supiferum (sic) vel alias etc.

Darauf geht nun der Verfasser auf die Bedeutung dieser so ungewöhnlichen Erscheinung ein. Die Pilger sagen meistens 'se nescire propter quid currerent'. Da aber doch alles seinen Grund habe und haben müsse, so sei sehr zu fürchten, daß ein bevorstehendes Unheil dadurch angezeigt werden solle, eine Verwirrung in der Kirche, deren gute Ordnung den Teufel sehr beunruhige. Dafür spreche auch, was man von dem Orte selbst höre,

ubi multe decepiones dicuntur fieri circa venerabile sacramentum et errores, et sic timendum est quod significet venturam aliquam heresim circa sacramentum ex Bohemia vel aliunde.

Dann geht er zu guten Rathschlägen über, von denen sich schon bei Breest ein Auszug findet, Ermahnung und Beaufsichtigung für die Verirrten, Beichte u. s. w., aber auch die Obrigkeiten sollen ihre Härte mildern; 'ut moderaciores et mansueciores sint in regimine nec dent occasionem populo mobili ad commociones et sediciosos tumultus excitandos.' Vorzüglich jedoch solle man sie nicht haufenweise mit Geschrei durch die Städte und Ortschaften laufen lassen, damit nicht ihr Beispiel andere verlocke. Die Armen aber solle man unterstützen, auch die Pilger nicht verhöhnen, sondern mit Sanftmuth belehren; auch für sie beten. Diese Rathschläge stammen von JOHANNES DORSTEN:

Hec sunt scripta reverendi patris, sacre theologie doctoris Erfordensis, ordinis S. Augustini, Johannis Dorsten. In multis conformia sentencie venerabilium patrum ac dominorum Magdeburgensis civitatis (qui) contra jam dictum cursum modum qui sequitur posuerunt.

Auch diese waren schon in Breest's Manuscript; wir theilen sie jedoch hier im Wortlaut mit, weil sie sehr verständig sind und noch auf manche Erscheinungen der jüngsten Vergangenheit sich wörtlich anwenden lassen.

Primo ad cavendum dampnum corporis et anime, que evenire possunt ex obumbracione luminis recte rationis, exhortandi in sermone populi, ut in suis devotis racionibus petant ab omnipotenti deo custodire (sic) ob omni impulsu seu instinctu ad currendum velud animal brutum sine deliberacione, nichil curando de licencia plebani sui, non dominos nec uxores maritos et e converso nec dampnum proprium nec alienum, an festa violentur, an fides inter conjugatos servetur, an sit contra caritatem dei vel proximi vel precepta ecclesie, quasi nulla sit obediencia. Periculosa igitur videtur hec peregrinacio.

Secundo videntur admonendi, quod ad utilitatem peregrinacionis requiritur licencia sui prelati seu plebani et consensus omnium illorum quorum interest, premissa contricione et confessione, ita ut in nullius dampnum vel prejudicium fiat peregrinacio ad loca insignia absque cultu supersticionis, non credendo quod in ymaginibus vel cruoribus vel quacunque alia creatura inanimata sit gracia ad exaudiendum pro salute vel vis miraculorum, set solus deus adoretur ut exaudiat, et sancti ejus ut pro nobis orent. Quamcunque autem adoracionem coram ymaginibus facimus seu reliquiis sanctorum quasi per signa ad sanctos ducimur.

Tercio exhortandi videntur ut in suis devotis oracionibus aspirent ad omnipotentem deum, qui timetur maximis offensus peccatis, quare hanc plagam supra tanto populo permittit durari, in hujusmodi periculosa peregrinacione, ne extendat omnem iram suam per plagas crudeliores pro futuro, set ut per suam immensam misericordiam dignetur corda peccatorum ad debitum reducere et pro commissis penam moderare.

Hec illi anno 1475.

Diese letzte Jahreszahl scheint das Datum des Gutachtens zu sein. Aber dafs die Abschrift auch nicht viel jünger ist, zeigen die von anderer Hand zugefügten Bemerkungen, welche vielleicht eine Beziehung auf den Verfasser enthalten, aber so flüchtig und undeutlich mit blasser Dinte geschrieben sind, dafs namentlich die Eigennamen zum Theil sehr zweifelhaft bleiben. Wir erkennen darin die Verheerungen der Seuche, welche nach Konrad Stolle's Bericht dem »Laufen« ein Ende machte. Die Worte lauten:

In isto anno 1475 die invencionis sancte crucis (3. Mai) que tunc fuit vigilia ascensionis domini, obiit pater et postea circa Michaelis filia sua Anna et in quadragesima precedenti (?) Jasper Frise. Et anno 1478 in vigilia trinitatis obierunt d. Ludolphus Frise et d. Hinricus Cuntner (?) etc. postea in estate d. Arnoldus detort (?) etc.

Anno 1479 circa festum trinitatis obiit Jasper Truspene (?) et eodem anno in crastino S. Mauricii obiit Balte gernor (?) in Magdeburg, qui istuc venit pro cura.

Es wäre ja möglich, daß diese Notizen für Kenner der Magdeburger Localgeschichte irgend eine brauchbare Anknüpfung darböten. Denn auf Magdeburg weist die unmittelbar hierauf folgende 1478 in Magdeburg von derselben Hand geschriebene Schrift des JOHANNES DE WESALIA de indulgentiis, welche als eine Kritik des Ablasswesens in diesen Zusammenhang gehört, aber ohne geschichtlichen Inhalt ist. Sie hat folgende Unterschrift:

Scriptum in Magd. 1478 in estate. Que tempore Marchio Albertus cum filiis suis Johanne et Frederico habuit expeditionem in terra Pamororum. Eo eciam tempore adducta fuit filia ducis Saxonie ad filium regis Dacie ad nubendum ei etc.

Item in eadem estate marchio Johannes, filius Alberti, cum igne devastavit opidum Belitz et cepit inibi Bohemum Jacobze, capitaneum ducis Johannis de Crossen, cum ducentis vel quasi. Qui illud furtive et dolose intrabant et occupabant etc.

Item eodem anno fuit tradimentum et disturbium mirabile in civitate Florentina inter illos de Paccis et Medicis etc.

1882.

XXVIII.

SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

8. Juni. Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. AUWERS.

1. Hr. PRINGSHEIM las über neue Beobachtungen, die er über den Befruchtungsact der Gattungen Achlya und Saprolegnia angestellt hat.

Die Mittheilung wird nach Fertigstellung einer längere Zeit beanspruchenden Tafel in den Sitzungsberichten erscheinen.

2. Hr. BURMEISTER in Buenos Ayres, correspondirendes Mitglied der Akademie, hat mit Schreiben vom 18. April eine Mittheilung über ein im La Plata-Gebiet gefundenes, bisher unbekanntes fossiles Faulthier, Nothropus priscus, eingesandt, welche dem heutigen Sitzungsberichte angehängt ist.

3. Hr. L. FUCHS in Heidelberg, correspondirendes Mitglied der Akademie, übersendet unter dem 4. d. Mts. einen Aufsatz: Über lineare homogene Differentialgleichungen, zwischen deren Integralen homogene Relationen höhern als ersten Grades bestehen. Derselbe wird mit dem nächsten Sitzungsbericht der Classe veröffentlicht werden.

4. Hr. KRONECKER überreichte im Namen des Hrn. Prof. W. FIEDLER in Zürich dessen soeben erschienenes Werk: Cyklographie oder Construction der Aufgaben über Kreise und Kugeln und elementare Geometrie der Kreis- und Kugel-Systeme.

Nothropus priscus, ein bisher unbekanntes fossiles Faulthier.

Von H. BURMEISTER.

Hierzu Taf. XI.

Die reiche quaternäre Säugethier-Fauna Süd-Americas ist in den meisten Fällen ein Vorbild der gegenwärtigen, ohne darum in allen Formen ganz mit ihr übereinzustimmen; es gibt neben einzelnen identischen Arten nicht bloss zahlreiche untergegangene Species, sondern auch Nebenformen, welche mit den lebenden nur gewisse Gruppenmerkmale gemein haben; ja es gibt selbst ganz eigenthümliche, der Gegenwart fehlende Gestalten.

Besonders sind es drei der grossen Säugethier-Abtheilungen, welche diese Angaben, soweit sie die Argentinische Republik betreffen, bestätigen: die der Raubthiere, der Edentaten und der Hufthiere.

Unter den Raubthieren scheinen die quaternären Katzen alle von den lebenden Arten verschieden gewesen zu sein; es tritt selbst eine eigenthümliche Gestalt, der auch in der alten Welt vertretene, dort tertiäre *Machaerodus* in der quaternären Epoche Süd-Americas auf.

Die quaternären Hunde dagegen möchte ich für identische mit denen der Gegenwart halten, soweit sich das nach den wenigen bekannten Resten beurtheilen läßt.

Ausserdem ist ein grosser fossiler Bär als quaternärer Bewohner des La Plata-Gebietes bekannt; eine Thierform, die dem Flachlande Süd-Americas in der Gegenwart abgeht.

Weiterhin kennt man von Raubthieren nur noch das Stinkthier fossil aus hiesiger Gegend, aber nicht die kleinen langschwänzigen Ursinen *Nasua* und *Procyon*, und ebensowenig die Marderform *Galictis*, welche gegenwärtig bei uns nicht selten ist.

Die Edentaten Süd-Americas sind in der Gegenwart durch die drei Formen der Faulthiere, Gürtelthiere und Ameisenbären vertreten. Davon besass die quaternäre Periode nur die beiden zuerst genannten Gruppen, und zwar hauptsächlich in eigenthümlichen Gigantentypen, welche der Gegenwart fehlen.

Die quaternären Faulthiere erscheinen als colossale Gravigraden mit mehreren Gattungen, wie *Megatherium*, *Scelidotherium*, *Myiodon* und *Megalonyx*; — die Gürtelthiere als Glyptodonten, gewaltige gürtellose Panzerthiere, in verschiedenen Gattungen mit vielen Arten bekannt. Zu beiden eigenthümlichen Gruppen gehören die grössten und zahlreichsten der quaternären Säugethiere Süd-Americas.

Lange Zeit kannte man kein von lebenden abweichendes, mit Gürteln versehenes Panzerthier aus der quaternären Epoche Argentinens, bis GERVAIS vor einigen Jahren die Gattung *Eutatus* beschrieb (Mém. de la Soc. géol. de Fr. II. Sér. tome IX No. 5). Wir besitzen jetzt diese eigenthümliche Form auch in der hiesigen Sammlung. Aber ein ächtes fossiles Faulthier war bisher unbekannt und soll nun hier unter dem Namen *Nothropus* beschrieben werden.

Die dritte Hauptgruppe der quaternären Säugethiere, die der Hufthiere, ist die merkwürdigste, denn sie enthält neben gegenwärtigen Typen auch ganz neue, völlig eigenthümliche, untergegangene.

Man kennt davon zunächst Wiederkäuer, als die beiden lebenden Typen der Lamas und Hirsche, welche den gegenwärtigen Arten ganz ähnlich, oder gar mit ihnen identisch gewesen zu sein scheinen.

Demnächst das hiesige Wildschwein und Pferde, ächte *Equus*-Arten, zugleich mit einer eigenthümlichen Gattung *Hippidium*; beide in je zwei Arten vertreten.

Die übrigen quaternären Hufthiere sind untergegangene Formen, welche den lebenden ziemlich fern stehen; so *Macrauchenia*, eine mit *Palaeotherium* zunächst verwandte Gattung; — dann *Toxodon*, *Nesodon* und *Typotherium*. *Nesodon* ist tertiär, die anderen beiden sind quaternär. Diese drei Gattungen kommen keinem der aus anderen Gegenden bekannten Hufthiere ganz nahe, sie bilden vielmehr eine durch viele sonderbare Eigenschaften ausgezeichnete, eigenthümliche Gruppe, welche man neben den Gravigraden und Glyptodonten für die merkwürdigste Besonderheit der südamerikanischen, quaternären Säugethier-Fauna ansprechen darf.

Mit ihr und ihren gleichzeitigen Genossen lebten, als Repräsentanten der Proboscideen, zwei *Mastodon*-Arten, gleichfalls der Gegenwart fehlende Formen, welche altweltlich schon tertiär auftraten, also weit verbreitet waren.

Vorstehende einleitende Bemerkungen schienen mir passend, um auf die Bedeutung aufmerksam zu machen, welche das hier zu besprechende Fundstück wohl verdienen dürfte.

Es ist die in natürlicher Grösse auf beiliegender Tafel dargestellte, rechte Hälfte des Unterkiefers eines Thiers aus der Brady-poden-Gruppe, wie solche im Jahre 1870 beim Ausgraben für die

Fundamente des Eckpfeilers einer Brücke über den Rio Carcarañal, zum Behuf der von Rosario nach Cordova führenden Eisenbahn, von dem Inspector der Arbeiter, Herrn MARTIN SCHAFFTER, gefunden und mir mit vielen anderen Knochen von derselben Stelle gütigst überlassen wurde. Die Schicht, worin die Knochen sich fanden, ist ein Kiesbett im Diluviallehm, bestehend aus ziemlich gleichmässig grossen, nicht gerade feinen Sandkörnern, welches im Niveau des heutigen normalen Wasserstandes des Flusses, also über dem gegenwärtigen Boden des Flussbettes, in der oberen Teufe des Diluviallehms liegt und offenbar von demselben Fluss zur Zeit der quaternären Epoche herrührt. Die Kiesschicht enthielt, neben dem Unterkiefer, besonders Knochen vom Lama, von Hirschen, dem Wildschwein Pecari, aber keinen anderen Rest, der zu dem Besitzer des Unterkiefers in Beziehung gebracht werden könnte, und ist dasselbe Sandlager, woraus die von GERVAIS besprochenen (Journ. d. Zoolog. II. 231) fossilen Menschenknochen durch SEGUIN hervorgezogen wurden. Sie führte ziemlich viele Knochen, aber nur isolirte oder Trümmer davon, namentlich halbe Unterkiefer, Wirbel, Rippenstücke und Röhrenknochentheile, selten einen ganz unversehrten Knochen, und beweist sowohl dadurch, als auch durch das ziemlich gleiche mässig feine Korn des Sandes, dass das Material aus weiter Ferne herbeigeführt wurde und dass die Thiere schwerlich in der Nähe des jetzigen Fundortes ihrer Knochen gelebt haben. Jene vorher genannten Arten gehören alle der jüngeren Abtheilung der Quaternär-Epoche an, welche ich in meiner Descr. physiq. de la Rép. Arg. tome II. pag. 214 dem postglacialen Zeitraum derselben in der alten Welt parallel stellte, und in diese Periode dürfte also auch das hier zu besprechende Faulthier zu bringen sein.

Wie meine Abbildung zeigt, so ist der halbe Unterkiefer an beiden Enden zertrümmert; es fehlt vorn die Spitze des Kinns und hinten der äussere Rand des aufsteigenden Kieferastes mit dem Gelenkkopf und der Endecke des Kronenfortsatzes. Das unversehrt gebliebene Stück, dem sogenannten Körper des Unterkiefers entsprechend, hat eine Länge von 11.5^{cm} und der Rest des aufsteigenden Astes ist 5.5^{cm} hoch. Die Innenfläche des zahntragenden Theils ist völlig eben, ohne Spur einer Wölbung, die Aussenfläche dagegen stark gewölbt und in der Mitte, an der erhabensten Stelle, 2.1^{cm} dick, während der Anfang des aufsteigenden Astes dahinter nur 1.4^{cm} Dicke hat. An der inneren Oberfläche des Körpers bemerkt man an seinem vorderen Ende, wie diess Fig. 2 lehrt, den einwärts vortretenden Kinnrand, welcher mittelst der beide halben Unterkiefer verbindenden Kinnnaht dieselben zusammenhält. Diese Naht ist am Anfange nach innen 1.4^{cm} breit, wird aber gegen die Spitze des Unterkiefers hin

allmählich schmaler, so dass der Bruchrand vor der Spitze nur noch 0.9^{cm} Breite besitzt. Hieraus folgt, dass das abgebrochene Ende sich zusehends verjüngte und wohl in eine förmliche Spitze auslief, ähnlich der von mir in der Zeichnung restituirten.¹⁾ Doch geht der noch vorhandene Theil des oberen Randes der Spitze anfangs der Kinnnaht völlig parallel, wie Fig. 2 angibt, und daraus folgt eine etwas bauchige, etwa löffelförmige Gestalt der Spitze, während dieselbe bei dem correspondirenden Faulthier der Gegenwart, dem *Choloepus didactylus*, ein gleichschenkeliges Dreieck mit ganz geraden Seiten darstellt. Auf der Fläche nach aussen war übrigens die Spitze auch bei dem fossilen Thiere nur wenig gewölbt, viel weniger als die mittlere Partie des Körpers, wie das Fig. 1 recht deutlich macht durch den tiefen Schatten, worin dieser Theil der Fläche sich befindet. Namentlich oben, in der Gegend zwischen dem ersten und zweiten Zahn, ist eine Vertiefung sichtbar, welche die Abplattung der Spitze verstärkt. Der Bruch für die fehlende Spitze ist an der breitesten Stelle 0.8^{cm} dick und umschliesst hier den völlig kreisrunden, 0.4^{cm} weiten Gang des *canalis alveolaris*, dessen viel grössere, 0.7^{cm} hohe, ovale hintere Mündung in der Mitte des Anfanges vom aufsteigenden Aste in Fig. 2 deutlich gesehen wird. Ein Seitengang des *canalis alveolaris* geht von dieser Mündung nach oben, schief durch die Substanz des Kiefers und öffnet sich nach aussen neben dem hintersten Zahn, am oberen Rande des Mittelstücks vom Körper. Einen eben solchen Seitengang besitzt auch der *canalis alveolaris* des *Choloepus didactylus*, dagegen fehlt derselbe bei allen Arten der Gattung *Bradypus*. Hierin liegt ein Hauptmerkmal für die sichere Bestimmung des fossilen Objectes. Wo die vordere Mündung des *canalis alveolaris*, das sogenannte *foramen mentale*, sich befand, lässt sich nicht mit Sicherheit angeben, weil es in der abgebrochenen Spitze angebracht war; bei den lebenden Faulthieren ist diess Loch stets sehr weit nach vorn gerückt, aber eng und klein, mitunter doppelt an jeder Seite.

Eigenthümlich ist der untere Rand des Körpers gestaltet, denn er bildet einen starken, abwärts gekrümmten Bogen, während er bei den lebenden Faulthieren fast ganz geradlinigt, oder gar leicht nach innen gebogen ist. Auf diesem dicken unteren Rande bemerkt man zwei leichte schiefe Eindrücke zwischen drei mehr erhabenen Wölbungen, welche den Zahnhöhlen der drei Backzähne entsprechen.

Hinter den bezeichneten Wölbungen des unteren Randes wird der Körper des Kiefers schnell dünner und zeigt davor auf der äusseren,

¹⁾ In Fig. 1 meiner Zeichnung habe ich diese ergänzte Spitze mir als durchsichtig gedacht, um den durch eine Linie angedeuteten Verlauf des oberen Randes der Kinnnaht angeben zu können. Von aussen sieht man diesen Rand natürlich nicht.

am stärksten gewölbten Stelle seiner Oberfläche eine, zwar nicht scharfe, aber doch kenntliche Bogenkante, welche bis zur Mündung des Seitenzweiges vom *canalis alveolaris* hinaufsteigt und neben demselben in die Fläche des Kronenfortsatzes übergeht. Diese Kante bezeichnet die Grenze des großen Kaumuskels (*musc. masseter*), welcher den Kronenfortsatz mit seiner Fleischmasse bedeckt. Bei den lebenden Faulthierien der Gattung *Bradypus* ist die besprochene Kante weiter nach vorn gerückt, bis in die Gegend des mittleren Backzahns, auch schärfer umschrieben und darum viel deutlicher bemerkbar; bei *Choloepus* liegt sie nicht ganz so weit vorwärts, reicht aber doch etwas weiter vor als die Kante am fossilen Unterkiefer, etwa bis zum vorderen Rande des mittleren Backzahns. Überhaupt haben die lebenden Faulthiere stärkere Muskeleindrücke am Unterkiefer, als diese fossile Art; die Gegend des aufsteigenden Astes, welche den Condylus trägt, ist bei *Bradypus* deutlich als Verdickung der Knochensubstanz zu erkennen, während bei diesem fossilen Kiefer man kaum eine Spur davon wahrnimmt. Auch die untere Ecke des aufsteigenden Astes hat einen dickeren Rand als die der fossilen Species; lauter Eigenschaften, welche für eine kräftigere Musculatur und stärkere Kaufähigkeit des Kiefers sprechen.

Eben dasselbe möchten auch die Zähne, wenigstens der vordere, andeuten, denn dessen Kleinheit ist im hohen Grade überraschend, wenn man den von *Choloepus* damit vergleicht. Es sind im Unterkiefer, wie bei allen lebenden und den fossilen Faulthiertypen in der Regel vier an jeder Seite vorhanden. Bei *Bradypus* stehen alle vier in ziemlich gleichem Abstände von einander, bei *Choloepus* ist dagegen der erste von den drei folgenden weiter abgerückt, als diese von einander. Bei beiden lebenden Gattungen hat dieser vorderste Zahn eine andere Form. Bei *Bradypus* ist er zwar nur wenig höher als die folgenden, aber etwas schwächer von elliptischem Umriss und quer gestellt, während die folgenden kreisrunden etwas dünner erscheinen, indem ihr Durchmesser kleiner ist, als der lange des elliptischen ersten Zahnes. Nur der letzte, hinterste erscheint etwas grösser, weil länglich oval und dabei dicker als der erste. Dieses Verhältniss erinnert etwas an die zweilappige Gestalt des hintersten Zahnes mancher Gravigraden, z. B. von *Mylodon* und *Scelidotherium*. — *Choloepus* hat einen anderen Zahntypus; sein vorderster, weiter abgerückter Unterkieferzahn ist dicker und höher, als jeder der drei folgenden und mit einer langen schiefen Kaufläche versehen, welche durch Abschleifen gegen den entsprechenden Zahn des Oberkiefers bewirkt wird, bei letzterem aber nach hinten gewendet ist, und bei dem Zahn des Unterkiefers entgegengesetzt nach vorn. Die drei

anderen Zähne sind niedriger und dünner, von länglich ovalem Umriss, aber ebenfalls mit abgeschliffener Kaufläche versehen, die mehr oder minder deutlich das Ansehen eines zweiseitigen Daches mit scharfer Firste besitzt, während die Kaufläche der Zähne von *Bradypus* etwas vertieft wie ein Napf zu sein pflegt.

Vergleicht man damit den Zahnbau der fossilen Gattung *Nothropus*, so zeigt sich an ihm eine höchst merkwürdige Mischung der Zahnform beider lebenden, nebst gewissen Eigenheiten, die davon gleichmässig abweichen. Wie bei *Choloepus* ist der vorderste Zahn von den nachfolgenden weiter abgerückt, als diese unter sich, aber der Abstand ist bei *Nothropus* viel gröfser und der Zahn selbst viel kleiner. Zwar fehlt dem mir vorliegenden Unterkiefer der Theil des Zahnes ausserhalb der Alveole, aber man sieht einen Rest des Zahnes im Grunde der Zahngrube und erkennt daran die gleiche Gröfse des Umfanges mit der der Grube und den gleichen elliptischen Umriss. Dass die heraustretende Krone eine schiefe Kaufläche besass, wie ich das in meiner Zeichnung angegeben habe, lässt sich freilich nicht mit Gewissheit behaupten, sondern nur nach der Analogie der lebenden Gattung muthmassen; meine Zeichnung ist also eine blosse Hypothese.

Die drei nachfolgenden Zähne des fossilen Unterkiefers stimmen in ihrer Form und relativen Grösse zum ersten mehr mit den correspondirenden Zähnen von *Bradypus* überein; der zweite und dritte Zahn hat einen quer oblongen Umriss, der vierte einen mehr ovalen. Die beiden ersteren sind an ihren Seiten nach aussen wie nach innen, längs der Mitte etwas vertieft, wie mit einer senkrechten Furche versehen, und der erste von beiden ist auch auf der nach vorn, gegen das Kinn gewendeten Seite ähnlich vertieft. Am hintersten und letzten Zahn sieht man eine solche sehr schwache Vertiefung nur an der gegen die Backe gewendeten Aufsen Seite. Alle drei Zähne sind nicht genau cylindrisch, sondern werden nach oben etwas schwächer, woraus folgt, dass sie in der Jugend kegelförmig gestaltet waren, wie das bei allen lebenden und fossilen Faulthieren ebenfalls zutrifft. Im Anfange ihrer Thätigkeit haben die Zähne eine einfache oder zum Theil eine doppelte Spitze, der Form eines Zuckerhuts vergleichbar, und diese Spitze nutzt sich mit vorschreitendem Alter ab; das freie Ende bekommt eine Kaufläche, die allmählich immer grösser wird, bis der Zahn, fast zur Hälfte abgekaut, die der unteren grösseren Portion eigene, cylindrische Form auch in der oberen annimmt. Selbst die dach- oder napfförmige Gestalt der Kaufläche wird durch den Abkauungsprocess gebildet; die erstere dadurch, dass die Zähne des Oberkiefers nicht denen des Unterkiefers in ihrer Stellung genau ent-

sprechen, sondern mit ihnen alterniren, indem jeder Zahn der Lücke zwischen zweien des anderen Kiefers gegenübersteht.

Die drei Backzähne des *Nothropus* haben eine Kaufläche, die weder dachförmig noch napfförmig vertieft ist, sie sind vielmehr mit einer breiten Querfurche oder Grube versehen, ähnlich den Zähnen von *Megatherium*. Indessen erheben sich die dadurch an den Kanten der Zähne gebildeten Ecken der Kaufläche etwas mehr, als die Ränder zwischen ihnen, und das gibt den Zähnen das Ansehen, als seien sie mit vier Höckern versehen. Freilich am ersten der drei Backzähne ist der vordere Rand der Quergrube nur eine gerade schneidende Kante, ohne erhöhte Ecken; aber der hintere Rand hat solche Ecken deutlich. Am zweiten Zahn sind alle vier Ecken scharf erhöht, am dritten nur die beiden äusseren Ecken auf der Seite des Zahnes gegen die Backe gewendet; der gegenüber liegende innere Rand der Kaufläche ist bogenförmig erniedrigt und ohne scharfe Ecken.

Die Zähne haben eine glänzende, fast spiegelnde äussere Oberfläche von schwarzer Farbe, deren Basis einen weisslichen Anflug zeigt. Die innere Zahnschubstanz (*dentina*) ist braun, und der sie äusserlich bedeckende Schmelzüberzug von 1^{mm} Dicke hellgelb. Jeder Zahn ragt 6—7^{mm} weit aus der Zahnhöhle hervor, und reicht bis zu den früher beschriebenen unteren Randwülsten, welche die Alveolen andeuten, in den Kiefer hinab. Am hintersten Zahn ist die Zahnhöhle durch Bruch auf der Innenfläche des Kiefers geöffnet; man sieht das untere hohle Zahnende in der Höhle und erkennt daraus, dass die Zähne ganz so gebildet sind, wie die von *Choloepus*, deren Figur BLAINVILLE in der Ostéographie etc. tome IV. Paresseux, pl. III gegeben hat. Demnach stimmt der Gattungstypus von *Nothropus* mit dem von *Choloepus* im Zahnbau überein, unterscheidet sich aber darin von der lebenden Gattung, dass der erste, weiter abgerückte Zahn der kleinste, viel kleiner als der von *Choloepus* ist, die drei folgenden dagegen etwas grösser sind, besonders der letzte, welcher bei *Choloepus* der kleinste Zahn ist. Ferner fehlt den Zähnen von *Nothropus* die dachförmige Abkauung, vielmehr erinnert die Quergrube der Kaufläche an den Napftypus der Zähne von *Bradypus*.

Die allgemeine Körperform des in Rede stehenden Geschöpfes, dem ich den Namen *Nothropus priscus* beilege, weil es die älteste bekannte Gestalt der Bradypoden-Gruppe darstellt, betreffend, dürfte der Schluss wohl nicht zu gewagt erscheinen, dass das Thier auch im ganzen Ansehen ebenso sehr wie im Zahnbau und Unterkiefer dem zweizehigen Faulthier der Gegenwart geähnelt habe, und folglich mit sehr langen dünnen Gliedmaassen und ziemlich gestrecktem Rumpfe versehen gewesen sei. In der Grösse mag es den *Choloepus didactylus*

un's Doppelte übertroffen haben, denn dessen ganzer Unterkiefer misst nur 8^{cm} in der Länge, während der von *Nothropus*, die fehlenden Theile hinzugerechnet, zwischen 15 bis 16^{cm} lang gewesen sein dürfte.

Weiter wüßte ich zur Bestimmung des Artcharakters nichts hinzuzufügen, denn Anhaltspunkte für eine mehr detaillirte Artcharakteristik sind nicht vorhanden.

Erklärung der Abbildungen.

Fig. 1. Ansicht des Unterkiefers von der gegen die Backe gewendeten Aussenfläche.

Fig. 2. Derselbe von oben gesehen, mit der Kaufläche der Zähne.

Beide Figuren sind in natürlicher Grösse des Gegenstandes, die Fläche im Tondruck ist allein daran vorhanden und sichtbar, die ohne Ton gezeichneten Fortsetzungen des Bildes sind nach der Analogie des Kiefers von *Choloepus didactylus* entworfen.

Berichtigung.

Monatsber. 1881, S. 380, Z. 10 v. u. st. dritte und vierte l. vierte und fünfte.

Ausgegeben am 15. Juni.




Fig. 1. *Archaeopteryx lithographica*
Fig. 2. *Archaeopteryx lithographica*

1882.
XXIX.

SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

15. Juni. Gesamtsitzung.



Vorsitzender Secretar: Hr. CURTIUS.

1. Hr. ROTH las: Zur Kenntniss der Ponza-Inseln.
2. Hr. HELMHOLTZ übergab einen Aufsatz des Hrn. LUCIEN J. BLAKE aus Boston: Über die elektrische Neutralität des von elektrisirten Wasserflächen aufsteigenden Dampfes.
Beide Mittheilungen folgen umstehend.
3. Der Vorsitzende zeigte den am 3. Juni erfolgten Tod des Hrn. REINHOLD PAULI, correspondirenden Mitgliedes der Akademie, an.
4. Die HH. Prof. BÜCHELER in Bonn, DITTENBERGER und KEIL in Halle a. S. wurden zu Correspondenten der philosophisch-historischen Classe gewählt.

Zur Kenntniss der Ponza-Inseln.

Von J. ROTH.

An der Westküste Mittelitaliens, gegenüber den vulkanischen Gebieten der Roccamonfina und der phlegraischen Felder, liegt die mit Ausnahme von Zannone ganz aus jüngeren Eruptivgesteinen und vulkanischen Gebilden bestehende, von WNW. nach OSO. sich hinziehende Gruppe der Ponza-Inseln. Die westlicheren drei Inseln, Palmarola, Zannone und Ponza, sind von den beiden östlicheren, Ventotene und S. Stefano, durch einen 20 Miglien breiten Meeresarm getrennt. Zwischen beiden Gruppen liegt, 5 Miglien von Ponza, 15 Miglien von Ventotene entfernt, eine kastellähnliche grosse Klippe, la Botte, oft als Zielscheibe von der italienischen Kriegsmarine benutzt und daher hier und da mit dünnen Bleiplättchen bedeckt. S. Stefano und das westlichere Ventotene, dessen Entfernung von Ischia 30 Miglien beträgt, sind nur durch einen eine Miglie breiten Meeresarm getrennt.

Die geologischen Verhältnisse der Ponza-Inseln sind, abgesehen von den älteren Angaben bei Sir WILLIAM HAMILTON 1785, bei DOLOMIEU 1788 und bei FORTIS (Mem. Acad. Padova 1794) zuerst von POULETT SCROPE behandelt. Sein Aufsatz (Transact. geol. Soc. of London 1827), welcher wie seine übrigen Arbeiten von ausgezeichnetem Scharfblick und guter Beobachtung zeugt, ist für die Zeit eine klassische Leistung. Er erklärt die Pechsteine, welche die Liparitgänge begrenzen, für umgeschmolzene Tuffe. Sodann gab ABICH (Vulk. Erscheinungen in Italien 1841) neben den Analysen von drei Lipariten der Ponza-Inseln Bemerkungen über die geognostische und geologische Beschaffenheit von Ponza und Palmarola und in einem »Geologischen Fragmente aus Italien« betitelten Hefte 1881 eine 1838 entworfene geologische Karte der Ponza-Inseln. Die S. 7 des Capitel III erwähnten erläuternden Bemerkungen sind bis jetzt nicht erschienen. Cap. I giebt Nachrichten der Alten über die Inseln Pontia und Pandateria, Cap. II barometrische Höhenmessungen im Kirchenstaat und im Königreich Neapel aus dem Jahre 1838. ABICH zweifelt nicht, dass die aus Pechsteinen und Perlsteinen gebildeten Salbänder der Liparite (Trachytporphyre)

gleichartig und gleichzeitig mit den weissen, beinahe zerreiblichen, durchbrochenen Trachyt-Conglomeraten und -Tuffen entstanden seien (l. c. p. 18). Er schildert die langgedehnte Gestalt von Ponza und Palmarola, die Steilheit ihrer bis zum Kamm hinaufsteigenden, aber nie bis zum Meere herabziehenden, vielmehr gewöhnlich dort senkrecht endenden Abhänge, die zahlreichen, aus zerstörten Gängen hervorgegangenen Klippenzüge, welche sich als gigantische Mauertrümmer weit hinaus in's Meer erstrecken, die bald in horizontalen, bald in vertikalen Prismen abgesonderten Liparitgänge und den weissen Liparit von Zannone. In dem Aufsatz über die Roccamonfina (Mém. soc. géol. (2) I. 1. 174. 1844) beschreibt PILLA den »granitischen Trachyt« des Monte della Capre (Montagnuola della capre ABICH) auf Ponza und nimmt an, den Anschauungen jener Zeit gemäss, dass der Liparitgang den Perlstein gehoben habe. Er hält (l. c. 179) die Ponza-Inseln für älter als die Roccamonfina und als die noch jüngeren Campi Flegrei. SORBY wendete seine Epoche machende Methode des Mikroskop für die Petrographie nutzbar zu machen (1858) auch auf die Liparite von Ponza an. JENN behandelt im Geol. mag. (New Series Decade II. Vol. II. 298—308. 1875) die Ponza-Inseln. Er hebt hervor, dass die Meerestiefe rings um dieselben sehr allmählich anwächst, so dass eine Tiefe von 200 Fathoms erst 3 Miles vom Ufer erscheint. Sie liegen innerhalb der Hundert-Fadenlinie. Er fügt seinen Beschreibungen und Abbildungen die Bemerkung hinzu, dass der Trachyt des Monte Guardia in Ponza auf Tuff liegt, welcher dem von Ventotene und Ischia ähnlich ist, und dass dieser Trachyt jünger ist als der Liparit, der den Tuff an den Grenzen in Obsidiane umwandelt. Nach einer vorläufigen Arbeit in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie (1875) hat DÖLTER in den Denkschriften (Bd. 36. 141 u. fg. 1875) neben geologischen Karten und Durchschnitten eine geologische Beschreibung der Ponza-Inseln gegeben. Seine Angaben stimmen sehr häufig weder mit den italienischen topographischen Aufnahmen, noch mit meinen Beobachtungen überein.

Die geologische Kenntniss der Ponza-Inseln ist weit davon entfernt, vollständig zu sein: zunächst fehlt noch eine topographische Aufnahme in grossem Maassstabe. Zu dem folgenden kleinen Beitrag bemerke ich, dass ich wegen stürmischen Wetters, trotz aller Bemühungen meines Freundes Dr. DOHRN, der mir durch sein Dampfboot die Reise ermöglichte, Palmarola und S. Stefano nicht besuchen konnte. Die im hiesigen mineralogischen Museum vorhandenen reichen Sammlungen ABICH's halfen diesem Mangel einigermaassen ab.

Es ist bezeichnend für die Ponza-Inseln, dass weder Kratere noch Spuren jetziger vulkanischer Thätigkeit vorhanden sind: keine Fuma-

rolen, welche früher überhaupt wohl nur im nördlichen Theile der Insel Ponza reichlich waren, keine heissen Quellen; nirgend ist ein Austrittspunkt für die reichlichen Tuffe sichtbar, welche die Unterlage und Decke der Eruptivgesteine bilden und von letzteren in Form von Gängen und Decken durchbrochen worden.

Ponza.

Der Hauptsache nach wird die Insel von Tuffen gebildet, in welchen Liparit gangförmig und Trachyt auftritt. Der gelbe oder weissliche Tuff ist bis auf den südlichen Theil der Insel, das Plateau des Monte Guardia, Liparittuff, wie die häufigen Einschlüsse von Liparit mit bis erbsengrossen Quarzkörnern und reichlichen Sanidinen und von Liparitperlstein zeigen. Ausserdem kommen in dem Tuff kleine Blättchen dunklen Glimmers vor; häufig ist er als Bimsteintuff ausgebildet, und in den Bimsteinstückchen Glimmer zu sehen. Das braune, lockere, südlich vom Ciglio di Guarnero vorkommende Gebilde, von DÖLTER als Tuffsandstein bezeichnet, ist eine örtliche Ausbildung des Liparittuffes. Als eine spätere submarine Bildung kann man das Gestein nicht betrachten; es reicht nicht an den Meeresspiegel, liegt vielmehr in ziemlich bedeutender Höhe über demselben, enthält weder Kalkkarbonat noch organische Reste. Entstand es etwa in einer Wasseransammlung durch Abschlammung aus dem Liparittuff? Glimmer, Sanidin, Liparitstückchen finden sich darin. Die Stellen an der Westseite des Piano della Guardia, wo nach DÖLTER ein rother Trachyttuff auftritt, habe ich nicht besucht. Den weissen, lockeren, bimsteinreichen Tuff unter dem Trachyt des Piano della Guardia analysirte auf meine Bitte Hr. Prof. RAMMELSBERG. Die Analyse ergab:

SiO ²	56.39	Wasserfrei berechnet	65.02
Al ² O ³ (FeO)	13.16	" "	15.17
MgO	3.83	" "	4.42
CaO	1.25	" "	1.44
Glühverlust	13.28	" "	—
Alkali aus Verlust	12.09	" "	13.95
	100		100

So schwierig nach dieser Analyse die Bestimmung des Tuffes, ob Liparittuff oder Trachyttuff, sein mag, da er nach seinem grossen Wassergehalt nicht unverändert ist, ich möchte ihn für Trachyttuff halten. Dafür sprechen auch die nach DÖLTER im Bagno vecchio, nach ARICH an den Scogli di Calzone muto vorkommenden Auswürflinge, welche die Mineralien des Trachytes enthalten. Die Grenze

des Trachyttuffes gegen den Liparittuff werden spätere Untersuchungen festzustellen haben.

Ein Austrittspunkt der grossen decken- und kuppenförmig zum Piano della Guardia ansteigenden Trachytmasse lässt sich nicht erkennen. Die Beschaffenheit des Gesteins unterliegt kleinen Variationen sowohl nach der Menge der Ausscheidungen als nach deren Grösse. Es ist ein Sanidintrachyt mit Plagioklasgehalt. Als typisch kann das Gestein von Scotto di basso dienen.

Der sehr frische bläulichgraue Trachyt vom Piano della Guardia, dem Scotto di basso genannten Ort entnommen, enthält in feinkörniger, kompakter, nicht überwiegender Grundmasse reichliche grosse tafelförmige Sanidine, sparsam kleine, grüne Augite und etwas Titaneisen. Der Dünnschliff zeigt ausserdem kleine braune Hornblende, kleine dunkle Glimmerblättchen, Mikrokrystalle, wahrscheinlich von Apatit, und ziemlich reichliche, zum Theil zonal aufgebaute Plagioklase. Die grünen Augite, zum Theil Zwillinge nach dem Orthopinakoid, zum Theil mikrolithisch, führen Einschlüsse von Titaneisen und Hornblende. Der überwiegende Sanidin enthält reichlich Gasporen, in Rissen parallel *M* und *P*, auch auf anderen Querrissen Einlagerungen eines bräunlichen Pulvers, so dass die Krystalle in längliche Rechtecke zertheilt erscheinen. Glasbasis habe ich nicht aufgefunden.

Nach DÖLTER'S Analyse, welche einen auffallend hohen Gehalt an Thonerde angibt, lässt sich eine Berechnung der Quantität der Gemengtheile nicht anstellen, selbst nicht annähernd. Am Campo santo bei dem kleinen Leuchthurm, nächst dem Ort Ponza, liegen in den oberen Partien des Tuffes Bruchstücke desselben Trachytes. Darunter folgt ein gelber Tuff und unter diesem ein Bimsteintuff, in welchem ein Liparitgang aufsetzt. Spätere Untersuchungen müssen entscheiden, ob diese oberen Tuffe Trachyt- oder Liparittuffe sind. In letzterem Falle würden nach Auftreten des Trachytes wiederum Liparittuffe gebildet sein.

Absonderung des Trachytes in Säulen und Kugeln beschrieb schon HAMILTON.

Die Ausbildung der zahlreichen, zum Theil nur wenig mächtigen Liparitgänge, welche sich schwerlich einigen wenigen Eruptionscentren unterordnen lassen, wechselt sehr stark, ist aber stets porphyrisch. Die überall vorherrschende, feinkörnige bis dichte, weissliche bis röthliche, bald kompakte bald von kurzen parallelen, meist schmalen Rissen durchzogene Grundmasse zeigt von grösseren Einsprenglingen bald nur Sanidin und dunkle Glimmerblättchen, bald daneben noch Quarzkörner: dieser Wechsel tritt in derselben Gesteinsmasse auf. Splärolithische Ausbildung und selbst Lithophysen kommen vor. In den Rissen des Gesteins ist oft sekundärer Quarz abgesetzt.

Absonderung in Säulen, deren Axen in schmalen Gängen den Gangwänden parallel, in breiteren rechtwinklig zu den Gangwänden stehen, ist häufig. Sehr eigenthümlich sehen die bogenförmigen Liparitgänge aus, die frei aus dem Meere hervorragen, nachdem die Erosion und das Meer die umgebenden Tuffe zerstört hat. Durch Erosion frei gelegte Gänge geben Ponza das eigenthümliche Gepräge. Von den zahlreichen Varietäten des Gesteins, unter denen ich eine mit breccienähnlicher Structur erwähne, habe ich nur zwei genauer untersucht.

Ein grauer, feinkörniger, feinsphärolithischer Liparit bildet in einem der Tunnel zwischen Ponza und Sancta Maria einen wenig mächtigen Gang im Liparittuff. Man erkennt in dem Gestein sparsam Sanidin und dunkle kleine Glimmerblättchen. Im Dünnschliff zeigt die mikrokristalline sphärolithische Grundmasse Sanidinzwillinge, zum Theil zonal aufgebaut und mit eingeschalteten Plagioklaslamellen, Quarzkörner, hellbraune Glimmerblättchen und einzelne grössere Plagioklase. Die Sphärolithe zeigen das Kreuz der Aggregatpolarisation.

Der Liparitgang im Liparittuff der Montagniola dei capri an der Westküste nördlich von Chiaja di luna ist in weit über 100 Fuss lange, quer getheilte Säulen abgesondert, welche von der Spitze des Berges — als solcher erscheint die Gangmasse — bis an's Meer hinabreichen. In der überwiegenden, weissen, feinkörnigen Grundmasse des in frischen Stücken compacten Gesteins sind fast ebenso reichlich als Sanidintafeln und Blättchen dunklen Glimmers und mit blossen Auge sichtbar Quarzkörner ausgeschieden, welche hier und da Erbsengrösse erreichen. Durch Verwitterung werden die dunklen, oft als sechsseitige Tafeln ausgebildeten Glimmerblättchen messinggelb, und in dem Gestein entstehen Hohlräume. Im Dünnschliff sieht man in den oft zonal aufgebauten Sanidinen Einschlüsse von Plagioklas und von Glasmasse, neben vereinzelt grösseren auch kleinere Plagioklase. Die reichlich Glasbasis enthaltende Grundmasse greift oft keulenförmig in die Quarzkörner hinein. Der Quarz enthält sparsam Flüssigkeitseinschlüsse mit einer Libelle. Der Glimmer ist fast ganz frei von Einschlüssen; ausserdem findet sich Magneteisen in kleinen Körnern. Ausser compakter Ausbildung des Gesteins kommt eine kleinporige und rissige vor, in welcher mit der Loupe neben Glimmer kaum Sanidin, aber kein Quarz zu sehen ist. Von diesen Varietäten ausgehend bezeichnet DÖLTER das Gestein mit Unrecht als Sanidinbiotittrachyt. An den beiden Salbändern gegen den Liparittuff geht, vom Meere aus gesehen, das Gestein in Pechstein über, der an der Ostseite des Berges perlitisch wird.

Die grösseren Liparitgänge ändern häufig näher dem Tuff ihre grauweisse bis röthliche Farbe in eine grauliche oder gelblichgrüne

und noch näher dem Tuff in ein hellbraunes Gelb. Dabei ändert sich die Struktur, sie erhalten plattige Absonderung, oder werden binstein-ähnlich faserig, der Glanz auf den Bruchflächen nimmt zu, ebenso der Wassergehalt; das spezifische Gewicht nimmt ab. An der Grenze gegen den Tuff ist Pechstein oder rundkörnig abgesonderter Pechstein, Perlstein, entstanden. Der gelbliche Pechstein, den ich der Grenze gegen den Tuff einem Gange entnahm, hat nach den Bestimmungen des Hrn. Korn nur noch ein sp. G. von 2.2024. Beim Glühen ändert sich das Gelb der Pechsteine in ein dunkles Braun. Glimmer und Sanidin sind darin fast überall, wenn auch in geringen Mengen, zu erkennen. Ich glaube nicht, dass man von Contactwirkung auf die Tuffe, sondern von Änderung der Beschaffenheit des Liparites reden muss. Wo, wie an der Chiaja di luna, bei der Erosion die Grenzen gegen den Tuff rippenförmig hervortreten, sieht man ein Gemenge von grauweissem Liparittuff mit Liparitstückchen und von Körnern grünlichen Pechsteins, welcher Anfänge von Perlitbildung zeigt. An manchen Aufschlüssen sieht man concentrisch schalige und verschieden gefärbte, rundliche Pechsteinmassen im Tuff ohne jeden Liparit, aber an den Salbändern der schmalen Liparitgänge an vielen Stellen keinen Pechstein.

Am Ciglio di Guarmero wechseln etwa zollstarke Lager von grünlichem Pechstein, etwas schwächere Lager von grünlichem Perlstein und hellröthlichgraue Lagen eines dichten, sphärolithischen, aber wasserhaltigen Liparites, in dessen unregelmässigen Hohlräumen sekundär Chalcedon traubig abgesetzt ist. Die Perlsteine sind auf Ponza nur sparsam.

Zannone.

Die im Maximum 182^m hohe, annähernd gleichschenkelig dreieckige, unbewohnte Insel Zannone fällt fast überall steil zum Meere ab. An der Nordostseite wird sie von Kalksteinen und Thonschiefern gebildet. Der übrige Theil der Insel besteht aus einem dichten, weissen, hie und da säuligen Liparit, in welchem grössere Sanidinzwillinge, Quarz in rundlichen Körnern, grünlicher meist durch Verwitterung gebleichter Glimmer und ein säulenförmiges verwittertes Mineral (Hornblende? Augit?) zu sehen sind. Eisenoxydhydrat, welches oft die Stelle der säulenförmigen verwitterten Mineralien einnimmt, überzieht auch die Klüfte des Gesteins, auf welchen später Quarzkrystalle auf nassem Wege abgesetzt sind. Das nicht frische Gestein braust schwach mit Säuren. Von Zersetzung durch saure Dämpfe ist nichts zu sehen.

Der Dünnschliff zeigt hie und da den Feldspath mit Gitterstruktur; Streifung liess sich, vielleicht in Folge von Verwitterung, nirgend in

den Feldspathen erkennen. Im Sanidin finden sich (ausser primären makroskopisch sichtbaren Einschlüssen von Glimmerblättchen) häufig, und namentlich deutlich in Durchschnitten der Karlsbader Zwillinge nach *M*, auf Spaltungsrissen parallel der Basis *P* kleine (sekundäre?) Glimmerblättchen. Ihre Farbe ist die des makroskopischen verwitterten Glimmers. Die sehr feinkörnige Grundmasse enthält Glasbasis. Von den Kalksteinen ist der häufigste ein dichter, blaugrauer, dolomitischer, bituminöser Kalkstein mit reichlichen schmalen Trümmern von weissem Kalkspath; auch Dolomit kommt vor. Von einer Contactzone mit dem Liparit habe ich nichts finden können.

Palmarola.

Da ich die Insel nicht selbst besucht habe, kann ich nur nach dem von ABICH dort Gesammelten urtheilen. Die Hauptmasse der Insel besteht aus Trachyt, dem vom Monte Guardia ähnlich und vollständig quarzfrei. Die Liparite sind denen von Ponza durchaus ähnlich, Obsidian, Pechstein und Perlit treten auf. Höchst wahrscheinlich gehört ein Theil der reichlichen Tuffe dem Liparit, ein Theil dem Trachyt an. Palmarola bietet die grösste Aehnlichkeit mit Ponza und verdiente eine genauere Untersuchung, als ihm bis jetzt zu Theil geworden.

La Botte.

Die Klippe la Botte besteht aus Sanidintrachyt, welcher in wenig regelmässige plumpe Pfeiler von ungleicher Höhe abgesondert ist. Das Gestein hat in den unteren Partien den sehr dünnen, schwarzen, firnissähnlichen Überzug, den das Meer so oft auf den Gesteinen absetzt, und geht unter Wasser ziemlich weit, besonders nach Westen, fort. Es gleicht dem Trachyt von la Guardia auf Ponza vollständig. Ausserdem kommt eine etwas grobkörnigere, hellfarbigere und drusige Varietät vor.

Neben dem vorwaltenden Sanidin sind darin kleine unvollkommen ausgebildete grüne Augite, sparsam ähnliche Hornblende, hier und da Plagioklas, reichlich Titaneisen zu sehen, welches durch Verwitterung dem Gestein einen rostbraunen Überzug verleiht. Der Dünnschliff zeigt noch Apatit, den grüngelben Augit schwach pleochroitisch, in Sanidin und Plagioklas zahlreiche Flüssigkeitseinschlüsse. Glasbasis habe ich nicht aufgefunden. Von Tuffen ist nichts zu sehen. Die Klüfte sind mit dem durch die Verwitterung des Titaneisens entstandenen Brauneisen ausgefüllt.

Ventotene.

Die über dem Meeresspiegel sichtbare Grundlage der etwa von NNO. nach SSW. hingestreckten, schmalen, am Süden 135 m hohen Insel Ventotene bildet Doleritbasalt. In der feinkörnigen blaugrauen Grundmasse liegt Olivin reichlicher und in grösseren Krystallen als Plagioklas und Augit. Wo das Gestein porös ausgebildet ist, erfüllen Kalkspath und Zeolith die Hohlräume. Der Basalt erreicht an dem Südwestende, unter dem Monte dell' arco, seine grösste Meereshöhe, bildet aber auch hier nicht die Oberfläche der Insel. Auf dem Basalt liegen Trachyttuffe, welche zum Theil fast ganz aus Bimsteinstückchen bestehen. Darüber folgt in grösserer Mächtigkeit ein gelber feinkörniger Trachyttuff, in welchem neben einzelnen Sanidinen Stückchen grauen und braunen Trachytes mit dunklen Glimmerblättchen, ferner zahlreiche, oft rundum ausgebildete Krystalle von grünem Augit und ziemlich reichlich dunkle Glimmerblättchen liegen. Hier und da wird die Oberfläche der Insel von einem lockeren kalkigen Tuff gebildet, in welchem neben Trümmern von Augit und Glimmer viele abgerollte Bruchstücke von Zweischalern, Gastropoden und anderen marinen Organismen zu erkennen sind. Alle diese Bruchstücke erlauben eine genauere Bestimmung nicht. Die in dem Tuff vorkommenden Kalkstücke entstanden aus ganz unkenntlich gewordenen Schalenresten, welche durch gelöstes Kalkkarbonat verkittet wurden. Es ist eine echte Strandbildung. Obwohl weder für noch gegen den submarinen Absatz der Trachyttuffe irgend ein Beweis vorliegt, zeigt das letzt erwähnte Vorkommen, dass in einer späten Zeit die Insel, welche schon ihre Tuffbedeckung über dem Basalt besass, unter dem Meeresspiegel lag und dann gehoben wurde.

Die Tuffe, welche überall die Oberfläche der Insel bilden, liegen der unebenen, nach NO. sich senkenden Oberfläche des Basaltes auf, so dass im nördlichen Theil der Insel auch an der Küste nur Tuff zu sehen ist. POULETT SCROPE und DÖLTER führen aus den Tuff Bruchstücke von Granit, Syenit und anderen älteren Eruptivgesteinen an. Ich habe sie nicht aufgefunden, sie sind auch in ABICH's Sammlung nicht vertreten. An der kleinen Marine liegen in dem gelben Tuff in grosser Menge Auswürflinge, denen der Somma ähnlich, und Bruchstücke von Sanidintrachyt. Die ersteren bestehen zumeist aus überwiegenden grossen Sanidinen, Hornblende und ziemlich reichlichem Titaneisen; daneben kommen sparsam dunkle Glimmerblättchen und honiggelbe Titanite vor. Durch Verwitterung des Titaneisens sind die meist faustgrossen Trümmer auf der Oberfläche und den Rissen des Innern eisenschüssig gebräunt. In den Dünnschliffen erkennt man

noch einzelne kleine Plagioklase, sparsam grüne, bisweilen mit Hornblende verwachsene Augite. Die Bruchstücke des Sanidintrachytes weisen in dichter, kompakter, blaugrauer, splittrig brechender, überwiegender Grundmasse kleine und sparsame Sanidine, noch sparsamere Augite und etwas Magneteisen auf. Im Dünnschliff erkennt man einzelne, durch die gitterförmige Verwitterungsstructur ausgezeichnete Noseane. Ein basaler Durchschnitt durch Augit zeigt einen hellgelben, kaum pleochroitischen Kern und eine äussere dunkle, nach innen unregelmässig begrenzte, stark pleochroitische Zone: gelbbraun parallel den nach der Orthodiagonale schwingenden Strahlen, schmutzig bräunlichgrün parallel den nach der Klinodiagonale schwingenden Strahlen, nach den Bestimmungen des Herrn Dr. ARZRUNI. Die kleinkörnige Grundmasse besteht wesentlich aus Sanidin, kurzen grünen Augitnadeln und etwas Magneteisen. Weder Plagioklas noch Glasbasis waren darin aufzufinden. Die eingesprengten grösseren Sanidine sind fast vollständig frei von Einschlüssen, die grösseren Augite reich an solchen von Magneteisen. DÖLTER erwähnt noch Einschlüsse von braunem schlackigen Trachyt.

Ausserdem führt der gelbe Tuff neben zahlreichen eckigen Trümmern von schwarzem und grünem Kalkstein Stückchen weisslichen Bimsteins (mit etwas Sanidin und Augit) und weisslichgrauen Trachytes, ferner dunkelfarbige Schlackenstücke mit einigen Sanidinen, Augiten und dunkeln Glimmerblättchen. Bolähnliche Partien und aus Lösung abgesetztes Kalkkarbonat sind in dem gelben Tuff häufig.

Ich kann nicht entscheiden, ob der Basalt von Ventotene als Lavastrom auf der Erdoberfläche geflossen ist, oder ob er (und ebenso der Trachyt von S. Stefano) intrusiv in die vorhandenen Trachyttuffe eindrang, oder ob diese auf den vorhandenen festen Eruptivgesteinen abgelagert wurden. Man kann wohl den Austrittspunkt der identen Tuffe der nur eine Miglie weit von einander entfernten beiden Inseln Ventotene und S. Stefano als zwischen ihnen gelegen annehmen. Waren sie einst durch Tuff verbunden, so sind sie Reste eines Tuffkraters. Eine begründete Meinung über das relative Alter des Basaltes von Ventotene und des Trachytes von S. Stefano lässt sich nicht aussprechen.

S. Stefano.

Die kleine, nur 68^m hohe, oben ebene Insel fällt ringsum steil zum Meere ab, nur an der Westseite ist ein Aufgang vorhanden. Über dem Meeresspiegel besteht die Insel aus einer nach NW. geneigten Masse von Sanidintrachyt, auf welcher in grosser Mächtigkeit und

die Oberfläche bildend Trachyttuffe lagern. ABICH (Vulk. Erscheinungen S. 39) erwähnt, dass der Trachyt auch als Piperno entwickelt vorkommt. Ein von ihm dort gesammelter, blaugrauer, in dichter Grundmasse nur Sanidin zeigender Trachyt (Nr. 1) wird von schmalen, ungleich langen Rissen und Klüften durchzogen, neben welchen das Gestein hellgelblich braun und schlackig erscheint. Nach Behandlung mit kalter Salzsäure erkennt man in dem jetzt grauweissen Gestein kleine honiggelbe Titanite und braune Hornblendenadeln. Ein zweites Handstück (Nr. 2) ist dem Piperno der Pianura zum Verwechseln ähnlich: schwarze Flammen in aschgrauer Grundmasse. Überall in dem porigen Gestein erkennt man Pünktchen von Magneteisen. Ein drittes Trachytstück (Nr. 6) zeigt in dichter, compakter, gelbbrauner Grundmasse neben Sanidintafeln bis 5^{mm} lange braune Hornblendsäulchen und sparsam schlecht ausgebildete grüne Augite. Keiner dieser Trachyte ist dem der Klippe la Botte ähnlich. DÖLTER'S Analyse des Trachytes gibt weniger Kali als Natron, obwohl Sanidin der häufigste Gemengtheil sein soll.

Der grobe, fast conglomeratische, gelbe Tuff enthält neben zahlreichen eckigen Trümmern von grauem und schwarzem Kalkstein Stückchen weisslichen Bimsteins (mit wenigen Sanidinen und Augiten) und graulichen Trachytes, ferner dunkelfarbige Schlacken mit einigen Augiten, einzelne grüne Augite und dunkle Glimmerblättchen. Bolähnliche Partien und aus Lösung sekundär abgesetztes Kalkkarbonat sind häufig. Auf die überaus grosse Ähnlichkeit mit dem gelben Tuff von Ventotene ist schon oben hingewiesen. Wie es scheint, liegt unter dem gelben Tuff ein der Hauptsache nach aus Trachytbimsteinstückchen bestehender weisslicher Tuff.

Es liegt nahe, die vulkanischen Gebiete Mittelitaliens in Zusammenhang zu bringen. Nimmt man mit SUESS an, dass die italischen Eruptionsstellen meist den Linien der Zertrümmerung des Landes zufallen, so bietet die südlich des Monte Amiata beginnende und mit dem Vesuv abschliessende Zone dafür ein ausgezeichnetes Beispiel, während die Ponza- (und die Liparischen) Inseln mehr in die Mitte der Senkungsfelder gestellt sind. Über das relative Alter der vier vulkanischen Gebiete, welche in Frage kommen, wenn man vom Vultur absieht, — das römische Gebiet, die Roccamonfina, die Campi flegrei mit Ischia und Vesuv, die Ponza-Inseln — lässt sich kaum eine gesicherte Ansicht aussprechen, während die Stellung des Albaner-Gebirges zum römischen Gebiet wie die des Somma-Vesuv zu den Campi flegrei klar vorliegt. Petrographisch handelt es sich in den vier genannten Gebieten um vier Gesteine, die sich in verschiedener Weise combiniren: Nördlich von Rom und im Albaner-Gebirge folgen

auf Sanidintrachyte Leucitophyre. Die Verbindung mit der südlicheren Rocca monfina wird durch die kleinen Leucitophyrvulkane des Heriker-Landes gebildet. In der Rocca monfina folgen auf Leucitophyre Sanidintrachyte und zuletzt im geringen Maass Doleritlava (Abich); in den Campi flegrei auf Sanidintrachyt und Leucit accessorisch enthaltende Sanidintrachyte Leucitophyre, daneben im Arso und im Monte nuovo wieder Sanidintrachyt. Auf den Ponza-Inseln erscheint Liparit als das ältere Gestein, dem Sanidintrachyt folgt und diesem vielleicht noch einmal Liparit; Doleritlava geht einem Theile der Trachyte voraus. Das Fehlen der Leucitophyre auf den Ponza-Inseln ist bemerkenswerth. Da jedoch in Mittelitalien das relative Alter derselben ein wechselndes ist, kann man für die Zeit der vulkanischen Thätigkeit auf den Ponza-Inseln keine Schlüsse aus diesem Mangel ziehen. Darin stehen die vier Gebiete einander nahe, dass Tuffe eine Hauptrolle spielen. Während petrographisch die östlichen Inseln — la Botte, Ventotene, San Stefano sich an Ischia, Vivara, Procida und die phlegraeischen Felder durch das reichliche Vorkommen von Sanidintrachyt anschliessen, bilden die westlichen Ponza-Inseln — Palmarola, Zannone, Ponza — durch den Reichthum an Lipariten ein zweites und verschiedenes System, in welchem vielleicht die eruptive Thätigkeit auf Zannone begann.

Über die elektrische Neutralität des von ruhigen elektrisirten Wasserflächen aufsteigenden Dampfes.

Von Hrn. LUCIEN J. BLAKE
in Boston.

Vorgelegt von Hrn. HELMHOLTZ.

Durch mehrfache Versuche, welche ich in letzter Zeit im physikalischen Institut der hiesigen Universität angestellt habe, hat sich ergeben, dass durch Wasserdampf, der sich ohne Verspritzen von der Oberfläche einer elektrisirten Flüssigkeit erhebt, keine Convection der Elektrizität stattfindet.

I.

Die bewegliche Platte *A* eines KOHLRAUSCH'schen Condensators stand in Verbindung mit einem nach einem Entwurf von Hrn. HELMHOLTZ construirten Quadrantelektrometer, dessen Quadrantenpaar durch zwei ZAMBONI'sche Säulen geladen wird. Die an einem dünnen silbernen Draht aufgehängte Aluminiumplatte desselben hat die Form zweier rechtwinkliger Kreissectoren, die an den Spitzen mit einander verbunden sind. Die Entfernung der horizontalen Deckplatten der Quadranten, zwischen denen die Aluminiumplatte schwebt, ist kleiner als in früheren Instrumenten gleicher Art, um das Instrument empfindlicher zu machen. Der Spiegel schwebt unterhalb der Quadranten. Das obere Ende des Drahtes ist in einem Torsionskopf befestigt und dient zur Verbindung der Elektrizitätsquelle mit der Aluminiumplatte. Das metallene Gestell des Instruments, welches die ZAMBONI'schen Säulen trug, war zur Erde abgeleitet.

Ein DANIELL'sches Element, von welchem ein Pol in Verbindung mit dem Elektrometer stand, der andere zur Erde abgeleitet war, gab einen Ausschlag von 70^{mm} , wenn die Entfernung der Scala vom Spiegel ungefähr 3^{m} betrug.

Über die Vollständigkeit der Isolirung sei Folgendes bemerkt. Wenn die Aluminiumplatte und die mit ihr in Verbindung stehende Platte *A* des Condensators auf das Potential 1 Dan. geladen war, so trat wegen mangelhafter Isolirung nach Verlauf von fünf Minuten ein Verlust von $1\frac{1}{4}$ Scalentheilen der (wie bereits erwähnt) 70 Scalentheile betragenden Ablenkung ein.

Condensator und Elektrometer sowohl, wie alle hiernach erwähnten Apparate, waren von Metallkästen umhüllt, die mit der Erde in leitender Verbindung standen. Alle Zuleitungsdrähte waren in ebenso abgeleiteten Messingröhren isolirt, um sie vor Influenz äusserer Elektricität zu schützen. Auf der nicht beweglichen Collectorplatte *B* wurde durch Condensation warmer Wasserdämpfe eine Wasserschicht gebildet. Ist *B* erwärmt und in Verbindung mit dem einen Pole einer galvanischen Batterie, deren anderer zur Erde abgeleitet ist, und wird dann die kalte Platte *A* bis auf geringe Entfernung (etwa 1^{mm}) genähert, so condensiren sich die von dem benachbarten *B* aufsteigenden Dämpfe ziemlich reichlich auf *A*; dabei findet aber durchaus kein Übergang von Elektricität statt, trotzdem sich hierbei die Dämpfe von der Wasseroberfläche entwickeln, welche die eine der im Condensator angesammelten beiden Elektricitätsschichten enthält. Es wurde mit schwachen Potentialunterschieden von 1 Daniell zwischen den Condensatorplatten anfangen, und diese stufenweise bis 420 Daniells gesteigert, ohne dass der Erfolg sich änderte.

Es ist hierbei nöthig, anfangs die Platte zur Erde abzuleiten, bis sie der Platte *B* gegenübersteht, um das Elektrometer vor zu grossen Ablenkungen durch inducirte Elektricität zu schützen; alsdann isolirt man *A*. Die durch den Dampf etwa zugeführte Elektricität müsste dann im Elektrometer wirksam werden.

Ausserdem besteht keine Convection der Elektricität, weder wenn *B* die Temperatur des Zimmers besitzt und *A* eine niedrigere, noch wenn beide Platten eine höhere Temperatur haben und Verdampfung ohne Verdichtung stattfindet. Wenn der aufsteigende Dampf die Elektricität der Wasseroberfläche mitnähme, so würde in allen diesen Fällen eine Ansammlung von Elektricität auf *A* beobachtet worden sein.

II.

Um Verdampfung von verschiedenen Lösungen zu erzeugen, war der folgenden Apparat construiert. In einem dritten zur Erde abgeleiteten Kasten war eine horizontale Messingplatte *C* von 125^{mm} Durchmesser in leitender Verbindung mit der Platte *B* des Conden-

sators. Die den Leitungsdraht zwischen *B* und *C* isolirenden Siegel-lackstücke, welche gleichzeitig dazu dienten, die Platte *C* in der geeigneten Lage festzuhalten, waren so weit von letzterer entfernt (nämlich ganz ausserhalb des Kastens), dass der aufsteigende Dampf keinen Einfluss auf die Isolirung ausüben konnte. Eine isolirte mit der zu untersuchenden Flüssigkeit gefüllte Porcellanschale war in der Art drehbar an einer verticalen Axe befestigt, dass sie entweder dicht unter die Platte *C* gebracht oder ganz aus dem Kasten entfernt werden konnte. Die bis jetzt benutzten Flüssigkeiten sind:

Destillirtes Wasser,
Verdünnte Schwefelsäure,
NaCl-Lösungen in verschiedener Concentration,
Seewasser (Ostsee).

Diese wurden auf ein bestimmtes Potential elektrisirt und unter die Verdichtungsplatte *C* gebracht, *B* und *C* anfangs zur Erde abgeleitet, nachher isolirt. Wenn nun Electricität in *C* und also auch in *B* auf irgend eine Weise inducirt oder direct zugeleitet worden wäre, während *A* zur Erde abgeleitet und $\frac{1}{2}$ mm von *B* entfernt war, so würde *A* diese Electricität auf *B* gebunden und sich selbst mit der entgegengesetzten Electricität beladen haben. Nachdem man *A* isolirt und von *B* entfernt hätte, würde dann eine Ablenkung der in Verbindung mit *A* stehenden Aluminiumplatte des Elektrometers das Vorhandensein gebundener Electricität auf *A* und demnach auch auf *B* und *C* gezeigt haben. Ich habe die Oberfläche der betreffenden Flüssigkeit mit einer Batterie, die bis zu 500 Elementen Zink, Wasser, Kupfer (= 420 Daniells) enthält, elektrisirt.

Die Versuche wurden in drei Weisen gemacht.

1) Flüssigkeit und Verdichtungsplatte *C*, beide bei der Temperatur des Zimmers, d. h. weder Verdichtung noch stärkere Verdampfung.

2) Flüssigkeit 100° C., Platte *C*, kalt, d. h. Verdampfung mit Verdichtung.

3) Flüssigkeit und Platte *C* bei gleicher, die Zimmerwärme übersteigender Temperatur: d. h. starke Verdampfung ohne Verdichtung. Die erwärmende Flamme blieb immer ausserhalb des Kastens.

Es zeigten sich bei allen drei Methoden dieselben Resultate, und zwar ergab sich nur ein Verlust von 1,2—4 Procent an der anfangs auf den isolirten, unter einander leitend verbundenen Platten *B* und *C* inducirten Electricität. Bei einer Convection der Electricität aus der Oberfläche der Flüssigkeit hätte eine Vermehrung der inducirten Electricität eintreten müssen.

Schliesslich wurde mit Hülfe eines Replenishers die Potentialdifferenz der Batteriepole so weit erhöht, dass Funken zwischen den

1^{mm} von einander entfernten Condensatorplatten übersprungen, wenn diese direct mit dem Replenisher verbunden werden. (Die Potential-Differenz beträgt dann ungefähr 5000 Daniells.) Ein Übergang der Elektricität mit dem niederschlagenden Dampfe war auch hier nicht zu bemerken. Es ist aus allen diesen Versuchen zu schliessen, dass bei ruhiger Verdampfung aus elektrisirtem Wasser oder aus seinen Lösungen, wenn keine Tröpfchen aufspritzen, keine Convection der Elektrizität stattfindet.


Mit der weiteren experimentellen Bestätigung dieses Gesetzes, welches den der bisherigen Erklärung der Lufterlektricität zur Grundlage dienenden Theorien von BECQUEREL und WM. THOMSON widerspricht, bin ich gegenwärtig beschäftigt.

Ausgegeben am 22. Juni.

1882.

XXX.

SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.



22. Juni. Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. AUWERS.

1. Hr. G. KIRCHHOFF las: Zur Theorie der Lichtstrahlen.
 2. Hr. VIRCHOW legte die Resultate neuer Messungen an jungen Gorilla-Schädeln vor.
 3. Hr. WEIERSTRASS trug eine Mittheilung des Hrn. Prof. F. LANDEMANN zu Freiburg i. Br.: Über die LUDOLPH'sche Zahl vor.
- Sämmtliche Mittheilungen erscheinen mit dem heutigen Bericht.

Zur Theorie der Lichtstrahlen.

Von G. KIRCHHOFF.

Die Schlüsse, durch welche man, hauptsächlich gestützt auf Betrachtungen von HUYGHENS und FRESNEL, die Bildung der Lichtstrahlen, ihre Reflexion und Brechung, so wie die Beugungserscheinungen zu erklären pflegt, entbehren in mehrfacher Beziehung der Strenge. Eine vollkommen befriedigende Theorie dieser Gegenstände aus den Hypothesen der Undulationstheorie zu entwickeln, scheint auch heute noch nicht möglich zu sein; doch lässt sich jenen Schlüssen eine grössere Schärfe geben. Ich erlaube mir, der Akademie Auseinandersetzungen vorzulegen, welche hierauf abzielen, und deren wesentlichen Inhalt ich in meinen Universitätsvorlesungen seit einer Reihe von Jahren vorgetragen habe. Das gleiche Ziel in Bezug auf die Beugungserscheinungen ist inzwischen in einigen veröffentlichten Abhandlungen von den HH. FRÖHLICH¹⁾ und VOLT²⁾ verfolgt.

§. I.

Es soll angenommen werden, dass das Licht in Transversal-schwingungen des Äthers besteht, und der Äther in Bezug auf diese in dem Mittel, in dem die Lichtbewegung betrachtet wird, sich wie ein fester, elastischer, isotroper und homogener Körper verhält, auf dessen Theile keine andere Kräfte wirken, als die durch die relativen Verrückungen hervorgerufenen. Sind u, v, w die Componenten nach den Coordinatenaxen der Verrückung eines Äthertheilchens, dessen Gleichgewichtslage die Coordinaten x, y, z hat, zur Zeit t , so genügt dann jede dieser Gröfsen der partiellen Differentialgleichung

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = a^2 \Delta \phi, \quad (1)$$

wo Δ die Summe der zweiten Differentialquotienten nach x, y, z und a die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes bedeutet. Doch

¹⁾ WIEDEMANN'S Annalen Bd. 3 S. 376, Bd. 6 S. 414 und Bd. 15 S. 592.

²⁾ WIEDEMANN'S Annalen Bd. 3 S. 532.

dürfen nicht beliebige Lösungen dieser Gleichung u, v, w gleichgesetzt werden, da auch

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$$

sein muss. Sind U, V, W beliebige Lösungen derselben, so entspricht aber

$$\begin{aligned} u &= \frac{\partial V}{\partial z} - \frac{\partial W}{\partial y} \\ v &= \frac{\partial W}{\partial x} - \frac{\partial U}{\partial z} \\ w &= \frac{\partial U}{\partial y} - \frac{\partial V}{\partial x} \end{aligned} \quad (2)$$

einer möglichen Lichtbewegung, und umgekehrt giebt es für jede Lichtbewegung Functionen U, V, W , die diesen Gleichungen genügen.¹⁾ Es soll im Folgenden unter ϕ eine der Grössen U, V, W oder u, v, w verstanden werden. T sei die Schwingungsdauer des als homogen vorausgesetzten Lichtes, dann ist jede dieser 6 Grössen eine lineare, homogene Function von

$$\cos \frac{t}{T} 2\pi \quad \text{und} \quad \sin \frac{t}{T} 2\pi.$$

Als Maass für die Intensität des Lichtes im Punkte (x, y, z) soll das arithmetische Mittel der Werthe genommen werden, welche

$$u^2 + v^2 + w^2$$

während der Zeit T erhält, d. h., wenn man

$$\begin{aligned} u &= u \cos \frac{t}{T} 2\pi + u' \sin \frac{t}{T} 2\pi \\ v &= v \cos \frac{t}{T} 2\pi + v' \sin \frac{t}{T} 2\pi \\ w &= w \cos \frac{t}{T} 2\pi + w' \sin \frac{t}{T} 2\pi \end{aligned}$$

setzt,

$$\frac{1}{2} (u^2 + u'^2 + v^2 + v'^2 + w^2 + w'^2).$$

Ist der ganze unendliche Raum von dem betrachteten Medium erfüllt, befindet sich in demselben ein leuchtender Punkt an dem Orte des Punktes 1 , dessen Coordinaten x_1, y_1, z_1 sind, und bezeichnet man durch r_1 den Abstand der Punkte (x, y, z) und (x_1, y_1, z_1) von einander, durch λ die Wellenlänge des Lichtes, d. h. das Product αT , so ist die einfachste Annahme, die man über ϕ machen kann, und die erlaubt ist, wenn man unter ϕ eine der drei Grössen U, V, W versteht,

$$\phi = \frac{1}{r_1} \cos \left(\frac{r_1}{\lambda} - \frac{t}{T} \right) 2\pi. \quad (3)$$

¹⁾ CLEBSCH in BORCHARDT's Journal, Bd. 61.

Aus diesem Ausdruck von ϕ kann man einen allgemeineren, der auf denselben Fall sich bezieht, ableiten, indem man zu ihm einen constanten Factor, zu t eine additive Constante hinzufügt, nach x_1 , y_1 oder z_1 einmal oder wiederholt differentiirt und die Summe so gebildeter Ausdrücke nimmt. Das Resultat dieser Operation vereinfacht sich wesentlich, wenn man die Annahme einführt, die für die Optik von fundamentaler Bedeutung ist, dass die Wellenlänge λ als unendlich klein betrachtet werden darf. Man erhält dadurch, indem man nur die Glieder höchster Ordnung berücksichtigt,

$$\phi = \frac{D}{r_1} \cos\left(\frac{r_1}{\lambda} - \frac{t}{T}\right) 2\pi + \frac{D'}{r_1} \sin\left(\frac{r_1}{\lambda} - \frac{t}{T}\right) 2\pi, \quad (4)$$

wo D und D' von $\frac{\partial r_1}{\partial x_1}$, $\frac{\partial r_1}{\partial y_1}$, $\frac{\partial r_1}{\partial z_1}$, oder, was dasselbe ist, von $\frac{\partial r_1}{\partial x}$, $\frac{\partial r_1}{\partial y}$, $\frac{\partial r_1}{\partial z}$, d. h. von der Richtung der Linie r_1 abhängen, im Übrigen aber constant sind. Ausdrücke von derselben Form gelten dann nach (2) auch für u , v , w ; bezeichnet man die Werthe von D und D' für den Fall, dass $\phi = u$, $= v$ oder $= w$ gesetzt wird, durch A , A' , B , B' oder C , C' , lässt also diese 6 Zeichen Größen bedeuten, die von der Richtung der Linie r_1 abhängen, im Übrigen aber constant sind, so wird die Intensität des Lichtes im Punkte (x, y, z)

$$= \frac{1}{2r_1^2} (A^2 + A'^2 + B^2 + B'^2 + C^2 + C'^2).$$

Dadurch ist ausgesprochen, dass diese Intensität dem Quadrate der Entfernung vom leuchtenden Punkte umgekehrt proportional ist, dabei aber mit der Richtung der Linie r_1 in einer Weise variirt, die durch die Bewegung im leuchtenden Punkte bedingt ist.

Ein leuchtender Punkt, wie der gedachte, soll bei den folgenden Betrachtungen als Lichtquelle vorausgesetzt und es soll untersucht werden, wie das von ihm ausgehende Licht durch einen fremdartigen Körper, der in seine Nähe gebracht ist, modificirt wird. Ein wesentliches Hülfsmittel bei dieser Untersuchung wird ein Satz darbieten, den die Anwendung des GREEN'schen Satzes auf Functionen, die der für ϕ aufgestellten Differentialgleichung genügen, ergiebt, und der eine Präcisirung und eine Verallgemeinerung des sogenannten HUYGHENS'schen Principes bildet. Hr. HELMHOLTZ hat denselben schon in seiner »Theorie der Luftschwingungen in Röhren mit offenen Enden«¹⁾ abgeleitet und seine Wichtigkeit gezeigt; es soll dieser Satz auf einem anderen Wege und in einer anderen Form in dem folgenden Paragraphen entwickelt werden.

¹⁾ BORCHARDT's Journal Bd. 57.

§. 2.

Sind \mathfrak{U} und \mathfrak{B} zwei Functionen von x, y, z , die mit ihren ersten Differentialquotienten nach x, y, z innerhalb eines vollständig begrenzten Raumes (der auch aus mehreren getrennten Theilen bestehen kann) eindeutig und stetig sind, ist $d\tau$ ein Element dieses Raumes, ds ein Element seiner Oberfläche (die gleichfalls aus getrennten Theilen zusammengesetzt sein kann) und N die nach dem Innern des Raumes gerichtete Normale von ds , so ist nach dem GREEN'schen Satze

$$\int ds \left(\mathfrak{U} \frac{\partial \mathfrak{B}}{\partial N} - \mathfrak{B} \frac{\partial \mathfrak{U}}{\partial N} \right) = \int d\tau (\mathfrak{B} \Delta \mathfrak{U} - \mathfrak{U} \Delta \mathfrak{B}).$$

Hier setze man $\mathfrak{U} = \phi$ und nehme in Bezug auf \mathfrak{B} zunächst an, dafs es auch der Gleichung (1) genügt. Man erhält dann

$$\begin{aligned} \int ds \left(\phi \frac{\partial \mathfrak{B}}{\partial N} - \mathfrak{B} \frac{\partial \phi}{\partial N} \right) &= \frac{1}{a^2} \int d\tau \left(\mathfrak{B} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} - \phi \frac{\partial^2 \mathfrak{B}}{\partial t^2} \right) \\ \text{oder} &= \frac{1}{a^2} \frac{\partial}{\partial t} \int d\tau \left(\mathfrak{B} \frac{\partial \phi}{\partial t} - \phi \frac{\partial \mathfrak{B}}{\partial t} \right). \end{aligned}$$

Diese Gleichung multiplizire man mit dt und integriere zwischen zwei Werthen der Zeit, von denen der eine negativ, der andere positiv ist, und die $-t'$ und t'' genannt werden mögen. Bei einer gebräuchlichen Bezeichnungsweise ergibt sich dadurch

$$\int_{-t'}^{t''} dt \int ds \left(\phi \frac{\partial \mathfrak{B}}{\partial N} - \mathfrak{B} \frac{\partial \phi}{\partial N} \right) = \frac{1}{a^2} \left[\int d\tau \left(\mathfrak{B} \frac{\partial \phi}{\partial t} - \phi \frac{\partial \mathfrak{B}}{\partial t} \right) \right]_{-t'}^{t''} \quad (5)$$

Nun sei $\mathfrak{B} = \frac{F(r_0 + at)}{r_0},$

wo r_0 die Entfernung des Punktes (x, y, z) von einem beliebig gewählten Punkte, dem Punkte o , bedeutet und F eine Function ist, die für jeden endlichen, positiven oder negativen, Werth ihres Arguments verschwindet, nie negativ ist und der Bedingung genügt, dass

$$\int F(\zeta) d\zeta = 1, \quad (6)$$

wenn die Integration von einem endlichen negativen bis zu einem endlichen positiven Werthe von ζ ausgedehnt wird.

Es sei jetzt ein vollständig begrenzter Raum gegeben, der von homogenem Aether erfüllt und frei von leuchtenden Punkten ist; s sei seine Oberfläche und ds ein Element derselben. Der Punkt o werde im Innern dieses Raumes angenommen und die Gleichung (5) auf den Raum angewandt, der von jenem übrig bleibt, wenn eine unendlich kleine Kugel, deren Mittelpunkt der Punkt o ist, ausgeschlossen wird. dS sei ein Element der Oberfläche dieser Kugel. Es sei t' so gross gewählt, dass

$$r_0 - at'$$

für den grössten Werth, den r_0 in der Fläche s , also überhaupt in dem gedachten Raume, erhält, negativ und endlich ist; unter dieser Bedingung kommen auf der rechten Seite der Gleichung (5) nur Werthe von \mathfrak{B} und $\frac{\partial \mathfrak{B}}{\partial t}$ vor, für welche $r_0 + at$ endlich, positiv oder negativ, ist, und welche daher verschwinden. Die Gleichung (5) giebt daher

$$\int_{-r}^{r'} dt \int ds \left(\phi \frac{\partial \mathfrak{B}}{\partial N} - \mathfrak{B} \frac{\partial \phi}{\partial N} \right) + \int_{-r}^{r'} dt \int dS \left(\phi \frac{\partial \mathfrak{B}}{\partial N} - \mathfrak{B} \frac{\partial \phi}{\partial N} \right) = 0. \quad (7)$$

Das zweite von diesen beiden Integralen lässt sich ausführen. Bezeichnet man durch R den Radius der unendlich kleinen Kugel, auf die es sich bezieht, und vernachlässigt bei der Berechnung des mit dS multiplicirten Ausdrucks, was mit R^2 multiplicirt unendlich Kleines giebt, so kann man setzen

$$\frac{\partial \mathfrak{B}}{\partial N} = -\frac{1}{R^2} F(at), \quad \mathfrak{B} = 0,$$

also

$$\int dS \left(\phi \frac{\partial \mathfrak{B}}{\partial N} - \mathfrak{B} \frac{\partial \phi}{\partial N} \right) = -4\pi \phi_o F(at),$$

wo ϕ_o den Werth von ϕ für den Punkt o bedeutet. Da ferner $F(at)$ nur für unendlich kleine Werthe von t von Null verschieden und der Gleichung (6) zufolge

$$\int_{-r}^{r'} dt F(at) = \frac{1}{a}$$

ist, so wird das zweite Glied der Gleichung (7)

$$-\frac{4\pi}{a} \phi_o(o),$$

wo $\phi_o(o)$ den Werth von ϕ_o für $t=0$ bezeichnet. Auch bei ihrem ersten Gliede lässt sich die Integration nach t mit Hülfe der Gleichung (6) ausführen. Zunächst hat man

$$a \int_{-r}^{r'} dt \mathfrak{B} \frac{\partial \phi}{\partial N} = a \int_{-r}^{r'} dt \frac{F(r_0 + at)}{r_0} \frac{\partial \phi}{\partial N} = \frac{1}{r_0} \frac{\partial \phi}{\partial N},$$

wo in $\frac{\partial \phi}{\partial N}$ nach Ausführung der Differentiation

$$t = -\frac{r_0}{a}$$

zu setzen ist. Macht man

$$\frac{\partial \phi}{\partial N} = f(t), \quad (8)$$

so wird dieser Ausdruck also

$$\frac{1}{r_o} f\left(-\frac{r_o}{a}\right).$$

Ferner ist

$$\frac{\partial \mathfrak{B}}{\partial N} = \frac{\partial \frac{F(r_o + at)}{r_o}}{\partial N} = \frac{\partial \frac{1}{r_o}}{\partial N} F(r_o + at) + \frac{1}{r_o} \frac{\partial r_o}{\partial N} \frac{1}{a} \frac{\partial F(r_o + at)}{\partial t}$$

und daher

$$a \int_{-r}^{r} dt \phi \frac{\partial \mathfrak{B}}{\partial N} = \frac{\partial \frac{1}{r_o}}{\partial N} \phi\left(-\frac{r_o}{a}\right) + \frac{1}{r_o} \frac{\partial r_o}{\partial N} \int_{-r}^{r} \phi \frac{\partial F(r_o + at)}{\partial t} dt,$$

wo $\phi\left(-\frac{r_o}{a}\right)$ den Werth von ϕ für $t = -\frac{r_o}{a}$ bedeutet. Formt man das letzte Integral durch partielle Integration um und erwägt, dass die Function F für jeden endlichen Werth ihres Arguments verschwindet, so findet man denselben Ausdruck

$$= \frac{\partial \frac{1}{r_o}}{\partial N} \phi\left(-\frac{r_o}{a}\right) - \frac{1}{a} \frac{1}{r_o} \frac{\partial r_o}{\partial N} \frac{\partial \phi}{\partial t},$$

wo in $\frac{\partial \phi}{\partial t}$ ebenfalls $t = -\frac{r_o}{a}$ zu setzen ist. Substituirt man diese

Resultate in die Gleichung (7) und verlegt zugleich den Anfangspunkt der Zeit so, dass der bisherige Anfangspunkt der Zeitpunkt t wird, so erhält man

$$4\pi\phi_o(t) = \int ds \left\{ \frac{\partial \frac{1}{r_o}}{\partial N} \phi\left(t - \frac{r_o}{a}\right) - \frac{1}{a} \frac{1}{r_o} \frac{\partial r_o}{\partial N} \frac{\partial \phi}{\partial t}\left(t - \frac{r_o}{a}\right) - \frac{1}{r_o} f\left(t - \frac{r_o}{a}\right) \right\}. \quad (9)$$

Die beiden ersten Glieder des hier mit ds multiplicirten Ausdrucks lassen sich in das eine

$$\frac{\partial}{\partial N} \frac{\phi\left(t - \frac{r_o}{a}\right)}{r_o}$$

zusammenziehen, wo die Differentiation so auszuführen ist, dass nur r_o als variabel angesehen wird, den Grössen, von denen $\phi(t)$ abhängt, aber die Werthe gelassen werden, die ihnen in dem Elemente ds zukommen. Man hat hiernach

$$4\pi\phi_o(t) = \int ds \Omega, \quad (10)$$

wo

$$\Omega = \frac{\partial}{\partial N} \frac{\phi\left(t - \frac{r_o}{a}\right)}{r_o} - \frac{f\left(t - \frac{r_o}{a}\right)}{r_o}, \quad (11)$$

und wo die Function f durch (8) definirt ist.

Hieraus ist zu schliessen, dass die Bewegung des Äthers in dem von der Fläche s umschlossenen Raume angesehen werden kann als hervorgebracht von einer Schicht von leuchtenden Punkten in der Fläche s , da ein jedes von den beiden Gliedern, aus denen Ω zusammengesetzt ist, sich bezeichnen lässt als einem leuchtenden Punkte entsprechend, der am Orte von ds sich befindet.

Die folgende Betrachtung beweist, dass unter einer gewissen Bedingung, die später immer als erfüllt angenommen werden soll, die Gleichung (10) auch gilt, wenn die leuchtenden Punkte innerhalb des von der Fläche s umschlossenen Raumes liegen und der Punkt o ausserhalb desselben sich befindet; nur muss die Normale N dann nach Aussen gekehrt sein. Man wende in diesem Falle die Gleichung (10) auf den Raum an, der nach Innen durch die Fläche s , nach Aussen durch eine unendlich grosse Kugelfläche begrenzt ist, deren Element dS genannt werden möge. Man erhält dadurch

$$4\pi\phi_o(t) = \int ds \Omega + \int dS \Omega.$$

Nun nehme man an, dass bis zu einem gewissen, endlichen Werthe der Zeit überall Ruhe herrsche, so dass für unendlich grosse, negative Werthe von t überall, also auch an der unendlich grossen Kugel, $\phi(t)$ und $f(t)$ verschwinden. Wählt man den Punkt o im Endlichen und fasst nur endliche Werthe der Zeit ins Auge, so verschwindet dann Ω für jedes Element dS , weil hier $t - \frac{r_o}{a}$ negativ unendlich ist; man erhält also die Gleichung (10). Die Beschränkung, dass der Punkt o im Endlichen liegen und die Zeit endlich sein soll, ist dabei nur eine scheinbare; welches die Lage des Punktes o und der Werth von t sein möge, man kann den Radius der Kugel so gross wählen, dass die angestellte Betrachtung ihre Gültigkeit behält.

Wendet man die Gleichung (10) auf zwei geschlossene Flächen an, die einen Theil gemeinsam haben und beide den Punkt o , aber nicht die leuchtenden Punkte — oder auch die leuchtenden Punkte, aber nicht den Punkt o — umschliessen, und zieht die Resultate, die man dadurch erhält, von einander ab, so sieht man, dass das Integral $\int ds \Omega$, ausgedehnt über eine geschlossene Fläche, welche weder die leuchtenden Punkte noch den Punkt o umgiebt, verschwindet. Es verschwindet auch für eine geschlossene Fläche, welche den Punkt o und die leuchtenden Punkte umgiebt, wie man erkennt, wenn man die Gleichung (10) für zwei geschlossene Flächen bildet, die einen gemeinsamen Theil haben, und von denen die eine den Punkt o

und nicht die leuchtenden Punkte, die andere die leuchtenden Punkte und nicht den Punkt o umgiebt.

Die Anwendung, die von der Gleichung (10) bei dem vorliegenden, am Ende des vorigen Paragraphen bezeichneten Problem zu machen ist, liegt auf der Hand. Man denke sich in dem homogenen Äther, der den unendlichen Raum erfüllt, einen leuchtenden Punkt 1; auf die Bewegung, die er hervorbringt, beziehe sich die Function ϕ^* . Wird ein fremdartiger Körper in den Raum gebracht, so wird die Bewegung geändert; es werde dadurch ϕ aus ϕ^* ; es handelt sich darum ϕ zu ermitteln für irgend einen Punkt o , der ausserhalb des Körpers liegt. Es sei ds ein Element der Oberfläche des Körpers, dS ein Element einer unendlich kleinen Kugelfläche, die um den leuchtenden Punkt beschrieben ist; der Gleichung (10) zufolge ist dann

$$4\pi\phi_o = \int dS \Omega + \int ds \Omega.$$

Das erste dieser beiden Integrale hat einen leicht angebbaren Werth. Die Änderung der Bewegung an dem Elemente dS , die durch die Einführung des Körpers hervorgerufen wird, ist (bei Ausschluss eines gewissen, speciellen Falles) nicht unendlich gross, und, da die Kugelfläche, der dS angehört, unendlich klein ist, so ist ihr Einfluss auf den Werth des Integrals unendlich klein. Es kann in diesem also ϕ^* für ϕ gesetzt werden, wodurch dasselbe nach der Gleichung (10) $= 4\pi\phi_o^*$ wird, wenn ϕ_o^* den Werth von ϕ^* im Punkte o bezeichnet. Man hat daher

$$4\pi\phi_o = 4\pi\phi_o^* + \int ds \Omega. \quad (12)$$

Nach dieser Gleichung kann ϕ_o allgemein berechnet werden, wenn man ϕ^* und für die Oberfläche des Körpers die Werthe von ϕ und $\frac{\partial\phi}{\partial N}$ kennt.

§. 3.

Für die später anzustellenden Betrachtungen ist es nöthig den Werth zu kennen, den das Integral $\int ds \Omega$, ausgedehnt über eine begrenzte Fläche, unter gewissen Bedingungen hat. Dieser Werth soll jetzt abgeleitet werden. Vorausgesetzt soll dabei werden, dass die Wellenlänge unendlich klein ist, dass ϕ von einem leuchtenden Punkte 1 herrührt, also den in (4) angegebenen Ausdruck hat, dass für keinen endlichen Theil der Fläche s , über die das Integral auszudehnen ist, oder ihrer Grenze $r_1 + r_o$ constant, oder bis auf unendlich Kleines constant ist, und endlich, dass die gerade Verbindungs-

linie der Punkte i und o nicht durch die Grenze der Fläche oder unendlich nahe an ihr vorbei geht. Es wird bewiesen werden, dass dann das genannte Integral verschwindet, falls die gerade Verbindungslinie von i und o die Fläche s nicht schneidet. Die Rechnung wird ergeben, dass, wenn ein solcher Schnitt stattfindet, das Integral $= \pm 4\pi\phi$ ist, wo das obere oder untere Zeichen gilt, je nachdem die Normale N in dem Schnittpunkt einen spitzen oder stumpfen Winkel mit der von i nach o gezogenen Geraden bildet; was, wenn die erste Behauptung bewiesen ist, schon aus der Gleichung (10) folgt.

Man nehme zuerst für ϕ den in (3) gegebenen Ausdruck an, setze also

$$\phi = \frac{1}{r_i} \cos \left(\frac{r_i}{\lambda} - \frac{t}{T} \right) 2\pi;$$

dann wird

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial N} \frac{1}{r_o} \phi \left(t - \frac{r_o}{a} \right) &= - \frac{1}{r_i r_o^2} \frac{\partial r_o}{\partial N} \cos \left(\frac{r_i + r_o}{\lambda} - \frac{t}{T} \right) 2\pi \\ &\quad - \frac{2\pi}{r_i r_o \lambda} \frac{\partial r_o}{\partial N} \sin \left(\frac{r_i + r_o}{\lambda} - \frac{t}{T} \right) 2\pi, \end{aligned}$$

ferner nach (8)

$$\begin{aligned} \frac{1}{r_o} f \left(t - \frac{r_o}{a} \right) &= - \frac{1}{r_i^2 r_o} \frac{\partial r_i}{\partial N} \cos \left(\frac{r_i + r_o}{\lambda} - \frac{t}{T} \right) 2\pi \\ &\quad - \frac{2\pi}{r_i r_o \lambda} \frac{\partial r_i}{\partial N} \sin \left(\frac{r_i + r_o}{\lambda} - \frac{t}{T} \right) 2\pi \end{aligned}$$

und daher nach (11)

$$\begin{aligned} \Omega &= \frac{1}{r_i r_o} \left(\frac{1}{r_i} \frac{\partial r_i}{\partial N} - \frac{1}{r_o} \frac{\partial r_o}{\partial N} \right) \cos \left(\frac{r_i + r_o}{\lambda} - \frac{t}{T} \right) 2\pi \\ &\quad + \frac{2\pi}{r_i r_o \lambda} \left(\frac{\partial r_i}{\partial N} - \frac{\partial r_o}{\partial N} \right) \sin \left(\frac{r_i + r_o}{\lambda} - \frac{t}{T} \right) 2\pi. \end{aligned} \quad (13)$$

Um bei diesem Werthe von Ω das genannte Integral zu finden, gehe man von dem folgenden Satze aus.

Bezeichnet $F(\zeta)$ eine Function von ζ , die stetig ist in dem Intervall, in dem ζ von ζ_o bis ζ' wächst, und δ eine Constante, so verschwindet das Integral

$$\int_{\zeta_o}^{\zeta'} \frac{dF}{d\zeta} \sin(k\zeta + \delta) d\zeta, \quad (14)$$

wenn k unendlich gross wird.

Die Richtigkeit dieses Satzes folgt aus Betrachtungen, die denen ganz ähnlich sind, welche DIRICHLET bei seinen Untersuchungen über die FOURIER'sche Reihe in Bezug auf ein ähnliches Integral angestellt hat. Man zerlege das Integral in solche Theile, dass innerhalb eines

jeden $\frac{dF}{d\zeta}$ weder sein Vorzeichen wechselt, noch vom Abnehmen ins Zunehmen oder umgekehrt übergeht; von jedem dieser Theile (deren Anzahl als endlich vorausgesetzt wird) beweist man, dass er verschwindet, wenn k ins Unendliche wächst, indem man ihn weiter in Theile zerlegt der Art, dass alle Werthe von ζ , für welche $\sin(k\zeta + \delta) = 0$ ist, als Zwischen-Grenzen auftreten, und die Ungleichheiten benutzt, die für die absoluten Werthe dieser Theile sich angeben lassen.

Aus diesem Satze ergibt sich leicht der folgende.

Wenn die Function $F(\zeta)$ die Eigenschaft hat, dass ihr erster Differentialquotient in dem Intervall von $\zeta = \zeta_0$ bis $\zeta = \zeta'$ stetig ist, so wird für $k = \infty$

$$k \int_{\zeta_0}^{\zeta'} \frac{dF}{d\zeta} \sin(k\zeta + \delta) d\zeta = - \left[\frac{dF}{d\zeta} \cos(k\zeta + \delta) \right]_{\zeta_0}^{\zeta'} \quad (15)$$

In der That wird die linke Seite dieser Gleichung durch partielle Integration

$$= - \left[\frac{dF}{d\zeta} \cos(k\zeta + \delta) \right]_{\zeta_0}^{\zeta'} + \int_{\zeta_0}^{\zeta'} \frac{d^2 F}{d\zeta^2} \cos(k\zeta + \delta) d\zeta;$$

das neue, hier auftretende Integral ist aber von der Form des Integrals (14), verschwindet also, wenn k ins Unendliche wächst.

Jetzt denke man sich eine stetig gekrümmte, vollständig begrenzte Fläche s , deren Element ds sein soll, nenne r_1 und r_0 die Entfernungen dieses Elementes von zwei festen Punkten 1 und 0, setze

$$\zeta = r_1 + r_0,$$

bezeichne durch G eine sich stetig ändernde Function des Ortes von ds , durch δ eine Constante, und untersuche den Werth, den das Integral

$$\int G \sin(k\zeta + \delta) ds \quad (16)$$

annimmt, wenn k unendlich gross wird.

Zu diesem Zwecke stelle man sich die Flächen vor, deren Gleichung

$$\zeta = \text{const.}$$

ist, also die Rotationsellipsoide, deren Brennpunkte die Punkte 1 und 0 sind, und die Schnittlinien dieser mit der Fläche s ; dann setze man

$$F(\zeta) = \pm \int G ds, \quad (17)$$

wo die Integration über den Theil der Fläche s auszudehnen ist, der zwischen den zwei Schnittlinien liegt, von denen die eine dem variablen Werthe ζ , die andere einem beliebig gewählten, festen

Werthe Z entspricht, und wo das Zeichen $+$ gelten soll, wenn $\zeta > Z$, das Zeichen $-$, wenn $\zeta < Z$ ist. Bei dieser Festsetzung ist, wenn $d\zeta$ positiv gewählt wird,

$$\frac{dF}{d\zeta} d\zeta = \int G ds, \quad (18)$$

wo die Integration über den Theil der Fläche s auszudehnen ist, der zwischen den beiden Schnittlinien liegt, welche den Werthen ζ und $\zeta + d\zeta$ entsprechen. Ist ζ_0 der kleinste, ζ' der grösste Werth von ζ in der Fläche s , so ist hiernach das Integral (16)

$$= \int_{\zeta_0}^{\zeta'} \frac{dF}{d\zeta} \sin(k\zeta + \delta) d\zeta,$$

also = dem Integral (14); es verschwindet daher für $k = \infty$, falls $F(\zeta)$ in der Fläche s stetig ist, d. h. falls für keinen endlichen Theil der Fläche s ein constanter Werth von ζ stattfindet.

Es werde jetzt bei gleicher Bedeutung der Zeichen der Ausdruck

$$k \int G \sin(k\zeta + \delta) ds \quad (19)$$

ins Auge gefasst. Dieser ist

$$= k \int_{\zeta_0}^{\zeta'} \frac{dF}{d\zeta} \sin(k\zeta + \delta) d\zeta,$$

also gleich dem linken Theile der Gleichung (15). Er ist daher für $k = \infty$ auch gleich dem rechten Theile derselben, falls das durch (18)

definierte $\frac{dF}{d\zeta}$ innerhalb der Fläche s stetig ist. Dieser Differential-

quotient ist unstetig, sobald ζ für einen endlichen Theil der Grenze von s constant ist; wird dieser Fall ausgeschlossen, so kann eine Unstetigkeit nur eintreten, wenn für einen Punkt der Fläche $d\zeta$ verschwindet. Es wird besonders untersucht werden, was dann stattfindet. Sonst hat die Gleichung (15) Gültigkeit, und aus dieser folgt weiter, dass der Ausdruck (19) verschwindet. Unter den gemachten Voraussetzungen findet nämlich sowohl der grösste als der kleinste Werth von ζ in einem oder einigen Punkten der Grenze von s statt

und für einen jeden solchen Punkt ist das Integral $\int G ds$, das man berechnen muss, um nach (18) das entsprechende $\frac{dF}{d\zeta}$ zu ermitteln,

unendlich klein von höherer Ordnung als $d\zeta$; es verschwindet also dieses $\frac{dF}{d\zeta}$.

Nun ist der Werth von (19) für den Fall zu suchen, dass $d\zeta$ für einen Punkt in der Fläche s verschwindet. Es geschehe das für den Punkt (x, y, z) und $g(x, y, z) = 0$ sei die Gleichung dieser Fläche; dann ist

$$\begin{aligned}\frac{\partial r_1}{\partial x} + \frac{\partial r_0}{\partial x} &= L \frac{\partial g}{\partial x} \\ \frac{\partial r_1}{\partial y} + \frac{\partial r_0}{\partial y} &= L \frac{\partial g}{\partial y} \\ \frac{\partial r_1}{\partial z} + \frac{\partial r_0}{\partial z} &= L \frac{\partial g}{\partial z},\end{aligned}$$

wo L einen unbestimmten Factor bedeutet. Bezeichnen $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1, \alpha_0, \beta_0, \gamma_0$ und α, β, γ die Cosinus der Winkel, welche die Coordinatenachsen bilden mit der Linie, die von dem Punkte 1 nach dem Punkte (x, y, z) gezogen ist, der Linie, die von dem Punkte 0 nach dem Punkte (x, y, z) gezogen ist, und einer Normale N der Fläche s in diesem Punkte, so lassen diese Gleichungen sich schreiben:

$$\begin{aligned}\alpha_1 + \alpha_0 &= M\alpha \\ \beta_1 + \beta_0 &= M\beta \\ \gamma_1 + \gamma_0 &= M\gamma,\end{aligned}\tag{20}$$

wo M einen neuen Factor bedeutet. Es ergibt sich aus ihnen einmal, dass die Linien r_1, r_0 und N in einer Ebene liegen; dann folgt auch

$$M(\alpha\alpha_1 + \beta\beta_1 + \gamma\gamma_1) = M(\alpha\alpha_0 + \beta\beta_0 + \gamma\gamma_0),$$

und diese Gleichung sagt aus, dass entweder $M = 0$, d. h. $\alpha_0 = -\alpha_1, \beta_0 = -\beta_1, \gamma_0 = -\gamma_1$ ist, also der Punkt (x, y, z) zwischen den Punkten 1 und 0, auf ihrer geraden Verbindungslinie liegt, oder die Richtungen $(\alpha_1, \beta_1, \gamma_1)$ und $(\alpha_0, \beta_0, \gamma_0)$ mit der Richtung von N gleiche Winkel bilden. Im zweiten Falle müssen die Linien r_1 und r_0 auf entgegengesetzten Seiten der Normale N liegen, wenn sie nicht mit dieser oder ihrer Verlängerung zusammenfallen; denn durch $\alpha_0 = \alpha_1, \beta_0 = \beta_1, \gamma_0 = \gamma_1$ werden die Gleichungen (20) nicht erfüllt, es sei denn, dass r_1 und r_0 mit N oder der Verlängerung von N zusammenfallen.

Es werde jetzt die Bedeutung der Zeichen x, y, z geändert und durch (x, y, z) ein variabler Punkt der Fläche s in Bezug auf ein Coordinatensystem bezeichnet, dessen Anfangspunkt der frühere Punkt (x, y, z) und dessen z -Axe die Normale N ist. Es sollen ferner die Dimensionen der Fläche s als unendlich klein (aber als unendlich gross gegen $\frac{1}{k}$) angenommen werden; es ist ausreichend unter dieser Annahme das Integral (19) zu berechnen, da sein Werth durch Hinzufügung neuer

Teile zur Fläche s nach dem, was bewiesen ist, nicht geändert wird. Die Gleichung der Fläche s ist dann

$$z = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2, \quad (21)$$

wo a_{11} , a_{12} , a_{22} Constanten sind, und zugleich ist

$$ds = dx dy.$$

Um die Schnittlinien der Fläche s mit den Flächen $\zeta = \text{const.}$ zu finden, muss nun der Ausdruck von ζ gebildet und nach Potenzen von x und y entwickelt werden. Es seien x_0 , y_0 , z_0 die Coordinaten des Punktes o und

$$\rho_0 = \sqrt{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2};$$

dann ist

$$r_0 = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}$$

oder

$$r_0 = \sqrt{\rho_0^2 - 2xx_0 - 2yy_0 - 2zz_0 + x^2 + y^2 + z^2}.$$

Bezeichnet man x und y als unendlich klein von der ersten Ordnung und entwickelt r_0 bei Benutzung von (21) bis auf Grössen der zweiten Ordnung inclusive, so ergibt sich

$$r_0 = \rho_0 - \frac{xx_0 + yy_0}{\rho_0} - \frac{a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2}{\rho_0} z_0 + \frac{x^2 + y^2}{2\rho_0} - \frac{(xx_0 + yy_0)^2}{2\rho_0^3},$$

oder, da die in (20) vorkommenden Grössen α_0 , β_0 , γ_0 den Gleichungen

$$\frac{x_0}{\rho_0} = -\alpha_0, \quad \frac{y_0}{\rho_0} = -\beta_0, \quad \frac{z_0}{\rho_0} = -\gamma_0$$

genügen,

$$r_0 = \rho_0 + \alpha_0 x + \beta_0 y + (a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2)\gamma_0 + \frac{1}{2\rho_0} (x^2(1 - \alpha_0^2) - 2xy\alpha_0\beta_0 + y^2(1 - \beta_0^2)).$$

Setzt man entsprechend

$$\rho_1 = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2},$$

so findet man ebenso

$$r_1 = \rho_1 + \alpha_1 x + \beta_1 y + (a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2)\gamma_1 + \frac{1}{2\rho_1} (x^2(1 - \alpha_1^2) - 2xy\alpha_1\beta_1 + y^2(1 - \beta_1^2)).$$

Bei dem gewählten Coordinatensystem ist aber $\alpha = 0$ und $\beta = 0$, und daher nach (20)

$$\alpha_1 + \alpha_0 = 0, \quad \beta_1 + \beta_0 = 0.$$

Man hat daher

$$\zeta = A_0 + A_{11}x^2 + 2A_{12}xy + A_{22}y^2,$$

wo

$$\left. \begin{aligned} A_0 &= \rho_1 + \rho_0 \\ A_{11} &= a_{11}(\gamma_1 + \gamma_0) + \frac{1 - \alpha_1^2}{2\rho_1} + \frac{1 - \alpha_0^2}{2\rho_0} \\ A_{12} &= a_{12}(\gamma_1 + \gamma_0) - \frac{\alpha_1\beta_1}{2\rho_1} - \frac{\alpha_0\beta_0}{2\rho_0} \\ A_{22} &= a_{22}(\gamma_1 + \gamma_0) + \frac{1 - \beta_1^2}{2\rho_1} + \frac{1 - \beta_0^2}{2\rho_0} \end{aligned} \right\} (22)$$

Die Schnittcurven der Flächen $\zeta = \text{const.}$ mit der Fläche s sind hiernach ähnliche und ähnlich liegende Kegelschnitte, deren gemeinsamer Mittelpunkt der Anfangspunkt der Coordinaten ist. Ihre Gleichung, bezogen auf die Hauptachsen, sei

$$\zeta - A_0 = \mu_1 x^2 + \mu_2 y^2,$$

d. h. es seien μ_1 und μ_2 die (stets reellen) Wurzeln der quadratischen Gleichung

$$(A_{11} - \mu)(A_{22} - \mu) - A_{12}^2 = 0. \quad (23)$$

Haben μ_1 und μ_2 gleiches Vorzeichen, so sind die Kegelschnitte Ellipsen; A_0 ist das Minimum von ζ , wenn μ_1 und μ_2 positiv sind, das Maximum, wenn diese beiden Grössen das negative Vorzeichen haben. Im ersten Falle ist die Fläche der Ellipse, die einem Werthe von ζ entspricht,

$$= \frac{\pi(\zeta - A_0)}{\sqrt{\mu_1 \mu_2}},$$

im zweiten

$$= \frac{\pi(A_0 - \zeta)}{\sqrt{\mu_1 \mu_2}},$$

wo die Wurzel positiv zu nehmen ist, wie überhaupt die Wurzel aus einer positiven Grösse hier positiv verstanden werden soll. Nach der Gleichung (17) ist daher, wenn die dort mit Z bezeichnete Grösse $= A_0$ gewählt wird, für Werthe von ζ , bei denen die entsprechenden Ellipsen ganz innerhalb der Fläche s liegen, in beiden Fällen

$$F(\zeta) = G \frac{\pi(\zeta - A_0)}{\sqrt{\mu_1 \mu_2}},$$

wo G sich auf den Punkt ($x = 0$, $y = 0$) bezieht, also

$$\frac{dF}{d\zeta} = G \frac{\pi}{\sqrt{\mu_1 \mu_2}}.$$

Fällt kein Theil der Grenze von s mit einer der Ellipsen zusammen, so ist $\frac{dF}{d\zeta}$ in dieser Fläche stetig und für den zweiten Grenzwert, den ζ hier erlangt, $= 0$. Danach ist der Ausdruck (19) für $k = \infty$, wenn μ_1 und μ_2 positiv sind,

$$= G \frac{\pi}{\sqrt{\mu_1 \mu_2}} \cos(kA_0 + \delta), \quad (24)$$

und, wenn μ_1 und μ_2 negativ sind,

$$= -G \frac{\pi}{\sqrt{\mu_1 \mu_2}} \cos(kA_0 + \delta). \quad (25)$$

Weniger einfach gestaltet sich die Rechnung, wenn μ_1 und μ_2 entgegengesetzte Vorzeichen haben, die Kegelschnitte also Hyperbeln sind; in welchem Falle $\frac{dF}{d\zeta}$ bei $\zeta = A_0$ unstetig ist. Man wähle hier

die Hauptaxen als Coordinatenaxen und gebe der Fläche s eine bestimmte Gestalt, nämlich die eines Rechtecks, dessen Seiten den Hauptaxen parallel sind und die Gleichungen

$$x = \pm a, \quad y = \pm b$$

Haben. Die Ecken sollen auf den Asymptoten liegen, es soll also

$$a\sqrt{\mu_1} = b\sqrt{-\mu_2} = c$$

sein, wo μ_1 positiv, μ_2 negativ, c positiv ist. Die reelle Hauptaxe der einem Werthe von ζ entsprechenden Hyperbel fällt dann in die x -Axe, wenn $\zeta - A_0$ positiv, in die y -Axe, wenn $\zeta - A_0$ negativ ist. Setzt man wieder die bei der Gleichung (17) definirte Grösse $Z = A_0$, so hat man daher für $\zeta > A_0$

$$F(\zeta) = G \left\{ 2ab - \frac{4}{\sqrt{-\mu_2}} \int_0^a \frac{\sqrt{\mu_1 x^2 - \zeta + A_0} dx}{\sqrt{\frac{\zeta - A_0}{\mu_1}}} \right\},$$

wo G wiederum auf den Punkt ($x=0, y=0$) sich bezieht. Daraus folgt

$$\frac{dF}{d\zeta} = G \frac{2}{\sqrt{-\mu_2}} \int_0^a \frac{dx}{\sqrt{\mu_1 x^2 - \zeta + A_0} \sqrt{\frac{\zeta - A_0}{\mu_1}}}$$

oder, da

$$\int_1^z \frac{dz}{\sqrt{z^2 - 1}} = \lg(z + \sqrt{z^2 - 1}),$$

$$\frac{dF}{d\zeta} = G \frac{2}{\sqrt{-\mu_1 \mu_2}} \lg \frac{c + \sqrt{c^2 - \zeta + A_0}}{\sqrt{\zeta - A_0}}.$$

Ebenso findet man für $\zeta < A_0$

$$\frac{dF}{d\zeta} = G \frac{2}{\sqrt{-\mu_1 \mu_2}} \lg \frac{c + \sqrt{c^2 + \zeta - A_0}}{\sqrt{A_0 - \zeta}}.$$

Erwägt man, dass der kleinste Werth von ζ in den Punkten ($x=0, y=\pm b$) stattfindet und $= A_0 - c^2$ ist, während der grösste in den Punkten ($x=\pm a, y=0$) vorkommt und $= A_0 + c^2$ ist, so ergibt sich der Ausdruck (19)

$$= G \frac{2}{\sqrt{-\mu_1 \mu_2}} k \left\{ \int_{A_0 - c^2}^{A_0} \lg \frac{c + \sqrt{c^2 + \zeta - A_0}}{\sqrt{A_0 - \zeta}} \sin(k\zeta + \delta) d\zeta \right. \\ \left. + \int_{A_0}^{A_0 + c^2} \lg \frac{c + \sqrt{c^2 - \zeta + A_0}}{\sqrt{\zeta - A_0}} \sin(k\zeta + \delta) d\zeta \right\}.$$

Setzt man in dem ersten dieser beiden Integrale

$$A_0 - \zeta = \xi,$$

in dem zweiten

$$\zeta - A_0 = \xi,$$

so wird derselbe Ausdruck

$$= G \frac{2}{\sqrt{-\mu_1 \mu_2}} k \int_0^c \lg \frac{c + \sqrt{c^2 - \xi}}{\sqrt{\xi}} (\sin(k\xi + kA_0 + \delta) - \sin(k\xi - kA_0 - \delta)) d\xi,$$

oder

$$= G \frac{4}{\sqrt{-\mu_1 \mu_2}} k \sin(kA_0 + \delta) \int_0^c \lg \frac{c + \sqrt{c^2 - \xi}}{\sqrt{\xi}} \cos k\xi d\xi.$$

Nun ist aber

$$\begin{aligned} & k \int_0^c \lg \frac{c + \sqrt{c^2 - \xi}}{\sqrt{\xi}} \cos k\xi d\xi \\ &= \left[\sin k\xi \lg \frac{c + \sqrt{c^2 - \xi}}{\sqrt{\xi}} \right]_{\xi=0}^{\xi=c} - \int_0^c \sin k\xi \frac{d}{d\xi} \lg(c + \sqrt{c^2 - \xi}) d\xi \\ & \quad + \frac{1}{2} \int_0^c \frac{\sin k\xi}{\xi} d\xi. \end{aligned}$$

Das erste von diesen 3 Gliedern ist für jeden Werth von k gleich Null, da der in den Klammern stehende Ausdruck sowohl für $\xi = c^2$, als für $\xi = 0$ verschwindet; das zweite ist von der Form des Ausdrucks (14) und verschwindet daher für $k = \infty$, da $\lg(c + \sqrt{c^2 - \xi})$ auch bei $\xi = c^2$ stetig ist, obwohl sein Differentialquotient unendlich wird; das dritte endlich ist für $k = \infty$

$$= \frac{1}{2} \int_0^\pi \frac{\sin u du}{u} \text{ d. h. } = \frac{\pi}{4}.$$

Der gesuchte Werth des Ausdrucks (19) ist daher, wenn μ_1 und μ_2 von entgegengesetztem Vorzeichen sind,

$$= G \frac{\pi}{\sqrt{-\mu_1 \mu_2}} \sin(kA_0 + \delta). \quad (26)$$

Bei der weiteren Discussion der Ausdrücke (24), (25) und (26) ist zu benutzen, dass, da μ_1 und μ_2 die Wurzeln der Gleichung (23) sind,

$$\mu_1 \mu_2 = A_{11} A_{22} - A_{12}^2 \quad (27)$$

ist, wo A_{11} , A_{12} , A_{22} die in (22) angegebenen Werthe haben.

Wie aus den Gleichungen (20) geschlossen ist, beziehen sich die nun durchgeführten Betrachtungen auf zwei Fälle; der erste von diesen ist der, dass die Fläche s von der geraden Verbindungslinie der

Punkte 1 und 0 geschnitten wird, der zweite der, dass es in der Fläche s einen Punkt giebt, der die Eigenschaft hat, dass die von ihm nach den Punkten 1 und 0 gezogenen Linien gleiche Winkel mit der Normale der Fläche s bilden und mit dieser in einer Ebene liegen. Der erste von diesen Fällen soll hier noch weiter untersucht werden. In ihm ist

$$\alpha_1 + \alpha_0 = 0, \quad \beta_1 + \beta_0 = 0, \quad \gamma_1 + \gamma_0 = 0,$$

die Gleichungen (22) geben daher

$$A_{11} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\rho_1} + \frac{1}{\rho_0} \right) (1 - \alpha_1^2)$$

$$A_{12} = -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\rho_1} + \frac{1}{\rho_0} \right) \alpha_1 \beta_1$$

$$A_{22} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\rho_1} + \frac{1}{\rho_0} \right) (1 - \beta_1^2)$$

und nach (27) ist

$$\mu_1 \mu_2 = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{\rho_1} + \frac{1}{\rho_0} \right)^2 \gamma_1^2.$$

Die Wurzeln der Gleichung (23), μ_1 und μ_2 , sind

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\rho_1} + \frac{1}{\rho_0} \right) \quad \text{und} \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\rho_1} + \frac{1}{\rho_0} \right) \gamma_1^2,$$

also beide positiv; daher ist der Ausdruck (19) dem Ausdruck (24) gleichzusetzen; er ist also

$$= \pm G 2\pi \frac{\rho_1 \rho_0}{\rho_1 + \rho_0} \frac{1}{\gamma_1} \cos \left(k(\rho_1 + \rho_0) + \delta \right), \quad (28)$$

wo das positive oder negative Zeichen zu wählen ist, je nachdem γ_1 positiv oder negativ ist.

Bei diesen, über den Ausdruck (19) angestellten Betrachtungen ist δ als eine Constante angenommen; sie gelten aber auch, wenn δ , wie G , sich stetig mit dem Orte von ds ändert; dann muss in den Ausdrücken (24), (25), (26) und (28) δ , sowie G , auf den Punkt ($x=0$, $y=0$) bezogen werden. Man sieht das ein, wenn man erwägt, dass das Integral (19) bei variablem δ durch die Formel

$$\sin(k\zeta + \delta) = \cos \delta \sin k\zeta + \sin \delta \cos k\zeta$$

in die Summe zweier Integrale von gleicher Form zerlegt werden kann, in denen δ die constanten Werthe 0 und $\frac{\pi}{2}$ hat.

Mit Hülfe der gewonnenen Resultate ist es nun leicht, die im Eingange dieses Paragraphen in Betreff des Integrals $\int ds \Omega$ ausgesprochene Behauptung zu beweisen.

Es habe zunächst Ω den in (13), also ϕ den in (3) angegebenen Werth; man setze

$$\frac{2\pi}{\lambda} = k \text{ und } -\frac{t}{T} 2\pi = \delta;$$

man sieht dann, dass der Theil des genannten Integrals, der von dem ersten Gliede von Ω herrührt, verschwindet, und dass auch der Theil desselben, den das zweite Glied von Ω ergiebt, gleich Null ist, wenn es nicht in der Fläche s einen Punkt der Art giebt, dass die von ihm nach den Punkten 1 und o gezogenen Linien gleiche Winkel mit der Normale der Fläche bilden und mit dieser in einer Ebene liegen, und wenn die Fläche nicht von der Verbindungslinie der Punkte 1 und o geschnitten wird. Ist die erste von diesen beiden Bedingungen nicht erfüllt, so verschwindet das betreffende Integral aber auch; um seinen Werth zu finden, hat man nämlich in dem Ausdruck (24), (25) oder (26) für G den Werth zu setzen, den

$$\frac{1}{r_1 r_o} \left(\frac{\partial r_1}{\partial N} - \frac{\partial r_o}{\partial N} \right) \quad (29)$$

in dem bezeichneten Punkte annimmt, und dieser Werth ist gleich Null, da $\frac{\partial r_1}{\partial N}$ und $\frac{\partial r_o}{\partial N}$ die Cosinus der Winkel sind, die einander

gleich sein sollen. Es verschwindet daher $\int ds \Omega$ nur dann nicht, wenn die Fläche s von der Verbindungslinie der Punkte 1 und o geschnitten wird. Der Ausdruck (28) giebt in diesem Falle seinen Werth, wenn man in ihn für G den Werth setzt, den (29) in dem Schnittpunkte hat. Lässt man die Richtung von N , die in (13) vorkommt, mit der Richtung der z -Axe zusammenfallen, auf die γ_1 in (28) sich bezieht, so wird

$$\frac{\partial r_1}{\partial N} = \gamma_1, \quad \frac{\partial r_o}{\partial N} = -\gamma_1$$

und daher der Werth von (29)

$$= \frac{2\gamma_1}{\rho_1 \rho_o},$$

also

$$\int ds \Omega = \pm \frac{4\pi}{\rho_1 + \rho_o} \cos \left(\frac{\rho_1 + \rho_o}{\lambda} - \frac{t}{T} \right) 2\pi$$

oder

$$= \pm 4\pi \phi_o,$$

wo die positiven oder negativen Zeichen gelten, je nachdem γ_1 positiv oder negativ ist, d. h. je nachdem die Normale N mit der von 1 nach o gezogenen Linie einen spitzen oder einen stumpfen Winkel bildet.

Hiermit ist die in Rede stehende Behauptung für den Fall bewiesen, dass ϕ den durch die Gleichung (3) angegebenen Werth hat; sie bleibt richtig, wenn man von dieser Gleichung in der dort angegebenen Weise zu der allgemeineren Gleichung (4) übergeht.

§. 4.

Um aus der Gleichung (12) Folgerungen ziehen zu können, ist es nöthig, die Werthe von ϕ und $\frac{\partial \phi}{\partial N}$ an der Oberfläche des Körpers, den die Gleichung voraussetzt, zu untersuchen.

Fallen in einem durchsichtigen Mittel auf die Ebene, in der dasselbe an ein zweites Mittel grenzt, ebene Lichtwellen, so bilden sich reflektirte und gebrochene ebene Wellen. Dass diese entstehen und die Richtungen haben, die sie erfahrungsmässig besitzen, kann als eine Folge davon angesehen werden, dass zwischen den Verrückungen der Äthertheile an der Grenze in beiden Mitteln und deren Differentialquotienten lineare, homogene Gleichungen mit constanten Coefficienten bestehen. Es beziehe sich ϕ_e auf das einfallende Licht, ϕ_r auf das reflektirte im Punkte (ξ, η, ζ) ; für das erste Mittel sei $\zeta < 0$, für das zweite $\zeta > 0$ und

$$\phi_e = A \cos \left(\frac{l\xi + m\eta + n\zeta}{\lambda} - \frac{t + \alpha}{T} \right) 2\pi,$$

wobei l, m, n die Cosinus der Winkel bedeuten, die die Coordinatenachsen mit der Richtung der Wellennormale des einfallenden Lichtes bilden, in der dieses fortschreitet. Es ist dann

$$\phi_r = cA \cos \left(\frac{l\xi + m\eta - n\zeta}{\lambda} - \frac{t + \alpha + \gamma}{T} \right) 2\pi,$$

wo c und γ Constanten sind, deren Werthe abhängen von der Bedeutung des Zeichens ϕ , dem Einfallswinkel, dem Polarisationszustande des einfallenden Lichtes und der Natur der beiden Mittel. Für $\zeta = 0$ hat man daher, wenn man die Zeichen $\phi_e(t)$ und $\phi_r(t)$ als gleichbedeutend mit ϕ_e und ϕ_r gebraucht,

$$\phi_e(t) = c\phi_r(t + \gamma)$$

$$\text{und} \quad \frac{\partial \phi_e(t)}{\partial \zeta} = -c \frac{\partial \phi_r(t + \gamma)}{\partial \zeta}, \quad (30)$$

von welchen Gleichungen die zweite auch geschrieben werden kann

$$\frac{\partial \phi_e(t)}{\partial N} = -c \frac{\partial \phi_r(t + \gamma)}{\partial N}, \quad (30)$$

wenn N , wie früher, die nach dem Innern des ersten Mittels gekehrte Normale der Grenze bedeutet.

Sind im einfallenden Lichte gleichzeitig Wellen von verschiedenen Richtungen vorhanden, so dass sowohl ϕ_e als ϕ_r eine Summe solcher Ausdrücke ist, wie sie eben diesen Zeichen gleichgesetzt sind, so bestehen entsprechende Gleichungen für die einzelnen Glieder dieser Summen.

Diese Sätze können eine Anwendung auf den Fall finden, auf den die Gleichung (12) sich bezieht, wenn man die Wellenlänge λ als unendlich klein voraussetzt und die Krümmung der Oberfläche des gedachten Körpers als nirgends unendlich gross annimmt.

Die Gleichung (12) stellt ϕ_o (d. h. den Werth von ϕ für einen beliebigen Punkt o des betrachteten Raumes) als eine Summe von Gliedern dar, die herrühren von dem leuchtenden Punkte i und von leuchtenden Punkten, die in der Grenzfläche jenes Raumes liegen. Man nehme den Punkt o unendlich nahe an dieser Grenzfläche an, und zwar so nahe, dass sein Abstand von ihr auch gegen λ unendlich klein ist. Die Lichtwellen, die ihn treffen, können dann theils als einfallende, theils als reflektirte oder gebrochene bezeichnet werden, je nachdem sie nach der Grenze hin, oder von ihr fort sich bewegen. Die leuchtenden Punkte, von denen die ersten herrühren, sind diejenigen, die sich auf der einen, die leuchtenden Punkte, von denen die letzten herrühren, diejenigen, die auf der andern Seite der unendlichen Ebene sich befinden, die durch den Punkt o , dem nächsten Element der Grenzfläche parallel gelegt ist. Sind, wie angenommen werden soll, in dem zweiten Mittel einfallende Wellen nicht vorhanden, so existiren in dem ersten nur einfallende und reflektirte; es möge ϕ_e auf die einfallenden, ϕ_r auf die reflektirten Wellen, ϕ auf die ganze Bewegung in dem Punkte, der hier der Punkt o genannt ist, sich beziehen, so dass

$$\phi = \phi_e + \phi_r \quad \text{und} \quad \frac{\partial \phi}{\partial N} = \frac{\partial \phi_e}{\partial N} + \frac{\partial \phi_r}{\partial N}$$

ist. Dabei gelten dann die Gleichungen (30), wenn das einfallende Licht nur aus einem Wellensysteme besteht und die entsprechenden, dort angegebenen, wenn mehr einfallende Wellensysteme zu unterscheiden sind.

Ein Fall, der besonders einfach und für den die Vorstellung leichter ist, als für den allgemeinen, ist der, dass ein schwarzer Körper das zweite Mittel bildet, d. h. ein solcher, der Licht weder reflektirt, noch hindurchlässt. Ein Körper, in dem das Licht dieselbe Fortpflanzungsgeschwindigkeit hat, wie in der durchsichtigen Umgebung und hinreichend stark absorbirt wird, muss, der Erfahrung zufolge, diese Eigenschaft besitzen. In einem solchen Körper, wie in jedem undurchsichtigen, sind einfallende Wellen an seiner Oberfläche nicht

vorhanden, wie es oben vorausgesetzt ist; überdies ist die mit c bezeichnete Grösse bei ihr immer gleich Null; die an der Oberfläche des schwarzen Körpers zu erfüllende Bedingung ist daher die, dass

$$\phi_r = 0 \quad \text{und} \quad \frac{\partial \phi_r}{\partial N} = 0 \quad (31)$$

ist.

Wenn der bei der Gleichung (12) gedachte Körper ein schwarzer und seine Oberfläche überall convex ist, so lassen sich hiernach die Werthe von ϕ und $\frac{\partial \phi}{\partial N}$ für die Oberfläche mit Leichtigkeit finden.

Denkt man sich eine Ebene, die, einer Tangentialebene parallel und unendlich nahe, bei dem Körper vorbeigeht, so liegt die ganze Oberfläche auf der einen Seite dieser Ebene, der Art, dass jedes Element ds immer nur einen Beitrag zu ϕ_r , aber keinen zu ϕ , liefern kann. Man stelle sich den Kegel vor, der seine Spitze in dem leuchtenden Punkte 1 hat und die Oberfläche berührt; die Berührungslinie desselben theilt die Oberfläche in zwei Theile, von denen der eine dem leuchtenden Punkte zugewandt, der andere von diesem abgewandt ist; für einen Punkt, der dem ersten Theile unendlich nahe ist, liefert der leuchtende Punkt 1 zu ϕ_r den Beitrag zu ϕ^* , für einen Punkt, der unendlich nahe an dem zweiten liegt, liefert er diesen Beitrag zu ϕ_r , wo ϕ^* wieder sich auf die Bewegung bezieht, die stattfinden würde, wenn der schwarze Körper nicht vorhanden wäre. An dem ersten Theile ist daher

$$\phi = \phi^*, \quad \frac{\partial \phi}{\partial N} = \frac{\partial \phi^*}{\partial N}; \quad (32)$$

an dem zweiten ist

$$\phi_r = 0, \quad \frac{\partial \phi_r}{\partial N} = 0,$$

und hieraus folgt nach (31)

$$\phi = 0, \quad \frac{\partial \phi}{\partial N} = 0. \quad (33)$$

Bei einer beliebigen Gestalt des schwarzen Körpers genügt man der Bedingung (31), indem man für diejenigen Punkte der Oberfläche, in denen diese zum ersten Male von Geraden, die vom Punkte 1 ausgehen, getroffen wird, die Gleichungen (32), für alle anderen Punkte der Oberfläche die Gleichungen (33) festsetzt. Unter dieser Annahme folgt nämlich aus einem im §. 3 bewiesenen Satze, dass das Integral $\int ds \Omega$, ausgedehnt über die ganze Oberfläche, verschwindet, wenn der Punkt o unendlich nahe an dem ersten Theile, und dass es $= -4\pi \phi_o^*$ ist, wenn der Punkt o unendlich nahe an dem zweiten

Theile der Oberfläche gewählt wird; woraus dann mit Hülfe von (12) die Gleichungen (31) für die ganze Oberfläche sich ergeben.

Aus dem eben angezogenen Satze folgt aber auch weiter, dass, wo auch der Punkt o in dem durchsichtigen Mittel angenommen wird, $\phi_o = \phi_o^*$ ist, falls die gerade Verbindungslinie von i und o die Oberfläche des Körpers nicht trifft, und $\phi_o = 0$, falls diese Linie die Oberfläche zweimal oder öfter schneidet. Da man unter ϕ irgend eine der Verrückungen u, v, w verstehen kann, so ist hierdurch ausgesprochen, dass in dem ersten der beiden unterschiedenen Fälle die Lichtbewegung im Punkte o dieselbe ist, wie wenn der schwarze Körper fehlte, im zweiten aber am Orte von o Dunkelheit stattfindet; damit ist gesagt, dass der schwarze Körper einen Schatten wirft, dass das Licht des leuchtenden Punktes sich geradlinig fortpflanzt, in Strahlen, die als unabhängig von einander betrachtet werden können.

§. 5.

Der eben benutzte, im Anfange des §. 3 ausgesprochene Satz gilt nur unter gewissen, dort angegebenen Voraussetzungen; sind diese nicht erfüllt, so sind auch die hier aus dem Satze gezogenen Folgerungen nicht richtig, es treten dann Beugungserscheinungen auf.

Man denke sich den leuchtenden Punkt i von einem schwarzen Schirm, in dem eine Öffnung sich befindet, rings umgeben. Die Linie, in welcher die Oberfläche des Schirms von einem Kegel berührt wird, der seine Spitze in dem Punkte i hat, heisse der Rand der Öffnung; er theilt die Oberfläche des Schirms in einen inneren und einen äusseren Theil. Irgend eine Fläche, die durch den Rand begrenzt ist und mit dem einen, wie mit dem anderen dieser Theile eine geschlossene Fläche bildet, die den leuchtenden Punkt umgiebt, sei die Fläche s . Liegt der Punkt o irgendwo ausserhalb dieser geschlossenen Flächen, so ist dann nach der Gleichung (12), nach der in Bezug auf schwarze Körper aufgestellten Hypothese, also den Gleichungen (32), (33), und nach der Gleichung (10)

$$4\pi\phi_o = \int ds\Omega, \quad (34)$$

wo bei der Bildung von Ω ϕ^* für ϕ zu setzen und die Integration über die Fläche s auszudehnen ist. Es können sich Beugungserscheinungen in der Nähe des Punktes o zeigen, wenn für einen endlichen Theil der Fläche s oder ihrer Grenze $r_1 + r_o$ bis auf unendlich Kleines constant ist, oder die gerade Verbindungslinie der Punkte i und o unendlich nahe an der Grenze der Fläche s vorbeigeht. Bei den Er-

scheinungen, die FRESNEL in der Axe einer kreisförmigen Öffnung oder eines kreisförmigen Schirmes beobachtete, während ein leuchtender Punkt auf derselben Axe sich befand, waren r_1 und r_o , also auch $r_1 + r_o$ für alle Punkte der Grenze von s nahe constant; bei den nach FRESNEL benannten Beugungserscheinungen, bei den Fransen nämlich, die in der Nähe der Schattengrenze eines Schirmes auftreten, geht die Verbindungslinie von i und o nahe bei der Grenze von s vorbei; bei den FRAUNHOFER'schen Beugungserscheinungen (wenn dieselben ohne Benutzung von Linsen, also auf einer unendlich entfernten Tafel, mit Hülfe eines unendlich entfernten leuchtenden Punktes dargestellt werden) ist $r_1 + r_o$ für die ganze Öffnung nahe constant.

Um auch für diese Fälle die Intensität des Lichtes im Punkte o zu finden, setze man zunächst, der Gleichung (3) entsprechend,

$$\phi^* = \frac{1}{r_1} \cos\left(\frac{r_1}{\lambda} - \frac{t}{T}\right) 2\pi. \quad (35)$$

Es erhält dann Ω den in (13) angegebenen Werth. Die beiden Glieder, aus denen derselbe zusammengesetzt ist, sind, da λ unendlich klein ist, von ungleicher Grössenordnung, es sei denn, dass

$$\frac{\partial r_1}{\partial N} - \frac{\partial r_o}{\partial N}$$

unendlich klein ist, welcher Fall hier nicht in Betracht gezogen zu werden braucht. Die Gleichung (34) giebt daher

$$\phi_o = \frac{1}{2\lambda} \int \frac{ds}{r_1 r_o} \left(\frac{\partial r_1}{\partial N} - \frac{\partial r_o}{\partial N} \right) \sin\left(\frac{r_1 + r_o}{\lambda} - \frac{t}{T}\right) 2\pi.$$

Um Weitläufigkeiten zu vermeiden, werde nun angenommen, dass die Fläche s eine ebene ist, dass ihre Dimensionen gegen r_1 und r_o so klein sind, dass r_1 und r_o da, wo sie ausserhalb des Sinuszeichens vorkommen, sowie ihre nach N genommenen Differentialquotienten als constant betrachtet werden können, und endlich, dass die Linien r_o unendlich kleine Winkel mit den Verlängerungen der Linien r_1 bilden. Man hat dann

$$\frac{\partial r_o}{\partial N} = - \frac{\partial r_1}{\partial N}$$

und

$$\phi_o = \frac{1}{\lambda r_1 r_o} \frac{\partial r_1}{\partial N} \int ds \sin\left(\frac{r_1 + r_o}{\lambda} - \frac{t}{T}\right) 2\pi.$$

Man verallgemeinere nun den Ausdruck von ϕ^* auf dem Wege, auf dem die Gleichung (4) aus der Gleichung (3) abgeleitet ist, so dass man erhält

$$\phi^* = \frac{D}{r_1} \cos\left(\frac{r_1}{\lambda} - \frac{t}{T}\right) 2\pi + \frac{D'}{r_1} \sin\left(\frac{r_1}{\lambda} - \frac{t}{T}\right) 2\pi, \quad (36)$$

wo D und D' von der Richtung des von dem leuchtenden Punkte i durch den Punkt (x, y, z) gehenden Strahles abhängen. Dabei wird dann

$$\phi_0 = \frac{1}{\lambda r_i r_o} \frac{\partial r_i}{\partial N} \left\{ D \int ds \sin \left(\frac{r_i + r_o}{\lambda} - \frac{t}{T} \right) 2\pi - D' \int ds \cos \left(\frac{r_i + r_o}{\lambda} - \frac{t}{T} \right) 2\pi \right\},$$

wo D und D' dieselbe Bedeutung haben. Jetzt darf man unter ϕ irgend eine der Verrückungen u, v, w verstehen; thut man das und schreibt A und A', B und B', C und C' für D und D' , je nachdem $\phi = u, v, w$ gesetzt wird, so wird bei der im §. 1 definirten Einheit für die Lichtintensität die Intensität des Lichtes in der beugenden Öffnung

$$= \frac{1}{2r_i^2} (A^2 + A'^2 + B^2 + B'^2 + C^2 + C'^2).$$

Bezeichnet man diese durch J und setzt

$$c = \int ds \cos \frac{r_i + r_o}{\lambda} 2\pi$$

$$s = \int ds \sin \frac{r_i + r_o}{\lambda} 2\pi,$$

so wird die Intensität im Punkte o

$$= J \frac{1}{\lambda^2 r_o^2} \left(\frac{\partial r_i}{\partial N} \right)^2 (c^2 + s^2),$$

welche Gleichung durch mannigfaltige Messungen als mit der Erfahrung übereinstimmend nachgewiesen ist.¹⁾

§. 6.

Die eben abgeleitete Gleichung setzt wesentlich voraus, dass die Dimensionen der beugenden Öffnung sehr gross gegen die Wellenlängen sind, und ihre Anwendung auf die Beugungsspectren, bei deren Herstellung oft Gitter benutzt sind, deren Spalten nur eine Breite von wenigen Wellenlängen besassen, ist nicht zu rechtfertigen.²⁾ Doch haben die Messungen, denen wir die Kenntniss der Wellenlängen verdanken, gezeigt, dass diese Anwendung die Orte der Lichtmaxima mit grosser Genauigkeit richtig ergibt. Diese Thatsache findet von den hier zu Grunde gelegten Hypothesen aus ihre Erklärung durch die folgenden Betrachtungen.

Man denke sich das Gitter, über dessen Beschaffenheit eine specielle Voraussetzung nicht gemacht zu werden braucht, das z. B. ein Drahtgitter oder ein Russgitter oder ein Diamantgitter sein kann, in die passende Öffnung eines ebenen, schwarzen Schirmes, der nach

¹⁾ Vergl. FRÖHLICH, WIEDEMANN'S Annalen Bd. 6 S. 429.

²⁾ Vergl. FRÖHLICH, WIEDEMANN'S Annalen Bd. 6 S. 430 und Bd. 15 S. 592.

allen Seiten sich in die Unendlichkeit erstreckt, eingefügt. Man verstehe unter ds ein Element der Ebene des Gitters, oder, um präziser zu reden, ein Element einer Ebene, die dem Gitter sehr nahe, auf der Seite desselben liegt, auf der der Punkt o sich befindet. Es gilt dann die Gleichung (9), und diese vereinfacht sich, wenn man die Annahme einführt, dass r_o unendlich gross ist, in

$$4\pi\phi_o(t) = - \int \frac{ds}{r_o} \left\{ f\left(t - \frac{r_o}{a}\right) + \frac{1}{a} \frac{\partial r_o}{\partial N} \frac{\partial \phi}{\partial t} \left(t - \frac{r_o}{a}\right) \right\}.$$

Die Ebene, deren Element ds genannt ist, sei die xy -Ebene des Coordinatensystems, die x -Axe senkrecht auf den Spalten, der Anfangspunkt der Mittelpunkt des rechteckig angenommenen Gitters; ferner sei ρ_o die Länge der vom Anfangspunkt nach dem Punkte o gezogenen Linie und es seien $\alpha_o, \beta_o, \gamma_o$ die Cosinus der Winkel, welche diese mit den Coordinatenachsen bildet. Man hat dann

$$r_o = \rho_o - \alpha_o x - \beta_o y, \quad \frac{\partial r_o}{\partial N} = \gamma_o$$

und

$$ds = dx dy.$$

Man hat ferner

$$\begin{aligned} \phi(t) &= A \cos \frac{t}{T} 2\pi + A' \sin \frac{t}{T} 2\pi \\ f(t) = \frac{\partial \phi(t)}{\partial N} &= B \cos \frac{t}{T} 2\pi + B' \sin \frac{t}{T} 2\pi \\ \frac{1}{a} \frac{\partial \phi(t)}{\partial t} &= \frac{2\pi}{\lambda} A' \cos \frac{t}{T} 2\pi - \frac{2\pi}{\lambda} A \sin \frac{t}{T} 2\pi, \end{aligned}$$

wo A, A', B, B' Functionen von x und y sind. Substituirt man diese Ausdrücke in die für ϕ_o aufgestellte Gleichung, so erhält man bei passender Verlegung des Anfangspunktes der Zeit

$$\phi_o = \iint dx dy \left\{ C \cos \left(\frac{t}{T} + \frac{\alpha_o x + \beta_o y}{\lambda} \right) 2\pi + C' \sin \left(\frac{t}{T} + \frac{\alpha_o x + \beta_o y}{\lambda} \right) 2\pi \right\},$$

wo C und C' umgekehrt proportional mit ρ_o , lineare Functionen von γ_o und — was hier hervorzuheben ist — lineare homogene Functionen von A, A', B, B' sind, deren Coefficienten von x und y nicht abhängen. Nun sei die Lichtquelle ein leuchtender Punkt, der auf der negativen z -Axe in der Unendlichkeit liegt, $2b$ die Länge der Spalten, $2n$ ihre Anzahl und e der Abstand entsprechender Punkte zweier auf einander folgender, also $2ne$ die Breite des Gitters. Man darf dann annehmen, dass A, A', B, B' , also auch C und C' von y so abhängen, dass sie constant bleiben, wenn y von $-b$ bis $+b$ variirt, und verschwinden, wenn y ausserhalb dieses Intervalls liegt; von x aber so, dass sie um e periodisch sind, wenn x einen Werth zwischen $-ne$ und $+ne$ hat,

und für andere Werthe von x verschwinden. In Folge hiervon wird zunächst

$$\phi_0 = \frac{\sin \frac{\beta_0 b}{\lambda} 2\pi}{\frac{\beta_0}{\lambda} \pi} \int_{-ne}^{ne} dx \left\{ C \cos \left(\frac{l}{T} + \frac{\alpha_0 x}{\lambda} \right) 2\pi + C' \sin \left(\frac{l}{T} + \frac{\alpha_0 x}{\lambda} \right) 2\pi \right\}.$$

Da λ als unendlich klein gegen b angesehen werden kann, so ist der vor dem Integralzeichen stehende Factor für jeden endlichen Werth von β_0 gegen b unendlich klein, während er endlich ist, wenn β_0 von der Ordnung von $\frac{\lambda}{b}$ ist. Unter dem Integralzeichen denke man

sich C und C' nach Sinus und Cosinus der Vielfachen von $\frac{x}{e} 2\pi$ entwickelt; es treten dann, wenn h eine ganze Zahl oder Null bedeutet, die Integrale auf

$$\int_{-ne}^{ne} dx \cos h \frac{x}{e} 2\pi \sin \alpha_0 \frac{x}{\lambda} 2\pi \text{ und } \int_{-ne}^{ne} dx \sin h \frac{x}{e} 2\pi \cos \alpha_0 \frac{x}{\lambda} 2\pi,$$

die verschwinden, und die Integrale

$$\int_{-ne}^{ne} dx \cos h \frac{x}{e} 2\pi \cos \alpha_0 \frac{x}{\lambda} 2\pi \text{ und } \int_{-ne}^{ne} dx \sin h \frac{x}{e} 2\pi \sin \alpha_0 \frac{x}{\lambda} 2\pi,$$

die resp.

$$= \frac{\sin ne 2\pi \left(\frac{h}{e} - \frac{\alpha_0}{\lambda} \right)}{2\pi \left(\frac{h}{e} - \frac{\alpha_0}{\lambda} \right)} + \frac{\sin ne 2\pi \left(\frac{h}{e} + \frac{\alpha_0}{\lambda} \right)}{2\pi \left(\frac{h}{e} + \frac{\alpha_0}{\lambda} \right)}$$

und

$$= \frac{\sin ne 2\pi \left(\frac{h}{e} - \frac{\alpha_0}{\lambda} \right)}{2\pi \left(\frac{h}{e} - \frac{\alpha_0}{\lambda} \right)} - \frac{\sin ne 2\pi \left(\frac{h}{e} + \frac{\alpha_0}{\lambda} \right)}{2\pi \left(\frac{h}{e} + \frac{\alpha_0}{\lambda} \right)}$$

sind. Diese Ausdrücke sind im Allgemeinen gegen ne unendlich klein, wenn λ als unendlich klein gegen ne bezeichnet wird; sie sind aber endlich, falls

$$\alpha_0 \pm h \frac{\lambda}{e}$$

von der Ordnung von $\frac{\lambda}{ne}$ ist.

Da nun unter ϕ irgend eine der Verrückungen u , v , w verstanden werden kann, so folgt hieraus, dass für

$$\alpha_0 = \pm h \frac{\lambda}{e}, \beta_0 = 0$$

die Lichtintensität unendlich gross ist gegen die in allen andern Punkten des Gesichtsfeldes stattfindende; und das ist es, was die Beobachtungen gezeigt haben.

§. 7.

Nach den gemachten Auseinandersetzungen ist es leicht, auch das Gesetz der Reflexion der Lichtstrahlen abzuleiten. Dem leuchtenden Punkte 1 sei ein beliebiger Körper gegenübergestellt. Um den Fall zu vereinfachen, denke man sich aber die Oberfläche dieses mit einer schwarzen Hülle bedeckt, in der nur eine kleine Öffnung auf der dem leuchtenden Punkte zugewandten Seite sich befindet; überdies seien die geometrischen Verhältnisse der Art, dass das reflektirte Strahlenbündel, welches erfahrungsmässig sich bildet, die Oberfläche des Körpers nicht zum zweiten Male trifft. Wiederum beziehe sich das Zeichen ϕ^* auf die Bewegung, die stattfinden würde, wenn der fremde Körper nicht vorhanden wäre, und es sei zunächst ϕ^* durch die Gleichung (35) bestimmt. Den zu erfüllenden Bedingungen genügt man dann, indem man setzt:

für den freien Theil der Oberfläche

$$\phi_r = \phi^*, \quad \frac{\partial \phi_r}{\partial N} = \frac{\partial \phi^*}{\partial N},$$

also nach (30)

$$\phi_r = \frac{c}{r_1} \cos \left(\frac{r_1}{\lambda} - \frac{t + \gamma}{T} \right) 2\pi, \quad \frac{\partial \phi_r}{\partial N} = -c \frac{\partial}{\partial N} \frac{1}{r_1} \cos \left(\frac{r_1}{\lambda} - \frac{t + \gamma}{T} \right) 2\pi,$$

und daher

$$\begin{aligned} \phi &= \phi^* + \frac{c}{r_1} \cos \left(\frac{r_1}{\lambda} - \frac{t + \gamma}{T} \right) 2\pi \\ \frac{\partial \phi}{\partial N} &= \frac{\partial \phi^*}{\partial N} - c \frac{\partial}{\partial N} \frac{1}{r_1} \cos \left(\frac{r_1}{\lambda} - \frac{t + \gamma}{T} \right) 2\pi, \end{aligned}$$

für die Punkte des geschwärzten Theiles der Oberfläche, in denen diese zum ersten Male von einer vom leuchtenden Punkte 1 ausgehenden Linie getroffen wird,

$$\phi = \phi^*, \quad \frac{\partial \phi}{\partial N} = \frac{\partial \phi^*}{\partial N},$$

für alle anderen Punkte der geschwärzten Oberfläche

$$\phi = 0, \quad \frac{\partial \phi}{\partial N} = 0.$$

Den Gleichungen (12) und (11) zufolge ist dann der Überschuss des Werthes von ϕ_0 über den Werth, den ϕ_0 haben würde, wenn

die ganze Oberfläche des fremden Körpers geschwärzt wäre, die Summe der beiden Integrale

$$-\frac{1}{4\pi} \int c \frac{ds}{r_1 r_0} \left(\frac{1}{r_1} \frac{\partial r_1}{\partial N} + \frac{1}{r_0} \frac{\partial r_0}{\partial N} \right) \cos \left(\frac{r_1 + r_0}{\lambda} - \frac{t + \gamma}{T} \right) 2\pi$$

und

$$-\frac{1}{2\lambda} \int c \frac{ds}{r_1 r_0} \left(\frac{\partial r_1}{\partial N} + \frac{\partial r_0}{\partial N} \right) \sin \left(\frac{r_1 + r_0}{\lambda} - \frac{t + \gamma}{T} \right) 2\pi, \quad (37)$$

wo die Integration über den freien Theil der Oberfläche — der die Fläche s heissen möge — auszudehnen ist.¹⁾ Das erste von diesen beiden Integralen ist, wenn der Punkt o in endlichem Abstände von der Oberfläche sich befindet, da λ unendlich klein ist, gegen das zweite zu vernachlässigen, so dass der genannte Unterschied der beiden Werthe von ϕ_o durch das Integral (37) dargestellt ist.

Es gilt dieses auch, wenn ϕ^* , statt durch die Gleichung (35), durch die Gleichung (36) gegeben ist; nur die Werthe von c und γ sind dann andere. Das Integral (37) ist von der Form des Integrals (19); aus den in Bezug auf dieses angestellten Betrachtungen folgt, dass jenes im Allgemeinen verschwindet. (19) verschwindet nicht, wenn die Fläche s von der Verbindungslinie der Punkte 1 und o geschnitten wird, (37) verschwindet aber auch dann, weil dann für den Schnittpunkt

$$\frac{\partial r_1}{\partial N} + \frac{\partial r_0}{\partial N} = 0$$

ist. Es ist das Integral (37) von Null verschieden, wenn es in der Fläche s einen Punkt giebt, dessen Verbindungslinien mit den Punkten 1 und o gleiche Winkel mit der Normale der Fläche s bilden und mit dieser in einer Ebene liegen. Dadurch ist ausgesprochen, dass reflektirte Strahlen existiren, und welche Richtungen diese haben. Eine Störung durch Beugungserscheinungen tritt ein, wenn für einen endlichen Theil der Fläche s oder ihrer Grenze $r_1 + r_0$ bis auf unendlich Kleines constant ist, oder der Punkt o unendlich nahe an der Grenze des reflektirten Strahlenbündels liegt.

Aus dem eben abgeleiteten Gesetze, welches die Richtungen der reflektirten Strahlen bestimmt, lassen sich die geometrischen Eigenschaften eines Strahlenbündels, das von einem leuchtenden Punkte ausgegangen und an einer krummen Fläche reflektirt ist, entwickeln. Die im §. 3 durchgeführten Rechnungen erlauben aber auch anzugeben,

¹⁾ Es wird ohne Schwierigkeit sich nachweisen lassen, dass, wenn der Punkt o in oder unendlich nahe an der Oberfläche liegt, dieser Ausdruck zu den Werthen von ϕ und $\frac{\partial \phi}{\partial N}$ zurückführt, die angenommen sind. Doch soll dieser Beweis hier nicht gegeben werden.

wie auf einem Strahle eines solchen Bündels die Intensität und die Phase von einem Punkte zum andern variirt.

Der Theil von ϕ_0 , der dem reflektirten Lichte entspricht, d. h. der Ausdruck (37), ist durch die Ausdrücke (24), (25) oder (26) gegeben, wenn darin

$$G = \frac{K}{\rho_0}$$

gesetzt wird, wo K eine von ρ_0 unabhängige Grösse bedeutet. Daraus folgt, dass auf einem reflektirten Strahle die Intensität mit ρ_0 so sich ändert, dass sie mit dem absoluten Werthe von

$$\rho_0^2 \mu_1 \mu_2$$

umgekehrt proportional ist. Nach (27) und (22) lässt dieser Ausdruck sich schreiben

$$(b_{11}\rho_0 + c_{11})(b_{22}\rho_0 + c_{22}) - (b_{12}\rho_0 + c_{12})^2,$$

wo die Grössen b und c von ρ_0 unabhängig sind und

$$c_{11} = \frac{1}{2}(1 - \alpha_0^2), \quad c_{12} = -\frac{1}{2}\alpha_0\beta_0, \quad c_{22} = \frac{1}{2}(1 - \beta_0^2)$$

ist. Sind $\rho_0 = f_1$ und $\rho_0 = f_2$ die (stets reellen) Wurzeln der quadratischen Gleichung, die man erhält, indem man diesen Ausdruck gleich Null setzt, so ist also die Intensität auch umgekehrt proportional mit dem absoluten Werthe von

$$(\rho_0 - f_1)(\rho_0 - f_2).$$

In den Punkten $\rho_0 = f_1$ und $\rho_0 = f_2$ ist die Intensität unendlich; es sind das die Brennpunkte des Strahls.

In Betreff der Phase ist zu bemerken, dass diese, wie die Ausdrücke (24), (25), (26) zeigen, sich sprunghaft um $\frac{\pi}{2}$ ändert, wenn der Punkt o durch einen der Brennpunkte hindurchgeht.

Es bedarf kaum der Erwähnung, dass ganz ähnliche Betrachtungen, wie über die Reflexion, auch über die Brechung der Lichtstrahlen angestellt werden können.

Über den Schädel des jungen Gorilla.

Von RUD. VIRCHOW.

Hierzu Taf. XII.

Die Erörterungen über den Schädel des jungen Gorilla, welche ich, unter Vorlage zweier, noch nicht genauer bekannt gewordener Schädel aus den zoologischen Museen von Dresden und Berlin, in der Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe vom 7. Juni 1880 vorgetragen hatte, sind der Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen geworden, welche die HH. v. TÖRÖK¹⁾ und v. BISCHOFF²⁾ veröffentlicht haben. Jener hat den Schädel eines jungen Gorilla benutzt, welcher sich im Musée Broca in Paris befindet und welcher nach seiner Auffassung dem Alter nach zwischen die beiden von mir beschriebenen zu stellen wäre. Hr. v. BISCHOFF hat einen Theil der früher von ihm behandelten Materialien noch einmal durchgearbeitet und zugleich über drei neue Schädel junger Anthropoiden, darunter eines Gorilla, berichtet, welche die Münchener anatomische Anstalt erworben hat.

Wenn ich noch einmal auf diese Angelegenheit zurückkomme, so geschieht es nicht deshalb, weil etwa durch diese Untersuchungen in Hauptpunkten abweichende Ergebnisse zu Tage gekommen wären; — es hat sich im Gegentheil eine grosse Übereinstimmung gezeigt. Allein es ist mir seitdem wiederum ein junger Gorilla-Schädel zugänglich geworden, welchen das hiesige zoologische Museum gekauft hat, und ich bin darnach in der Lage, über einige Punkte von secundärer Bedeutung zu sprechen, welche durch die bisherigen Erörterungen nicht zum Austrag gekommen sind.

Bevor ich dazu übergehe, möchte ich jedoch meine Befriedigung darüber ausdrücken, dass eine Hauptfrage, welche mit der geographischen Vertheilung der Anthropoiden eng zusammenhängt, nunmehr, bei der

¹⁾ A. de TÖRÖK. Sur le crâne d'un jeune gorille du Musée Broca. *Bullet. de la Soc. d'anthrop.* 1881. p. 46.

²⁾ v. BISCHOFF. Über Brachycephalie und Brachyencephalie des Gorilla und der anderen Affen. *Sitzungsber. der mathem. physik. Classe der Akademie zu München*, 11. Juni 1881, S. 379.

völligen Concordanz aller einzelnen, zur Untersuchung gekommenen, Specimina, als entschieden gelten darf. Ich meine die Frage von der typischen Gestalt der Schädel der Anthropoiden. Es schien ziemlich festgestellt, dass die afrikanischen Anthropoiden, gleich den Negern, dolichocephal, die asiatischen, gleich den Malayen, brachycephal seien, und es lag nahe, daraus gewisse Schlüsse in Bezug auf Rassen-, Arten- und Menschenbildung zu ziehen. Dem gegenüber wies ich nach, dass der Schädel des Gorilla ursprünglich brachycephal sei und dass er erst bei weiterer Entwicklung dolichocephal werde, indem die äusseren Knochenkämme die Messpunkte hinausschieben, während die eigentliche Schädelkapsel, auf welche es doch besonders ankomme, brachycephal bleibe. Die HH. v. TÖRÖK und v. BISCHOFF haben diese Thatsache bestätigt und der letztere hat sie überdies in besonders dankenswerther Weise erweitert, indem er die Untersuchung auch auf die Gehirne und die Schädelausgüsse der Anthropoiden ausdehnte. Er fand, dass die Schädelausgüsse bei allen Anthropoiden brachycephal waren, freilich die vom Orang-Utan noch etwas mehr, als die der anderen.

Noch jetzt darf der von mir benutzte Schädel des Dresdener Museums als der jüngste, überhaupt bis jetzt bekannte gelten. In welche Reihenfolge die übrigen zu stellen sind, wage ich nicht zu entscheiden, da nicht über alle genügende Angaben vorliegen. Einigermassen sollte man erwarten, dass die Zunahme der Capacität das Merkmal abgeben könne. Soweit dieselbe bekannt ist, würde sich daraus folgende Reihenfolge ergeben:

1. der Dresdener Schädel (VIRCHOW)	355 ^{ccm} ,
2. der Berliner Schädel I. (VIRCHOW)	380 "
3. der Lübecker Schädel I. (v. BISCHOFF)	380 "
4. der Berliner Schädel II. (VIRCHOW)	410 "
5. der Lübecker Schädel II. (v. BISCHOFF)	425 "
6. " " " III. (v. BISCHOFF)	450 "
7. der Pariser Schädel (v. TÖRÖK)	500 "

Sehr wahrscheinlich ist es darnach nicht, dass der Pariser Schädel zwischen No. 1 und 2 dieser Reihe zu stellen ist, wie Hr. v. TÖRÖK will; er führt leider über die Dentition desselben nichts Genaueres an. Ja, man könnte fast in Zweifel darüber gerathen, ob dieser Schädel überhaupt noch als ein junger anzuerkennen sei, da der grösste Schädel eines männlichen Gorilla im Dresdener Museum nur 560 (A. B. MEYER) und der eines anderen im Musée Broca nur 570^{ccm} (MANOUVRIER) beträgt.

Der Längenbreitenindex obiger Schädel beträgt, je nachdem man als vorderen Messpunkt für die Länge die Mitte des Nasenwulstes (*a*) oder die Mitte der stärksten Wölbung der Stirn (*b*) nimmt, für

	<i>a</i>	<i>b</i>
No. 1	80.5	81.9
„ 2	80.1	91.5
„ 3	79.6	—
„ 4	83.9	91.0
„ 7	83.3	86.1

Dazu käme noch der neue Münchener Schädel (v. BISCHOFF) mit einem Index von 80.0.

Wenn man erwägt, dass der von Hrn. v. BISCHOFF gefundene mesocephale Index von 79.6 für den Lübecker Schädel unmittelbar an der Grenze der Brachycephalie steht, so ist darin an sich keine Abweichung zu erkennen. Vielmehr lässt sich behaupten, dass nach dem vorliegenden Material die Brachycephalie des jungen Gorilla-Schädels als feststehend angesehen werden kann.

Dagegen tritt schon hier eine Erscheinung hervor, welche mir auch in anderer Beziehung sehr auffällig geworden ist, nämlich die grosse Inconstanz der Verhältnisse bei dem fortschreitenden Wachsthum des Schädels. Während man erwarten sollte, dass mit dem fortschreitenden Alter Capacität, Länge, Breite u. s. f. in einer gewissen Beständigkeit, wenn auch nicht gerade in gleichen Proportionen, zunähmen, so zeigt sich, dass durchaus kein Parallelismus stattfindet. Zum Theil liesse sich diese Inconstanz vielleicht durch Abweichungen der einzelnen Untersucher im Messen erklären, aber ich selbst erhielt ähnliche Widersprüche. Am grössten freilich ist der Widerspruch, wenn Hr. von TÖRÖK an einem Schädel von 500^{ccm} Rauminhalt einen Index von 86.1 findet, während ich an einem Schädel von 410^{ccm} einen Index von 91.0, also fast ebensoviel, als an einem Schädel von nur 380^{ccm} Capacität, berechne. Hier erscheinen die kleineren Schädel mehr brachycephal, als der grössere, aber dieser grössere oder genauer grösste der verglichenen Schädel ist wieder mehr brachycephal, als der kleinste (No. 1).

Mit voller Sicherheit würden sich diese Einzelheiten nur entscheiden lassen, wenn derselbe Beobachter oder wenigstens Beobachter, welche genau nach derselben Methode messen, sämtliche Schädel, welche in Frage kommen, untersuchten. Erst dadurch würde es sicher gestellt werden, ob der junge Gorilla-Schädel noch eine Zeit lang in seiner Brachycephalie zunimmt, bis die Bildung der Schädelleisten einen höheren Grad erreicht, oder ob auch bei dem Gorilla so grosse individuelle Abweichungen vorkommen, dass man darauf verzichten muss, die einzelnen Schädel ihrem Alter nach in eine bestimmte, auch für die Grössen- und Formverhältnisse im Einzelnen maassgebende Reihenfolge zu bringen. Mir erscheint vorläufig das

Letztere wahrscheinlicher, da auch sonst so viel individuelle Variation bemerkbar wird, dass ich glauben möchte, man dürfe das Urtheil über die Details der Untersuchung nicht zu streng an Einzelfälle anknüpfen. Indess ist andererseits die Frage aufgeworfen, ob es nicht mehrere Arten oder Rassen von Gorillas gebe, und ich möchte der Entscheidung derselben nicht vorgreifen. Ehe man sich jedoch zu einer solchen Annahme entschliesst, sollte erst genau in Erwägung genommen werden, ob nicht die Grösse der individuellen Variation auch bei dem Gorilla, wie bei dem Menschen, eine so beträchtliche ist, dass manche Besonderheit, welche man bei anderen Thiergattungen als genügend für eine Artunterscheidung erachten würde, als eine bloss individuelle anzusehen sein dürfte.


In meiner früheren Abhandlung habe ich in dieser Weise die Zustände an der seitlichen temporalen Fontanelle betrachtet, namentlich in Bezug auf die Bildung des Processus frontalis der Schläfenschuppe. Betreffs dieses Punktes hat die weitere Untersuchung nichts Neues gelehrt. Ausser dem Dresdener Schädel haben alle anderen diesen Fortsatz vollständig ausgebildet. In dem neuen Fall (Fig. 2) ist der Schläfenfortsatz ganz gross: die Länge der Sutura temporo-frontalis beträgt 17^{mm} d. h. die Spitze der sehr niedrigen Ala sphenoidalis major ist von dem fast gänzlich verkümmerten Angulus parietalis durch einen Zwischenraum von 17^{mm} getrennt.

Dem entsprechend ist die Temporalbreite äusserst gering: die Spitzen beider Alae sind nur durch eine Distanz von 63^{mm} von einander getrennt und die untere Schläfengegend erscheint demgemäss tief eingedrückt. Aber auch die untere Stirnbreite ist sehr klein. Schon in meiner früheren Abhandlung hatte ich auf die sonderbare Thatsache hingewiesen, dass diese Stirnbreite bei dem jüngsten Schädel, dem Dresdener, um 8^{mm} grösser sei, als bei dem ungleich älteren Berliner. Hr. v. Török hat dies für accidentell erklärt, weil von sechs Schädeln erwachsener Gorilla's des Musée Broca mit einer einzigen Ausnahme alle eine höhere Frontalbreite zeigten, als der Dresdener Schädel. Ich möchte umgekehrt hervorheben, dass der jüngste Schädel des Musée Broca einen Frontaldurchmesser von 68^{mm} hat, also weniger als der weit jüngere Dresdener, und dass die grössere Stirnbreite der erwachsenen Gorilla's möglicherweise der zunehmenden Dicke der Knochen und nicht dem zunehmenden Wachsthum der Stirnlappen des Gehirns zuzuschreiben sein dürfte. Immerhin gestehe ich zu, dass auch hier individuelle Variation mitspielen mag: dafür spricht namentlich der Umstand, dass einer der erwachsenen Gorilla-Schädel des Musée Broca, noch dazu ein männlicher, nur 64^{mm} im Querdurchmesser der Stirn (*diamètre frontal*

4.



5.



minimum) maass, während von den anderen einer 77, zwei 76, einer 74 und einer 70^{mm} zeigten.

Über die Höhenverhältnisse kann ich leider wenig sagen, da dem neuen Schädel der occipitale Wirbelkörper fehlt und daher das eigentliche Höhenmaass nicht constatirt werden konnte. Die Auricularhöhe hat sich gegen die früheren Schädel nur minimal verändert. Damit stimmt die von mir schon früher hervorgehobene Thatsache, dass der Gorilla-Schädel, wenn man von den Knochenkämmen absieht, immer mehr chamäcephal wird¹⁾.

Es muss übrigens besonders erwähnt werden, dass an dem neuen Schädel noch nicht eine einzige Naht obliterirt ist und dass von den verschiedenen Schädelleisten am stärksten ausgebildet ist die frontale, nächstdem die mastoideo-occipitale, dagegen noch gar nicht die sagittale. Die Entfernung der beiden Lineae temporales supremæ von einander beträgt an der Coronaria im geraden Durchmesser 48, im Oberflächenmaass 50^{mm}. Fast längs der ganzen Grenze des Planum temporale lassen sich übrigens drei Temporallinien unterscheiden, nur nach vorn am Stirnbein und hinten an dem Schläfenbein laufen sie in einfachen, aber sehr breiten Leisten zusammen. —

Was die Gesichtsbildung anlangt, so hat sich Hr. v. BISCHOFF am meisten eingehend damit beschäftigt. Zunächst besteht eine kleine Differenz zwischen uns in Bezug auf die Gestalt der Augenhöhlen, welche er rundlich-viereckig, ich dagegen einfach gerundet, aber hoch (hypsikonch) genannt hatte. Hr. v. BISCHOFF gesteht die Hypsikonchie für seinen älteren Gorilla-Schädel zu, dessen Index 106.4 betrage, bleibt aber in Bezug auf den jüngeren, bei dem der Index nur 100 betrage, bei seiner früheren Angabe stehen. Hier würde es nun zunächst auf eine Definition der Ausdrücke ankommen: ich finde bei dem neuen Schädel einen Orbitalindex von 121 und kann nur bei meiner früheren Angabe bleiben, wo ich schon zugestand, dass nach oben und innen der Orbitalrand schwach eckig oder ausgebuchtet sei (vergl. Fig. 1).

Was den Nasenfortsatz des Zwischenkiefers angeht, so war eine Differenz zwischen Hrn. v. BISCHOFF einerseits und Hrn. TURNER

¹⁾ Hr. von TÜRÖK findet einen Widerspruch darin, dass ich von den Abbildungen der Schädel, welche zu meiner früheren Abhandlung gehören, gesagt habe, die Schädel seien planmässig in die deutsche Horizontale gestellt, während auf meiner Tafel die »deutsche Horizontale« von der wirklichen Horizontale der Tafel eine Abweichung von 6°.5 mache. Diess ist richtig, ändert aber nichts an der Thatsache, dass die Zeichnung nach dem Schädel, als er in der deutschen Horizontale stand, ausgeführt ist; unglücklicherweise bot die Tafel nicht soviel Raum, um auch die Zeichnung wieder genau in die Horizontale der Tafel zu stellen. Sachverständige werden sich jedoch leicht zurechtfinden.

und mir andererseits vorhanden, welche sich auf die Ausdehnung bezog, in welcher sich dieser Fortsatz zwischen Oberkiefer und Nasenbein lege. Wahrscheinlich handelt es sich auch hier um ein Gebiet individueller Variationen, denn während ich früher Hrn. TURNER beipflichten musste, entspricht der neue Schädel vielmehr der Angabe des Hrn. v. BISCHOFF, ja er geht darüber hinaus, insofern die Sutura intermaxillaris schon am Naseneingange hinter den äusseren Rand der Apertur tritt und hier alsbald verschwindet, so dass von einer Zwischenlagerung oder auch nur einer Annäherung an das Nasenbein gar nicht die Rede sein kann. Sowohl am Alveolarfortsatz des Oberkiefers, als an der Gaumenplatte ist übrigens die Naht des Zwischenkiefers noch ganz deutlich.

Der Gaumen selbst hat sich insofern sehr verändert, als er sehr viel länger und tiefer als früher ist, während seine Breite, namentlich im hinteren Theil, sich direct verkleinert hat. Sie ist um 5^{mm} kleiner, als bei dem früher beschriebenen Berliner, und um 3^{mm} kleiner, als bei dem Dresdener Schädel. Es hängt das zusammen mit der zunehmenden Grösse der Molaren, welche sich nach innen vordrängen und den Raum der Gaumenplatte verengen. Letztere hat einen Index von 38.8, ist übrigens sehr glatt. Die Platte des Gaumenbeines selbst springt spitzwinklig in die Oberkieferplatte vor; eine Spina nasalis posterior ist auch nicht in der Anlage vorhanden (Fig. 5.)

Die Zahnentwicklung ist so weit vorgerückt, dass sowohl hinter den tief abgeschliffenen Schneidezähnen des Oberkiefers, als an den Eckzähnen die Alveolen der zweiten Dentition geöffnet sind und die Zahnkronen sichtbar werden. Die letzten Molaren liegen noch tief in ihren Alveolen und die hintersten haben ihre Stelle ganz hoch oben an der äusseren Seite des Processus pterygoides. Am Unterkiefer (Fig. 6) ist das Nämliche der Fall, nur dass die Öffnung des letzten hervorbrechenden Zahnes an dem Rande des Kronenfortsatzes liegt. Am Oberkiefer sind die inneren Theile der Kronen der Molares und Prämolares tief abgenutzt, am Unterkiefer umgekehrt die äusseren Theile. Sämmtliche Zahnkronen sind fast ganz mit einem schwarzen, rauhen Ueberzuge versehen. Von der Synchondrosis mentalis sind noch oben und unten Spuren vorhanden; in der Mitte hat sich eine gewaltige Vorwölbung entwickelt, hinter der das Kinn oder genauer die Kinngegend (da das Kinn selbst fehlt) ganz weit nach hinten zurückweicht. Mit der wachsenden Grösse des Kiefers stellt sich übrigens, wie aus der Tabelle hervorgeht, der Ast immer steiler; er hat bei dem neuen Schädel nur noch einen Winkel von 118°.

Am grössten ist offenbar die individuelle Variation in Bezug auf die Nasenbildung. In der Hauptsache bestätigt der neue Schädel

das, was ich früher beschrieben hatte, nämlich dass das Nasenbein einfach sei und dass sein oberer Theil sich spindelförmig erweitere und mit einer Spitze in den Nasenfortsatz des Stirnbeines einschiebe (Fig. 1). Ich kann anerkennen, dass sich an dem einfachen Nasenbein des neuen Schädels, und zwar am vorderen Ende, welches dreieckig ausgebrochen ist, ein ganz kurzer (2^{mm}), vor der Verletzung offenbar länger gewesener Nahtrest findet, woraus hervorgeht, dass es nicht ursprünglich einfach angelegt war. Das obere, in den Stirnnasenwulst eingeschobene Ende des Nasenbeins ist in dem neuen Falle ziemlich breit; die Nähte sind hier zackig und der oberste Abschnitt sieht fast aus, als seien kleine Zwickelchen eingeschoben. Jedenfalls ist die knöcherne Nase und auch die Interorbital-Scheidewand sehr schmal und der ganze Index klein (33.3). Es dürfte dies eines der am meisten charakteristischen Merkmale des Gorilla, namentlich gegenüber dem Chimpanse, sein.

In Bezug auf den Naseneingang bemerke ich übrigens, dass sich daselbst nur ganz schwache Andeutungen von Pränasalfurchen finden. Im Gegentheil wölbt sich jederseits neben der etwas klaffenden Mediannaht ein rundlicher Höcker gegen den Naseneingang hervor; in Folge davon bildet die Gegend der Mediannaht eine tiefe Vförmige Einsenkung. Pränasale Furchen sieht man erst lateralwärts von den Höckern, dicht neben der Sutura intermaxillaris, und zwar so seichte und kurze, dass ohne besondere Aufmerksamkeit man sie leicht übersehen könnte.

Die Grösse des Kieferwachsthums und die zunehmende Prognathie wird man aus den Zahlen der nachfolgenden Tabelle, in welcher ich eine Zusammenstellung der Maasse der drei von mir untersuchten jungen Gorilla-Schädel gebe, leicht ersehen.

M a a s s e .	Dresdener Schädel	Berliner Schädel	
		I	II
Capacität	355 ^{ccm}	380 ^{ccm}	410 ^{ccm}
Grösste Länge A von der Nasenwurzel..	113 ^{mm}	136 ^{mm}	140 ^{mm}
" B von der Stirnwölbung.	111 "	119 "	129 "
Diagonale Länge vom Alveolarrand des Oberkiefers bis zur Crista occip.	128 "	186 "	196 "
Grösste Breite	91 "	109 "	117.5 ^{mm}
Ganze senkrechte Höhe	75 "	83 "	—
Auricularhöhe	71 "	71 "	72 ^{mm}
Gerade Distanz der Schläfenlinien	75 "	45(70) ^{mm}	48 "
Umfangs- " " "	105 "	48(75) "	50 "
Untere Frontalbreite	69 "	61 ^{mm}	65 "
Temporalbreite A (Zusammenstoss der Sut. squamosa mit der Coronaria)	67 "	79 "	82 "

M a a s s e	Dresdener Schädel	Berliner Schädel	
		I	II
Temporalbreite <i>B</i> (Spitze der Ala sphen.)	52 ^{mm}	62 ^{mm}	63 ^{mm}
Auricularbreite	65 "	95 "	104 "
Occipitalbreite (Fontic. later.)	75 "	92 "	94 "
Mastoidealbreite (Spitze)	36 "	88 "	91 (?) ^{mm}
Entfernung der Nasenwurzel vom Ohrloch	69 "	87 "	99 ^{mm}
" " Mitte des Naseneinganges			
" " vom Ohrloch	68 "	107 "	119 "
" des oberen Alveolarrandes vom			
Ohrloch	71 "	122 "	133 "
" " Zahnrandes vom			
Ohrloch	72.5 ^{mm}	128 "	136 "
" unteren Kinnrandes vom			
Ohrloch	67 ^{mm}	128 "	134 "
" der Nasenwurzel vom For.			
magnum	71 "	89 "	—
" " Mitte des Naseneinganges			
vom For. magnum	66 "	105 "	—
" des oberen Alveolarrandes vom			
For. magnum	70 "	114 "	—
" " oberen Zahnrandes vom			
For. magnum	71 "	120 "	—
" " unteren Kinnrandes vom			
For. magnum	68.5 ^{mm}	114 "	—
Gesicht, Höhe (Nasenwurzel bis Kinnrand)	71 ^{mm}	128 "	137 "
" Breite (unteres Ende des Proc.			
zygom. max.)	56 "	84 "	93 "
Jugalbreite	74 "	109 "	119 "
Nase, Höhe	43 "	69 "	78 "
" Länge	30 "	47 "	36 "
" Breite der Öffnung	19 "	26 "	26 "
Orbita, Höhe	26 "	36 "	46 "
" Breite	25 "	31 "	38 "
Infraorbitaldurchmesser	27 "	45 "	46 "
Maxillardurchmesser	37 "	60 "	56 "
Länge (Höhe) des oberen Alveolarfortsatzes	6.5 ^{mm}	22 (14) ^{mm}	20 "
Gaumen, Länge	33 ^{mm}	60 ^{mm}	68 "
" Breite	24 "	26 "	21 "
Gesichtswinkel (Ohrloch, Naseneingang,			
Nasenwurzel)	67°	50°	55°
Unterkiefer, Distanz der Winkel	41 ^{mm}	70 ^{mm}	70 ^{mm}
" mediane Höhe	20 "	39 "	43 "
Kieferwinkel	140°	120°	118°
Kieferast, Länge	26 ^{mm}	52 ^{mm}	76 ^{mm}

Über die LUDOLPH'sche Zahl.

Von Prof. F. LINDEMANN

in Freiburg i. Br.

(Vorgelegt von Hrn. WEIERSTRASS.)

Durch directe Erweiterung der Schlüsse, vermittelt welcher Hr. HERMITE (in der Abhandlung »Sur la fonction exponentielle«, Compt. rend. 1873) bewiesen hat, dass die Basis der natürlichen Logarithmen eine transscendente Zahl ist, bin ich bei dem Versuche, dasselbe von der Zahl π nachzuweisen, zunächst zu dem folgenden Satze gelangt:

Sind

$$f_1(z) = 0, f_2(z) = 0, \dots f_i(z) = 0$$

s algebraische Gleichungen, von denen jede irreducibel und von der Form

$$z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n = 0$$

ist, wo unter $a_1, a_2, \dots a_n$ ganze Zahlen zu verstehen sind, werden ferner mit Z_i, Z'_i, Z''_i, \dots die Wurzeln der Gleichung $f_i(z) = 0$ bezeichnet, wird kurz

$$\sum e^{Z_i} = e^{Z_i} + e^{Z'_i} + e^{Z''_i} + \dots$$

gesetzt, bedeuten endlich $N_0, N_1, \dots N_i$ beliebige ganze Zahlen, welche nicht sämtlich gleich Null sind, so kann eine Relation von der Form

$$(1) \quad 0 = N_0 + N_1 \sum e^{Z_1} + N_2 \sum e^{Z_2} + \dots + N_i \sum e^{Z_i}$$

nicht bestehen, es sei denn, dass eine der Grössen Z gleich Null ist.

Was den Beweis angeht, so möge es genügen, hier den Gedanken-gang für den einfachsten Fall darzulegen. Es handle sich nur um eine Gleichung $f(z) = 0$ von der Form (1), deren Wurzeln dann mit $z_1, z_2, \dots z_n$ bezeichnet sein mögen. Setzt man, unter m eine ganze positive Zahl verstehend,

$$(2) \quad \eta_k^i = \frac{1}{1 \cdot 2 \dots (m-1)} \int_0^{z_k} \frac{e^{-z} z^m [f(z)]^m dz}{z - z_i}, \quad \left(\begin{matrix} i = 0, 1, \dots n \\ k = 1, 2, \dots n \end{matrix} \right)$$

wo $z_0 = 0$ zu nehmen ist, so ist nach Hrn. HERMITE

$$\begin{aligned}
 \eta_k^0 &= A_0 - e^{-z_k} A_k, \\
 \eta_k^1 &= B_0 - e^{-z_k} B_k, \\
 &\dots\dots\dots \\
 \eta_k^n &= \Lambda_0 - e^{-z_k} \Lambda_k.
 \end{aligned}
 \tag{3}$$

Hierin ist A_k eine ganze Function von z_k mit ganzzahligen (von m abhängigen) Coefficienten, B_k ist eine eben solche Function von z_1 und z_k, \dots, Λ_k eine solche Function von z_n und z_k . Aus diesen ganzen Functionen werden die Grössen $A_0, B_0, \dots, \Lambda_0$ dadurch gebildet, dass man z_k gleich Null setzt.

Ferner hat man

$$\begin{vmatrix} A_0 & A_1 & \dots & A_n \\ B_0 & B_1 & \dots & B_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \Lambda_0 & \Lambda_1 & \dots & \Lambda_n \end{vmatrix} = \delta^{2m},
 \tag{4}$$

wenn

$$\delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & z_1 & z_2 & \dots & z_n \\ 0 & z_1^2 & z_2^2 & \dots & z_n^2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & z_1^n & z_2^n & \dots & z_n^n \end{vmatrix}.$$

Sollte nun eine Relation von der Form (2), also hier

$$0 = N_0 + N_1 \sum e^{z_1}
 \tag{5}$$

bestehen, so würden sich aus (3) folgende $n + 1$ Gleichungen ergeben:

$$\begin{aligned}
 N_0 A_0 + N_1 (A_1 + \dots + A_n) &= -N_1 (\eta_1^0 e^{z_1} + \dots + \eta_n^0 e^{z_n}), \\
 N_0 B_0 + N_1 (B_1 + \dots + B_n) &= -N_2 (\eta_1^1 e^{z_1} + \dots + \eta_n^1 e^{z_n}), \\
 &\dots\dots\dots \\
 N_0 \Lambda_0 + N_1 (\Lambda_1 + \dots + \Lambda_n) &= -N_n (\eta_1^n e^{z_1} + \dots + \eta_n^n e^{z_n}).
 \end{aligned}
 \tag{6}$$

Hier stehen links ganze Functionen der z_i mit ganzzahligen Coefficienten, welche sich bei Vertauschungen der z_i unter einander entweder nicht ändern (wie die linke Seite der ersten Gleichung) oder sich doch nur unter einander vertauschen. Diese ganzen Functionen müssen daher Wurzeln einer Gleichung

$$V^{n+1} + M_1 V^n + \dots + M_{n+1} = 0
 \tag{7}$$

sein, deren Coefficienten M_i ganze Zahlen sind.

Die rechten Seiten der Gleichungen (6) können nach (2) dadurch beliebig klein gemacht werden, dass man m hinreichend gross wählt. Dasselbe gilt also auch von den linken Seiten, somit von den sämtlichen Wurzeln der Gleichung (7) und von den ganzen Zahlen M_i . Hieraus folgt, dass es eine endliche ganze Zahl m' gibt der Art, dass für alle ganzzahligen Werthe von m , die nicht kleiner als m' sind,

die Zahlen M_i genau der Null gleich werden. Für dieselben endlichen Werthe von m müssen dann auch die Wurzeln der Gleichung (7), d. i. die linken Seiten der Gleichungen (6) verschwinden. Letzteres würde zur Folge haben, dass alle zweigliedrigen Determinanten, welche man aus den Grössen

$$\begin{vmatrix} A_0 & B_0 & \dots & A_0 \\ \Sigma A_i & \Sigma B_i & & \Sigma A_i \end{vmatrix}$$

bilden kann, gleich Null seien für $m \geq m'$. Dies aber kann nicht eintreten, denn sonst müsste die Determinante (4) verschwinden, welche doch als Potenz der Discriminante einer irreducibeln Gleichung nothwendig von Null verschieden ist.

In einem Aufsätze »Über die Zahl π «, welcher demnächst in den »Mathematischen Annalen« erscheinen wird, verfolge ich speciell den Zweck, die Zahl π als eine transscendente nachzuweisen. Für diesen Zweck genügt es, einen besonderen Fall des obigen allgemeinen Satzes abzuleiten. Man hat nämlich die Gleichungen $f_i(z) = 0$ zu ersetzen durch diejenigen irreducibeln Gleichungen, welche bez. von den Zahlen

$$Z_1 = z_1, Z_2 = z_1 + z_2, Z_3 = z_1 + z_2 + z_3, \dots Z_n = z_1 + z_2 + \dots + z_n$$

befriedigt werden. Die Anzahl s dieser Gleichungen wird gleich n sein, wenn sämtliche Zahlen Z_i, Z'_i, \dots numerisch von einander verschieden sind; andernfalls ist sie grösser als n ; die letzte Gleichung ist immer linear. Es folgt dann, dass unter obigen Festsetzungen über die N_i eine Relation von der Form

$$(8) \quad 0 = N_0 + N_1 \sum e^{\tilde{z}_1} + N_2 \sum e^{\tilde{z}_1 + \tilde{z}_2} + \dots + N_n \sum e^{\tilde{z}_1 + \dots + \tilde{z}_n}$$

nicht bestehen kann; ausgenommen den Fall, wo

$$N_1 = N_2 = \dots = N_{n-1} = 0, N_0 = -1, N_n = 1, \sum z_i = 0.$$

Jede der Grössen $e^{\tilde{z}_i}$ ist offenbar Wurzel der Gleichung

$$0 = V^n - V^{n-1} \sum e^{\tilde{z}_1} + V^{n-2} \sum e^{\tilde{z}_1 + \tilde{z}_2} - \dots \pm \sum e^{\tilde{z}_1 + \dots + \tilde{z}_n}$$

Diese Gleichung aber würde von der Form (8) sein, wenn sie durch eine rationale Zahl V befriedigt würde. Hebt man noch, was leicht geschehen kann, die bisherige Beschränkung auf, dass der Coefficient von z^n in $f(z)$ gleich Eins sei, so kann man also folgenden Satz aussprechen:

Ist z eine von Null verschiedene rationale oder algebraisch irrationale Zahl, so ist e^z immer transscendent.

Also auch insbesondere:

Die LUDOLPH'sche Zahl π ist eine transscendente Zahl. (Damit steht zugleich fest, dass die Quadratur des Kreises constructiv unausführbar ist.)

Es ist leicht zu sehen, dass die angeführten Sätze bestehen bleiben, wenn man unter den N_i nicht ganze oder rationale, sondern beliebige algebraisch irrationale Zahlen versteht. Insbesondere folgt:

Ist von den beiden Zahlen x, y , welche der Gleichung

$$x = e^y$$

genügen, eine rational oder algebraisch irrational, so ist die andere immer transscendent; allein ausgenommen ist der Fall $y = 0, x = 1$.

Um z. B. diesen besonderen Satz zu beweisen, würde man das Product aller derjenigen Zahlen zu bilden haben, welche aus der Differenz

$$x - e^y$$

(wo nun x, y beide algebraisch angenommen werden) entstehen, wenn man jede der Zahlen x, y mit allen denjenigen vertauscht, mit denen zusammen sie Wurzel einer irreducibeln Gleichung ist. Dieses Product würde dann gleich einem Ausdrücke von der Gestalt, wie er auf der rechten Seite von (1) vorkommt; es kann also nicht gleich Null sein, und folglich kann auch keiner seiner Factoren verschwinden.

In analoger Weise leitet man aus dem allgemeinen Eingangs erwähnten Satze den folgenden ab, aus welchem dann wieder das Theorem des Hrn. HERMITE hervorgeht, wenn alle Zahlen N_i, z_i als ganze angenommen werden:

Versteht man unter N_0, N_1, \dots, N_n beliebige, und unter z_0, z_1, \dots, z_n von einander verschiedene (reelle oder complexe) algebraische Zahlen, so kann eine Relation von der Form

$$0 = N_0 e^{\tilde{z}_0} + N_1 e^{\tilde{z}_1} + \dots + N_n e^{\tilde{z}_n}$$

nicht bestehen, es sei denn, dass die N_i sämmtlich gleich Null sind.

Die Beweise für diese allgemeineren Sätze habe ich in meiner Arbeit in den Annalen theilweise nur angedeutet; doch hoffe ich auf dieselben noch wieder zurückkommen zu können.

Die Theorie des longitudinalen Stosses cylindrischer Stäbe.

Von Prof. W. VOIGT

in Königsberg i. Pr.

(Vorgelegt von Hrn. G. KIRCHHOFF am 11. Mai [s. oben S. 516].)

Der Stoss zweier cylindrischer Körper, deren Querschnitt klein gegen ihre Länge angenommen ist, ist als Problem der Elasticität zuerst von CAUCHY¹⁾ behandelt worden, welcher aber nur einige Resultate seiner Entwicklungen, nicht diese selbst veröffentlicht hat. Später hat POISSON eine Lösung des Problems gegeben.²⁾ Sein Grundgedanke ist, dass während der Dauer ihrer Berührung die verschiedenen stossenden Stäbe angesehen werden können als einen einzigen zusammensetzend, so dass für diese Zeit diejenigen Betrachtungen, welche die longitudinalen Schwingungen von Prismen ergeben, Anwendung finden. Um die Trennung der einzelnen Theile zu bewirken, ist nach ihm erforderlich und hinreichend erstens, dass zu beiden Seiten der Berührungsstelle die Spannung gleich Null ist, damit nicht der eine Stab gegen den andern gedrückt wird, und zweitens, dass zugleich eine Geschwindigkeitsdifferenz der sich berührenden Grenzelemente im Sinne einer Trennung vorhanden ist. Auf Grund dieser Definition gelangt er zu dem Resultat, dass vollständig elastische Stäbe nach dem Stoss stets zusammenbleiben, mit Ausnahme des einzigen Falles, dass sie gleichartig und gleichgestaltet sind.

In den funfziger Jahren hat zuerst Hr. Geh. Rath F. NEUMANN in seinen Vorlesungen über Elasticität an hiesiger Universität den Fehler aufgedeckt, der in der Poisson'schen Definition des Zeitpunktes der Trennung liegt, und bei der vorgetragenen Lösung des Problems darauf hingewiesen, wie der Zusammenhang nicht mehr bestehen kann, wenn die elastische Spannung in der Grenzstelle aus einer Druckkraft (begleitet von einer Compression) zu einer Zugkraft (begleitet von einer Dilatation) wird, — eine Bemerkung, die so einleuchtend ist, dass nicht weiter darauf eingegangen zu werden braucht. Ist in

¹⁾ CAUCHY, Bullet. d. Scienc. d. l. Soc. Philomatique, Déc. 1826 p. 180.

²⁾ POISSON, Traité de Mécanique § 499 bis 504.

dem Moment, wo eine solche Dilatation in der Berührungsstelle entsteht, überdies eine Geschwindigkeitsdifferenz der Schwerpunkte der Stäbe vorhanden im Sinne einer Trennung, so beendet dieser Augenblick den Stoss, — wenn nicht, kann sich derselbe wiederholen.

Viel später hat (ohne die NEUMANN'sche Lösung zu kennen) Hr. SAINT VENANT¹⁾ das Problem in derselben Weise behandelt, sowohl für gleichartige und gleich dicke Stäbe, als für den allgemeineren Fall (den NEUMANN seiner Zeit nur andeutungsweise besprochen hat). Noch fehlte aber, soviel ich weiss, eine Prüfung der neuen Theorie, denn die von SCHNEBELI²⁾ veröffentlichten Beobachtungen sind ohne Rücksicht auf dieselbe durchgeführt. Dies bewog mich, einige Messungen anzustellen, um die Geschwindigkeiten der Stäbe nach dem Stoss, wie sie die Beobachtung zeigt, mit den nach der Theorie berechneten zu vergleichen; ich wollte mich dabei auf den einfachsten Fall gleichartiger und gleich dicker Stäbe beschränken, wurde aber am Schluss der Untersuchung durch die Bekanntschaft mit einer Arbeit von Hrn. Prof. BOLTZMANN,³⁾ die derselbe mir zu senden die Güte hatte, veranlasst, wenigstens noch einige Beobachtungsreihen für den Stoss verschieden dicker Stäbe gleicher Art hinzuzufügen.

Im Folgenden werde ich zunächst zeigen, wie die Beobachtungen der genannten Theorie durchaus widersprechen, und sodann versuchen, dieselben durch eine etwas modificirte Theorie zu erklären.

I.

Die Beobachtungen sind mit Stäben aus glashartem Stahl von circa 8 und 11^{mm} Dicke und 20 bis 40^{cm} Länge⁴⁾ angestellt, welche mit je vier Fäden von 2¹/₃^m Länge als Pendel an einem geeigneten nahe der Decke an der Wand des Beobachtungssaales befestigten Gestelle aufgehängt waren. Als Zeiger angebrachte feine Spitzen gestatteten auf einer Theilung die Schwingungsamplituden abzulesen, die der stossende Stab vor dem Zusammentreffen und beide nach demselben erreichten. Der gestossene Stab befand sich anfangs in Ruhe — was die Allgemeingültigkeit der gezogenen Folgerungen augenscheinlich nicht beeinträchtigt, denn die ganze Erscheinung hängt nur von den relativen Geschwindigkeiten ab.

Eine ganz besondere Sorgfalt war darauf zu verwenden nöthig, dass die Stäbe mit ihren Längsachsen in eine Gerade fielen und sich

¹⁾ SAINT VENANT, Liouville's Journ. II. Ser. XII. Bd. p. 237 1867.

²⁾ SCHNEBELI, Pogg. Ann. Bd. 143 p. 239 (1871).

³⁾ L. BOLTZMANN, Sitzb. der k. Ak. der Wissensch. II., Jahrg. 1881. Dec. p. 1225.

⁴⁾ Die Schwierigkeit der Härtung verbot grössere Längen.

ohne seitliche Schwankungen vor und nach dem Stoss bewegten. Demgemäss wurde der stossende Stab an einem geeignet geschnittenen feinen Papierstreifen in seiner Anfangslage gehalten und erst, nachdem er vollständig beruhigt war, durch Durchbrennen jenes Streifens in Bewegung gesetzt. Nach dem ersten Stoss wurden zwei bis drei Amplituden beider Stäbe — zwischen je zweien lag ein neuer Stoss — gleichzeitig beobachtet. Hr. stud. WIECHERT hat mich hierbei freundlich unterstützt.

Ferner war zu berücksichtigen, dass in der Ruhelage die beiden Stäbe sich berühren mussten, ohne irgend einen Druck aufeinander auszuüben; dies liess sich dadurch prüfen, dass jeder Stab, wenn der andere entfernt wurde, seine Lage ungeändert beibehalten musste; Abweichungen, die 0.1^{mm} nicht überstiegen, wurden bei der Berechnung der Resultate berücksichtigt. — Um bei der Ablesung der Amplituden Parallaxe zu vermeiden, waren hinter den Scalen Spiegelglasstreifen aufgestellt.

In den folgenden Tafeln sind die Resultate der Beobachtung mitgetheilt. Die erste Colonne enthält die Anfangsamplitude des stossenden Stabes, der durch eine römische Zahl charakterisirt ist. Die Amplituden sind so klein gewählt, dass sie ohne merklichen Fehler als Maass für die Stossgeschwindigkeit angesehen werden können. Die zweite und dritte Colonne enthalten die Amplituden (resp. Geschwindigkeiten) des stossenden und gestossenen Stabes nach der Trennung und zwar nicht nur die erste, sondern — weil dieselbe vielleicht von Interesse sein kann — auch die zweite. Nur beim Stoss kleinerer gegen grössere Stäbe musste die zweite Amplitude übersprungen werden, weil sie zu sehr von der ersten abwich, um eine genaue Messung zu gestatten.

Jede Ablesung ist öfter wiederholt worden, je nach Umständen fünf bis zwölfmal, aber da alle Fehlerquellen im gleichen Sinne, nämlich die Amplituden verkleinernd, wirkten, so war es unthunlich, aus allen beobachteten Zahlen das Mittel zu nehmen; es sind vielmehr von vornherein alle auffällig kleinen Werthe, zumal solche Beobachtungen, bei denen die wohl nie vollständig fehlenden seitlichen Schwankungen der Stäbe stark waren, von der Berechnung ausgeschlossen und nur drei bis vier der grössten der Regel nach benutzt worden. Die einzelnen Ablesungen differirten bei den kleinsten Amplituden (20^{mm}) kaum um 0.3^{mm} , bei den grössten (200^{mm}) um fast 1.5^{mm} ; die Sicherheit der angegebenen Zahlen schätze ich im ersten Falle auf etwa 0.2^{mm} , im letzten auf 0.5^{mm} .

Die Längen der verwandten gleich dicken Stäbe I bis IV waren

$$L_I = L_{II} = 30^{\text{cm}}, L_{III} = 20^{\text{cm}}, L_{IV} = 40^{\text{cm}}$$

und ihre Masse sehr nahe ihren Längen proportional; genauer, wenn man mit μ die mittlere Masse auf 10^{cm} Länge bezeichnet

$$m_I = 226.0^{\text{gr}} = \mu (3 - 0.0022); \quad m_{II} = 226.1^{\text{gr}} = \mu (3 - 0.0020);$$

$$m_{III} = 151.4^{\text{gr}} = \mu (2 + 0.0027); \quad m_{IV} = 302.5^{\text{gr}} = \mu (4 + 0.0016).$$

Dabei war $\mu = 75.5^{\text{gr}}$.

Der dünnere Stab V hatte eine Länge von 30^{cm} und wog 115^{gr}.

Tabelle I.

Stäbe von gleichem Querschnitt.

V_1°	V_1		V_2		V_2°	V_2		V_1
I	I		II ¹⁾		II	II		I ²⁾
20	0.3	0.8	19.7	18.7	20	0.3	1.0	19.5 18.7
40	0.5	1.7	39.2	38.1	40	0.5	2.0	39.3 37.9
80	1.1	3.3	78.8	76.0	80	1.3	3.5	78.7 75.9
120	1.6	4.6	117.9	114.1	120	1.7	5.2	118.2 114.0
160	2.3	6.4	156.8	152.0	160	2.1	7.0	157.5 149.2
I	I		III ³⁾		III	III		I ⁴⁾
20	4.2	4.7	23.2	22.3	20	— 3.2 × — 3.6	15.9	15.1
40	8.4	9.8	46.2	44.0	40	— 6.8 × — 4.7	31.2	29.6
80	18.0	21.7	91.6	86.7	80	— 12.0 × — 6.1	61.4	57.4
160.4	37.6	47.2	183.6	166.2	160.8	— 22.0 × — 7.6	122.0	112.0
I	I		IV ⁵⁾		IV	IV		I ⁶⁾
20	— 2.5 × — 2.0	16.5	16.2	20	3.0	3.6	22.3	21.6
40	— 4.9 × — 3.4	33.3	31.9	40	6.6	7.6	44.7	42.9
80	— 9.1 × — 5.5	66.3	63.2	80	13.1	16.3	89.3	84.5
120	— 13.4 × — 5.9	99.2	93.3	120	20.0	25.8	133.3	125.5
160	— 17.2 × — 7.2	132.0	124.0					
III	III		IV ⁷⁾		IV	IV		III ⁸⁾
20	— 6.0 × — 5.0	13.0	12.6	20	6.9	7.2	26.0	25.1
40	— 11.4 × — 8.6	25.8	24.0	40	14.0	15.4	51.8	49.0
80.4	— 20.8 × — 11.2	50.4	45.2	80.2	29.6	34.4	99.6	89.6
160.8	— 35.4 × — 10.0	98.0	85.2	160.4	62.8	75.6	194.2	168.0

Stäbe von verschiedenem Querschnitt.

V_1^0	V_1		V_2		V_2^0	V_2		V_1	
I	I		V 9)		V	V		I 10)	
20	6.6	7.1	25.5	24.3	20	— 6.0 × —	5.0	13.0	11.3
40	13.3	14.0	52.2	49.3	40	— 12.0 × —	10.6	26.1	25.5
80	26.6	28.2	104.2	99.2	80	— 24.6 × —	22.1	52.4	50.6
120	39.6	41.5	156.4	150.8	160	— 48.8 × —	?	106.0	101.7
IV	IV		V 11)		V	V		IV 12)	
20	9.0	9.5	27.8	25.9	20	— 8.2 × —	6.3	10.5	9.7
40	18.4	20.0	55.7	51.3	40	— 15.9 × —	11.9	21.2	19.4
80	37.6	41.1	110.1	99.8	80	— 30.8 × —	20.9	41.8	38.2
120	57.7	63.2	163.6	145.6	160	— 60.2 × —	34(?)	83.5	73.6

Um die in diesen Tafeln enthaltenen Zahlenwerthe mit der Theorie vergleichbar zu machen, sind sie noch von Fehlern zu befreien. Der Luftwiderstand ist bei so kleinen Amplituden zwar fast unmerklich; es beträgt nämlich die Abnahme der Amplituden pro Doppelschwingung bei 160^{mm} Ausschlag

für die Stäbe I und II 0.6^{mm}
 für „ „ III 0.7^{mm}
 für „ „ IV 0.5^{mm}
 und für „ „ V 1.1^{mm},

es fällt also der Einfluss während einer einfachen Schwingung beinahe in die Grenze der Beobachtungsfehler,¹⁾ — aber eine andere Wirkung der umgebenden Luft ist merklicher.

Während der Einleitung des »Stosses« entsteht zwischen den Stäben eine Verdichtung der Luft, während ihrer Trennung eine Verdünnung. Beide Umstände wirken in entgegengesetzter Weise auf das System ein, aber wahrscheinlich nicht mit gleicher Stärke. Ich glaube annehmen zu müssen, dass die Verdünnung eine energischere ist, als die vorhergehende Verdichtung, und sehe die in den beiden ersten Tafeln ausgesprochene Erscheinung, dass bei zwei gleichen Stäben entgegen der Erwartung der stossende nicht nach dem Stoss in Ruhe verharret, sondern dem gestossenen noch ein wenig folgt, als eine Wirkung dieser Ursache an. Demgemäss corrigire ich

¹⁾ Eine Correction ist deshalb nur näherungsweise angebracht.

zunächst die Beobachtungen der ersten beiden Tafeln dadurch, dass ich die kleine im stossenden Stab übrige Geschwindigkeit dem gestossenen noch zulege, und darnach die der übrigen (indem ich berücksichtige, dass die besprochene Ursache nur von der relativen Geschwindigkeit der beiden Stäbe abhängen kann und indirect proportional ihren Massen auf sie wirken muss) dadurch, dass ich bei jeder Beobachtung den aus der ersten oder zweiten Tafel für die relative Geschwindigkeit der betreffenden beiden Stäbe passenden Werth entnehme und denselben, mit dem umgekehrten Verhältniss der Massen multiplicirt, der Endgeschwindigkeit des stossenden Stabes abziehe, der des gestossenen zufüge. Z. B. ist in der dritten Beobachtung der fünften Tafel die relative Geschwindigkeit nahe dieselbe wie in der dritten, der ersten und zweiten Tafel. Ich bilde daher den corrigirten Werth

$$v_1 = -9.1 - 1.2 = -10.3, \text{ aber}$$

$$v_2 = 66.3 + 1.2 \cdot \frac{m_I}{m_{IV}}, \text{ d. i. da } \frac{m_I}{m_{IV}} = \frac{3}{4} \text{ ist,}$$

$$= 67.2.$$

Zu letzterem Werth würde wegen des Luftwiderstandes noch beinahe 0.2 hinzukommen.

Das Gleiche habe ich bei den Beobachtungen der neunten bis zwölften Tafel gethan in der Annahme, dass wegen der schwachen Abrundung der Enden der Stäbe ihr Querschnitt auf die genannte Erscheinung nur geringen Einfluss üben möchte; indess scheint es (vergl. S. 700), dass die so gebildete Correction etwas zu gross ausfällt.

Stellt man nach diesen Reductionen die beobachteten Werthe mit den nach der NEUMANN - SAINT VENANT'schen Formel berechneten zusammen, so erhält man folgende Übersicht.

Tabelle II.

beobachtet		berechnet		beobachtet		berechnet	
V_1	V_2	V_1	V_2	V_2	V_1	V_2	V_1
Stäbe von gleichem Querschnitt.							
$\frac{m_1}{m_2} = 1$				$\frac{m_2}{m_1} = 1$			
0	20.0	0	20.0	0	19.8	0	20.0
0	39.7	0	40.0	0	39.8	0	40.0
0	80.1	0	80.0	0	80.1	0	80.0
0	119.7	0	120.0	0	120.1	0	120.0
0	159.5	0	160.0	0	160.0	0	160.0

beobachtet		berechnet		beobachtet		berechnet	
V_1	V_2	V_1	V_2	V_2	V_1	V_2	V_1
$\frac{m_1}{m_2} = \frac{3}{2}$ 3)				$\frac{m_2}{m_1} = \frac{2}{3}$ 4)			
3.9	23.5	6.7	20.0	— 3.6	16.2	0	13.3
7.9	47.0	13.3	40.0	— 7.6	31.7	0	26.7
16.8	93.5	26.7	80.0	— 13.9	62.9	0	53.3
35.3	187.4	53.3	160.4	— 25.5	124.0	0	106.7
$\frac{m_1}{m_2} = \frac{3}{4}$ 5)				$\frac{m_2}{m_1} = \frac{4}{3}$ 6)			
— 2.8	16.7	0	15	2.8	22.6	5	20
— 5.4	33.7	0	30	6.2	45.2	10	40
— 10.3	67.4	0	60	12.2	90.5	20	80
— 15.1	100.6	0	90	18.8	135.1	30	120
— 19.5	134.1	0	120				
$\frac{m_1}{m_2} = \frac{1}{2}$ 7)				$\frac{m_2}{m_1} = 2$ 8)			
— 6.4	13.2	0	10	6.7	26.4	10	20
— 12.2	26.2	0	20	13.6	52.6	20	40
— 21.6	51.4	0	40.2	28.7	101.5	40.1	80.2
— 38.7	99.0	0	80.4	61.0	197.7	80.2	160.4

Stäbe von verschiedenem Querschnitt.

$\frac{m_1}{m_2} = 1.96$ 9)				$\frac{m_2}{m_1} = 0.51$ 10)			
6.3	26.1	6.5	26.5	— 6.6	13.3	— 6.5	13.5
12.8	53.2	13.0	53.0	— 13.8	26.6	— 13.0	27.0
25.4	106.7	26.0	106.0	— 27.0	53.8	— 26.0	54.0
38.0	160.1	39.1	159.1	— 51.8	108.5	— 52.1	108.0
$\frac{m_1}{m_2} = 0.38$ 11)				$\frac{m_2}{m_1} = 2.63$ 12)			
8.8	28.4	9.9	13.5	— 8.8	10.7	— 6.5	10.1
18.0	56.7	19.8	26.9	— 16.9	21.6	— 13.1	20.2
36.8	112.6	40.7	53.8	— 33.3	42.7	— 26.2	40.3
56.1	167.0	60.5	80.7	— 63.6	85.3	— 52.3	80.6

Die vorstehende Zusammenstellung zeigt ausser in den Tafeln 1, 2, 9 und 10, von denen später gesprochen werden wird, durchweg ausserordentliche Differenzen zwischen Theorie und Beobachtung. Besonders auffällig ist, dass, während bei Stäben gleichen Querschnitts die Theorie, wenn der kürzere stösst, nach dem Stosse für denselben

Ruhe verlangt, die Beobachtung consequent ein lebhaftes Zurückspringen ergibt (vergl. Tafel 4, 5 und 7); ferner dass sich ganz allgemein die nach dem Stoss übrige lebendige Kraft der fortschreitenden Bewegung sehr erheblich grösser findet, als sie die Theorie ergibt, und beide Umstände sprechen dagegen, dass Fehlerquellen die Ursachen der Abweichungen sind. — Bestätigt erscheint vollständig das allgemeine Gesetz von der Erhaltung der Bewegung des Schwerpunktes. Aber mit den NEUMANN - SAINT VENANT'schen Stossformeln sind diese Beobachtungen unvereinbar.

Hier ist nun der Ort der Beobachtungen, die Hr. Prof. BOLTZMANN¹⁾ veranlasst und publicirt hat, zu gedenken. Sie betreffen nur den speciellen Fall zweier Stäbe von nahe gleicher Masse und gleichem oder verschiedenem Querschnitt, aber ich trage Bedenken, ihnen entscheidende Bedeutung beizulegen. Einmal sind nämlich die Querdimensionen so gross gegen die Längsdimensionen (bei den dickeren ist das Verhältniss 17:100), dass man kaum die Theorie, welche die Querdimensionen verschwindend klein voraussetzt, auf sie anwenden kann und zweitens sind die mitgetheilten Beobachtungen noch nicht von dem Einfluss der oben erörterten Fehlerquellen befreit, der bei den sehr leichten Stäben (aus Hartgummi gefertigt) ausserordentlich gross gewesen sein muss; wenigstens ergab die Beobachtung mit gleichen Stäben den Ausschlag des gestossenen Stabes resp. = 83.5, 42 und 26^{mm}, wo nach der Theorie (die in diesem Falle sich bei meinen Versuchen vollständig bewährt hat, ja wie man weiter sehen wird, sich bewähren musste) resp. 100, 50 und 30^{mm} zu erwarten gewesen wäre.

Trotz alledem geben die BOLTZMANN'schen Beobachtungen durch ihre Abweichungen von den theoretischen Zahlwerthen Grund zu schwerem Zweifel gegen die Richtigkeit der Theorie, eventuell ihre Anwendbarkeit auf die unter den gewöhnlichen Umständen angestellten Beobachtungen.

II.

Wenn man, um die im Vorstehenden entwickelten höchst auffälligen Widersprüche zwischen Theorie und Beobachtung zu erklären, die NEUMANN - SAINT VENANT'sche Theorie der Prüfung unterwirft, liegt wohl der Gedanke am nächsten, dass die Definition des Momentes der Trennung noch immer nicht völlig richtig sei. Aber eine solche Vermuthung ist schon deshalb durchaus abzuweisen, weil sich leicht zeigen lässt, dass gleichviel, wie man diesen Zeitpunkt gewählt denkt,

¹⁾ L. BOLTZMANN, l. c. p. 1227.

niemals die genannte Theorie das Zurückprallen des stossenden kleineren Stabes von dem frei beweglichen, ursprünglich ruhenden, grösseren ergibt.

Berechtigter scheint mir ein Zweifel gegen die Anwendung der Differentialgleichungen der Elasticität auf diesen Fall überhaupt. Denn die Stetigkeit des Zustandes, die Entwickelbarkeit der Verrückungen und Geschwindigkeiten nach den Coordinaten und die Berechtigung, die betreffenden Reihen mit dem ersten Glied abzuberechnen, ist doch bei diesem Problem zum mindesten fraglich. Indessen bin ich durch gewisse Betrachtungen, die hier zu weit führen würden, zu der Ansicht gekommen, dass diese Widersprüche mit den Grundvoraussetzungen der allgemeinen Elasticitätstheorie nicht ausreichen, jene qualitativen Verschiedenheiten zu erklären, die zwischen Beobachtung und Theorie unleugbar bestehen. In der That hat es ja auch nichts gar zu Gewalttames, sich vorzustellen, dass die beiderseitigen Oberflächenschichten während der Einleitung des Stosses in einen Zustand gelangen, der eine stetige Vermittelung zwischen dem im einen und im andern Stab vorhandenen Bewegungszustand bilden.

Ich sehe den Grund für die Abweichung der Beobachtungen in der Unrichtigkeit der Annahme der Theorie, dass während des Stosses die Stäbe als Theile eines einzigen festen Systems angesehen werden können. Denn die allgemeine Erfahrung, dass abgebrochene Stücke eines Körpers nicht durch blossen Druck wieder mit demselben zu verbinden sind, zeigt, dass entweder eine Annäherung der Theile, welche die Grenzschichten des einen in die Wirkungssphären derjenigen des anderen bringt, in Wirklichkeit unmöglich ist, oder wenn doch, die zunächst der Oberfläche liegenden Massentheile in einem andern Zustand sind, als die inneren und auf die ihnen genäherten anders, nämlich weit schwächer wirken. Das Erstere wahrscheinlich zu machen, erinnere ich nur an die bekannte Thatsache, dass bei der Berührung einer Linse und einer Platte aus Glas die im reflectirten Licht entstehenden Newton'schen Ringe keineswegs in der Mitte den theoretisch verlangten schwarzen Fleck zeigen, sondern ein farbiges Feld, welches darthut, dass, trotz oft nicht unerheblichen Druckes, Platte und Linse um die Grösse mehrerer Wellenlängen von einander entfernt verharren, dass also eine dünne Schicht — sagen wir verdichteten Gases — in einem Zustand, der mehr dem festen als dem flüssigen gleicht, die beiden Oberflächen bedeckt und die unmittelbare Berührung der Glastheile hindert.

Das Letztere wird wahrscheinlich durch die Überlegung, dass zum Gleichgewicht des einen Körper bildenden Massensystemes erforderlich ist, dass die vom Innern normal auf die Oberflächenelemente

ausgeübten Molecularkräfte sich zerstören: es wird demnach ihre Wirkung auch in unmittelbarer Nähe der Oberfläche nur klein sein können.

Die Bedingungen für die Berührungsfläche zweier Körper werden abgeleitet durch Betrachtung des Gleichgewichtes eines Raumelementes, welches durch zwei unendlich nahe diesseits und jenseits parallel der Berührungsfläche der Körper construirte Flächenelemente begrenzt ist. Hängen die beiden Körper fest zusammen, so müssen die beiden der Grenze parallelen Flächenelemente, deren Abstand als ein Unendlichkleines 1. Ordnung angesehen werden mag, Verrückungen und Drucke erfahren, die sich nur um ein Unendlichkleines 2. Ordnung unterscheiden, d. h. wenn man die Z -Axe der Normalen parallel wählt, muss in der Grenze sein:

$$w_2 - w_1 = 0, \quad (Z_z)_2 - (Z_z)_1 = 0, \quad \text{u. s. f.}$$

Die zweite Bedingung muss offenbar bestehen, gleichviel, welcher Art die Wechselwirkungen in der Grenze selbst sind, die erstere ist unrichtig, sowie die Grösse der Verrückungsdifferenz unendlich klein 1. Ordnung wird. Die oben entwickelte Vorstellung veranlasst mich anzunehmen, dass dies bei der blossen Berührung zweier Körper stattfinden kann. (Sind die sich berührenden Flächen verschieden gekrümmt, so dass das beiden gemeinsame Flächenstück besonders klein ist, so wird dies analog wirken.¹⁾)

Ich lege demnach der im Weiteren zu entwickelnden Theorie des Stosses die Annahme zum Grunde, dass das Grenzelement zwischen beiden, das ich kurz die »Zwischenschicht« nenne, ein singuläres Verhalten im erörterten Sinne zeigt. Die Differenz der Verschiebungen normal zur Grenze, die jetzt nicht mehr gleich Null zu nehmen ist, stellt die Dilatation der Zwischenschicht dar und ist eine Function des in der Grenze wirksamen Druckes.

Nach der eigenthümlichen Natur dieser Zwischenschicht wird jene Function wahrscheinlich eine ziemlich complicirte sein; da aber die Rechnung nur durchzuführen ist, wenn ein lineärer Zusammenhang zwischen Druck und Compression stattfindet, werde ich ebenfalls einen solchen annehmen; — aber es ist zu bemerken, dass der hierdurch in die Rechnung eingeführte Elasticitätscoefficient

¹⁾ Auf den Einfluss der nie ganz fehlenden Krümmung der stossenden Flächen macht auch Hr. BOLTZMANN (l. c. S. 1225) aufmerksam und fügt hinzu: »dass daher bei gleich langen ebensowenig als bei ungleich langen Stäben die reflectirten Wellen sich wieder am Ausgangspunkte concentriren. Hiernach würde also der bedeutende Verlust von lebendiger Kraft beim Stosse nicht bloss der elastischen Nachwirkung zuzuschreiben sein u. s. w.« Aber dies letztere scheint mir angesichts des Resultates, dass die bei Stäben mit gekrümmten Endflächen erhaltenen Verluste an lebendiger Kraft durchweg viel geringer als nach der NEUMANN - SAINT VENANT'schen Theorie, ja bei gleichen Stäben völlig verschwindend sind, nicht aufrecht zu erhalten.

der Zwischenschicht nur die Bedeutung eines Mittelwerthes für die bei einem bestimmten Stosse allmählich eintretenden Werthe hat und sich bei verschiedenen Stossgeschwindigkeiten verschieden finden wird, kleiner bei geringen, grösser bei bedeutenderen. Setze ich demgemäss

$$p = + c \cdot \delta l$$

den Werth des Druckes, der einer Dilatation der Zwischenschicht um δl entspricht, so ist c nicht nothwendig für alle Stosserscheinungen, die dasselbe Stabpaar zu zeigen vermag, dasselbe.

Ferner ist nach der Natur der Zwischenschicht, die aus zwei getrennten Hälften besteht, von denen die eine am einen, die andre am andern Stab haftet, wahrscheinlich, dass dieselbe nur für negative Werthe von δl (d. h. Compression) eine Widerstandskraft leistet; es ist also $p = 0$ für $\delta l > 0$.

Lege ich die Z -Axe in die Mittellinie der stossenden Stäbe von ihrer Berührungsstelle aus, bezeichne mit $w_1, w_2, E_1, E_2, \epsilon_1, \epsilon_2, m_1, m_2, q_1, q_2, l_1, l_2$ für den ersten und zweiten Stab Verrückungen, Elasticitätscoefficienten, Dichtigkeiten, Massen, Querschnitte und Längen, und setze endlich abgekürzt

$$\frac{E_1}{\epsilon_1} = a_1^2, \frac{E_2}{\epsilon_2} = a_2^2, E_1 q_1 = b_1, E_2 q_2 = b_2$$

so ist das Problem in folgenden Gleichungen ausgesprochen.

Es muss sein:

$$\begin{array}{ll} \text{für } -l_1 < z < 0 & \text{für } 0 < z < l_2 \\ \frac{\partial^2 w_1}{\partial t^2} = a_1^2 \frac{\partial^2 w_1}{\partial z^2} & \frac{\partial^2 w_2}{\partial t^2} = a_2^2 \frac{\partial^2 w_2}{\partial z^2} \end{array} \quad (1.)$$

$$\text{für } z = -l_1, \frac{\partial w_1}{\partial z} = 0, \quad \text{für } z = l_2, \frac{\partial w_2}{\partial z} = 0 \quad (2.)$$

$$\begin{array}{l} \text{für } z = 0^1) \\ b_1 \frac{\partial w_1}{\partial z} = b_2 \frac{\partial w_2}{\partial z} = c (w_2 - w_1) \end{array} \quad (3.)$$

$$\begin{array}{ll} \text{endlich für } t = 0 \\ w_1 = 0 & w_2 = 0^2) \end{array} \quad (4.)$$

$$\frac{\partial w_1}{\partial t} = V_1^0 \quad \frac{\partial w_2}{\partial t} = V_2^0. \quad (5.)$$

Das Problem zu lösen setze ich

$$\begin{array}{l} w_1 = \sum \sin a_1 p_1 A_1 \cos p_1 (l_1 + z) + B_1 t \\ w_2 = \sum \sin a_2 p_2 A_2 \cos p_2 (l_2 - z) + B_2 t, \end{array}$$

wodurch sogleich die Bedingungen (1.), (2.) und (4.) erfüllt sind.

¹⁾ Neben den Dimensionen der Stäbe ist die Dicke der Zwischenschicht zu vernachlässigen.

²⁾ Die Annahme einer anfänglichen Dilatation hat wohl kaum Interesse.

Aus (3.) folgt $a_1 p_1 = a_2 p_2$

$$b_1 p_1 A_1 \sin p_1 l_1 + b_2 p_2 A_2 \sin p_2 l_2 = 0 \text{ und}$$

$$c \left(\frac{1}{b_1 p_1} \cotg p_1 l_1 + \frac{1}{b_2 p_2} \cotg p_2 l_2 \right) = 1,$$

$$\text{endlich } B_1 = B_2 = B.$$

Setze ich $a_1 p_1 = a_2 p_2 = v$

$$b_1 p_2 A_1 \sin p_1 l_1 = -b_2 p_2 A_2 \sin p_2 l_2 = A,$$

so kommt

$$w_1 = \sum \frac{a_1 A_k \sin v_k t \cos \frac{v_k (l_1 + z)}{a_1}}{b_1 v_k \sin \frac{v_k l_1}{a_1}}$$

$$w_2 = - \sum \frac{a_2 A_k \sin v_k t \cos v_k \frac{(l_2 - z)}{a_2}}{b_2 v_k \sin \frac{v_k l_2}{a_2}}$$

$$\left. \begin{aligned} \text{und } \frac{\partial w_1}{\partial t} = v_1 &= \sum a_1 A_k \frac{\cos v_k t \cos \frac{v_k (l_1 + z)}{a_1}}{b_1 \sin \frac{v_k l_1}{a_1}} + B \\ \frac{\partial w_2}{\partial t} = v_2 &= - \sum a_2 A_k \frac{\cos v_k t \cos \frac{v_k (l_2 - z)}{a_2}}{b_2 \sin \frac{v_k l_2}{a_2}} + B \end{aligned} \right\} (6.)$$

Dabei sind die v_k die Wurzeln der transcendenten Gleichung (6.)

$$\frac{a_1}{b_1} \cotg \frac{v l_1}{a_1} + \frac{a_2}{b_2} \cotg \frac{v l_2}{a_2} = \frac{v}{c} \quad (7.)$$

Um die Constanten A der einzigen noch übrigen Bedingung (5.) gemäss zu bestimmen, hat man folgendermaassen zu verfahren.

Man setze kurz $v_1 = \sum_k A_k \cdot \tau_k \cdot \zeta'_k + B$

$$v_2 = \sum_k A_k \cdot \tau_k \cdot \zeta'_k + B,$$

$$\text{worin } \tau_k = \cos v_k t, \quad \zeta'_k = \frac{a_1 \cos \frac{v_k}{a_1} (l_1 + z)}{b_1 \sin \frac{v_k l_1}{a_1}}, \quad \zeta''_k = - \frac{a_2 \cos \frac{v_k}{a_2} (l_2 - z)}{b_2 \sin \frac{v_k l_2}{a_2}} \text{ ist.}$$

Dann ist

$$A_k = \frac{\frac{b_1}{a_1^2} \int_{-l_1}^0 (V_1 - B) \zeta'_k dz + \frac{b_2}{a_2^2} \int_0^l (V_2 - B) \zeta''_k dz}{\frac{b_1}{a_1^2} \int_{-l_1}^0 \zeta_k^2 dz + \frac{b_2}{a_2^2} \int_0^l \zeta_k^2 dz}.$$

Denn es lässt sich zeigen, dass

$$\frac{b_1}{a_1^2} \int_{-l_1}^0 \zeta'_k \zeta'_k dz + \frac{b_2}{a_2^2} \int_0^h \zeta'_k \zeta'_k dz = 0 \text{ ist für } h \geq k.$$

Dies folgt aus den Eigenschaften von ζ , dass nämlich überall

$$-v_k^2 \zeta'_k = a_1^2 \frac{\partial^2 \zeta'_k}{\partial z^2} \quad -v_k^2 \zeta''_k = a_2^2 \frac{\partial^2 \zeta''_k}{\partial z^2}, \quad (1')$$

$$\text{für } z = -l_1, \frac{\partial \zeta'_k}{\partial z} = 0, \text{ für } z = +l_2, \frac{\partial \zeta''_k}{\partial z} = 0 \quad (2')$$

und für

$$z = 0 \quad b_1 \frac{\partial \zeta'_k}{\partial z} = b_2 \frac{\partial \zeta''_k}{\partial z} = c(\zeta'_k - \zeta''_k) \text{ ist.} \quad (3')$$

Bildet man nämlich aus (1'):

$$\begin{aligned} -\frac{v_k^2 - v_k^2}{a_1^2} b_1 \int_{-l_1}^0 \zeta'_k \zeta'_k dz &= b_1 \int_{-l_1}^0 \left(\zeta'_k \frac{\partial^2 \zeta'_k}{\partial z^2} - \zeta'_k \frac{\partial^2 \zeta'_k}{\partial z^2} \right) dz \\ -\frac{v_k^2 - v_k^2}{a_2^2} b_2 \int_0^h \zeta''_k \zeta''_k dz &= b_2 \int_0^h \left(\zeta''_k \frac{\partial^2 \zeta''_k}{\partial z^2} - \zeta''_k \frac{\partial^2 \zeta''_k}{\partial z^2} \right) dz \end{aligned}$$

führt die rechte Seite durch theilweise Integration und Benutzung von (2') aus, und addirt beide Formeln, so kommt nach (3') rechts Null; also ist

$$(v_k^2 - v_k^2) \left[\frac{b_1}{a_1^2} \int_{-l_1}^0 \zeta'_k \zeta'_k dz + \frac{b_2}{a_2^2} \int_0^h \zeta''_k \zeta''_k dz \right] = 0$$

und demnach für $k \geq h$ der zweite Factor = Null, q. e. d.

Ausgerechnet ergibt sich demgemäss

$$A_k = \frac{4(V_1^0 - V_2^0)}{a_1 \left(\frac{\frac{2l_1 v_k}{a_1} + \sin \frac{2l_1 v_k}{a_1}}{b_1 \sin^2 \frac{l_1 v_k}{a_1}} \right) + a_2 \left(\frac{\frac{2l_2 v_k}{a_2} + \sin \frac{2l_2 v_k}{a_2}}{b_2 \sin^2 \frac{l_2 v_k}{a_2}} \right)}. \quad (8.)$$

Die einzig noch übrige Constante B zu bestimmen, bilde man den Werth der Schwerpunktsgeschwindigkeit für das ganze System. Dann findet sich

$$m_1 V_1 + m_2 V_2 = B(m_1 + m_2) + \sum_k A_k \cos v_k t \left(q_1 \epsilon_1 \int_{-l_1}^0 \zeta'_k dz + q_2 \epsilon_2 \int_0^h \zeta''_k dz \right).$$

Aber diese Summe findet sich nach den Formeln (1') (2') und (3') gleich Null, also

$$B = \frac{m_1 V_1 + m_2 V_2}{m_1 + m_2} = \frac{m_1 V_1^0 + m_2 V_2^0}{m_1 + m_2} \quad (9.)$$

Die Formeln (6.) — (9.) enthalten die Lösung des gestellten Problems.

Den Inhalt des Resultates zu überblicken, müsste eigentlich die in den Gleichungen (3.) und (7.) vorkommende Constante c , die dem Elasticitäts-Coefficienten der Zwischenschicht proportional ist, bekannt sein. Da dies aber nicht der Fall ist, muss man sich mit einigen speciellen Folgerungen begnügen.

Ist $c = \infty$, so wirkt die Zwischenschicht ebenso als wäre sie gar nicht vorhanden, sondern trafen die Stäbe unmittelbar auf einander; denn es wird hier für $z = 0$, $b_1 \frac{\partial w_1}{\partial z} = b_2 \frac{\partial w_2}{\partial z}$ und $w_1 = w_2$. Man erhält auf diese Weise die NEUMANN - SAINT VENANT'schen Formeln.¹⁾

Aber mit dieser Annahme sind die Resultate der Messung im Widerspruch, c muss also endlich sein und die oben entwickelte Vorstellung lässt vermuthen, dass es bei kleinen Stofsgeschwindigkeiten selbst verschwindend klein werden kann.

In diesem Falle lässt sich die Lage der Wurzeln der transscendenten Gleichung (7.) leicht beurtheilen. Construiert man nämlich die Curven

$$y = \frac{a_1}{b_1} \cotg x \frac{l_1}{a_1} + \frac{a_2}{b_2} \cotg x \frac{l_2}{a_2} \text{ und } y = \frac{x}{c}$$

so sind die x Coordinaten ihrer Schnittpunkte die gesuchten Wurzeln ν_k .

Man erkennt, dass eine erste Wurzel ν_0 unweit Null liegen muss, — um so näher, je kleiner c ist, — ausserdem zwei Systeme bei $\frac{a_1}{l_1} (h\pi + \delta'_k)$ und $\frac{a_2}{l_2} (h\pi + \delta''_k)$, wo $h = 1, 2, 3 \dots$ sein kann und zwar sind die Werthe δ'_k und δ''_k bereits sehr klein, wenn ν_0 noch ziemlich beträchtlich ist.

Mit abnehmendem c werden die höheren Glieder der Reihen **6** sehr schnell den Einfluss verlieren, da sie proportional mit $\sin \delta'_k$ und $\sin \delta''_k$ sind, zugleich wird das erste Glied wegen der Kleinheit von ν_0 sich einem Grenzwert h nähern.

Vernachlässigt man Glieder von der Ordnung δ'_k und δ''_k sowie $\left(\frac{\nu_0 l_1}{a_1}\right)^2$ und $\left(\frac{\nu_0 l_2}{a_2}\right)^2$ neben 1, so erhält man nach leichten Reductionen

¹⁾ Vergl. SAINT VENANT l. c. p. 288.

$$v_1 = \frac{m_1 V_1^0 + m_2 V_2^0}{m_1 + m_2} + \frac{m_2 (V_1^0 - V_2^0)}{m_1 + m_2} \cos v_0 t$$

$$v_2 = \frac{m_1 V_1^0 + m_2 V_2^0}{m_1 + m_2} - \frac{m_1 (V_1^0 - V_2^0)}{m_1 + m_2} \cos v_0 t$$

und für die Berührungsstelle zugleich

$$\frac{\partial \bar{w}}{\partial z} = -A_0 \sin v_0 t$$

Die letztere Formel zeigt, dass während $0 < t < \frac{\pi}{v_0}$ bleibt, in der Berührungsstelle eine Compression vorhanden ist, für $t = \frac{\pi}{v_0}$ aber eine Dilatation sich zu bilden beginnt. Zu diesem Zeitpunkt müssen also nach den oben entwickelten Ansichten die Stäbe ausser Wechselwirkung treten, und $T = \frac{\pi}{v_0}$ ist als die »Dauer des Stosses« anzusehen.

Die Stäbe bewegen sich in diesem extremen Falle fortwährend als Ganzes, d. h. ohne innere Dilatationen; ihre Schwerpunkts-
geschwindigkeit wird also für den Moment der Trennung einfach durch Einsetzen des Werthes $t = \frac{\pi}{v_0}$ in die letzten Formeln erhalten und es ergibt sich

$$V_1 = \frac{2 m_2 V_2^0 + (m_1 - m_2) V_1^0}{m_1 + m_2}$$

$$V_2 = \frac{2 m_1 V_1^0 + (m_2 - m_1) V_2^0}{m_1 + m_2} \quad (10.)$$

In diesem extremen Falle, wo sich die Stäbe nur als Massen, deren Elasticität nicht in Betracht kommt, bewegen und die elastische Wirkung nur von der Zwischenschicht ausgeht, erscheinen also die alten Stossgleichungen, die man durch alleinige Benutzung des Princips der Erhaltung der lebendigen Kraft und der Schwerpunkts-
geschwindigkeit ableiten kann, — und dies ist begreiflich, da mit dem Verschwinden der innern Oscillationen der Stäbe der Satz von der Erhaltung der lebendigen Kraft wieder in Geltung tritt.¹⁾

Innerhalb der beiden Extreme, dass die Zwischenschicht gar nicht wirkt ($c = \infty$) und dass sie allein das Stossphänomen hervorbringt ($c = 0$) liegen alle denkbaren Fälle. Welchen Werth c bei jedem einzelnen Experiment hat, kann nur die Beobachtung selbst ent-

¹⁾ Nach dem oben Entwickelten würden unter den Umständen, die die vorgenommenen Vernachlässigungen gestatten, elastische und absolut starre Körper sich ganz gleich verhalten — nicht aber ebenso unelastische, weiche Körper, wie es vielleicht scheinen könnte.

scheiden, — aber die oben auseinandergesetzte Hypothese macht wahrscheinlich, dass bei den kleinsten Stossgeschwindigkeiten c den kleinsten Werth besitzt und mit jenen zunimmt. Dementsprechend müssten die Beobachtungen bei den kleinsten Stossgeschwindigkeiten am genauesten durch die Formeln (10.) dargestellt werden und die bei grösseren angestellten Messungen nach den NEUMANN - SAINT VENANT'schen Formeln hinneigen. In wie weit dies stattfindet, zeigt die Zusammenstellung der beobachteten Werthe mit den aus Formel (10.) berechneten auf Tabelle III und ihre Vergleichung mit Tabelle II.

Tabelle III.

beobachtet		berechnet		beobachtet		berechnet	
V_1	V_2	V_1	V_2	V_2	V_1	V_2	V_1

Stäbe mit gleichem Querschnitt.

$\frac{m_1}{m_2} = 1$ 1)				$\frac{m_2}{m_1} = 1$ 2)			
0	20.0	0	20.0	0	19.8	0	20.0
0	39.7	0	40.0	0	39.8	0	40.0
0	80.1	0	80.0	0	80.1	0	80.0
0	119.7	0	120.0	0	120.1	0	120.0
0	159.5	0	160.0	0	160.0	0	160.0

$\frac{m_1}{m_2} = \frac{3}{2}$ 3)				$\frac{m_2}{m_1} = \frac{2}{3}$ 4)			
+ 3.9	23.5	+ 4	24	— 3.6	16.2	— 4	16
+ 7.9	47.0	+ 8	48	— 7.6	31.7	— 8	32
+ 16.8	93.5	+ 16	96	— 13.9	62.9	— 16	64
+ 35.3	187.4	+ 32.1	192.5	— 25.5	124.0	— 32	128

$\frac{m_1}{m_2} = \frac{3}{4}$ 5)				$\frac{m_2}{m_1} = \frac{4}{3}$ 6)			
— 2.8	16.7	— 2.9	17.1	+ 2.8	22.6	+ 2.9	22.9
— 5.4	33.7	— 5.7	34.3	+ 6.2	45.2	+ 5.7	45.7
— 10.4	67.4	— 11.4	68.6	+ 12.2	90.5	+ 11.4	91.4
— 15.1	100.6	— 17.1	102.9	+ 18.8	134.9	+ 17.1	137.1
— 19.5	134.1	— 22.9	137.1				

$\frac{m_1}{m_2} = \frac{1}{2}$ 7)				$\frac{m_2}{m_1} = 2$ 8)			
— 6.4	13.2	— 6.7	13.3	+ 6.7	26.4	+ 6.7	26.7
— 12.2	26.2	— 13.3	26.7	+ 13.6	52.6	+ 13.3	53.3
— 21.6	51.4	— 26.7	53.3	+ 28.7	101.5	+ 26.7	106.7
— 38.9	99.0	— 53.3	106.7	+ 61.1	197.9	+ 53.3	213.3

beobachtet		berechnet		beobachtet		berechnet	
V_1	V_2	V_1	V_2	V_2	V_1	V_2	V_2

Stäbe mit verschiedenem Querschnitt.

$\frac{m_1}{m_2} = 1.96$ 9)				$\frac{m_2}{m_1} = 0.51$ 10)			
+ 6.3	26.1	+ 6.5	26.5	— 6.6	13.3	— 6.5	13.5
+ 12.8	53.2	+ 13.0	53.0	— 13.8	26.6	— 13.0	27.0
+ 25.4	106.7	+ 26.0	106.0	— 27.0	53.8	— 26.0	54.0
+ 38.0	160.1	+ 39.1	159.1	— 51.8	108.5	— 52.1	108.0
$\frac{m_1}{m_2} = 0.38$ 11)				$\frac{m_2}{m_1} = 2.63$ 12)			
+ 8.8	28.4	+ 9.0	29.0	— 8.8	10.7	— 9.0	11.0
+ 18.0	56.7	+ 17.9	57.9	— 16.9	21.6	— 17.9	22.0
+ 36.8	112.6	+ 35.9	115.8	— 33.3	42.7	— 35.9	44.0
+ 56.1	167.0	+ 52.8	173.7	— 63.6	85.3	— 71.8	88.1

Die Zahlen dieser Tabelle ergeben, dass bei den kleinsten benutzten Stossgeschwindigkeiten von circa 40^{mm} pro Secunde (entsprechend 20^{mm} Ausschlag) die Annahme, dass c verschwindend klein ist und demgemäss die Stäbe nur als bewegte Massen wirken, sehr nahe erfüllt ist; denn hier stimmen die beobachteten Werthe mit den nach Formel (10.) berechneten soweit, als nach der Schwierigkeit der Beobachtungen zu erwarten ist. Dass die Abweichungen meist in dem Sinne stattfinden, dass der beobachtete Werth kleiner erscheint als der berechnete, ist nur natürlich, da alle Fehlerquellen in diesem Sinne wirken.

Bei grösseren Stossgeschwindigkeiten treten beträchtlichere Abweichungen von der Formel (10.) auf, aber stets in dem vorausbezeichneten Sinne nach der NEUMANN-SAINT VENANT'schen Formel hin. Letztere gibt nämlich für V_1 in Tafel 3, 6, 8, 11 Grösseres, in 4, 5, 7, 12 Kleineres als Formel (10.), — dem entsprechend ist bei grösseren Stossgeschwindigkeiten das beobachtete V_1 in Tafel 3, 6, 8 und 11 auch grösser, in Tafel 4, 5, 7 und 12 kleiner als das berechnete, — V_2 aber in allen Tafeln kleiner als nach Formel (10.) berechnet, weil hierfür die Abweichungen beider Formeln auch stets im selben Sinne stattfinden. Die beobachteten Werthe der Tafeln 1 und 2 stimmen mit den berechneten für grosse und kleine Stossgeschwindigkeiten fast gleich gut; in der That giebt für gleiche Stablängen jedes c dasselbe Gesetz für die Endgeschwindigkeiten.

Noch muss ich besonders auf die Beobachtungen (9.) bis (12.) hinweisen, die, wie gesagt, durch die Publication des Hrn. Prof. BOLTZMANN veranlasst worden sind. Die in jener Arbeit mitgetheilten Resultate widersprechen insofern meiner Theorie, als sie zu zeigen scheinen, dass auch bei kleinen Stossgeschwindigkeiten das Phänomen nicht nur von der Masse, sondern auch der Gestalt der benutzten Stäbe abhängt. Hr. Prof. BOLTZMANN erhielt nämlich beim Stoss zweier nahezu identischer Stäbe (Länge 100 und 104^{mm}, Dicke 17^{mm}) bei einer Anfangs-elongation von 30^{mm} im Mittel 25.8^{mm} Ausschlag, beim Stoss zweier verschieden gestalteter (Längen 104 und 230^{mm}, Dicken 17 und 11^{mm}) und nahe gleich schwerer (Gewichte 23.8 und 23.9^{gr}) im Mittel 24.2. Auf Grund der oben angeführten Umstände vermag ich diesen Zahlen nicht entscheidende Bedeutung beizulegen, obgleich ich mir die nicht unbeträchtliche Grösse der Abweichung nicht zu erklären weiss.

Um aber den Zweifel, ob meine Formeln, auch auf den Fall ungleicher Querschnitte angewandt, die Beobachtungen darstellen, zu beseitigen, habe ich zum Schluss noch die Reihen 9 bis 12 beobachtet; die beobachteten Zahlen in 11 und 12, welche auf Tabelle II. vollständig den berechneten Werthen widersprechen, sind hier auf Tabelle III mit der Theorie so weit in Einklang, als zu erwarten ist, wenn man berücksichtigt, dass bei dem dünneren Stab V die seitlichen Schwankungen fast noch auffallender waren, als bei den dickeren. Tafel 9 und 10 sind mit 1 und 2 analog, insofern nämlich auch bei verschiedenen Querschnitten für Stäbe gleicher Länge bei allen Annahmen über die Grösse c sich dieselben Werthe V_1 und V_2 ergeben. Demgemäss stimmen die beobachteten und berechneten Werthe auch bei grösseren Stossgeschwindigkeiten überein; dass dies nicht so vollkommen Statt hat wie in den Tafeln 1 und 2 habe ich oben (S. 16) erklärt.

Es darf daher wohl als Resultat dieser Untersuchung ausgesprochen werden, dass die Formeln, auf welche die Annahme einer eigenartigen stark compressibeln Oberflächenschicht führt, die Erscheinungen des longitudinalen Stosses cylindrischer Körper von gleichem und verschiedenem Querschnitt, gleicher und verschiedener (darf man wohl nach der Natur des Resultates hinzufügen) Materie befriedigend wiedergeben.

N a c h t r a g.

Während des Druckes der vorstehenden Mittheilungen habe ich, — veranlasst durch die Abhandlung des Hrn. HERTZ »über die Berührung fester elastischer Körper«, ¹⁾ in welcher der Einfluss der Krümmung der zusammenstossenden Flächen bei unendlich kleinen Stossgeschwindigkeiten untersucht und für die Endgeschwindigkeit dieselbe Formel abgeleitet ist, die ich für diesen Fall gegeben und durch die Beobachtung bestätigt habe, — noch einige Beobachtungen angestellt, deren Resultate ich hier anfügen will.

Ich bemerke dazu, dass die bei den früheren Beobachtungen benutzten Stäbe an den Enden durch Flächen abgerundet waren, deren Krümmungsradien in der Axe nahe gleich der Länge des betreffenden Stabes waren; dies war nach der Herstellung der Flächen wahrscheinlich und ist durch mikrometrische Messung von Coordinaten angenähert bestätigt worden. Für die neuen Beobachtungen sind die Stäbe I bis IV so nahe eben abgeschliffen worden, dass die mikroskopische Messung keinen Werth für die Krümmungsradien mehr zu bestimmen gestattete; ich schätze sie auf mehrere Meter Länge. In diesem Zustande sind zuerst die Stäbe I und II beobachtet worden, um die auf S. 687 und 688 erwähnte Correction zu bestimmen, und darauf der Stoss von IV gegen III.

Ich stelle die neuen Beobachtungen (unter n. B.) zusammen mit den früheren (unter a. B.), sowie mit den Resultaten der älteren Formel (a. F.) und der Formel (10.) im Vorstehenden (n. F.), deren erstere in der obigen Theorie dem Falle $c = \infty$, die letztere $c = 0$ entspricht.

n. F.		a. B.		n. B.		a. F.	
V_1	V_2	V_1	V_2	V_1	V_2	V_1	V_2
6.7	26.7	6.7	26.4	6.9	24.5	10	20
13.3	53.3	13.6	52.6	15.2	47.6	20	40
26.7	106.7	28.7	101.5	32.2	92.1	40	80
42.1	160.0	45.0	148.0 ²⁾	49.6	137.3	60	120

Die Vergleichung ergibt, der Erwartung entsprechend, eine Abweichung der Beobachtungen bei nahe ebenen Endflächen von den bei gekrümmten erhaltenen in dem Sinne von der neuen Formel (oder

¹⁾ CRELLE's Journal XCII S. 156 (1882).

²⁾ Aus Tafel II interpolirt.

$c = 0$) zur alten ($c = \infty$) hin. Aber die Kleinheit dieser Abweichung lässt wahrscheinlich erscheinen, dass auch neben der Wirkung der Krümmung die oben (S. 692) erörterten Umstände sehr merklichen Einfluss üben. Dies noch weiter zu belegen, habe ich begonnen, die Elasticität der an verschiedenen Oberflächen haftenden condensirten Gasschichten beobachtend zu untersuchen. Die bisher erhaltenen Resultate, deren Mittheilung ich mir vorbehalte, sind in vollständiger Übereinstimmung mit den oben der Theorie zu Grunde gelegten Anschauungen.

Über lineare homogene Differentialgleichungen, zwischen deren Integralen homogene Relationen höher als ersten Grades bestehen.

Von L. FUCHS
in Heidelberg.

(Vorgelegt am 8. Juni [s. oben S. 611].)

Ein Fundamentalsystem von Integralen einer homogenen linearen Differentialgleichung ist dadurch charakterisirt, dass zwischen den Elementen des Systems keine homogene Gleichung ersten Grades mit constanten Coefficienten stattfinden darf. Man kann aber voraussetzen, dass zwischen den Elementen homogene Relationen höheren Grades bestehen. Ist die Ordnung der Differentialgleichung die m^{te} , so ist nur erforderlich, dass die Anzahl solcher Relationen nicht gröfser als $m - 2$ sei. Es ist alsdann die besondere Natur der Integrale unter Voraussetzung solcher Relationen zu ergründen.

Im Folgenden sind die hauptsächlichsten Resultate einer Arbeit angegeben, welche ich ausführlicher zu veröffentlichen gedenke, und welche ausser einer Reihe von Sätzen über Differentialgleichungen einer beliebigen Ordnung die Lösung des eben in Anregung gebrachten Problems für den Fall der Differentialgleichungen dritter Ordnung enthält.

Es ist einleuchtend, dass die Differentialgleichungen, welche algebraisch integrirbar sind, zu der Classe von Differentialgleichungen gehören, zwischen deren Integralen homogene Relationen bestehen.

1.

Es sei

$$(A) \quad \frac{d^3 y}{dz^3} + p \frac{d^2 y}{dz^2} + q \frac{dy}{dz} + ry = 0$$

eine lineare homogene Differentialgleichung dritter Ordnung mit in z rationalen Coefficienten, gehörig zu der Classe von Differentialgleichungen,

welche sich in meiner Arbeit (BORCHARDT's Journal für Mathem. B. 66 S. 146 Gl. 12) charakterisirt finden, und es werde vorausgesetzt, dass die Wurzeln sämtlicher determinirender Fundamentalgleichungen rationale Zahlen sind und dass zwischen den Elementen eines Fundamentalsystems von Integralen der Gleichung (A) y_1, y_2, y_3 eine irreductibele Gleichung

$$(B) \quad f(y_1, y_2, y_3) = 0$$

stattfinde, wo $f(y_1, y_2, y_3)$ eine ganze rationale und homogene Function n^{ten} Grades von y_1, y_2, y_3 bedeutet.

Bezeichnen wir mit $H(f)$ die Hessische Covariante von f , so ist

$$(1) \quad H(f) = X(z)$$

Wurzel einer rationalen Function von z , welche nicht identisch verschwindet.

Substituirt man in (A)

$$(2) \quad y = X(z)^{\frac{1}{3n-6}} \cdot v,$$

so geht dieselbe über in

$$(A') \quad \frac{d^3 v}{dz^3} + p' \frac{d^2 v}{dz^2} + q' \frac{dv}{dz} + r' v = 0$$

Ist v_1, v_2, v_3 das y_1, y_2, y_3 entsprechende Fundamentalsystem von Integralen der Gleichung (A'), so ist

$$(B') \quad f(v_1, v_2, v_3) = 0.$$

Ist z ein beliebiger Werth, und nimmt auf geeigneten Wegen jeder Quotient zweier Integrale von (A) für $z = z_1$ je einen gleichen Werth an, wie für $z = z$, so erhalten v_1, v_2, v_3 auf denselben Wegen in z_1 Werthe, welche aus denen für z durch Multiplication mit derselben Einheitswurzel hervorgehen.

Ist n grösser als zwei, so ist z_1 eine algebraische Function von z , und es sind sämtliche Integrale der Gleichung (A) algebraisch.

2.

Bezeichnen wir mit u_1, u_2, u_3 das resp. y_1, y_2, y_3 entsprechende Fundamentalsystem von Integralen der zu (A) adjungirten Differentialgleichung:

$$(A'') \quad \frac{d^3 u}{dz^3} - \frac{d^2(pu)}{dz^2} + \frac{d(qu)}{dz} - ru = 0,^1)$$

so finden wir

$$(C) \quad \frac{\partial f}{\partial y_i} = M \cdot u_i \quad (i = 1, 2, 3),$$

wo M Wurzel einer rationalen Function von z .

¹⁾ Vergleiche über die Definition adjungirter Differentialgleichungen meine Arbeit in BORCHARDT's Journ. für Mathem. B. 76 S. 183, und eine Arbeit des Hrn. FROBENIUS in demselben Journal B. 77 S. 245.

Ist insbesondere n gleich zwei, so ergibt sich zwischen p , q , r in der Gleichung (A) die Relation:

$$(1) \quad 2r = -\frac{1}{3}p^{(2)} - \frac{2}{3}pp^{(1)} - \frac{4}{27}p^3 + \frac{2}{3}pq + q^{(1)},$$

wo $p^{(i)} = \frac{d^i p}{dz^i}$, $q^{(i)} = \frac{d^i q}{dz^i}$ gesetzt ist, und man hat

$$(2) \quad M = e^{-\frac{2}{3} \int p dz}.$$

Findet umgekehrt die Relation (1) statt, so besteht zwischen y_1 , y_2 , y_3 eine Gleichung (B) vom zweiten Grade.

Bestimmt man zwei Functionen p_1 , p_0 aus den Gleichungen:

$$(3) \quad 3p_1 = p, \quad 2p_1^2 + p_1' + 4p_0 = q, \quad p_1' = \frac{dp_1}{dz},$$

so ergibt Gleichung (1)

$$(4) \quad r = 4p_0p_1 + 2p_0', \quad p_0' = \frac{dp_0}{dz},$$

d. h. ist n gleich zwei, so ist die Gleichung (A) übereinstimmend mit derjenigen Differentialgleichung, welcher das Quadrat jedes Integrals der Gleichung:

$$(5) \quad \frac{d^2 y}{dz^2} + p_1 \frac{dy}{dz} + p_0 y = 0$$

genügt.

3.

Es seien sämtliche Integrale der Gleichung:

$$(1) \quad \frac{d^m y}{dz^m} + f_1(z) \frac{d^{m-1} y}{dz^{m-1}} + \dots + f_m(z) \cdot y = 0$$

mit rationalen Coefficienten, algebraisch. Gehören zu einem beliebigen Werthe z genau die Werthe $z_1, z_2, \dots, z_{\sigma-1}$ von der Beschaffenheit, dass auf geeigneten Wegen jeder Quotient zweier Integrale von (1) in $z_1, z_2, \dots, z_{\sigma-1}$ je einen gleichen Werth erhält wie in z , so kann man eine rationale Function $\phi(z)$ von z angeben, von der Art, dass auf denselben Wegen $y\phi(z)^{-\frac{1}{\mu}}$ in $z_1, z_2, \dots, z_{\sigma-1}$ Werthe erhält die sich nur durch Einheitswurzeln als Factoren von dem Werthe von $y\phi(z)^{-\frac{1}{\mu}}$ in z unterscheiden, wo y ein willkürliches Integral der Gleichung (1), und μ eine ganze Zahl bedeutet.

Setzt man

$$(2) \quad y = \phi(z)^{\frac{1}{\mu}} \cdot w,$$

so genügt w der Gleichung

$$(3) \quad \frac{d^m w}{dz^m} + g_1(z) \frac{d^{m-1} w}{dz^{m-1}} + \dots + g_m(z) w = 0$$

mit rationalen Coefficienten. Ein willkürliches Integral dieser Gleichung erhält auf geeigneten Wegen in $z_1, z_2, \dots, z_{\sigma-1}$ Werthe, welche sich von dem Werthe desselben in z durch Einheitswurzeln als Factoren unterscheiden.

Es sei

$$(4) \quad t = (\alpha - z)(\alpha - z_1) \dots (\alpha - z_{\sigma-1})$$

wo α eine willkürliche Grösse, so ist t eine rationale Function von z .

Die Gleichung (3) lässt sich in eine Gleichung:

$$(5) \quad \frac{d^m w}{dt^m} + h_1(t) \frac{d^{m-1} w}{dt^{m-1}} + \dots + h_m(t) w = 0$$

mit der unabhängigen Variablen t transformiren, deren Coefficienten rationale Functionen von t werden.

Die Gleichung (5) besitzt die beiden Eigenschaften, dass erstlich zu einem beliebigen Werthe t kein anderer t_1 gehört, für welchen jeder Quotient zweier Integrale der Gleichung (5) je einen gleichen Werth annimmt, wie in t ; und dass zweitens die Anzahl der Werthe, welche ein willkürliches Integral derselben Gleichung durch alle Umläufe von t annimmt, und wovon nicht der Quotient zweier constant, übereinstimmt mit der Anzahl der Werthe, welche ein willkürliches Integral der Gleichung (1) durch alle Umläufe von z annimmt, und wovon nicht der Quotient zweier constant.

Ist ν die Anzahl derjenigen allen Umläufen der unabhängigen Variablen z entsprechenden Werthe eines willkürlichen Integrals einer linearen homogenen algebraisch integrirbaren Differentialgleichung m^{ter} Ordnung, mit rationalen Coefficienten, von welchen Werthen nicht der Quotient zweier constant, so ist die Anzahl der verschiedenen Werthe von z , welche zu einem Werthe des Quotienten zweier willkürlicher Integrale derselben Differentialgleichung gehören, nicht kleiner als $\frac{m-1}{2} \cdot \nu$.

4.

Die Gleichung (B) können wir als eine algebraische Gleichung zwischen

$$(1) \quad \eta = \frac{y_2}{y_1}, \quad \zeta = \frac{y_3}{y_1}$$

betrachten.

Wir bezeichnen nach RIEMANN mit p die Classe dieser algebraischen Gleichung, d. h. die Anzahl der linearunabhängigen Integrale erster Gattung, welche zu derselben gehören.

Seien J_1, J_2, \dots, J_p solche linearunabhängige Integrale erster Gattung, in der Form, welche nach dem Vorgange des Herrn ARONHOLD¹⁾ von CLEBSCH und Herrn GORDAN²⁾ für die Abel'schen Functionen eingeführt worden ist, so dass also

$$(2) \quad dJ_k = \frac{\phi_i(y_1, y_2, y_3)}{c_1 \frac{\partial f}{\partial y_1} + c_2 \frac{\partial f}{\partial y_2} + c_3 \frac{\partial f}{\partial y_3}} \cdot \sum \pm c_i y_i dy_i \quad (i = 1, 2, \dots, p)$$

wo $\phi_i = 0$ eine Curve $n-3^{\text{ter}}$ Ordnung darstellt, welche durch die sämtlichen Doppel- und Rückkehrpunkte der Curve (B) hindurchgeht.

Wir finden zunächst

$$(3) \quad \frac{\sum \pm c_i y_i dy_i}{c_1 \frac{\partial f}{\partial y_1} + c_2 \frac{\partial f}{\partial y_2} + c_3 \frac{\partial f}{\partial y_3}} = (n-1)^{\frac{2}{3}} \sqrt[3]{\frac{X(z)}{\Delta}} dz = \frac{\Delta}{M} dz$$

wo $X(z)$, M , Δ Wurzeln rationaler Functionen von z sind, und zwar $X(z)$ dieselbe Bedeutung hat wie in Gleichung (1) No. 1, M dieselbe Bedeutung wie in Gleichung (C), und endlich

$$(4) \quad \Delta = e^{-\int p dz}$$

Wir zeigen alsdann, dass $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_p$ als Functionen von z ein Fundamentalsystem von Integralen einer linearen homogenen Differentialgleichung p^{ter} Ordnung

$$(D) \quad \frac{d^p w}{dz^p} + Q_1 \frac{d^{p-1} w}{dz^{p-1}} + \dots + Q_p w = 0$$

mit in z rationalen Coefficienten bilden.

Giebt es einen Umlauf U von z , welcher y_1, y_2, y_3 resp. in y'_1, y'_2, y'_3 überführt und zugleich den Quotienten λ zweier willkürlicher Integrale der Gleichung (D) ungeändert lässt, ohne dass $\frac{y'_2}{y'_1} = \frac{y_2}{y_1}, \frac{y'_3}{y'_1} = \frac{y_3}{y_1}$, so muss eine zweimalige Anwendung dieses Umlaufes $\frac{y_2}{y_1}, \frac{y_3}{y_1}$ ungeändert lassen.

Ist ν die Anzahl der allen Umläufen von z entsprechenden Werthe eines willkürlichen Integrals der Gleichung (A), wovon nicht der Quotient zweier constant, so ist $\frac{1}{2}\nu$ oder ν die Anzahl der allen Umläufen von z entsprechenden Werthe eines willkürlichen Integrals der Gleichung (D), wovon nicht der Quotient zweier constant, je nachdem es Umläufe der Art U giebt oder nicht giebt.

Die Anzahl der Stellen (η, ζ) der RIEMANN'schen Fläche, welche einem gegebenen Werthe des Quotienten

$$\frac{c_1 \phi_1 + c_2 \phi_2 + \dots + c_p \phi_p}{c'_1 \phi_1 + c'_2 \phi_2 + \dots + c'_p \phi_p}$$

¹⁾ Monatsberichte der Akademie April 1861.

²⁾ Theorie der ABEL'schen Functionen S. 2.

wo $c_1, c_2, \dots c_p, c'_1, c'_2, \dots c'_p$ willkürliche Constanten, entsprechen, ist bekanntlich $2p - 2$.¹⁾

Ist daher die Gleichung (A) so beschaffen, dass nicht jeder Quotient zweier Integrale derselben für einen beliebigen Werth von z und noch für einen anderen Werth z_1 je einen gleichen Werth annehmen kann so ist die Anzahl der Werthe z , welche einem gegebenen Werthe des Quotienten λ zweier willkürlicher Integrale der Gleichung (D) entsprechen, $p - 1$ oder $2p - 2$, je nachdem es Umläufe der Art U giebt oder nicht giebt. In dem einen oder dem anderen Falle folgt aus No. :

$$(E) \quad \begin{aligned} p - 1 &\geq \frac{p - 1}{2} \cdot \frac{1}{2} \nu \quad \text{oder} \\ 2p - 2 &\geq \frac{p - 1}{2} \cdot \nu \end{aligned}$$

also

$$(F) \quad \nu \leq 4.$$

Nach No. 3 ergibt sich, dass (F) auch bestehen bleibt, wenn für einen beliebigen Werth z und noch andere Werthe z_1 jeder Quotient zweier Integrale der Gleichung (A) je einen gleichen Werth annimmt

Das durch (F) ausgedrückte Resultat lässt sich auch folgender massen aussprechen:

Ist die Classe p der Gleichung (B) grösser als Eins, so ist die Anzahl der reducirten Wurzeln²⁾ derjenigen algebraischen Gleichung welcher das allgemeine Integral der Gleichung (A) genügt, nicht grösser als vier.

5.

Ist p gleich Eins, so gehört zur Gleichung (B) nur ein Integral erster Gattung, J .

Wir zeigen, dass

$$(1) \quad dJ = \frac{\phi(y_1, y_2, y_3) \sum \pm c_i y_i dy_i}{c_1 \frac{\partial f}{\partial y_1} + c_2 \frac{\partial f}{\partial y_2} + c_3 \frac{\partial f}{\partial y_3}} = \psi(z, \eta) dz = R dz,$$

wo $\psi(z, \eta)$ eine rationale Function von z und η und R Wurzel einer rationalen Function von z .

Aus den Untersuchungen der Herren BRIOT und BOUQUET³⁾ ergiebt sich, dass R^4 oder R^6 eine rationale Function von z sein müsse.

Ist die Gleichung (A) so beschaffen, dass nicht für ein beliebiges z und noch für einen anderen Werth z_1 jeder Quotient zweier Inte-

¹⁾ RIEMANN ABEL'sche Functionen.

²⁾ Über die Bedeutung dieser Bezeichnung s. meine Arbeit in BORCHARDT's Journal für Mathem. B. 81 S. 111 No. 9.

³⁾ Journal de l'École polytechnique t. 21 p. 222.

grale derselben je einen gleichen Werth annimmt, so ergibt sich, dass η und demnach auch eine gewisse Potenz eines willkürlichen Integrals y der Gleichung (A) eine rationale Function von z und R ist.

Es ist daher die Anzahl der reducirten Wurzeln derjenigen algebraischen Gleichung, welcher das allgemeine Integral der Gleichung (A) genügt, durch eine der Zahlen 2, 3, 4, 6 gegeben.

Nach No. 3 bleibt dieser Satz auch bestehen, wenn für ein beliebiges z und noch andere Werthe z_1 jeder Quotient zweier Integrale der Gleichung (A) je einen gleichen Werth annehmen kann.

Ist endlich p gleich Null, so ist bekanntlich

$$(2) \quad \eta = \frac{f_2(s)}{f_1(s)}, \quad \zeta = \frac{f_3(s)}{f_1(s)},$$

wo $f_1(s)$, $f_2(s)$, $f_3(s)$ ganze rationale Functionen n^{ten} Grades einer Variablen s darstellen.

Wir beweisen, dass s als Function von z der Quotient zweier Integrale ξ_1 , ξ_2 einer linearen homogenen Differentialgleichung zweiter Ordnung mit der unabhängigen Variablen z und mit in z rationalen Coefficienten ist.

Es sei

$$(3) \quad \xi_i \cdot f_i(s) = \phi_i(\xi_1, \xi_2) \quad i = 1, 2, 3$$

so findet sich

$$(4) \quad y_i = \rho \cdot \phi_i(\xi_1, \xi_2) \quad i = 1, 2, 3$$

wo ρ Wurzel einer rationalen Function von z ist.

Das allgemeine Integral der Gleichung (A) ist also im Falle $p = 0$ abgesehen von der Wurzel einer rationalen Function als Factor durch eine ganze rationale und homogene Function n^{ten} Grades des Fundamentalsystems von Integralen ξ_1 , ξ_2 einer algebraisch integrirbaren linearen homogenen Differentialgleichung zweiter Ordnung mit in z rationalen Coefficienten¹⁾ darstellbar.

Für $n = 2$ ergeben sich ebenfalls die Gleichungen (2) und die daraus hervorgehenden (4). Die Functionen $\phi_i(\xi_1, \xi_2)$ sind in diesem Falle vom zweiten Grade und ρ ist eine Constante, während die Differentialgleichung zweiter Ordnung in diesem Falle nicht algebraisch integrirbar zu sein braucht, in Übereinstimmung mit dem in No. 2 gegebenen Resultate.

6.

Für die lineare homogene Differentialgleichung (A), zwischen deren Integralen eine Gleichung (B) stattfindet, ergeben sich nach dem Vorhergehenden folgende Resultate:

¹⁾ Über solche Differentialgleichungen zweiter Ordnung vergl. meine Arbeiten in BORCHARDT'S Journal Bd. 81 S. 97 und Bd. 85 S. 1.

I. Ist der Grad n der Gleichung (B) gleich zwei, so ist die Gleichung (A) übereinstimmend mit der Differentialgleichung dritter Ordnung, welcher das Quadrat jedes Integrals einer beliebigen linearen homogenen Differentialgleichung zweiter Ordnung mit rationalen Coefficienten genügt.

II. Ist n grösser als zwei, so sind die Integrale der Gleichung (A) algebraische Functionen von z .

Hierbei ergeben sich drei Fälle:

a) Ist die Classe p der algebraischen Gleichung (B) grösser als Eins, so ist die Anzahl der reducirten Wurzeln derjenigen algebraischen Gleichung, welcher das allgemeine Integral der Gleichung (A) genügt, nicht grösser als vier.

b) Ist p gleich Eins, so ist die Anzahl der reducirten Wurzeln zwei, drei, vier oder sechs.

c) Ist p gleich Null, so sind die Integrale der Gleichung (A) , abgesehen von einer Wurzel einer rationalen Function als einem für alle gültigen Factor, rationale ganze homogene Functionen n^{ten} Grades des Fundamentalsystems von Integralen ξ_1, ξ_2 einer algebraisch integrierbaren linearen homogenen Differentialgleichung zweiter Ordnung mit rationalen Coefficienten.

Da jede algebraisch integrierbare Gleichung (A) die Eigenschaft hat, dass zwischen den Elementen des Fundamentalsystems y_1, y_2, y_3 eine Gleichung (B) besteht, so sind durch diese Resultate auch alle die Fälle erschöpft, in welchen eine lineare homogene Differentialgleichung dritter Ordnung mit rationalen Coefficienten nur algebraische Integrale besitzt.

Die Vergleichung der auf die Anzahl der reducirten Wurzeln bezüglichen Sätze, für den Fall, dass die Gleichung (A) algebraisch integrierbar ist, mit den Resultaten des Herrn C. JORDAN¹⁾ behalte ich mir für die ausführlichere Abhandlung über den gegenwärtigen Gegenstand vor.

¹⁾ BORCHARDT's Journal für Mathem. Bd. 84 S. 89.

1882.
XXXI.

SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

22. Juni. Sitzung der philosophisch-historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. CURTIUS.

Hr. DIELS las: Zur Textgeschichte der aristotelischen
Physik.

Die Mittheilung erscheint in den Abhandlungen.


Ausgegeben am 29. Juni.

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei.

1882.
XXXII.

SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

29. Juni. Öffentliche Sitzung zur Feier des LEIBNIZ'schen
Gedächtnisstages.



Vorsitzender Secretar: Hr. AUWERS.

Der vorgeordnete Minister Hr. VON GOSSLER Exc. wohnte der Sitzung bei.

Der vorsitzende Secretar eröffnete dieselbe mit einer Festrede, in welcher er die Bedeutung der LEIBNIZ'schen Periode für die praktische Astronomie, in Folge der in derselben vollzogenen Umwandlung der äusseren Verhältnisse der astronomischen Forschung, darlegte.

Darauf hielten die seit dem letzten LEIBNIZ-Tage in die Akademie eingetretenen Mitglieder, HH. TOBLER, WATTENBACH, DIELS und LANDOLT ihre Antrittsreden, welche von den HH. MOMMSEN und DU BOIS-REYMOND als Classen-Secretaren beantwortet wurden.

Hr. TOBLER sprach:

Wenn ich denken müsste, die Akademie habe, als sie mich in ihre Mitte rief, beabsichtigt, irgend welchem von mir um die Förderung der Wissenschaft erworbenen Verdienste eine Anerkennung zu Theil werden zu lassen, so könnte ich nicht ohne die grösste Beklemmung daran gehen von meiner bisherigen Thätigkeit zu reden.

Denn wie müsste diese erscheinen, gemessen mit dem Maassstabe d
 Ehre, die es bringt, dieser Körperschaft anzugehören. Ich weiss ab
 dass die Akademie durch die Wahl meiner Person in erster Linie h
 bekunden wollen, welche Bedeutung sie auch dem Zweige philol
 gischer Studien zuerkennt, mit dem ich in Gemeinschaft mit ein
 immerfort wachsenden Zahl von Gelehrten mich beschäftige.
 früherer Zeit, da es noch möglich erschien, die romanistischen St
 dien aufmerksam zu verfolgen und durch eigene Arbeit zu förder
 auch wenn man den Schwerpunkt seiner Thätigkeit ganz andersv
 liegen hatte, hat die Akademie an IMMAN. BEKKER ein Mitglic
 besessen, dessen romanistische Arbeiten damals zum Theil bahnbrecher
 gewesen, in hohem Maasse lehrreich für alle Folgezeit geblieben sin
 Sie hat später in FRIEDRICH DIEZ wenigstens in der Ferne den erst
 mit sich verknüpft, der auf dem Boden der romanischen Phil
 logie schöpferisch zu arbeiten sich beschränkte, dafür aber innerha
 dieses Gebietes seiner Forschung keine Gränzen der Zeit oder d
 Ortes glaubte ziehen zu dürfen, und die vergleichende Grammatik c
 romanischen Sprachen ins Leben gerufen hat. Sie will nunmehr,
 die von Diez in Gang und Richte gebrachte Forschung von so vie
 eifrig gefördert wird, sich mehr und mehr verzweigt, hie und
 auch früher ausser Acht gelassenen Punkten sich zuwendet, sich d
 Zusammenhang mit den Studien auch auf diesem Gebiete dauer
 sichern, und mit Genugthuung müssen die Genossen derselben es ve
 nommen haben, dass die Akademie den Zeitpunkt gekommen eracht
 hat, die Errichtung einer neuen Mitgliedsstelle zu beantragen, vo
 welcher aus sie erwartet, dass die Beziehung zu den romanistische
 Studien vorzugsweise und regelmässig unterhalten werde. Von m
 freilich wird die Akademie eine nach allen oder auch nur nach viele
 Seiten des Faches gleichmässig sich richtende Thätigkeit nicht erwarten
 hier wie überall darf der Arbeit nicht zugleich zu vielerlei zum Gegen
 stande gegeben werden, soweit sie nicht der Aneignung fremder E
 rungenschaft, der Unterhaltung nutzbringenden Zusammenhangs m
 fremder Arbeit, dem Festhalten der Fäden dient, welche für d
 Wissenschaft jeden Gegenstand mit zahllosen anderen verbinden. M
 sind, nachdem in früheren Jahren Italiens Sprache und Litteratur mi
 vorzugsweise beschäftigt hatten, seit langer Zeit hauptsächlich d
 Denkmäler der altfranzösischen Sprache Gegenstand der Forschun
 Von der kaum übersehbaren Fülle dessen, was an mittelalterliche
 Erzeugnissen des französischen Geistes vor sechzig oder siebzig Jahre
 noch ungedruckt in Handschriften verborgen lag, habe einiges aus
 ich ans Licht gezogen; an einem Texte, dessen Entstehungszeit u
 Entstehungsort sich sicher bestimmen liessen, den zuvor an fran

zösischem Texte nicht unternommenen Versuch der Herstellung der ursprünglichen mundartlichen Gestalt gewagt. Ganz besonders aber schien mir und scheint mir von Wichtigkeit daran zu arbeiten, dass unser Verständniss der alten Litteraturwerke genauer und sicherer, dass vor allem der volle Umfang des alten Wortschatzes festgestellt, aber derselbe auch der Verwendung nach möglichst durchsichtig werde. Welche Dienste alle das vollständige Lexikon einer Sprache, auch wenn es sich auf die Darstellung einer Periode derselben beschränkt, leisten soll, habe ich gegenwärtig nicht auszuführen; nur dies sei hier ausgesprochen, dass ein Hilfsmittel für alle die Fälle, wo unsere Kenntniss der heutigen Sprache zum Verständniss der alten nicht auszureichen scheint, — und liesse dasselbe den Leser noch so selten im Stich —, noch lange nicht das sein würde, was mir als Ziel vorschwebt. Es gilt vielmehr, vom heutigen Gebrauche ganz abgesehen, den alten allseitig zu ermitteln, dergestalt, dass später die gleich vollständige Sammlung des einen neben die des andern sich halten lasse, und daraus erhelte, was die Sprache im Verlaufe ihres Lebens von dem Wortbestande der ersten Zeit festgehalten, was fallen gelassen, was aus eigenem oder aus fremdem Stoffe zugewonnen habe, wie sie in vielen Fällen von einer manchmal werthvollen, oft aber auch die Bestimmtheit der Rede gefährdenden Dehnbarkeit des Wortsinnes zu grösserer Festigkeit desselben vorgeschritten sei, wie sie aber hinwieder die kräftige Sinnlichkeit alter Sprechweise gegen die farblose Begrifflichkeit der heutigen vertauscht habe. Es soll das Wörterbuch ferner, in dem Maasse als die Denkmäler es gestatten, feststellen, inwiefern die alten Mundarten Frankreichs, an deren lautlicher Charakteristik zur Zeit so erfolgreich gearbeitet wird, auch im Wortschatz sich von einander entfernen, und soll uns dem einzelnen Schriftsteller gegenüber in Stand setzen zu beurtheilen, ob und wo in Worten und Wendungen er eigenartiges Wesen zur Geltung bringt, wo er andererseits sich an das Gangbare, an Sprichwort und geflügeltes Wort hält.

Als zu einer Zeit, die ich lieber nicht bezeichne, um nicht gefragt zu werden, warum ich denn noch immer nicht fertig sei, ich zu einem altfranzösischen Wörterbuch auszuarbeiten mich entschloss, was anfänglich eine Sammlung gelegentlicher Notizen von lexikalischen Merkwürdigkeiten gewesen war, erschien mir, was ich mir vornahm, noch nicht so gross, wie es sich mir später erwiesen hat: noch wusste ich nicht, von wie viel anderm, das zu eingehender Beschäftigung nicht minder lebhaft reizte, ich mich um jener einen Arbeit willen würde entsagend fern halten müssen, wusste nicht, in welchem Maasse von Jahr zu Jahr das auszubeutende litterarische Ma-

terial wachsen würde, dergestalt dass ein Sammler lexikalischer T. sachen kaum so viel, die Feder in der Hand, zu lesen vermag, gleichzeitig an Inediten gedruckt wird. Auch war mir damals n weniger klar, dass der grösste Theil dessen, was gemeiniglich der Syt zugewiesen wird, fürs Französische durchaus dem Wörterbuche nur ihm anheimfällt und die Aufgabe für mich wesentlich erweitet die einem anders Überzeugten enger sein würde. Doch habe ich durch, dass meine Aufgabe wuchs, je ernster ich ihrer Lösung ob mich noch immer nicht entmuthigen lassen und darf es jetzt wenigsten, da die Akademie mir die Ehre der Mitgliedschaft gedeihen lässt. Zudem sehe ich ja oft genug, wie mir a schon mit dem bisher Zusammengetragenen fremde Arbeit un stützen zu können die erfreuliche Genugthuung wird. Von den gebnissen meines Studiums der historischen Syntax des Französisc habe ich einzelnes in den letzten Jahren veröffentlicht und freue m wenn die Schule auch nach der syntaktischen Seite des französisc Unterrichts hin ihre Lehre an diesem oder jenem Punkte zu tiefen, dem geschichtlichen Sachverhalte gemäss zu gestalten dadu veranlasst wird, wie sie in anderer Hinsicht es zu thun begon hat, und wie bezüglich der Lehre vom Versbau ich es anzuregen sucht habe. Denn auch die Schule hat Theil an mir. Vom Schulun richt her bin ich zur Lehrthätigkeit an der Universität berufen wor und auch seit ich in dieser stehe, sehe ich die alten Bande nur di neue ersetzt, die mich an die Schule knüpfen, Bande, deren ich n freue, wenn ich sie gleich manchmal etwas loser geschlungen wünsch um freier mich dem zuzuwenden, was wissenschaftliche Aufgabe ohne unmittelbaren Gewinn für irgend welche Praxis zu verheiss Möge die Akademie es mir nicht verdenken, wenn sie mich m Hauptaufgaben langsamer fördern sieht, als es unter anderen Umstär der Fall sein würde. Welche diese Aufgaben sind, bin ich mir v bewusst, und würde die mir von der Akademie in ihrer Mitte geräumte Stelle mir jederzeit in Erinnerung bringen, wenn ich e vergessen könnte. Je nachsichtiger aber Sie, meine Herren, m bescheidene Mitwirkung unter Ihnen aufnehmen werden, um so froh Muthes werde ich Zeuge des Gelingens der gewaltigen Arbeiten : die ich theils von der Akademie als Körperschaft, theils von einzelnen Mitgliedern unternommen und dem Abschluss zugeführt s und um so mehr Zuversicht daraus schöpfen, es möge auch gelingen, zu leisten, was mich der Zugehörigkeit zu dieser Genoss schaft würdig mache.

Dann sprach Hr. WATTENBACH:

Auch die Geschichte des deutschen Mittelalters hat von dem Manne, dessen Andenken der heutige Tag gewidmet ist, von LEIBNIZ, die einsichtigste und umfassendste Förderung erfahren; in noch viel höherm Grade würde sein Vorgang fruchtreich gewirkt haben, wenn nicht sein Hauptwerk, die *Annales Imperii Occidentis*, länger als ein Jahrhundert im Dunkel verborgen geblieben wäre. Es war G. H. PERTZ, der es zuerst ans Licht gebracht hat, derselbe, welcher auch das ebenfalls von LEIBNIZ begonnene Werk einer Sammlung der Quellen der deutschen Geschichte im Mittelalter in grösserm Maassstab, wie es vom Freiherrn vom STEIN ins Leben gerufen wurde, mit sicherer Hand so weit geführt hat, dass der weiteren Fortsetzung ihre Bahnen vorgezeichnet waren. Durch seine Aufnahme in die Akademie wurde zuerst das Band zwischen derselben und dem grossen nationalen Unternehmen geknüpft, zunächst noch rein persönlich; nachdem aber das hohe Alter seine Rechte geltend gemacht hatte und das schon längst der Leitung eines Mannes entwachsene Werk einer neuen Organisation bedurfte, ist es in die Reihe der grossen Unternehmungen aufgenommen, welche unter den Auspicien der Akademie der Vollendung entgegen gehen.

An dieses Werk schliesst sich die Entwicklung meiner wissenschaftlichen Thätigkeit. Philologisch vorgebildet, zuletzt durch die Vorlesungen von L. RANKE in das Verständniss des deutschen Mittelalters eingeführt, widmete ich mit voller Hingebung meine Thätigkeit der Bearbeitung der mittelalterlichen Autoren. Schwer war es damals, in das Labyrinth der Quellenschriften einzudringen, dort seinen Weg zu finden und eine Uebersicht zu gewinnen. Was ich selbst mit grosser Anstrengung erreicht hatte, versuchte ich Anderen zu leichterem Gewinnung darzubieten, und das in vier Ausgaben nach und nach weiter geförderte Werk hat seinen Zweck nicht verfehlt. Mir öffnete es die Rückkehr zur akademischen Wirksamkeit, nachdem ich derselben längere Zeit hindurch hatte entsagen müssen, und endlich die Aufnahme in den engern Kreis der Männer, welchen jetzt die Leitung der *Monumenta Germaniae* anvertraut ist.

Die Bearbeitung der mittelalterlichen Geschichtsquellen hat zu einer immer umfassenderen Durchforschung der Bibliotheken und Archive geführt: es fanden sich in überraschender Anzahl noch erhaltene Autographen der Verfasser. Die Vergleichung derselben mit jüngeren Abschriften liess die fortschreitende Entartung des Textes, welche bei den alten Autoren in eine frühere, uns verborgene Periode fällt, hier in lehrreichster Weise verfolgen, während zugleich die vielen mit bestimmten

Daten versehenen Handschriften das werthvollste Material für paläographische Untersuchungen darboten. Schon PERTZ hat diesem Gegenstande grosse Sorgfalt gewidmet, und die Schriftproben in den ersten Bänden der *Monumenta Germaniae* bildeten lange Zeit hindurch einen sehr wesentlichen Theil des Stoffes, auf welchen man für solche Studien angewiesen war. Die früher vorzüglich auf praktische Benutzung der Urkunden gerichteten Arbeiten der Diplomatiker hatten nach den Stürmen der Revolution, welche diesem Material seinen hohen praktischen Werth geraubt hatten, längere Zeit geruht. Jetzt aber mahnten die grossen Entdeckungen auf diesem Gebiete, welche uns den Blick in eine frühere Vorzeit über alle Erwartung erweiterten, die grössere Zugänglichkeit der Bibliotheken, in neuester Zeit auch die grosse Vervollkommenung der Hilfsmittel, um völlig treue Nachbildungen von Handschriften auch einem grössern Kreise von Schülern vorlegen zu können, im Anschluss an die grundlegenden Werke eines MABILLON und MONTFAUCON der griechischen wie der lateinischen Paläographie erneute Sorgfalt zuzuwenden, die Entwicklung des Schriftwesens eingehend zu beobachten und darzustellen, und die unentbehrliche Kunst des zuverlässigen Lesens alter Schriften, die nothwendige Grundlage aller Kritik, welche zu lernen früher nur selten Gelegenheit geboten war, zum Gegenstand der Forschung sowohl wie der Lehre zu machen.

Dass ich auf diesen eng verbundenen Gebieten nicht ohne Erfolg thätig zu sein mich bestrebt habe, zeigt mir zu meiner hohen Befriedigung die Aufnahme in diese Genossenschaft, in welcher ich mit besonderer Freude den jetzigen Leiter des Unternehmens begrüsse, von dem der Freiherr vom STEIN jetzt nicht mehr Anlass haben würde zu beklagen, dass die Berliner Akademie ihm fremd und ablehnend gegenüber stehe.

Hierauf sprach Hr. DIELS:

Wenn die akademische Sitte es den neu aufgenommenen Mitgliedern zur Pflicht macht, am LEIBNIZ-Tage das Wort zu ergreifen, so richtet sich durch die Bedeutung dieses Tages angeregt unwillkürlich der Blick zu dem Bilde des Stifters empor, der in seiner allumfassenden wissenschaftlichen Wirksamkeit selbst eine Akademie darstellend, uns Epigonen fast wie ein Held des Mythos erscheint. Nicht dass es unserer Zeit an genialen Naturen mangelte, aber die Wissenschaft selbst hat sich im Laufe zweier Jahrhunderte so mannigfach gespalten, so weit gedehnt, dass selbst der umfassendste Geist nur ein kleines Bruchtheil überschauen und mit Erfolg bebauen kann. In dieser Zeit der Zersplitterung ist die Akademie in ihrer organisirenden, die Kräfte verschiedener Disciplinen auf ein Ziel concen-

trirenden Thätigkeit nicht nur eine löbliche und nützliche Institution, wie damals, sie ist vielmehr heute eine Nothwendigkeit.

Diesen mächtigen Einfluss cooperirender Kräfte hat unsere Akademie in diesem Jahrhunderte auf mannigfachen Gebieten des Wissens bethätigt, nicht zum mindesten fürwahr in der Erforschung der antiken Philosophie, in deren Kreis vorzüglich mich meine philologischen Studien geführt haben.

Von der Zeit an, wo SCHLEIERMACHER mit der Betrachtung der ältesten griechischen Naturphilosophie seine segensreiche Wirksamkeit an dieser Stätte inaugurierte, bis zu den neulich Ihnen vorgelegten Ausgaben der spätesten Vertreter griechischer Weltweisheit, während dieses drei Generationen umfassenden Zeitraumes hat die Akademie in planvoll organisirter, stetig und sicher durchgeführter Arbeit die methodische Erforschung der griechischen Philosophie in die Hand genommen. Sie hatte das Glück, einen Bund hochbegabter und trefflich sich ergänzender Gelehrten zu vereinigen, welche bald durch Herbeischaffung und Sichtung eines reichen Materials, bald durch eindringende Untersuchung oder zusammenfassende Darstellung, bald durch Anregung weiterer Kreise jener umfangreichen und schwierigen Disciplin eine Sicherheit, Abrundung und relative Vollendung gaben, welche in wenig anderen Fächern der Alterthumsstudien erreicht, in keinem übertroffen worden ist.

Wenn auf SCHLEIERMACHERS Anregung in die Mitte dieser Unternehmung Aristoteles gestellt worden ist, so hätte nicht leicht etwas förderlicheres geschehen können. Mochte auch SCHLEIERMACHERS individuelle Neigung sich mehr zu Platons wahlverwandter Natur hingezogen fühlen, so verkannte er doch nicht, dass nur Aristoteles ein Recht habe, als der alle Strahlen gleichmässig sammelnde und wieder ausstrahlende Brennpunkt antiker Wissenschaft zu gelten. LEIBNIZ selbst würde keinen andern gewählt haben, da er von Kindheit an mit diesem Philosophen vertraut, sein ganzes Leben hindurch von Niemand lieber als von ihm sich hat anregen lassen. Es ist bekannt, dass die akademische Ausgabe des Aristoteles dem Studium des Stagiriten einen gewaltigen Aufschwung gegeben und eine ganze Litteratur zum Theil ausgezeichnetster Art hervorgerufen hat. Die eindringende Beschäftigung mit der Sprache des Philosophen, welche ebenfalls aus dem Schoosse der Akademie hervorgegangen, in dem akademischen Index ihren zusammenfassenden Abschluss erhalten, hat auf weite Kreise befruchtend gewirkt. Die Betrachtung der philosophischen Terminologie in ihrer geschichtlichen Entwicklung fand hier ihren Ausgangs- und Stützpunkt. Ebenso hat die Kunst individueller Interpretation, die einen heilsamen Damm gegen die vorschnelle, alles nivellirende Kritik auf-

richtet, in neuer Zeit aus dem Studium der aristotelischen Sprachindividualität die kräftigste Anregung erhalten.

Nach Vollendung der monumentalen Aristotelesausgabe stiegen sofort zwei neue Aufgaben empor, die mit jener in organischem Zusammenhange stehen. Zuerst erwies es sich als dringlich, die alten Erklärer des Aristoteles neu zu ediren, da sie nicht nur für das Verständniss und die kritische Herstellung des schwierigsten Schriftstellers unentbehrlich, sondern auch direct durch die darin aufgespeicherte alte Gelehrsamkeit für das Studium der griechischen Philosophie von Bedeutung sind.

Eine zweite nicht minder dringliche Aufgabe bezog sich auf die Epoche, welche zwischen Aristoteles und den Commentatoren in der Mitte liegt. Denn auch die alexandrinischen Gelehrten haben der geschichtlichen Betrachtung der Philosophie ein lebhaftes, aber freilich immer mehr verflachtes Studium zugewandt. Diese ganze, einst so emsig betriebene Gelehrsamkeit ist verschüttet. Nur Auszüge sehr verschiedener Verfasser und sehr verschiedenen Werthes haben sich bis zu uns gerettet. Diese Excerptlitteratur auf ihre Quellen zurückzuführen, war eine unerlässliche Aufgabe, wenn man überhaupt die so überlieferten Daten benutzen wollte. Mir war schon in Bonn durch Anregung eines hochverehrten Lehrers, welche eigner Neigung entgegenkam, diese Frage nahe gelegt worden. Als daher später die Akademie ihrerseits diese Aufgabe stellte, ergriff ich mit Freuden die Gelegenheit, meine früheren Versuche in erweitertem Umfange aufzunehmen.

Die ganze Masse dieser Überlieferung sondert sich leicht in zwei Classen von Schriftstellern. Die einen, welche ich die Doxographen nenne, überliefern die Lehrsätze, die andern, die Biographen, das Leben der Philosophen. Die letzteren sind im Ganzen wenig zuverlässig, selbst ihre Chronologie, welche mit grosser Zuversichtlichkeit auftritt und dadurch manchen täuschte, ist nicht ohne arge Willkür. Dagegen geht, wie die Untersuchung ergab, die doxographische Überlieferung ihrem werthvollsten Bestandtheile nach auf ein grosses Werk des Theophrast zurück, der wiederum durch seinen Lehrer die Anregung zu dieser bedeutenden Arbeit erhalten hatte. So führte auch diese Litteratur wieder, wie man erwarten durfte, auf Aristoteles zurück.

Die hier skizzirten Resultate nahm die Akademie mit Wohlwollen auf, und als bald darauf Torstrik durch allzufrühen Tod der Leitung der geplanten Commentatorenausgabe entrissen wurde, schenkte sie mir das Vertrauen, die Weiterführung jener Aufgabe in meine unerprobten Hände zu legen. Sie haben die Güte gehabt, meine Herren, diese Verbindung mit der Akademie noch enger zu gestalten. Sie

haben mir durch Aufnahme in Ihre Reihen eine grosse und ungehoffte Ehre erwiesen. Wenn ich Ihnen dafür heute meinen tiefgefühlten Dank sage, so richte ich ihn namentlich auch an die Männer unter Ihnen, welche ich seit langem als Führer und Berather meiner Studien verehere und die meinen Bestrebungen eine unausgesetzte, wohlwollende Förderung haben zu Theil werden lassen. Ich bitte Sie, die zur Mitwirkung an demselben Werke mit mir vereint sind, mich auch ferner mit Ihrer seit langer Zeit erprobten Kraft unterstützen zu wollen. So allein wird der Spätgeborene den Muth finden dürfen, an eine grosse Tradition anknüpfend im Dienste der Akademie weiter zu arbeiten.

Auf diese drei Reden antwortete Hr. MOMMSEN Folgendes:

Indem ich Sie, meine Herren, an dem heutigen Tage als Theilnehmer unserer Arbeiten, als künftige Genossen unserer Hoffnungen wie unserer Sorgen in diesem Saal begrüsse, geschieht dies mit dem sichern Gefühl, dass Sie nicht als Fremde in einen fremden Kreis eintreten. Wir kennen uns gegenseitig seit Jahren. Es knüpfen sich an diesem Tage nicht neue Bande; wohl aber ziehen alte längst bestehende sich fester, wohlbegründete wissenschaftliche Anerkennung erhält durch diesen Act ihren förmlichen Ausdruck, gemeinsames Streben damit eine feste gemeinsame Bahn.

Du, mein theurer Freund TOBLER, wirst in unserem Kreise die romanische Sprachkunde vertreten; dessen freuen wir uns in besonderer Weise und mit gutem Grund. Wenn unsere Akademie im Allgemeinen wohl berechtigt ist die Anerkennung zu fordern, dass mit dem Wachsen der Wissenschaft auch ihre Kreise und ihre Ziele stetig gewachsen sind und bei uns die älteren Disciplinen den jüngeren nächstverwandten nicht den Neid und die Missgunst, sondern das Wohlwollen und die Pflege des ältern Bruders bewiesen haben; wenn namentlich im Kreise der Sprachforschung die Akademie nicht am letzten den alten Bann, als gebe es eine Philologie nur für das Griechische und das Lateinische, gebrochen und den grossen Gedanken der weltumfassenden und weltenbändigenden Sprachwissenschaft der realen Entwicklung näher geführt hat, so ist es der Berliner Akademie, mindestens den Localpatrioten derselben immer eine schmerzliche Empfindung gewesen, dass der romanische Zweig dieser Studien seine Begründung nicht in gleichem Maasse an akademische Namen geknüpft hat wie der indische und der deutsche. Wohl dürfen auch wir, mit Dir, auf IMMANUEL BEKKERS Arbeiten hinweisen und es für uns in Anspruch nehmen, dass aus dem Schooss der classischen Philologie diese neue Blüthe innerhalb unserer Akademie gekeimt hat. Aber

in Dir begrüßen wir den ersten selbständigen Vertreter dieser jetzt mündig gewordenen Wissenschaft, in Dir nicht bloss einen ihrer Meister, sondern zugleich den entsagenden und muthigen Unternehmer eines jener fundamentalen Werke, die geschaffen zu haben dem Gelehrten das reine Gefühl nützlichen Strebens gewährt, an denen helfend und fördernd mitgewirkt zu haben der Ruhm der Akademien wie der Regierungen bleibt. Es ist das aufrichtige Bestreben unserer Körperschaft, das, was der Mangel an geeigneten Persönlichkeiten uns bisher in Betreff der neueren Philologie zu thun verhindert hat, nach jeder Richtung hin, nicht bloss in Betreff der romanischen, nachzuholen. Wir haben der neueren Philologie überhaupt, so weit es an uns liegt, eine hervorragende Stellung in unserm Kreise gesichert, und Dein Eintritt ist das erste Pfand dafür, dass wir der Verpflichtung eingedenk sind, welche uns als Vertreter nicht dieser oder jener Forschung und Richtung, sondern der vollen und ganzen deutschen Wissenschaft überhaupt obliegt.

Anders, lieber WATTENBACH, wird Deine Stellung in unserm Kreise sein. Du förderst die deutsche Geschichtsforschung; sie ist wie ewig neu, so bei uns alt. Das grosse Unternehmen der Sammlung der deutschen Geschichtsquellen ist nicht bloss in idealem Sinne verknüpft mit dem Namen des Mannes, der gleichsam der ideale Repräsentant unserer Akademie und der *genius huiusce diei* ist, sondern auch seit seinem Beginn praktisch verknüpft mit unserer Akademie und vielfach von derselben gefördert, seit einigen Jahren sodann organisch mit derselben vereinigt. Gleichzeitig wie die Hauptstadt Preussens zur deutschen Reichshauptstadt geworden ist, hat auch die preussische Akademie das Vermächtniss STEINS, die Herausgabe der Quellen der deutschen Geschichte ihrem Arbeitskreise einreihen und in ihre Fürsorge nehmen dürfen. Mögen wir heute daran erinnert worden sein, dass unsere Vereinigung diesem Unternehmen nicht immer in gleicher Weise gegenübergestanden hat: die Akademie ist besserungsfähig; heute ist dies Werk auch unser Stolz. Ihm ist Dein Name bereits vielfach und ehrenvoll eingezeichnet und wird es noch weiter werden. Du findest in unserm Kreise eine Anzahl specieller und speciellster Collegen; ich begrüsse Dich wie für unsere gesammte Akademie, so als unsern langjährigen Arbeitsgenossen noch besonders im Namen dieser.

Auch Sie, Hr. DIELS, treten zu uns als Arbeiter auf einem seit einem halben Jahrhundert stetig von der Akademie gepflegten Forschungsgebiet. Vielleicht hat die Nützlichkeit der akademischen Continuität sich nirgends so glänzend bewährt wie im Gebiet der Aristotelesarbeiten. Wie das Dichten, so ist auch das Forschen ein

Übermuth; und diesem Meister des Wissens und seiner zweitausend-jährigen Geschichte gegenüber tritt die Unzulänglichkeit der individuellen Erforschung wohl schärfer hervor als irgendwo sonst. Aber unsere Akademie ist kein Individuum, und leistet nach vielen Seiten hin weniger, aber in gewissen Richtungen auch mehr. Hier trifft das Letztere zu. Sie haben es uns eben in die Erinnerung gerufen, wie aus der zunächst rein philologisch gehaltenen und durchaus individuellen grossen Editorenleistung IMMANUEL BEKKERS weiter die grundverschiedene und doch so nothwendig auf jene gebaute lexikalische Bearbeitung des Sprachschatzes erwachsen ist; wie sodann nach deren Abschluss, wieder in ganz anderer Richtung, aber nicht minder nothwendig ergänzend, sich daran die Gesamtausgabe der Aristotelescommentare geknüpft hat, deren Fundamentirung und Realisirung wir jetzt von Ihnen erhoffen. Es darf wohl hinzugefügt werden, dass dies letzte Unternehmen hervorgegangen ist aus einem unzulänglichen und theilweise verfehlten Anlauf, mit welchem die akademische Ausgabe des Aristoteles abgeschlossen ward. Auf diesem Gebiet hat in der That jede reife Frucht aus sich eine neue Blüthe entwickelt, die dann wieder ihrerseits zur Frucht geworden ist; und auch die unreife Frucht ist nicht ganz ohne Nutzen geblieben. Was dem Individuum kaum je vergönnt ist, die mangelhafte Schöpfung durch umfassenden Neubau zu ersetzen, das vermag im Wechsel der Zeiten und der Personen wohl die verständig sich leitende Körperschaft. Das Unternehmen, das Sie jetzt zu leiten berufen sind, hat auch bereits seine Geschichte und seine Unglücksfälle. Sie haben mit Recht an TORSTRIKS Namen erinnert; billig gedenken wir heute in Ehre und in Trauer des tüchtigen Mannes, den wir zunächst zur Leitung dieses Unternehmens berufen hatten. Aber Ihre Leistungen wie Ihre Jugendkraft geben uns zugleich die Hoffnung, dass das verwaiste Werk an Ihnen den rechten Meister gefunden hat, und wir erwarten jetzt, wo Sie unserm Kreise selbst angehören, vor allem von Ihnen die einsichtige, energische und entsagende Leitung des schwierigen Unternehmens.

Hierauf sprach Hr. LANDOLT:

Selten bin ich in die Lage gekommen, einen Dank mit grösserer Freude auszusprechen, als denjenigen, den ich heute abstaten möchte. Die Ernennung zum Mitgliede der Akademie der Wissenschaften, welche mir durch Ihr Wohlwollen zu Theil wurde, ist für mich nicht allein eine hohe Ehre, sondern sie hat noch andere Bedeutungen. Wenn ich auch dieselbe zunächst als eine Anerkennung meiner bisherigen Arbeiten auf dem Gebiete der physikalischen Chemie auf-

fassen darf, erblicke ich darin doch vor Allem eine Aufmunterung, in jener Richtung zu verharren und ihr meine Kräfte in noch höherem Grade als bis dahin zu widmen. Ein zweiter wichtiger Umstand, welchen die Aufnahme in die Akademie für mich zur Folge hat, ist die Möglichkeit, über das bezeichnete Fach an der hiesigen Universität Vorlesungen halten zu können. Obgleich mehrfache andere Berufsgeschäfte meiner Thätigkeit in dieser Hinsicht eine Schranke setzen, so bringt dieselbe doch mir selbst eine Menge neuer Anregungen, und ich darf vielleicht auch die Hoffnung hegen, dass sie nicht ohne Nutzen für die Studirenden sich gestalten werde.

Die physikalische Chemie im engeren Sinne ist die Lehre von den Beziehungen zwischen physikalischen Eigenschaften und chemischer Constitution der Körper; sie verfolgt die Einwirkungen, welche die ersteren erleiden, wenn in den Moleculen zusammengesetzter Substanzen die Art, Zahl und Verbindungsweise der Atome sich ändert. Dieser Gesichtspunkt ist zuerst festgehalten worden in einer Abhandlung E. MITSCHERLICH's: »Über die Krystallisation der Salze, in denen das Metall der Basis mit zwei Proportionen Sauerstoff verbunden ist«, welche Derselbe am 19. December 1819 in unserer Akademie las. Mit Bestimmtheit wurde darin nachgewiesen, dass die Krystallform gewisser Verbindungen in Relation zu der atomistischen Zusammensetzung steht, und indem MITSCHERLICH diesen Gegenstand durch zahlreiche Beobachtungen weiter verfolgte, entwickelte sich daraus eine der werthvollsten Lehren der Wissenschaft, diejenige vom Isomorphismus. Damit war die physikalische Chemie glänzend eröffnet, aber es trat sodann ein Stillstand von über zwanzig Jahren ein, und auch später mehrten sich die Arbeiten auf diesem Gebiete nur sehr langsam. Die Ursache hiervon liegt in der natürlichen Entwicklung, welche die Chemie nahm. Seitdem dieselbe mit Beginn dieses Jahrhunderts in das Zeitalter der quantitativen Untersuchungen getreten, und durch die Auffindung der Zahlengesetze, nach denen die Elemente sich untereinander vereinigen, zur exacten Wissenschaft geworden war, hatten sich unermessliche Felder zur Bearbeitung aufgethan. Die Analyse der im Mineralreich sowie in der organischen Natur vorkommenden Körper, die Darstellung einer zahllosen Menge chemischer Verbindungen theils schon bekannter, theils neu entdeckter Elemente, und endlich die Erforschung der gegenseitigen Reactionen aller dieser Substanzen erforderten eine Arbeit, welche sämtliche Kräfte absorbirte. So kam es, dass obgleich seit Errichtung der Unterrichtslaboratorien die Zahl der Chemiker in immer wachsendem Grade zunahm, doch nur bei Wenigen Neigung oder Veranlassung auftrat, die grosse geebnete Strasse zu verlassen und Nebenpfade ein-

zuschlagen, die zudem mühsam wurden, wenn hierfür noch ein tieferes Studium anderer Wissenschaften wie der Physik erforderlich war. Aber es liegt noch ein anderer Grund vor, welcher einen raschern Fortschritt der physikalischen Chemie nicht zuließ, und dieser ist der jeweilige Zustand, in dem sich die chemische Theorie befand. Die allmählich durch immer mehr Fälle festgestellte Thatsache, dass Körper von gleicher Zusammensetzung existiren, welche dennoch verschiedene physikalische Eigenschaften besitzen, wies darauf hin, dass die letzteren nicht bloss von der Art und Zahl der Atome im Molecül abhängig sind, sondern dass auch die Gruppierungsweise der Atome einen wesentlichen Einfluss ausübt. Indem sich die Nothwendigkeit der Berücksichtigung chemischer Constitutionsformeln herausstellte, bedurfte es erst der nöthigen Entwicklung der organischen Chemie, besonders der Lehre von der Isomerie, um weitere Fortschritte auf dem physikalischen Gebiete möglich zu machen.

Wohl sind in dem Zeitraum von 1820 bis etwa 1870 manche Arbeiten sowohl von Chemikern wie von Physikern geliefert worden, welche auf dem Gränzgebiete der beiden Wissenschaften liegen; man hatte vielfach physikalische Constanten unorganischer und organischer Körper mit Genauigkeit bestimmt, allein in Beziehung zu der chemischen Constitution der Substanzen wurden die Zahlen selten gebracht. Der einzige Forscher, welcher diesen Gesichtspunkt stets im Auge behielt und alle seine Kräfte der physikalischen Chemie zuwandte, ist HERMANN KOPP. Dessen Arbeiten über Molecularvolume organischer Verbindungen, die Regelmässigkeiten in den Siedepunkten der letzteren, sowie die ausgedehnten Untersuchungen über die specifische Wärme fester Körper sind jedem Chemiker bekannt. Mit unermüdlicher Ausdauer hat Kopp mehr als fünfundzwanzig Jahre (1839—1865) darauf verwandt, um das nöthige Beobachtungsmaterial zu sammeln, die Präparate darzustellen und ihre physikalischen Eigenschaften wie specifisches Gewicht, Ausdehnung durch die Wärme, Siedepunkt u. s. w. mit möglichster Genauigkeit zu bestimmen. Ebenso sorgfältig verfuhr er bei der Ableitung der Resultate. Durch den Umfang dieser Arbeiten ist die physikalische Chemie erst zu einem selbstständigen Zweige der Wissenschaft erhoben worden, sie hatte vorher viel zu wenig Material, und man muss daher mit Recht Kopp als den eigentlichen Schöpfer dieses Gebietes bezeichnen. Seine Untersuchungen werden stets das Muster bleiben, nach welchem physikalisch-chemische Arbeiten auszuführen sind, und wenn auch bezüglich der von ihm aus den Beobachtungen gezogenen Schlüsse mit den Fortschritten der Wissenschaft Änderungen eintreten können, so bleibt der Werth der Versuchszahlen doch für alle Zeiten bestehen, weil sie den Stempel der Genauigkeit tragen.

Ausser KOPP hatten indess noch andere Chemiker, wenn auch nicht so ausschliesslich, die physikalische Richtung gepflegt. RAMMELSBERG erweiterte durch zahlreiche krystallographische Messungen die Kenntniss des Isomorphismus, und GROTH verfolgte bei organischen Substanzen die Veränderungen, welche die Krystallform erleidet, wenn gewisse Atome austreten oder sich durch andere substituiren. SCHRÖDER bestimmte die specifischen Gewichte einer grossen Zahl unorganischer und organischer Verbindungen, um daraus die Regeln der Volumconstitution fester Körper abzuleiten. Die Lehre vom Molecularvolum erfuhr zudem wichtige Bereicherungen durch sorgfältige Versuche, welche LOTHAR MEYER über die Transpiration der Dämpfe angestellt hatte. Eine eingehende Berücksichtigung fanden ferner die optischen Eigenschaften. KIRCHHOFFS und BUNSENS glänzende Entdeckung der Spectralanalyse, obgleich dieselbe nicht direct in das Anfangs bezeichnete engere Gebiet der physikalischen Chemie gehört, da sie nur in Beziehung zur qualitativen und nicht zur quantitativen Zusammensetzung der Körper steht, brachte werthvolle neue Hilfsmittel. Es wurde möglich, statt des unzuverlässigen Sonnenlichts künstliche Spectrallinien zur Bestimmung von Brechungsexponenten anzuwenden, und dieser grosse Vorzug ist auch sofort benutzt worden. Auf Grund vorangegangener Untersuchungen von DALE und GLADSTONE über die Abhängigkeit der Brechungsindices von der Körperdichte hatte ich den Einfluss der atomistischen Zusammensetzung organischer Substanzen auf die Fortpflanzung des Lichtes geprüft, und hierzu sind in neuerer Zeit weitere Arbeiten von BRÜHL und Anderen getreten, welche diesem Gegenstand bereits eine grosse Ausdehnung gegeben haben. Ebenso ist auch die Erscheinung der Drehung des polarisirten Lichtstrahles durch organische Körper, auf deren Erforschung schon BIOT einen grossen Theil seines Lebens verwandt hatte, in Beziehung zu der chemischen Constitution gebracht worden. Was endlich die Wärmeentwicklung bei chemischen Vorgängen betrifft, so hat dies-
Gegenstand fleissige Bearbeiter in J. THOMSEN und BERTHELOT nach der experimentellen, in NAUMANN und HORSTMANN nach der theoretischen Seite gefunden, und es ist derselbe schon zu einem grossen selbständigen Gebiete, dem der Thermochemie, herangewachsen.

Während die genannten Arbeiten nur vereinzelt und in langen Zwischenräumen erschienen, hat sich in der neuesten Zeit das physikalisch-chemische Interesse für diese Richtung hervorzutreten; man fängt an zu sehen, dass in der reinen Chemie wesentliche neue Gesichtspunkte für die nächste Zukunft kaum aufzufinden sein werden, und es macht sich daher das Bedürfniss nach anderen Wegen für den Fortschritt

der Wissenschaft geltend. Durchblättert man die letzten Jahrgänge der chemischen Journale, z. B. der Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft, so findet sich kaum ein Heft, welches nicht Mittheilungen aus dem Gebiete der physikalischen Chemie enthält, während früher in ganzen Bänden kaum eine einzige anzutreffen war. In allen Ländern treten junge Mitarbeiter auf, welche das Gebiet nach verschiedenen Richtungen experimentell verfolgen, und ebenso ist auch bereits die selbstständige Litteratur desselben in erfreulichem Wachsthum begriffen. RAMMELSBERGS werthvolles Handbuch der krystallographisch-physikalischen Chemie, NAUMANNs Lehr- und Handbuch der Thermochemie, J. THOMSENS thermochemische Untersuchungen, JAHNS Grundsätze der Thermochemie, welche sämmtlich in diesem Jahre erschienen, sie sind alle sprechende Zeichen der Zeit.

Was die physikalische Chemie in der Zukunft leisten wird, lässt sich nur zum kleinen Theile voraussehen. Ihr nächstes Bestreben, Mittel zu liefern, um aus der Messung physikalischer Eigenschaften zusammengesetzter Körper Schlüsse auf die atomistische Constitution der letzteren zu ziehen, weist bereits Erfolge auf, und es ist keinem Zweifel unterworfen, dass sie in den Stand kommen wird, bei den Fragen nach der Bindungsweise der Atome mit immer grösserer Sicherheit mitzusprechen. Was aber die weitere Aufgabe betrifft, die Chemie ihrem letzten Ziele, der Kenntniss der Statik und Mechanik der Atome, entgegen führen zu helfen, so ist die Fernsicht noch tief verschleiert. LOTHAR MEYERS ausgezeichnetes Buch: »Die modernen Theorien der Chemie und ihre Bedeutung für die chemische Mechanik« enthält alles, was die physikalische Richtung bis jetzt zu leisten vermochte; es zeigt, dass nur die schwächsten Anfänge vorhanden sind. Der künftige Erfolg wird in erster Linie von dem Eingreifen der Physik abhängen. Weit ist diese gegenwärtig ihrer Schwesterwissenschaft vorangeeilt; sie hat in der Lehre von der Erhaltung der Energie ein Princip gewonnen, welches die scheinbar verschiedensten Phänomene von einem allgemeinen Gesichtspunkte aus umfasst, die Gesetze derselben unter einander verbindet und die gleichen Maasse an alle Beweigungen anlegt. Die Zeit wird kommen und sie dürfte nicht fern sein, wo das Licht der modernen Physik auch hinüber zu strahlen beginnt in die Chemie, und dann lässt sich hoffen, dass diese zu Errungenschaften gelangt, um deren Besitz die späteren Generationen zu beneiden sein werden. Für jetzt kann man nur Steine zu dem künftigen Baue tragen, und die heranwachsenden Forscher auf die Werkzeuge aufmerksam machen, mit deren Hülfe sie ihn einst hoch und fest zu errichten vermögen.

Hrn. LANDOLT antwortete Hr. DU BOIS-REYMOND Folgendes:

Indem ich Sie, Hr. LANDOLT, in unserer Mitte begrüsse, drängt sich mir zunächst die Bemerkung auf, dass heute in die Akademie zwei Schweizer aufgenommen werden, und dass Sie der vierte Schweizer in der Akademie sind. Nach Hr. DE CANDOLLES Statistik stellte die Schweiz schon immer das relativ zahlreichste Contingent zu den auswärtigen und correspondirenden Mitgliedern der grossen Akademien, auch waren wiederholt Schweizer ordentliche Mitglieder dieser Akademie, wie EULER, der dritte JOHANN BERNOULLI, STEINER und jener SULZER, der lange vor GALVANI hier den ersten galvanischen Versuch beschrieb. Allein die Fülle ausgezeichneten Gelehrten, womit die Schweiz heute Deutschland beschenkt, ist culturhistorisch sehr merkwürdig. Bei dem Verhältniss der Bevölkerungszahlen wird diese Freigebigkeit nicht dadurch ausgeglichen, dass auch die Schweiz aus Deutschland Professoren bezieht. Wohl ihr, dass sie, wie einst physische Kraft in ihren Söldnern, so viel geistige Kraft ungefährdet abzugeben vermag.

Sie entwarfen, Hr. LANDOLT, ein scharf begrenztes, doch aussichtsreiches Bild von dem Gebiet der Chemie, dem Sie Ihre Arbeit widmen. Ja, im Gegensatz zur modernen Chemie kann man die physikalische Chemie die Chemie der Zukunft nennen.

Ich weiss nicht, ob es ein staunenswertheres Erzeugniss des menschlichen Geistes gibt, als die Structurchemie. Aus dem, was den unbefangenen fünf Sinnen als Qualität und Wandlung des Stoffes erscheint, Schritt für Schritt eine Lehre zu entwickeln, wie die von den Isomerie-Verhältnissen der Kohlenwasserstoffe, war wohl kaum leichter als die Mechanik des Planetensystems aus den Bewegungen leuchtender Punkte zu erschliessen, und die von STRECKER vorher gesagte, Hr. VOLHARD gelungene Synthese des Kreatins, wenn auch in minder erhabener Sphaere, im Grunde kein kleinerer Sieg als die Entdeckung des Neptuns. Aber wie blendend auch die Erfolge der Structurchemie sind, und mit wie gerechter Befriedigung ihnen Adepten auf das Vollbrachte blicken, die Ungeduld der ausserhalb Stehenden vermisst daran noch etwas, was ihr sogar die Hauptsache dünkt.

Wer in der Wissenschaft länger zurückdenkt, erinnert sich nicht lächelndem Bedauern des heute so kindlich erscheinenden Traumes der BERZELIUS'schen Elektrochemie, da noch der elektropositive Wasserstoff und der elektronegative Sauerstoff auf einander zu flogen wie zwei ungleichnamig elektrisirte Hollundermarkkugeln, und die Flamme einerlei war mit DAVY'S Lichtbogen, durch den die Elektrotechnik

zu verdrängen strebt. Durch die Annahme zusammengesetzter Radicale, welche schon LAVOISIERS Divination den einfachen Radicalen, den Elementen, entgegenstellte, wurde der Unterschied zwischen unorganischer und organischer Natur aufgehoben, den FOURCROY und VAUQUELIN darin suchten, dass dort binäre, hier ternäre, quaternäre, quinäre Verbindung der Atome herrsche; auch die organische Natur schien dem elektrochemischen Dualismus unterthan.

Wie ein Keulenschlag traf diese Theorie die unerhörte Mär von der Substitution, deren Geheimgeschichte Hr. Hofmann jüngst enthüllte. Wir mussten uns gewöhnen, bei Beurtheilung der chemischen Rolle eines Körpers abzusehen von dem, was so lange für das Wesentliche galt, von seiner Stellung in der Spannungsreihe, und was dem chemischen Anfänger heut als das Natürlichste in der Welt erscheint, dass es nur darauf ankommt, gewisse Plätze in einer Atomgruppe auszufüllen, gleichviel ob mit elektropositivem Wasserstoff oder elektro-negativem Chlor, empörte damals unser chemisches Gefühl als der ärgste Soloecismus.

Doch es kam noch ärger. Die Möglichkeit, in der Allotropie eine Art von Isomerie zu sehen, versöhnte uns nur schwer mit der Vorstellung, dass auch Atome desselben Stoffes sich chemisch verbinden. Des leitenden Fadens des Dualismus verlustig, gerieth überhaupt die organische Chemie (so wollte es uns bedünken) in einen Irrgarten bedenklicher Gedankenspiele. LAURENTS und GERHARDTS Typentheorie erklärte unstreitig grosse Reihen von Thatsachen, und bewährte sich in Entdeckungen, wie die der künstlichen Ammoniake; bei alledem trug sie das Gepräge äusserster Unwahrscheinlichkeit. Die Natur sollte sich für Zusammenfügung der Atome zu Molekeln, fast wie für Gestaltung der Lebewesen, einige wenige Schemata vorzeichnen haben, denen sich durchaus kein Sinn unterlegen, ja nicht einmal die Mehrzahl der Verbindungen anpassen liess.

Welche Befreiung war es, als der Sonnenstrahl der Quantivalenz die Trübe erhellte, und wir nach kurzer Herrschaft die quälenden Typen wieder vergessen durften. Sie waren nichts gewesen als ein noch unvollkommener, nicht hinreichend verallgemeinerter Ausdruck für die Werthigkeit der Atome. Nimmt man hinzu, dass die heutige Vorstellung wiederum, wie einst die dualistische Radicaltheorie, organische und unorganische Chemie umfasst, so gönnt man dem Geschlecht von Forschern, dem so Grosses gelang, eine Pause des Behagens und ruhigen Ausbauens gern.

Und doch gilt von dieser modernen Chemie auf ihrer stolzen Höhe noch, was KANT von der Chemie seiner Zeit sagte. Sie ist eine Wissenschaft, aber nicht Wissenschaft; in dem Sinne nicht, in

welchem es überhaupt nur Wissenschaft giebt, nämlich im Sinne der zur mathematischen Mechanik gediehenen Naturerkenntnis. In diesem Sinne würde es unsere Sehnsucht nach den Ursachen noch nicht einmal stillen, wenn wir wüssten, wie um das Kräftecentrum das wir ein Kohle-Atom nennen, die vier anderen Kräftecentra beliebiger stofflicher Natur räumlich vertheilt sind, welche ersteres zu fesseln vermag, und wie bei einem bestimmten Vorgange die Atome sich umlagern. Wissenschaft in jenem höchsten menschlichen Sinne wird erst die Chemie, wenn wir die Spannkraft, Geschwindigkeiten, stabile und labile Gleichgewichtslagen der Theilchen ursächlich in der Hand durchschauen, wie die Bewegungen der Gestirne. Hierin ist freilich die Astronomie der Chemie weit voraus, welche, seit sie auf BERZELIUS naive Erklärung verzichten musste, in abwartender Entscheidung einer Stufe verharret, noch unter der der Astronomie zu COPERNICUS und KEPLER'S Zeit.

Man denke sich eine bunte Reihe von Wasserstoff- und Chlormolekülen. Ein mechanisch wohl bekannter Anstoß, ein Aetherwellenzug, treffe diesen Chlorknallgas-Faden. Unter Wärmeentwicklung wird doch schliesslich ohne Volumänderung, lagern sich die Atome Chlorwasserstoff-Moleküle um; an Stelle des Chlorknallgas-Fadens tritt ein Chlorwasserstoff-Faden. Die mathematisch-mechanische Darstellung solch eines einfachsten chemischen Vorganges dürfte die Aufgabe sein, die der NEWTON der Chemie anzugreifen hätte. Ihre Lösung widersteht der Idee nach der Stein der Weisen, denn jene mathematische Chemie kennt keine Qualitäten mehr: wie denn in Sir WILLIAM THOMSON's kühnem Versuche, die Verschiedenheit der Atome durch verschiedene Verknötung von Wirbelringen zu erklären, die Qualitäten vollständig beseitigt sind.

Wann dies Ziel erreicht wird, wer kann es sagen? Vielleicht hat jener NEWTON schon irgendwo auf Schulbänken jugendliche Kräfte; vielleicht auch befinden sich nach hundert Jahren noch unsere Nachfolger auf diesen Sesseln der Umwandlung der Chemie der Mechanik gegenüber so rathlos wie wir. Sicher aber ist das Mittel, diese Umwandlung anzubahnen, neben dem fernern Ausbau der Structurchemie, die eifrige Bestellung Ihres Arbeitsfeldes, Hr. LANDOLT, der physikalischen Chemie, in etwas weiterm Sinne. Mathematische, physikalische, optische Krystallographie; die Lehre von Brechung und Zerstreuung, natürlicher und magnetischer Circumpolarisation des Lichts, Spectralanalyse; Thermochemie mit mechanischer Gastheorie und Dissociationslehre; Elektrochemie, da denn doch der elektrochemische Dualismus besteht; endlich die Lehre von der Diffusion, wozu Absorption und Lösung rechnen: dies Alles und noch manches Andere.

muss sich zum möglichst vollständigen Bild der Molecularvorgänge verbinden, ehe daran zu denken ist, dass, wie die Alchemisten es nannten, »das grosse Werk« gelinge.

Die organische Structurchemie und die von deren Ideen erfasste alte Mineralchemie waren längst in unserm Kreise glänzend und würdig vertreten. Der wachsenden Bedeutung der Hauptstadt, in welcher neue Lehranstalten ins Leben gerufen werden, verdanken wir, dass die Akademie sich in Ihnen, Hr. LANDOLT, auch einen der seltenen Bearbeiter des Grenzgebietes von Chemie und Physik verleihen konnte, denen Methoden und Betrachtungsweisen der Chemie so vertraut sind, wie in schwerer mathematischer Rüstung Optik und allgemeine Physik. Ausgegangen von der organischen Chemie, begannen Sie vor zwanzig Jahren eine Reihe bahnbrechender Arbeiten, welche für die optischen Constanten homologer organischer Verbindungen Entsprechendes leisteten, wie für deren Dampfspannungen und Schmelzpunkte die Entdeckungen KOPPS, SCHIELS und ihrer Nachfolger. Sie wurden seitdem nicht müde, ähnliche Gesichtspunkte zu verfolgen. Die Akademie, in deren Namen ich Sie herzlich bewillkommene, ist sicher, dass Sie in ihrem Schooss in ruhmvoller Weise das Werk dessen fortsetzen werden, den Sie den ersten Begründer der physikalischen Chemie nannten, EILHARD MITSCHERLICH.

Der vorsitzende Secretar verkündete hierauf die Beschlüsse der physikalisch-mathematischen Classe über den STEINER'schen Preis.

In der öffentlichen Sitzung am LEIBNIZ-Tage des Jahres 1880 ist in Erfüllung der Bestimmungen der STEINER'schen Stiftung verkündet worden, dass die Akademie, um die Geometer zu eingehenden Untersuchungen über die Theorie der höheren algebraischen Raumcurven zu veranlassen, beschlossen habe, zur Concurrrenz um den STEINER'schen Preis jede Arbeit zuzulassen, welche irgend eine auf die genannte Theorie sich beziehende Frage von wesentlicher Bedeutung vollständig erledigen werde.

Es sind drei Bewerbungsschriften rechtzeitig, am 27. und 28. Februar d. J., eingegangen. Ausserdem hat die Akademie am 28. Februar d. J. von Hrn. H. VALENTINER in Kopenhagen eine Schrift, betitelt: »Beiträge zur Theorie der Raumcurven« zugeschickt erhalten, welche, da sie den Namen des Verfassers enthielt, von der Concurrrenz auszuschliessen und nach dem Inhalte des von Kopenhagen den 26. Februar 1881 datirten Begleitschreibens vom Verfasser selbst auch nicht zur Concurrrenz um den STEINER'schen Preis bestimmt war. Hr. VALENTINER

erklärt in seinem an die Akademie gerichteten Briefe, dass ihm die Zeit zur Ausarbeitung einer eigentlichen Bewerbungsschrift zu kurz gewesen sei und nur dazu genügt habe, um seine bereits im December 1881 in dänischer Sprache veröffentlichte Inauguraldissertation über die Theorie der Raumcurven in's Deutsche zu übersetzen und Einiges hinzuzufügen. Er wünscht durch die Einsendung seiner Arbeit nur die Priorität seiner Resultate gegenüber denjenigen festzustellen, die in anderen an die Akademie eingeschickten Abhandlungen über die Theorie der Raumcurven enthalten wären. Diesem Wunsche hat die Akademie nicht anders entsprechen können, als dass sie bei der Berathung über die Ertheilung des STEINER'schen Preises den Beschluss gefasst hat, dem Hrn. VALENTINER seine aus äusseren Gründen zur Concurrenz nicht zuzulassende Arbeit unverzüglich zur Disposition zu stellen und ihm hierdurch die Möglichkeit zu geben, die Priorität seiner Resultate durch deren Veröffentlichung zu wahren.

Die erste der drei Bewerbungsschriften, welche den äusseren Bedingungen der Zulassung zur Concurrenz gestellten Bedingungen genügen, trägt das STEINER'sche Motto: »Hierbei macht weder die synthetische noch die analytische Methode den Kern der Sache aus, der darin besteht, dass die Abhängigkeit der Gestalten von einander und die Art und Weise aufgedeckt wird, wie ihre Eigenschaften von den einfacheren Figuren zu den zusammengesetzteren sich fortpflanzen«. Die Arbeit besteht aus zwei sowohl dem Gegenstande als der Behandlungsweise nach ganz verschiedenen Theilen. Im ersten Theile werden nach und nach in vier Abschnitten die Curven behandelt, welche auf speciellen Flächen, nämlich auf der allgemeinen Fläche dritter Ordnung, auf der cubischen Regelfläche, auf der Fläche vierter Ordnung mit doppelter Kegelschnitt und auf derjenigen mit einer Doppelgeraden liegen. Im zweiten Theile werden Untersuchungen über allgemeine Raumcurven ohne vorherige Fixirung einer Fläche, auf welcher sie liegen sollen, auf die CAYLEY'sche Darstellung durch sogenannte Monoide gegründet und dabei namentlich Bestimmungen über die Zahlen erlangt, welche für die Anzahl der scheinbaren Doppelpunkte von Raumcurven gegebener Ordnung auftreten können. Die beiden Theile der Abhandlung sind in einzelnen Abschnitten in ganz verschiedenem Maasse durchgeführt, relativ am meisten der erste Abschnitt, welcher sich mit den auf Flächen dritter Ordnung liegenden Raumcurven beschäftigt. Dieses grössere oder geringere Maass der Durcharbeitung entspricht aber keineswegs der grösseren oder geringeren Bedeutung der behandelten Fragen, sondern es waren dem Verfasser, wie er selbst in der Einleitung freimüthig erklärt, subjective Gründe hierfür bestimmend. So hat er sich im vergangenen December durch das Erscheinen

der VALENTINER'schen Inauguraldissertation, deren Inhalt sich, wie er sagt, »zum guten Theile mit seinen Untersuchungen im zweiten Theile seiner Abhandlung deckt und vielfach noch weiter geht«, bewegen lassen, von weiterer Durcharbeitung der darin behandelten allgemeinen Theorie der Raumcurven abzustehen und die letzten zwei Monate der Frist auf die eingehendere Bearbeitung des ersten Theiles zu verwenden. Die ganze Abhandlung lässt deshalb die systematische Entwicklung und vielfach auch selbst die übersichtliche Anordnung des Stoffes, die Scheidung des Wichtigern von dem minder Wichtigem vermissen, aber sie enthält in ihrem ersten Theile und namentlich in dessen erstem Abschnitt eine gründliche und umfassende geometrische Untersuchung der auf gewissen speciellen Flächen liegenden Curven und in beiden unterschiedenen Theilen eine Anzahl von werthvollen Resultaten, die jedoch nicht als solche anerkannt werden können, welche — wie es in der Preisaufgabe heisst — »auf die Theorie der Raumcurven bezügliche Fragen von wesentlicher Bedeutung vollständig erledigen«.

Die zweite Bewerbungsschrift hat das ABEL'sche Motto: »On doit donner au problème une forme telle, qu'il soit toujours possible de le résoudre«, und den Titel: »Zur Grundlegung der Theorie der algebraischen Raumcurven.« Sie ist, dem Titel entsprechend, ein Versuch gründlicher und umfassender Darstellung der Theorie der algebraischen Raumcurven, und es ist vor Allem anzuerkennen, dass darin die fundamentalen algebraischen Gesichtspunkte und zwar sowohl diejenigen, welche für die Classification der Raumcurven, d. h. für ihre Zusammenfassung in verschiedene Arten, als auch diejenigen, welche für die Entwicklung ihrer Eigenschaften maassgebend sind, mit Klarheit erfasst und mit Bestimmtheit hervorgehoben werden. Die Entwicklung der Theorie selbst ist eine durchaus systematische und durchweg wohl geordnete. Dabei hat es sich der Verfasser angelegen sein lassen, dem Leser die Übersicht und das Verständniss zu erleichtern, indem er seiner umfangreichen Arbeit ein genaues Inhaltsverzeichnis und eine Einleitung vorausschickte, in welcher er die auf den Gegenstand bezügliche Literatur sorgfältig angegeben, deren Inhalt und Ergebniss kurz dargelegt und daran eine nähere Auseinandersetzung der von ihm selbst in seiner Arbeit benutzten Methoden und der dabei erlangten Resultate geknüpft hat. Die Arbeit ist in drei Abschnitte eingetheilt und gibt im ersten Abschnitt eine Untersuchung der Raumcurven mittelst specieller Flächenschnitte, im zweiten eine solche mittelst Schnitte allgemeiner Flächen und im dritten Anwendungen auf die Raumcurven der einzelnen Ordnungen (bis zur siebenzehnten Ordnung hin), denen im Schlussparagraphen noch Anwendungen auf die Geometrie specieller Flächen angeschlossen sind. Alle

diese Untersuchungen sind in sorgfältiger, gediegener Weise geführt und auf tiefe algebraische Erkenntniss gegründet; einige derselben sind freilich, wie der Verfasser selbst eingesteht, noch keineswegs bis zum Abschluss geführt, und auch viele der entwickelten Resultate bedürfen noch einer weiteren Durcharbeitung. Aber diejenigen, vom Verfasser selbst als die hauptsächlichsten hervorgehobenen Untersuchungen, welche sich auf die Constantenzahl der Raumcurven beziehen, sowie die Ergebnisse dieser Untersuchungen, sind doch schon in der Form, wie sie vorliegen, von der Art, dass die Akademie darin, wenn sie dieselben im Zusammenhang der ganzen systematischen Entwicklung betrachtet, einen wesentlichen Fortschritt in der Theorie der algebraischen Raumcurven erkennen und hiervon Anlass nehmen kann, der an sich vortrefflichen Arbeit den Preis zuzuertheilen.

Die dritte Bewerbungsschrift ist mit dem LUCREZ'schen Motto versehen: »*Variam semper dant otia mentem*«, in französischer Sprache geschrieben und »*Mémoire sur la classification des courbes gauches algébriques*« betitelt. Die sehr umfangreiche und äusserst sorgfältige Arbeit ist durch eine übersichtliche Darlegung des gesammten Inhalts eingeleitet und in sechs Kapitel eingetheilt, welche von sehr verschiedener Ausdehnung sind. Das erste Kapitel enthält im Wesentlichen nur die Grundlagen der Entwicklung, drei kürzere Kapitel, welche zusammen noch nicht den vierten Theil der ganzen Arbeit ausmachen, nämlich das zweite, vierte und fünfte, behandeln die Curven auf den Oberflächen zweiten, dritten, vierten und fünften Grades; das letzte Kapitel gibt als Anwendung der allgemeineren Resultate eine Classification der Curven bis zum 20. Grade und eine solche der Curven 120. Grades. Das dritte Kapitel, welches allein beinahe die Hälfte des Umfanges der ganzen Arbeit hat, ist auch seinem Inhalte nach das vorzüglichste; es enthält die Darlegung eines eigenthümlichen Verfahrens, aus zwei gegebenen ganzen Functionen zweier Variabeln eine Reihe solcher Functionen herzuleiten, welches, — angewendet auf die bei der CAYLEY'schen Darstellung der Raumcurven vorkommenden Functionen — von einer Raumcurve zu einer anderen führt, die der Verfasser als die »adjungirte« bezeichnet. Die in diesem Kapitel gegebenen algebraischen Entwicklungen und die daraus erlangten geometrischen Resultate enthalten eine wesentliche Bereicherung der Theorie der Raumcurven und geben der Arbeit den Anspruch auf Ertheilung des STEINER'schen Preises, wenngleich dieselbe im Uebrigen, bei allen ihren Vorzügen, hinsichtlich der algebraischen Principien für die Classification der Curven und auch hinsichtlich der systematischen Entwicklung der zweiten Bewerbungsschrift nachsteht.

Hiernach hat die Akademie beschlossen, dem Verfasser der erstgenannten Bewerbungsschrift mit dem STEINER'schen Motto: »Hierbei macht weder die synthetische noch die analytische Methode u. s. w.« den STEINER'schen Preis nicht zuzuerkennen, dagegen einem jedem der beiden anderen Bewerber, deren Schriften, die eine mit dem ABEL'schen Motto: »On doit donner au problème etc.«, die andere mit dem LUCREZ'schen Motto: »Variam semper dant otia mentem«, beide von der Akademie für preiswürdig erachtet worden sind, den vollen ausgesetzten Preis von 1800 Mark zu ertheilen.

Indem hierauf die zu den beiden gekrönten Abhandlungen gehörigen Zettel eröffnet wurden, ergab sich als Verfasser der mit dem Motto: »On doit donner au problème etc.« bezeichneten:

Dr. MAX NOETHER, Professor an der Universität Erlangen, und als Verfasser der mit dem Motto: »Variam semper dant otia mentem« bezeichneten:

GEORGES-HENRI HALPHEN in Paris.

Der dritte Zettel mit Motto: »Hierbei macht weder u. s. w.« wurde sogleich uneröffnet verbrannt.

Die den Statuten der Stiftung gemäss jetzt zu stellende neue Preisfrage betreffend wurde Folgendes verkündet:

Die bis jetzt zur Begründung einer rein geometrischen Theorie der Curven und Flächen höherer Ordnung gemachten Versuche sind hauptsächlich deswegen wenig befriedigend, weil man sich dabei — ausdrücklich oder stillschweigend — auf Sätze gestützt hat, die der analytischen Geometrie entlehnt sind und grösstentheils allgemeine Gültigkeit nur bei Annahme imaginärer Elemente geometrischer Gebilde besitzen. Diesem Übelstande abzuhelfen gibt es, wie es scheint, nur ein Mittel: es muss der Begriff der einem geometrischen Gebilde angehörigen Elemente dergestalt erweitert werden, dass an die Stelle der im Sinne der analytischen Geometrie einem Gebilde associirten imaginären Punkte, Geraden, Ebenen wirklich existirende Elemente treten, und dass dann die gedachten Sätze, insbesondere die auf die Anzahl der gemeinschaftlichen Elemente mehrerer Gebilde sich beziehenden, unbedingte Geltung gewinnen und geometrisch bewiesen werden können.

Für die Curven und Flächen zweiter Ordnung hat dies v. STAUDT in seinen »Beiträgen zur Geometrie der Lage« mit vollständigem Erfolge ausgeführt. Die Akademie wünscht, dass in ähnlicher Weise auch das im Vorstehenden ausgesprochene allgemeine Problem in Angriff genommen werde, und fordert die Geometer auf, Arbeiten, welche dieses Problem zum Gegenstande haben und zur Erledigung desselben Beiträge von wesentlicher Bedeutung bringen, zur Bewerbung um den im Jahre 1884 zu ertheilenden STEINER'schen Preis einzureichen. Selbstverständlich muss in diesen Arbeiten die Untersuchung rein geometrisch durchgeführt werden; es ist jedoch nicht nur zulässig, sondern wird auch ausdrücklich gewünscht, dass die erhaltenen Resultate auf analytisch-geometrischem Wege erläutert und bestätigt werden.

Die ausschliessende Frist für die Einsendung der Bewerbungsschriften, welche in deutscher, lateinischer oder französischer Sprache verfasst sein können, ist der 1. März 1884. Jede Bewerbungsschrift ist mit einem Motto zu versehen und dieses auf dem Äussern des versiegelten Zettels, welcher den Namen des Verfassers enthält, zu wiederholen. Die Ertheilung des Preises von 1800 Mark erfolgt in der öffentlichen Sitzung am LEIBNIZ-Tage im Juli 1884.

Zum Schlusse verkündete Hr. CURTIUS als vorsitzender Secretar der philosophisch-historischen Classe über neue von dieser Classe gestellte Aufgaben Folgendes:

So allgemein auch die Bedeutung des Gesetzes der Causalität für alle Formen und Gebiete des menschlichen Erkennens heutzutage erkannt ist, so weit gehen die Ansichten doch immer noch darüber auseinander, auf welchem Wege sich die in jenem Gesetz ausgesprochene Auffassung der Dinge ursprünglich gebildet hat; auf welche wissenschaftlichen Gründe dieselbe sich stützt; welches daher der eigentliche Sinn des Causalitätsgesetzes ist und wie weit seine Geltung sich erstreckt. Als ein wesentliches Hilfsmittel für die gründliche Beantwortung dieser Fragen erscheint die geschichtliche Zusammenstellung und philosophische Kritik der Antworten, welche auf dieselben in der für diese Untersuchung vorzugsweise in Betracht kommenden neueren Philosophie gegeben worden sind. Um hier eine Anregung zu geben, wünscht die Akademie eine Darstellung und Prüfung der Theorien über den Ursprung, den Sinn und die Geltung des Causalitätsgesetzes, welche auf die wissenschaftliche Entwicklung der letzten drei Jahrhunderte Einfluss gewonnen haben.

Die ausschliessende Frist für die Einsendung der Beantwortung dieser Aufgabe, welche nach Wahl des Verfassers in deutscher, latei-

nischer, französischer, englischer oder italiänischer Sprache abgefasst sein kann, ist der 31. December 1884. Jede Preisschrift ist mit einem Motto zu versehen, welches auf einem beizufügenden versiegelten, den Namen und die Adresse des Verfassers angehenden Zettel wiederholt ist. Die Ertheilung des Preises von 5000 Mark geschieht in der öffentlichen Sitzung des LEIBNIZ'schen Jahrestages 1885.

Nach dem Statut der von Frau CHARLOTTE STIEPEL, geb. Freiin von HOPFGARTEN, errichteten Charlottenstiftung für Philologie ist am heutigen Tage eine neue Aufgabe zu veröffentlichen. Die von der philosophisch-historischen Classe erwählte Commission, welche die Aufgaben zu bestimmen hat, stellt im Namen der Akademie folgendes Thema:

Die Einrichtung der stadtrömischen Columbarien ist auf Grund der gedruckt vorliegenden Inschriften und Stiche daraufhin zu untersuchen, dass die Vertheilung der Nischen auf die einzelnen Wände, die Zählung der Grabplätze und die darauf bezügliche Terminologie ihre Erläuterung finden. Es ist den Bewerbern überlassen, darüber hinaus die Entstehung der Columbarien und deren Chronologie überhaupt, ferner die Rechtsfrage zu erörtern, auf welchen Momenten die Erwerbung des Grabrechts theils für Genossenschaften, theils für Individuen beruht.

Die Stiftung ist zur Förderung junger, dem deutschen Reiche angehöriger Philologen bestimmt, welche die Universitätsstudien vollendet und den philosophischen Doctorgrad erlangt oder die Prüfung für das höhere Schulamt bestanden haben, aber zur Zeit ihrer Bewerbung noch ohne feste Anstellung sind. Privatdocenten an Universitäten sind von der Bewerbung nicht ausgeschlossen.

Die Arbeiten der Bewerber sind bis zum 1. März 1883 an die Akademie einzusenden. Sie sind mit einem Denkspruch zu versehen; in einem versiegelten, mit demselben Spruche bezeichneten Umschlage ist der Name des Verfassers anzugeben und der Nachweis zu liefern, dass die statutenmässigen Voraussetzungen bei dem Bewerber zutreffen.

In der öffentlichen Sitzung am LEIBNIZ-Tage 1883 ertheilt die Akademie dem Verfasser der des Preises würdig erkannten Arbeit das Stipendium. Dasselbe besteht in dem Genusse der zur Zeit $4\frac{1}{2}$ Procent betragenden Jahreszinsen des Stiftungscapitals von 30000 Mark auf die Dauer von vier Jahren.

Ausgegeben am 6. Juli.

1882.

XXXIII.

SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

6. Juli. Gesamtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. CURTIUS.

1. Hr. SCHOTT las über den chinesischen Philosophen und Polyhistor Tschühjisi und seine Werke.

2. Hr. CONZE machte, zugleich Namens der HH. KIEPERT und SCHRADER, folgende Mittheilung aus einem Briefe des Hrn. Dr. PUCHSTEIN aus Diarbekr d. d. 26. Mai d. J.

Hr. PUCHSTEIN war von der Akademie in Begleitung des Hrn. Ingenieur SESTER ausgeschiedt, um ein von letzterem auf früheren Reisen gesehenes Monument auf dem Nimrud-dagh unweit Gerger genauer zu untersuchen.

Die Herren haben auf dem Nimrud-dagh bei ungünstiger Witterung vorläufig nur kurze Zeit aushalten können, Hrn. PUCHSTEIN's Bericht lässt aber bereits erkennen, dass das ganze Monument, ein hoher Hügel aus kleinen Steinen, mit Kolossalstatuen, Reliefs und griechischen Inschriften, der kommagenischen Dynastie im letzten Jahrhundert v. Chr. angehören wird. In den Inschriften kommt jedenfalls der Name desselben Königs Antiochos vor, von dem Hr. PUCHSTEIN ein Felsreliefbild mit Namensunterschrift an der Burgbergwand von Gerger copirt hat; dieser Antiochos ist aber wiederum derselbe, über den Hr. MOMMSEN in den Mittheilungen des deutschen archäologischen Instituts in Athen (I, S. 31 f.) gehandelt hat.

Die Reisenden waren beim Abgange des Briefes im Begriffe nach Nimrud-dagh zurückzukehren und die Untersuchung gründlich zu Ende

zu führen, so wie sie auf der Rückreise auch noch andre zur vielleicht derselben Periode angehörige Denkmäler zu unterbeabsichtigten.

3. Hr. HELMHOLTZ legte vor eine Mittheilung des Hrn. CHEESMAN über die Messung von Wechselströmen durch Anwe eines Galvanometers mit schräg gegen die Windungsebene ge Nadel.

Diese Mittheilung folgt umstehend.

4. Durch Ministerialschreiben vom 1. Juli werden auf der physikalisch-mathematischen Classe 8000 Mark angewiesen Professoren Dr. BÜCKING in Kiel und Dr. LEPSIUS in Darmstadt zu geologischen Aufnahme in Attica und eventuell auf den benach Inseln, und 350 Mark für Hrn. Dr. E. GERLAND in Kassel zur sicht LEIBNIZischer Manuscripte physikalischen und technischen in der Bibliothek zu Hannover.

Über die Messung von Wechselströmen durch Anwendung eines Galvanometers mit schräg gegen die Windungsebene gestellter Nadel.

Von Hrn. LOUIS M. CHEESMAN
aus Columbia.

Vorgelegt von Hrn. HELMHOLTZ.

Bei der häufigen Anwendung von Wechselströmen für Widerstandsbestimmungen von Flüssigkeiten und dergleichen ist es wünschenswerth, ein insbesondere für schwache Ströme empfindlicheres Instrument, als wir jetzt besitzen, herzustellen.

Auf Anregung des Hrn. Geheimrath HELMHOLTZ habe ich versucht, diesen Zweck durch elektromagnetische Wirkung zu erreichen, und gebe im Nachfolgenden eine kurze Beschreibung des Apparates und der Methode, da ich genöthigt bin, meine Versuche für einige Zeit zu unterbrechen.

Der Ausgangspunkt der Versuche war die Erscheinung der sogenannten »doppelsinnigen Ablenkung«, welche bekanntlich darin besteht, dass, wenn Wechselströme durch ein Galvanometer geleitet werden, dessen Rahmen so gestellt ist, dass die Magnetnadel einen Winkel grösser als 0° und kleiner als 90° mit der Windungsebene bildet, eine Ablenkung in dem Sinne eintritt, dass die schon vorhandene Ablenkung vergrössert wird.

POGGENDORFF¹⁾, der diese Erscheinung zuerst genauer studirte, zeigte, dass sie eine Folge der Einwirkung der Ströme nicht auf den permanenten, sondern auf den von ihnen inducirten Magnetismus der Magnetnadel ist und dass ferner das Drehungsmoment, welches der Nadel von den Strömen ertheilt wird, von dem permanenten Magnetismus derselben unabhängig ist.

Denken wir uns die Bedingungen erfüllt, die für die doppelsinnige Ablenkung nöthig sind, und betrachten die Wirkung zweier gleicher in einer gegen die Schwingungsdauer der Nadel kurzen Zeit

¹⁾ Pogg. Ann. XLV. 1838.

in entgegengesetzter Richtung auf einander folgenden Ströme. den ersten (positiven) Strom wird das schon vorhandene magnetische Moment (M) um (m) vergrößert, und der Nadel ein Drehungsmoment proportional $i(M + m)$ ertheilt, wenn unter i die Intensität des Stromes verstanden wird; durch den zweiten (negativen) Strom wird eine der Vermehrung im ersten Falle gleiche Verminderung des magnetischen Momentes ein, so dass das Drehungsmoment in diesem Falle proportional $-i(M - m)$ zu setzen ist; das von beiden Strömen herrührende Drehungsmoment ist mithin proportional $2im$. Durch eine ähnliche Betrachtung sieht man leicht ein, dass das Drehungsmoment, welches die Nadel nach dem Meridian zurück zu drehen strebt, dem inducirten Magnetismus unabhängig und dem Ausdrucksdruck proportional ist, wo (T) die horizontale Intensität des Erdmagnetismus bedeutet.

Zu den Vorversuchen diente ein gewöhnliches Galvanometer mit ringförmigem Magneten, dessen Drahtspirale man in eine solche Lage gebracht hatte, dass ihre Windungsebene einen Winkel von ca. 45° mit dem magnetischen Meridian bildete, und durch diese Drahtspirale die Ströme eines Du Bois-REYMOND'schen Separators geschickt wurden. Der Zweck dieser Vorversuche war zu sehen, ob die »doppelsinnige Ablenkung« sich zum Messen der Intensität von Wechselströmen eigne, d. h. ob die Ablenkung für schwache Ströme eine schickliche Grösse erreiche und die Nadel des Instrumentes für dieselbe Stromstärke immer dieselbe Stellung zeige, was bei etwaigen Veränderungen im magnetischen Zustande der Nadel nicht der Fall sein würde. Bezüglich der oben genannten Punkte war das Resultat ein so befriedigendes, dass die Hoffnung begründet schien durch eine günstigere Gestaltung der Rollen und des Magneten, so wie durch Verminderung des magnetischen Directionsdruckes ein zu Messungen vollkommen taugliches Instrument herzustellen. Nach einigen Umformungen der Apparatur folgende Form.

Beschreibung des Apparates.

An einem EDELMANN'schen Galvanometer wurden, nach Entfernung der zum Dämpfer gehörenden Theile, zwei Rollen — jede mit 10 Windungen von 0.25^{mm} dickem, mit Seide besponnenem Draht — angebracht: der Spielraum des Magneten war ein winkliges Parallelepiped von 11^{mm} Höhe, 61^{mm} Breite und 11^{mm} Tiefe. Der Gesamtwiderstand der Rollen betrug 452 S.E. Als

diente ein Bündel von elf glasharten Stahldrähten [Durchmesser = 1.6^{mm}], die zur Sättigung magnetisirt waren.

Die Verminderung der erdmagnetischen Directionskraft kann entweder wie gewöhnlich durch einen im passenden Abstand angebrachten Astasirungsmagneten geschehen, oder dadurch, dass man — je nach dem gewünschten Grad der Astasirung — eine Anzahl der zu einem Bündel vereinigten Magnetstäbchen mit ihren Polen in entgegengesetzter Richtung als die andern legt, was offenbar die Empfindlichkeit des Instrumentes erhöhen muss, da die hervorgebrachten Ablenkungen allein in Folge des inducirten Magnetismus auftreten und da das Drehungsmoment von Seiten der Wechselströme auf den permanenten Magnetismus Null ist. Aus verschiedenen Gründen ist jedoch die erste Methode vorzuziehen.

Magnetisirung der Galvanometernadel.

Die Art der Magnetisirung der Galvanometernadel ist hierbei von Bedeutung. Bekanntlich wirkt eine magnetische Scheidungskraft auf einen harten Stahlmagneten nicht nur so ein, dass Magnetismus inducirt wird, im Allgemeinen tritt auch eine Veränderung des permanenten Magnetismus ein. Wenn die Induction immer von einer solchen Veränderung begleitet wäre, würden die Angaben eines solchen Instrumentes, wie das hier beschriebene, offenbar illusorisch sein. Es geht aber aus den Untersuchungen von Hrn. FROMME¹⁾ hervor, dass durch wiederholtes Magnetisiren durch eine Kraft (P) der permanente Magnetismus des Stahles sich einem Grenzwerthe nähert, und, nachdem dieser erreicht ist, vermögen Kräfte, welche kleiner als P sind, keine Änderung des permanenten Magnetismus hervorzubringen. Daraus folgt jedoch nicht, dass Ströme von entgegengesetztem Vorzeichen, wie solche im vorliegenden Falle zur Wirkung kommen, den Magnetismus nicht verändern könnten; dass aber dies nicht oder nicht merklich bei den gebrauchten Nadeln, die durch wiederholte Einwirkung einer grossen Scheidungskraft magnetisirt waren, der Fall gewesen ist, glaube ich aus folgenden Gründen annehmen zu dürfen. Eine Veränderung des magnetischen Zustandes könnte in einer Verschiebung der magnetischen Axe, so wie in einer Veränderung des magnetischen Momentes bestehen. Wäre jenes eingetreten, so müsste es sich durch eine unregelmässige Änderung des Ruhepunktes des Instrumentes bei offenem Stromkreise zu erkennen geben; eine graphische Darstellung der Ruhepunkte bei zwei Beobachtungsreihen, die

¹⁾ Pogg. Ann. Ergänzungsband VII. p. 414. 1876.

zu einem andern Zweck angestellt waren, und wobei vor und nach jedem Stromschluss die Ruhepunkte notirt waren, erwies keine Unstetigkeiten bei den Punkten, wo der Strom gewirkt hatte; die Beobachtungen erstreckten sich über einen Zeitraum von vierzehn Stunden. Wenn andererseits eine Änderung des magnetischen Momentes durch die Ströme hervorgebracht wird, so muss sich dies ebenfalls auf einfache Weise zu erkennen geben, denn die Empfindlichkeit des Instruments hängt von dem permanenten Momente ab; wiederholte Bestimmungen des Ausschlages für nahezu gleiche Stromstärken ergaben Zahlen, die in einem constanten Verhältniss standen zu der zu gleicher Zeit gemessenen Ausschläge an einem WEBER'scher Dynamometer im selben Stromkreise.

Gesetz der Ablenkung.

Die Versuche über das Gesetz der Ablenkung sind noch nicht abgeschlossen, so dass es einer späteren Mittheilung vorbehalten werden muss, zu zeigen, in wie fern die Ausschläge der Formel

$$i^2 = c \operatorname{tg} \phi$$

entsprechen. Nach der schon erwähnten Abhandlung des Hrn. FROMME¹⁾ wächst bei Magneten, die den Grenzwert des magnetischen Momentes für die Kraft P haben, der inducirte Magnetismus proportional mit der Stärke der Scheidungskraft, so lange diese Kraft zwischen N und P liegt. Es treten hier etliche Fragen auf, die einer besonderen Untersuchung bedürfen, bevor Obiges auf den vorliegenden Fall angewendet werden dürfte. Wenn aber angenommen wird, dass der inducirte Magnetismus der Scheidungskraft proportional wächst, können auch dann die Ablenkungen nur für kleine Werthe von α und gewisse Stellungen der Axe der Galvanometerrolle gegen den Meridian durch $i^2 = c \operatorname{tg} \phi$ dargestellt werden.

Denn denkt man sich ein Galvanometer, bei dem die Axe der Rolle einen Winkel (α) mit dem Meridian bildet und dessen Nadel eine Ablenkung (ϕ) durch Wechselströme erfahren hat, so ist die Gleichgewichtsbedingung:

$$MT \sin \phi = i M' \mathfrak{F}(R) \sin (\alpha - \phi),$$

worin M das permanente magnetische Moment,

M' das inducirte magnetische Moment,

T die horizontale Intensität,

¹⁾ Pogg. Ann. Ergänzungsband VII S. 414. 1876.

i die Stromstärke,

$\mathfrak{F}(R)$ eine Function, die von den Windungen u. s. w. abhängt, bedeutet. M' kann durch $\mathfrak{F}(R) i \cos(\alpha - \phi)$ ersetzt werden, woraus folgt:

$$i^2 = c \cdot \frac{\sin \phi}{\sin 2(\alpha - \phi)}, \quad c = 2 \frac{MT}{[\mathfrak{F}(R)]^2}.$$

Für den speciellen Fall, dass $\alpha = 45^\circ$ ist, weicht der Werth von $\frac{\sin \phi}{\sin 2(\alpha - \phi)}$ schon bei $\phi = 3^\circ$ um 0.2 Procent von dem von $\tan \phi$ ab.

Empfindlichkeit.

Die Grösse des Ausschlages bei sonst gleichen Verhältnissen muss wesentlich von der Schwingungsdauer der Nadel abhängen. Um ein Urtheil über die Empfindlichkeit des oben beschriebenen Apparates für verschiedene Schwingungsdauern seiner Nadel zu erhalten, schaltete ich denselben und ein WEBER'sches Elektrodynamometer zusammen in einen und denselben Stromkreis ein und stellte in einer Tabelle das Verhältniss der Angaben meines Apparates, dividirt durch die auf gleichen Scalenabstand reducirten Angaben des WEBER'schen Dynamometers¹⁾, wie folgt zusammen:

Schwingungsdauer	Quotient der Ausschläge
22 Sec.	4.3
16 „	2.6
10 „	1.1
8.3 „	0.7.

Versuche.

Es erübrigt noch einige Bestimmungen anzuführen, die gemacht wurden, um durch den Versuch die Tauglichkeit des Apparates zu erproben. Als Beispiel gebe ich zwei Bestimmungen von Flüssigkeitswiderständen, die im einfachen Stromkreise mittels der Substitutionsmethode ausgeführt wurden, an. Als Strom dienten die Inductionsströme eines DU BOIS-REYMOND'schen Schlittenapparates; behufs eines gleichmässigeren Verlaufs der Ströme befand sich, nach Angabe des Hrn. HELMHOLTZ, die inducirende Spirale in einer Nebenschliessung. Durch sorgfältiges Einstellen des Federcontacts kann es leicht erreicht werden, dass die Ströme sich sehr continuirlich ändern, so dass der Änderung der Stromstärke Rechnung getragen werden konnte. Als

¹⁾ Dynamometer von LEYSER. Anzahl der Windungen der Galvanometerrolle = 1860. Widerstand = 145 S. E. Anzahl der Windungen der Bifilarrolle 4380. Widerstand = 195 S. E. Schwingungsdauer der Bifilarrolle = 20 Sec.

Widerstandsgefäße wurden die von Hrn. F. KOHLRAUSCH¹⁾ beschriebenen benutzt.

1. MgSO_4 Gehalt an Salz ungefähr 9 Procent.

Mit dem WEBER'schen Dynamometer. Schwingungsdauer 20 Sec.	Mit dem Galvanometer. Schwingungsdauer 11 Sec.
Temperatur bei der Beobachtung 16°.96	16°.96
Widerstand auf 15° reducirt ²⁾ 1021.9 S.E.	1019.3 S.E.

2. MgSO_4 Gehalt an Salz auch ungefähr 9 Procent.

Mit dem Galvanometer. Temperatur bei der Beobachtung	[Schwingungsdauer = 14 Sec.] Widerstand auf 15° reducirt
15°.64	1041.7
15°.70	1035.5
15°.76	1040.5
15°.82	1038.0
15°.88	1036.1
15°.96	1039.9
16°.00	1036.5
16°.03	1041.5
16°.24 [Mit dem Dynamometer.]	1042.3.

Zum Schluss möchte ich nur bemerken, dass ich baldmöglichst die Versuche, sowohl mit dieser, wie auch mit einer anderen Form des Instruments mit zwei Rollen für Bestimmungen in der WHEATSTONE'schen Brücke, fortsetzen werde.

¹⁾ WIED. ANN. XI S. 659. 1880.

²⁾ Die Zahlen zur Reduction der Angaben auf 15° wurden dem Leitfaden der Physik von KOHLRAUSCH entnommen.

1882.
XXXIV.

SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

13. Juli. Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. AUWERS.

1. Hr. VIRCHOW las: Zur physischen Anthropologie der **Kaukasusländer**.

2. Hr. SCHWENDENER legte eine Mittheilung des Assistenten am hiesigen pflanzen-physiologischen Institut Dr. M. WESTERMAIER: »**Untersuchung über den Bau und die Functionen des pflanzlichen Hautgewebes**« vor, welche nach Herstellung einer zugehörigen Tafel mit einem der nächsten Sitzungsberichte erscheinen wird.

Ausgegeben am 20. Juli.

1882.
XXXV.

SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

13. Juli. Sitzung der philosophisch-historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. CURTIUS.

Hr. KIEPERT las: Über den Gewinn für historische Geographie aus den neusten topographischen Arbeiten der Russen in Nord-Armenien.

Ausgegeben am 20. Juli.

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei.

READY

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1882.
XXXVI.

SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

20. Juli. Gesamtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. CURTIUS.

1. Hr. MUNK las: Über die Stirnlappen des Grosshirns.
Der Vortrag folgt umstehend.

2. Hr. MOMMSEN machte die folgende Mittheilung:

Von Hrn. HUMANN, welcher seine Expedition zur Abformung und Revision des ancyranischen Augustusmonuments und anderen kleinasiatischen Überresten des Alterthums Mitte Juni angetreten hat, lagen aus Angora schriftliche Berichte vom 8. Juli und ein Telegramm vom gestrigen Tage vor. Nach Angabe des letzteren hat er die Arbeit am Augustusmonumente vollständig und glücklich beendigt. Von den Ergebnissen der ersten Arbeitstage, die dem lateinischen Text gewidmet waren, theilt der Begleiter des Hrn. HUMANN, Hr. DOMASZEWSKI aus Wien, eine Anzahl Proben mit, die zwar keine sachlich wesentlichen Berichtigungen, aber doch vielfach Glättungen und kleine Ergänzungen darbieten. Über die Arbeit selbst schreibt Hr. HUMANN: •Es zeigte sich sogleich, wie nothwendig für die Collation ein Philologe war und zwar ein solcher, der sich speciell mit dem Monument befasst hat. Der gelbe Ton des Marmors ist in den Buchstaben intensiver als auf der Fläche, wahrscheinlich weil sich das die Wand herablaufende mit Kalk (Marmor) theilweise gesättigte Regenwasser in den Buchstaben in grösserer Quantität aufgehalten und dort durch

Verdunstung mehr Niederschlag bewirkt hat, als auf der Fläche. Nun ist der Marmor stellenweise so tief abgepickt als die Schrift ging, anscheinend um sie unleserlich zu machen. Hier nun haben sich auf der weissen abgepickten Fläche die Tiefen der Buchstaben als gelbe Striche theilweise erhalten. Diese farbigen Striche giebt der Gipsabguss nur unvollkommen wieder. Um möglichst sicher zu gehen controliren DOMASZEWSKI und ich solche zweifelhafte Stellen und bemerken, wo die Lesung uns beiden sicher erscheint. — Hrn. HUMANN ist es ferner gelungen, bei Angora selbst ein Gipslager aufzufinden und daraus sich für seine künftigen Reisezwecke mit einem hinreichenden Vorrath des Abformungsmaterials zu versehen.

Hr. KIEPERT fügte dieser Mittheilung noch Folgendes hinzu:

Hr. HUMANN hat seinem Berichte bereits eine topographische Skizze beigelegt, welche aus den unterwegs gemachten Aufnahmen auf dem Maassstab 1:200000 reducirt ist und zunächst den Weg von der Umgebung von Brussa (wo sie sich an frühere Detailaufnahmen anschliesst) bis zum Übergang über den Sakaria ein paar Tagereisen von Angora enthält. Nicht allein das seit BUSBEQ's und DERNSCHWAMM's Zeit (1515) erst durch die österreichischen Eisenbahn-Ingenieure (1872) wieder besuchte, aber damals nicht aufgenommene Thal des Pursak, des antiken Tymbres, Nebenflusses des Sangarius, sondern auch ein bedeutender Theil dieses Hauptthales selbst sind darin zum erstenmal richtig — wie wir bei HUMANN's bekannter Meisterschaft in topographischen Zeichnungen voraussetzen müssen — zur Darstellung gebracht und so in dem noch immer ziemlich chaotischen Gesamtbild Kleinasiens wieder eine empfindliche Lücke ausgefüllt.

3. Hr. AUWERS übergab den zweiten Band seines Werkes: „Neue Reduction der BRADLEY'schen Beobachtungen aus den Jahren 1750 bis 1762“.

4. Durch Ministerialverfügung vom 7. und 8. Juli werden 600 Mark für Band IV des Vinaya Pitakam, herausgegeben von Hrn. Prof. Dr. OLDENBERG, und 3000 Mark Hrn. MOMMSEN für die Supplemente des Corpus Inscr. Latinarum für 1882/83 angewiesen.

Über die Stirnlappen des Grosshirns.

Von HERMANN MUNK.

1. Einleitung.

Als in der Reaction gegen GALL's Organologie der Versuch und die pathologische Erfahrung übereinstimmend dargethan hatten, dass die intellectuellen Fähigkeiten (Vorstellen, Erinnern, Denken) an jeder Stelle der Oberfläche der Grosshirn-Hemisphären durch Verletzung geschädigt werden können, sah man allgemein die Intelligenz als an das ganze Grosshirn geknüpft an.¹⁾ Von einer ausschliesslichen oder selbst nur besonders engen Beziehung der Vorderlappen des Grosshirns zur Intelligenz wusste fortan lange Zeit hindurch weder Physiologie noch Pathologie, und bloss ausserhalb der Wissenschaft behielt der Stirntheil des Gehirns seine hohe Bedeutung weiter bei. Aber neuerdings ist der Glaube an jene Beziehung in der Physiologie wieder aufgelebt in Verbindung mit der Entwicklung, welche die FRITSCH-HRTZIG'schen Entdeckungen vom Jahre 1870 für die Lehre von der Grosshirnrinde mit sich brachten.

Wiederum sehen wir Hr. HRTZIG²⁾ an der Spitze stehen. Für die Scheitellappen des Grosshirns hatte er im Verein mit Hr. FRITSCH Beziehungen zu den Muskelbewegungen durch den Versuch aufgedeckt. In die Hinterhaupts- und Schläfenlappen hatte vorher Hr. MEYNERT die Endausbreitungen der Sinnesnerven anatomisch verfolgt. »Wenn man also«, sagte Hr. HRTZIG, »die sinnlichen Wahrnehmungen in die hinteren Regionen verlegen will, so bleibt für die höheren psychischen Thätigkeiten nur das Stirnhirn übrig, und es würde sich fragen, ob noch anderweitige Thatsachen existiren, welche die Localisation dieser Functionen an diesen Ort unterstützen.« Solche Thatsachen sah er einmal darin, dass nach den pathologischen Erfahrungen über die

¹⁾ Vgl. JOH. MÜLLER, Handbuch der Physiologie des Menschen. Bd. I. 4. Auflage. Koblenz 1844. S. 729—30. — LONGER, Anatomie und Physiologie des Nervensystems. Übersetzt von HEIN. Leipzig 1847. Bd. I. S. 512—62. — VULPIAN, Leçons sur la physiologie du système nerveux. Paris 1866. p. 706—20.

²⁾ Untersuchungen über das Gehirn. Berlin 1874. S. 127—8. — Verhandlungen der Berliner Anthropologischen Gesellschaft, Sitzung vom 14. März 1874. Zeitschr. f. Ethnologie, Bd. VI. S. 46—7.

Aphasie »die vorzüglichste menschliche Fähigkeit, die der selbständig Sprachbildung, im Stirnhirn ihr Organ besitzt«, und zweitens in der relativen Entwicklung des Stirnhirns bei den verschiedenen Thieren. »Die Intelligenz im höheren Sinne ist von Alters her in den Stirnlappen verlegt worden, und stets wurde mit dieser Vorstellung die Idee mächtigerer Entwicklung der Stirn und der unmittelbar von ihr bedeckten Organgruppen verknüpft... Vergleicht man (nun) nur dem Verhalten des Substrates die Lebensäußerungen desselben — der Seelenthätigkeiten, so scheint sich eine Parallele, wenn auch nur grossen Zügen, fast von selbst aufzudrängen. Die geringe Entwicklung bei gleichwohl gut zu unterscheidender Anlage des Stirnlappens würde der mangelhaften Ausbildung höherer Seelenthätigkeiten bei Hunden wohl entsprechen; in absteigender Linie hat die viel weniger intelligente und bildungsfähige Katze bereits einen beträchtlich reduzierten Stirntheil aufzuweisen.« In aufsteigender Linie dagegen zeigt die niederen Affen »eine erheblich vorgeschrittene Anlage des Stirnhirns, wenn auch die Ausbildung desselben im höchsten Grade dürftig ist; (und) folgt man der Stufenleiter der Affen bis hinauf zu den Anthropoiden, so nimmt das Stirnhirn fortwährend an Masse und Gliederung zu.« Kurz nachdem er sich so geäussert, hat der Hr. Hirtzig auch noch an Hunden Exstirpationen am Stirnhirn ausgeführt: »es erschien niemals irgend eine Functionsstörung, noch die Verletzung ganz oberflächlich gewesen sein oder den Hirntheil seiner ganzen Tiefe betroffen haben.«¹⁾ Dadurch fanden offenbar jene Anschauungen eine weitere Stütze, insofern es nie zu motorischen oder sensorischen Störungen gekommen war; und dass intellektuelle Störungen nicht bemerkt worden waren, durfte man vielleicht den Umstände zuschreiben — Hr. Hirtzig selber hat sich nicht darüber ausgesprochen —, dass solche Störungen beim Hunde zu schwer constataren waren.

Etwa gleichzeitig war aber auch Hr. FERRIER, nur auf einem anderen Wege, zu einem entsprechenden Ergebnisse gelangt. Er hatte an Affen die Exstirpation beider Stirnlappen einen blödsinnigen Zustand, eine ausgesprochene Schädigung der Intelligenz und der Fähigkeit zu aufmerksamer Beobachtung²⁾ herbeiführen sehen. Gesicht, Gehör, Geschmack, Tastsinn, Geruch und auch die Fähigkeit zu Willensbewegungen waren in voller Integrität erhalten, ebenso der Appetit, die Instinkte und die Fähigkeit zu Ausdrucksbewegungen. Aber eine entschiedene Alteration im Charakter und Benehmen war

¹⁾ REICHERT's und DU BOIS-REYMOND's Archiv, 1874. S. 402—9.

²⁾ Proceed. of the R. Soc. of London. Vol. XXII. p. 230. (March 5, 1874—Vol. XXIII. p. 431. (May 13, 1875.) — Philos. Transact. 1875. Part II. p. 487—

Thiere war zu bemerken. Statt dass sie wie zuvor sich für ihre Umgebung lebhaft interessirten und neugierig alles, was ihnen zur Beobachtung kam, betrachteten, blieben sie nun apathisch, stumpf oder schlaftrunken und antworteten bloss auf frische Reize, oder aber sie vertauschten diese Gleichgültigkeit mit Ruhelosigkeit und zwecklosem Hin- und Hergehen. Obwohl sie ihre Intelligenz nicht eingebüsst hatten, so schienen sie doch die Fähigkeit zu intelligenter und aufmerksamer Beobachtung verloren zu haben.¹⁾ An die Stirnlappen müssten deshalb, meinte Hr. FERRIER, die Hemmungscentren, welche ihre Thätigkeit durch innere Änderungen in den motorischen Centren zur Erscheinung bringen, localisirt werden — als die physiologischen Substrate der psychologischen Fähigkeit der Aufmerksamkeit, mit welcher die Intelligenz und das Denken im geraden Verhältnisse sich entwickelt zeigen. Das Vermögen der Aufmerksamkeit und Gedankensammlung sei auch gering und unvollkommen bei Idioten mit mangelhafter Entwicklung der Stirnlappen; und Krankheiten dieser Theile seien besonders ausgezeichnet durch Blödsinn oder allgemeine geistige Degradation. Weiter seien die Frontalregionen nur klein oder rudimentär bei den niederen Thieren, deren Intelligenz und Reflexionskraft auch diesem Zustande angemessen sei. Dagegen sei die Entwicklung der Stirnlappen am vorgeschrittensten beim Menschen, der ja die höchste Intelligenz besitze; und nehme man zwei Menschen zum Vergleiche, so sei die höchste Intelligenz bei jenem vorhanden, welcher die grösste Ausbildung der Stirnlappen zeige. »Ich denke,« so schloss Hr. FERRIER, »die Phrenologen haben guten Grund, die Reflexionsfähigkeit in die Stirngegend zu verlegen, und es ist in der That nicht unwahrscheinlich, dass die besondere Ausbildung bestimmter Punkte des Stirnhirns auch eine Anzeige von Concentrationskraft und intellectueller Leistungsfähigkeit in gewissen Richtungen abgebe.«²⁾

Ich unterschätzte den Werth dieser Ausführungen nicht, als ich wenige Jahre später bei meiner ersten Musterung der Grosshirnrinde auch die Stirnlappen des Hundes und des Affen in den Bereich der Untersuchungen zu ziehen hatte. Aber der vorurtheilsfreien Betrachtung stellten sich die Dinge ganz anders dar. Durch die Verstümmelung der Stirnlappen fand ich Bewegungsstörungen bedingt, beim Hunde des Rumpfes, beim Affen des Nackens und des Rumpfes; und nur auf dieser Grundlage boten sich intellectuelle Störungen dar, Störungen, welche im übrigen nicht grösser waren, als sie, jedesmal

¹⁾ Philos. Transact. 1875. Part II. p. 440—1. — FERRIER, The functions of the brain. London 1876. p. 231—2. (Übersetzt von OBERSTEINER. Braunschweig 1879. S. 256—8.)

²⁾ Functions etc. p. 287—8. (Übersetzung, S. 324—5.)

bloss in anderer Weise begrenzt, auch bei der Verstümmelung der anderen Grosshirnlappen sich ergeben hatten. Die Rinde des Stirnlappens war demgemäss der Fühlsphäre zuzurechnen, als welche ich vorher schon die Rinde des Scheitellappens erkannt hatte; und wie diese letztere die Armregion, die Beinregion, die Kopfregion u. s. w. so machte die erstere Rinde die Rumpf-, bezw. die Nacken-Rumpfregion der Fühlsphäre aus.¹⁾

Seitdem sind hierhergehörige Versuche noch von H. DE BOYER und von Hrn. MOOLMANN angestellt worden. H. DE BOYER hat sich auf die Angabe beschränkt, dass die Zerstörung eines grossen Theils des Stirnlappens an Hunden nicht von Bewegungsstörungen begleitet war. Über die MOOLMANN'schen Ergebnisse hat Hr. GOLTZ²⁾, in dessen Laboratorium die Versuche ausgeführt worden waren, folgendermassen berichtet: »Die dauernden Störungen nach der Zerstörung eines Stirnlappens sind weit geringfügiger als die nach Eingriffen in andere Abschnitten der grauen Rinde. Nach theilweiser Wegnahme des Stirnlappens sind die Folgen unbedeutend. Nach möglichst vollständiger Wegnahme beider Stirnlappen sind die Störungen ähnlich denjenigen wie nach Operationen innerhalb des Scheitellappens.« Damit soll jedoch keinerlei Bestätigung meiner Ermittlungen gegeben sein; der Hr. GOLTZ lässt Verletzungen der Scheitellappen ebensowohl wie Verletzungen der anderen Lappen die verschiedenartigsten Störungen zugleich — Bewegungsstörungen und Sehstörungen und Hörstörungen und andere Störungen — zur Folge haben.

Öfter ist der HITZIG-FERRIER'schen Auffassung von den Functionen der Stirnlappen erneuter Ausdruck gegeben worden. In der Regel ist dies mehr beiläufig geschehen, so von Hrn. RICHTER³⁾, H. DE BOYER (Hrn. DURET⁴⁾), Hrn. GRASSET⁵⁾ u. A.⁶⁾ Nur Hr. WUNDT⁷⁾ hat den Gegenstand eingehender behandelt. Nach ihm würde das Stirnhirn »die

¹⁾ Verhandlungen der Berliner Physiologischen Gesellschaft, 1878/79 No. 4 u. (Sitzung vom 29. November 1878). — DU BOIS-REYMOND's Archiv, 1878 S. 550; 555 — H. MUNK, Über die Functionen der Grosshirnrinde. Berlin 1881. S. 61; 69 —

²⁾ Études cliniques sur les lésions corticales des hémisphères cérébraux. Paris 1879. p. 46.

³⁾ PFLÜGER's Archiv. Bd. XX. S. 38—9.

⁴⁾ Structure des circonvolutions cérébrales (anatomie et physiologie). Traité d'agrégation. Paris 1878. p. 162—3.

⁵⁾ L. c. p. 73—5.

⁶⁾ Étude générale de la localisation dans les centres nerveux. Paris 1880. p. 116—7.

⁷⁾ Des localisations dans les maladies cérébrales. 3^{me} édit. Paris 1880. p. 116—7.

⁸⁾ Ich citire hier nur, was mir gerade in der letzten Zeit an Lesefrüchten zu gefallen ist: DUMONTFALLIER et MAGNIN, Compt. rend. 1882, t. 94. No. 2. — ALTHEIM, ERLKENMEYER's Centralblatt für Nervenheilkunde, 1882. No. 7. — MENDEL, Neurologisches Centralblatt, 1882. No. 11. S. 244.

⁹⁾ Grundzüge d. physiologischen Psychologie. 2. Aufl. Leipzig 1880. Bd. I. S. 216—

physiologische Substrat sein für gewisse an die höheren Entwicklungsformen des Bewusstseins gebundene Vorgänge«. Er fusst dafür besonders auf den pathologischen Erfahrungen am Menschen, nach welchen Verletzungen der Stirngegend, selbst wenn sie mit dem Verluste ansehnlicher Massen von Hirnsubstanz verbunden waren, ohne alle Störungen von seiten der Bewegungs- und Sinnesorgane verliefen, aber bleibende Störungen der geistigen Fähigkeiten und Eigenschaften — bald kindische intellectuelle Äusserungen, bald Abnahme des Gedächtnisses, bald Unfähigkeit die Aufmerksamkeit zu fixiren, bald gänzliche Willenlosigkeit — mit sich brachten. Damit stehe in Übereinstimmung, dass jene pathologischen Rückbildungen des Gehirns, welche die Herabsetzung der Intelligenz und des Willens im paralytischen Blödsinn begleiten, vorzugsweise die Stirnlappen betreffen. Endlich spreche noch für eine nähere Beziehung des Stirnhirns zu den geistigen Thätigkeiten, dass im allgemeinen in der Thierreihe die intellectuelle Entwicklung mit der Ausbildung des Vorderhirns gleichen Schritt hält, und dass beim Menschen vorzugsweise die Faltung des Vorderhirns ein Zeichen hervorragender Geisteskräfte zu sein scheint. Die Stirnregionen dürften danach als die Träger derjenigen physiologischen Vorgänge zu betrachten sein, welche die Apperception der Sinnesvorstellungen begleiten: die Sinneseindrücke würden so lange bloss zur Perception gelangen, als die centralen Erregungen auf die eigentlichen Sinnescentren beschränkt bleiben, dagegen würde ihre Erfassung durch die Aufmerksamkeit oder die Apperception stets mit einer gleichzeitigen Erregung von Elementen der Stirnregion verbunden sein. Die dominirende Bedeutung des Stirnhirns (des Organs der Apperception) würde darauf beruhen, dass seine Ausschaltung alle Apperceptions-Processse aufhebt, während die Beseitigung irgend eines anderen (Sinnes- oder Bewegungs-) Centrums immer nur einen Theil der Apperceptionen (die Ausschaltung z. B. des sensorischen Sprachcentrums die Apperception der Worte, nicht aber die von Gesichtsbildern und sogar von einfachen Schalleindrücken) unmöglich macht. Beachtet will aber noch sein, dass nach Hrn. WUNDT nach allen Erscheinungen, welche bei der Thätigkeit der Apperception sich darbieten, dieselbe durchaus zusammenfällt mit jener Function des Bewusstseins, welche wir mit Rücksicht auf die äusseren Handlungen als Willen bezeichnen¹⁾; so dass mit der Ausschaltung des Stirnhirns auch der Wille aufgehoben sein würde.

¹⁾ Ebenda, Bd. II. S. 210. Vergl. auch S. 206; 211; Bd. I. S. 492. — Bd. I. S. 219—21 giebt WUNDT noch eine durch ein Schema versinnlichte Hypothese über den die Apperception begleitenden physiologischen Vorgang; doch habe ich weder diese Hypothese noch mehrere andere die Apperception betreffende Ausführungen zu verstehen vermocht. Soviel ich sehe, ist WUNDT hinsichts seiner »Apperception«

Indessen habe ich selber, da ich der ersten Musterung der Grosshirnrinde eine genauere Untersuchung derselben folgen liess, nicht bloss vielfach meine früheren Ergebnisse wiedererhalten, sondern ich habe auch weitere und vollkommenere Erfahrungen, die Stirnlappen betreffend, gewonnen. Das so gesammelte Material, das mir mehr als ausreichend erscheint, um die Functionen der Stirnlappen des vielen Hypothetischen zu entkleiden und der Rinde dieser Lappen die richtige Stellung innerhalb der ganzen Grosshirnrinde anzuweisen will ich hier im Zusammenhange darlegen.

2. Exstirpationsversuche am Hunde.

Wo die Hemisphäre des Hundes, nachdem sie vom vorderen Ende aus allmählich an Breite gewachsen, plötzlich beträchtlich lateralwärts vorspringt, dringt zugleich medialwärts, und zwar schräg nach hinten zu, eine im Bogen mit der Convexität nach vorn verlaufende Furchung tief in die Substanz ein und bildet, bis zur Falx verlängert gedacht, die gewissermassen natürliche Grenze zwischen Stirn- und Scheitellappen. Hr. PANSCH¹⁾ hat die Furchung als vordere oder senkrechte Hauptfurchung bezeichnet; ich will sie die Hauptstirnfurchung nennen. Weniger willkürlich, als sonst die Grosshirnlappen, ist danach der Stirnlappen des Hundes als der schmale vor der Hauptstirnfurchung gelegene Theil der Hemisphäre, natürlich ohne den Tractus und den Bulbus olfactorius, zu definieren.

Der grossen Oberfläche und geringen Breite gemäss enthält dieser Stirnlappen nur verhältnissmässig wenig weisse Substanz in der Gestalt etwa einer dünnen, von vorn nach hinten an Breite und Dicke wachsenden verticalen Scheibe, so dass hier, im Gegensatze zu den anderen Grosshirnlappen, von einer Entfernung der grauen Schale ohne Zerstörung des weissen Kerns nicht wohl die Rede sein kann. Deshalb und weil bei der tiefen Lage des Lappens die untere Hälfte desselben, wenn das Versuchsthier erhalten werden soll, sich nicht freilegen lässt, habe ich schon früher, statt die Rinde des Stirnlappens zu exstirpiren, diesen Lappen abgetrennt²⁾. Ich führte dazu das Messer dicht vor dem vordersten Punkte der Hauptstirnfurchung senkrecht zur Falx von oben nach unten durch den Stirnlappen; und ich hatte mit dem Operationsverfahren, wie ich es damals beschrieben auch wenn beide Stirnlappen angegriffen wurden, die besten Erfolge

nicht zur Klarheit gekommen und hat darunter ganz verschiedene Vorgänge zusammengeworfen.

¹⁾ Morpholog. Jahrb. Bd. 5. S. 201 ff.

²⁾ Functionen u. s. w. S. 69—70; vergl. Fig. 3, S. 62.

indem nicht bloss alle Thiere erhalten blieben, sondern auch die **reactive** Entzündung immer sehr mässig war. Aber ich habe mich **damit** noch nicht zufrieden geben dürfen. Da die Hauptstirnfurche **in** einem nach vorn convexen Bogen verläuft und noch dazu nicht **senkrecht** zur Falx, sondern schräg nach hinten zu einschneidet, war **die** hinterste Partie des Stirnlappens nicht mit abgetrennt worden. **Ausserdem** hatte die Führung des Messers von oben nach unten es **mit** sich gebracht, dass immer die tiefste mediale Partie des Stirnlappens, bald nur in geringer, bald aber auch in grösserer Ausdehnung nicht durchschnitten und so eine Verbindung des abgetrennten **Stückes** mit dem übrigen Grosshirn erhalten geblieben war. Diese **Mängel** habe ich zu beseitigen mich bemüht, und folgendes Verfahren **hat** dafür als das brauchbarste sich bewährt.

Nachdem man mittels der kleinen convexen Säge oder des Trepanns in die Stirnhöhle eingedrungen ist, wird das Dach derselben in **ganzer** Ausdehnung abgetragen, an ihrer hinteren oder inneren Wand **in** der Gegend der Hauptstirnfurche mit Zange und Meissel eine erste **kleine** Öffnung in der Schädelkapsel hergestellt und von dieser **Öffnung** aus mit der Zange der Knochen über der Hauptstirnfurche und einige Millimeter weit zu jeder Seite derselben weggebrochen, **bis** am oberen Ende der Öffnung der Sinus sichtbar und am unteren Ende das Dach der Augenhöhle erreicht ist. Dieses Vorgehen ist ungleich **umständlicher** und schwieriger, als wenn man mit einem Sägeschnitte **hinter** der Rückwärtsbiegung des Stirnbeins die Schädelkapsel eröffnet, **bietet** aber die wesentlichen Vortheile dar, dass möglichst wenig vom Scheitellappen freigelegt und ein Hirnvorfall am ehesten verhütet wird. **Alsdann** wird die bis dahin unverletzte Dura vor der Hauptstirnfurche von oben nach unten gespalten und mehrfach so eingeschnitten, **dass** durch Zurückschlagen der Lappen die Hauptstirnfurche in der **ganzen** Ausdehnung der Wunde frei zugänglich wird. Sorgsam ist **dabei** die Verletzung der grossen Vene zu vermeiden, welche in der **Hauptstirnfurche** und ihrer Verlängerung zur Falx verläuft, um dort **in** den Sinus einzumünden. Gerade vor dieser Einmündungsstelle **schiebt** man nun einen dünnen Scalpellstiel zwischen der Falx und **der** medialen Hemisphärenseite vertical zum Sinus in die Tiefe, **bis** **man** auf Knochen stösst, und lässt man zwischen dem Scalpellstiele **und** der medialen Hemisphärenseite das Messer flach mit nach hinten **gerichteter** Schneide nachfolgen. Hat auch die Spitze des Messers **den** Knochen erreicht, so kehrt man die Schneide gegen die mediale **Hemisphärenseite** und zieht das Messer dicht vor der Hauptstirnfurche, **immer** deren Verlaufe folgend, quer durch die Hemisphäre, so zwar, **dass** die Spitze des Messers die Fühlung mit dem Knochen behält.

Abgeschnitten ist dann der ganze Stirnlappen, wie ich ihn oben definierte, mit Ausnahme eines ganz kleinen, am weitesten nach hinten aussen und unten sich erstreckenden dreieckigen Zipfels, welchen das untere Endstück der Hauptstirnfurche und die Riechfurche begrenzt und mit durchschnitten ist der Tractus olfactorius. Das letztere lässt sich aber vermeiden, wenn man ein bauchiges Messer benutzt und bei der Schnittführung die Spitze des Messers ein Stück zurückbleiben lässt; es überspringt dann die Messerspitze an der Schädelbasis die Vertiefung, in welcher der Tractus olfactorius gelegen ist und dieser wird nur angeschnitten. Ein Schwämmchen auf die Schädelücke gelegt, bringt die Blutung zum Stehen, und nach Reinigung der Stirnhöhle wird die Wunde durch Nähte geschlossen. Den abgeschnittenen Stirnlappen kann man auch noch entfernen, indem man ihn sogleich nach der Durchschneidung der Hemisphäre von der Schnittstelle aus mit dem Scalpellstiele heraushebt; doch ist in diesem Falle die Blutung schwerer zu stillen, und es tritt leichter ein Hirnvorfall ein. Sollen beide Stirnlappen auf einmal abgetragen werden, so verschafft man sich nach der Eröffnung der Schädelkapsel den Zugang zur zweiten Hemisphäre bequemer, indem man über den Sinus hinweg mit der Zange vorgeht; im übrigen erfährt das Verfahren keinerlei Veränderung. Natürlich stellt man auf beiden Seiten die nöthige Knochenücke her, bevor man die Dura angreift, und schreitet man erst nach beiderseitiger Spaltung der Dura zur Abtrennung der Stirnlappen.

Wenn dem Schnitte durch die Hemisphäre eine starke Blutung folgt, ist fast regelmässig das Thier verloren, indem das Blut aus der Basis zwischen Dura und Pia weit nach hinten dringt; das aus der Schädelücke hervortretende Gehirn verräth den Vorgang, der in der Tiefe statthat. Auch gehen auf dieselbe Weise durch Nachblutungen aus den Hirngefässen Versuchsthiere zugrunde, bei welchen die Blutung zuerst nur mässig war. Anderemal wiederum wird der Versuch vereitelt, indem in den nächsten Tagen eine Encephalomeningitis von der Wunde aus weit sich verbreitet. Endlich stellen sich auch noch zu einer späteren Zeit nach soweit gutem Befinden plötzlich Krämpfe und Coma ein, was eine rothe Erweichung zum Durchbruch in den Ventrikel geführt hat. So bringt das geschilderte Verfahren wie bei der Grösse und Lage der Verletzung nicht anders zu erwarten auch bei sauberstem Operiren ansehnliche Verluste mit. Aber in den übrigen Fällen kommen sehr schön zur Heilung, und zwar so einfach und rasch wie nach einem leichten Eingriffe. Öfters bedarf es selbst nicht der Öffnung der Hautwunde, um die Wundsecrete zu entlassen, da der Abfluss ausreichend durch die Nase erfolgt; und stets ist die

2—3 Wochen die Wunde vollkommen vernarbt, auch wenn beide **Stirnlappen** abgetrennt sind. Mit diesen Thieren, welche durch **Monate** bei ungestörter Gesundheit sich erhalten lassen, ist das allen **Anforderungen** entsprechende Material gegeben, die Folgen der **Abtragung** der Stirnlappen zu studiren.

Die Hunde, besonders diejenigen, welche beide Stirnlappen auf **einmal** verloren haben, sind wohl in der ersten Zeit etwas träge und **theilnahmlos**, sie laufen und springen nicht, sondern gehen bloss, **sie** liegen viel, sie verkriechen sich gern und sind schwer hervor-zulocken, — was alles die Nachwirkung der tiefen Narkose, der Blutverlust und die reactive Entzündung nur zu gut verständlich **machen**; aber nach 3—5 Tagen sind sie so munter wie zuvor, und bald laufen sie, ja tummeln sie sich in alter Weise. Mit der Durchschneidung beider Tractus olfactorii ist natürlich der Geruchssinn fortgefallen; aber wenn jene Tractus, wie in fast allen meinen Versuchen, bloss angeschnitten sind, lässt höchstens der auf beiden Seiten zugleich verstümmelte Hund den Geruchssinn in den ersten Tagen vermissen, sonst riechen die Hunde alle nicht merklich anders als in der Norm. Im Bereiche des Gesichts- und des Gehörssinnes thun sich zu keiner Zeit und durch keinerlei Prüfung irgendwelche Störungen kund; und wie die Hunde alles sehen und erkennen, alles hören und den Zuruf verstehen, so schmecken sie nach wie vor, und auch der Gefühlssinn der Haut bietet keine Abweichungen dar, indem die Berührung überall wie gewöhnlich gefühlt und richtig localisirt wird. Unverändert erscheinen ferner die Gemeingefühle; und was man gewöhnlich unter der Intelligenz der Thiere versteht, ist derart ungeschädigt, dass jahrelange Beobachtungen und Prüfungen nicht einen einzigen Zug mich haben entdecken lassen, durch welchen diese Hunde von unversehrten Hunden sich unterschieden. Dass die vegetativen Functionen alle normal ablaufen, brauchte kaum bemerkt zu werden. Aber auch Gehen, Laufen, Springen; die Bewegungen der Augen, der Ohren und der Zunge; Bellen, Beissen, Fressen, Saufen; die Bewegungen des Kopfes und des Halses, der Extremitäten und des Schwanzes kommen ganz normal zur Ausführung; und überhaupt lassen alle willkürlichen und unwillkürlichen Bewegungen gar keine Abnormitäten erkennen — mit Ausnahme der Bewegungen des Rumpfes. Hier am Rumpfe allein stellen sich Störungen in folgender Weise heraus.

Wenn der Hund, dem ein Stirnlappen, z. B. der linke, abgetragen ist, sich selbst überlassen ruhig geht und die Richtung ändernd einen grösseren Bogen beschreibt, so geht er dabei ebensowohl rechts- wie linksherum; aber wenn er kurz wendet, dreht er sich haken-

förmig linksherum, so dass die Rücken-Lendenwirbelsäule sich in der Convexität nach rechts krümmt, und jedesmal dreht er sich linksherum, nie rechtsherum. Je enger der Raum ist, in welchem der Hund sich bewegt, desto öfter wiederholen sich diese Drehungen immer in derselben Weise, auch dann, wenn zur rechten Seite (des Hundes) das Terrain ganz frei ist, während die Linksdrehung die Wand, den Schrank, den Tisch u. dgl. streifen lässt. Ruft man den stehenden oder gehenden Hund von hinten, so dreht er sich jedesmal hakenförmig linksherum; und wenn man selbst an seiner rechten Seite hinter ihm steht, so dreht er wohl manchmal zuerst Kopf und Hals weit nach rechts, aber dann nimmt er dieselben zurück, und es folgt die Linksdrehung. Führt man, vor dem Hunde stehend, auf seiner linken Seite ein Fleischstück langsam im Bogen vom After nach der Schwanzwurzel hin, so dreht sich der Hund allmählich mit seiner ganzen Wirbelsäule hakenförmig nach links, ohne die Extremitäten zu bewegen, und erreicht das Fleischstück mit der Schnauze über der Schwanzwurzel, ja öfters sogar noch rechts von derselben. Bewegt man dagegen das Fleischstück ebenso an der rechten Seite des Hundes, so dreht derselbe zunächst Kopf und Hals weit nach rechts; dann aber macht er entweder plötzlich die hakenförmige Drehung linksherum und sucht so das Fleischstück zu erhaschen, oder er wirft sich zu dem Zwecke ebenso plötzlich mit zeigerartiger Drehung rechtsherum, indem er sich im Becken dreht und beide Vorderextremitäten zugleich nach rechts bewegt. Läuft der Hund, so beschreibt er grössere Bögen sowohl rechts- wie linksherum, kleine Bögen aber nur linksherum und wenn ihn einmal der Zuruf, die offene Stallthür, der drohende Stoß u. dgl. rechtsum kurz zu wenden veranlassen, so wirft er sich ausnahmslos zeigerartig durch Drehung im Becken herum, so dass die ungeschickliche Wendung ihn öfters stolpern macht und hin und wieder sogar in eine Falle bringt. So zeigt sich überall und immer wieder, dass der Hund nicht mehr im Stande ist, unter Krümmung der Rücken-Lendenwirbelsäule sich nach rechts zu drehen. Und da die passive Beweglichkeit der Wirbelsäule unversehrt ist, da infolge einer Verstellung der Vorderextremitäten nach rechts hinten die Wirbelsäule nach links convex wird, so muss der Hund die Fähigkeit verloren haben, durch diejenigen willkürlichen Contraction seiner Rumpfmuskulatur, durch welche die Rücken-Lendenwirbelsäule mit der Convexität nach links gekrümmt wird. Diese Störung der willkürlichen Bewegung bleibt für die Dauer bestehen; durch Monate sieht man nichts an dem Hunde sich ändern, als dass er in späterer Zeit hin und wieder auch bei Gehen sich im Becken rechtsherum dreht, wenn plötzlich ein besonderer Anlass zur kurzen Wendung nach dieser Seite hin gegeben

Der Hund, welchem beide Stirnlappen abgetragen sind, lässt dieselbe Störung der willkürlichen Bewegung an beiden Seiten des Körpers erkennen: er dreht sich ohne Unterschied rechts- wie linksherum; aber alle seine Drehungen, ob er steht, geht oder läuft, vollziehen sich zeigerartig durch Drehung im Becken, und eine seitliche Krümmung der Rücken-Lendenwirbelsäule, eine hakenförmige Drehung nach rechts oder links kommt niemals vor. Dazu findet sich hier noch, im Gegensatz zu dem einseitig verstümmelten Hunde, dessen Körperhaltung unverändert ist, eine abnorme Wölbung der Rücken-Lendenwirbelsäule. Anfangs, so lange der Hund nur langsam oder doch zumeist langsam sich bewegt, ist stets beim Stehen wie beim Gehen eine geradezu katzenbuckelartige Krümmung des Rückens vorhanden, dergemäss die hinteren Extremitäten ansehnlich über die Norm den vorderen genähert sind. Später ist die abnorme Wölbung des Rückens weniger auffällig. Sie ist dann nicht zu constatiren, während der Hund rasch geht oder läuft, auch nicht, wenn er nach solchem Gehen und Laufen zum Stehen gekommen ist; aber wenn er steht, nachdem er sich vom Lager erhoben hat, und so lange er langsam geht, tritt sie immer wieder deutlich hervor, und so lässt sie durch Monate hindurch sich verfolgen.

Abweichungen vom geschilderten Verhalten kommen nicht anders vor, als dass einzelne Hunde erst später nach der Operation, erst in vier bis acht Tagen, ihre alte Munterkeit wiedergewinnen und während dieser Zeit noch weitere Störungen zeigen. Linksseitig operirte Hunde tragen den Kopf nach links gedreht und drehen ihn nur selten und immer nur auf besonderen Anlass, z. B. wenn ein starkes Geräusch zu ihrer Rechten entsteht, in die Normalstellung oder noch etwas weiter nach rechts. Beiderseits verstümmelte Hunde tragen den Kopf gesenkt; sie fassen die Fleischstücke schlecht mit den Kiefern, und noch ungeschickter und mühsamer schieben sie dieselben rückwärts in den Schlund; auch saufen sie schlecht, indem sie nicht die Flüssigkeit mit hohlgemachter Zunge nach hinten werfen, sondern bloss lecken. Alle diese Störungen sind um den dritten Tag nach der Operation am ausgeprägtesten vorhanden und nehmen dann rasch ab, bis sie spätestens am siebenten Tage verschwunden sind. Sie können daher nur darauf beruhen, dass die mit der Heilung der Wunde verknüpfte reactive Entzündung in diesen Fällen etwas weiter als sonst von der Schnittstelle aus sich verbreitet, aber auch bald bis auf die sonstige Ausdehnung sich wieder vollkommen zurückgebildet hat. Und so gewinnen diese Fälle noch ein besonderes Interesse; denn indem sie die Functionen der nächsten Nachbarschaft unseres Stirnlappens erkennen lassen, bestätigen sie, was unsere früheren Exstirpationsversuche ergeben haben,

dass unmittelbar hinter der Hauptstirnfurche die Nacken- (Hals-) und die Kopffregion der Fühlspähre gelegen sind.

Tödtet man die Hunde nach mehreren Wochen oder Monaten so erhebt man immer im wesentlichen denselben Befund: die weichen Bedeckungen sind an der Operationsstelle durch eine feste derbe Masse ersetzt, von welcher an der Schnittstelle ein dünner sichelartiger Fortsatz, jedoch nicht weit, in die Hemisphäre dringt; und mit dieser fibrösen Substanz ist die Hemisphäre verwachsen, welche in der zunächst angrenzenden dünnen Schicht, dann aber auch an der Schnittstelle in einer durch die ganze Dicke der Hemisphäre bis auf den Tractus olfactorius sich erstreckenden Scheibe, beidemal in noch nicht 1^{mm} Dicke, gelb erweicht sich zeigt; davor und dahinter ist alles normal, nur ist der Stirnlappen mehr oder weniger verkleinert. Auch trifft man die Wunde regelmässig in derartiger Vernarbung begriffen an, wo der Hund in der zweiten Woche nach soweit gutem Befinden plötzlich unter Krämpfen und Coma zugrunde gegangen ist; das Gehirn bietet bloss die Abweichung dar, dass in der Tiefe der Wunde dort, wo der Schnitt dem Ventrikel sehr nahe gekommen ist, eine eng begrenzte rothe Erweichung ungefähr trichterförmig in den Ventrikel und manchmal daneben noch in den Kopf des Nucleus caudatus führt. Dagegen finden sich sehr ausgedehnte rothe Erweichungen an der dem Schnitte benachbarten Hirnsubstanz, die oft zugleich prolabirt ist, und dahinter, mindestens über eine grössere Partie des Scheitellappens sich erstreckend, Hyperämie und Consistenzveränderung der Rinde, Trübung der Pia u. s. w. in allen den Fällen, welche ich oben als dadurch verunglückt zu bezeichnen hatte, dass eine heftige Entzündung infolge der Verletzung weit um sich griff; an solchen Hunden kommen natürlich bei Lebzeiten alle möglichen Bewegungsstörungen zur Beobachtung.

Recht interessant ist beiläufig eine Besonderheit, welche die letzteren Fälle darbieten. Wie ich schon früher wiederholt hervorgehoben habe, ist es nach ausgedehnten Exstirpationen der Grosshirnrinde nichts ungewöhnliches, dass einzelne Thiere von einer weit ausgebreiteten Encephalomeningitis befallen werden; und der eine Theil dieser Thiere stirbt, an dem anderen Theile bildet sich die Entzündung zurück, aber immer nur unvollkommen, so dass die Rinde in der Umgebung der Exstirpationsstelle auf eine grössere Strecke hin, wie die Section jedesmal augenfällig darthut, wesentlich verändert bleibt. Daher sind alle diese Thiere für das specielle Studium der Grosshirnrinden-Functionen unbrauchbar; und wer trotzdem aus den Störungen, welche derlei genesene Thiere zeigen, auf die Functionen der exstirpirten Rindenpartie schliesst, unterliegt einer schweren Täu-

schung. Bei unserer Abtragung beider Stirnlappen ist nun jede solche **Täuschung** einfach dadurch ausgeschlossen, dass hier die weit **ausgebreitete Encephalomeningitis** stets zum Tode führt. Bildet sich nämlich **selbst** die Entzündung zurück, so sind doch die den Stirnlappen **benachbarten** Kopfreionen der Fühlsphäre so lange auf's schwerste **geschädigt**, dass das Thier trotz sichtlich grösstem Verlangen nach Nahrung, **trotzdem** dass es z. B. jedes Fleischstückchen aufsucht und sich mit **der Schnauze** viel an ihm zu schaffen macht, nicht mehr die Nahrung **zu** sich zu nehmen, nicht mehr zu fressen und zu saufen vermag und **in** circa vierzehn Tagen an Inanition zugrunde geht. Sobald an den **Vorderextremitäten** beträchtliche Bewegungsstörungen auftreten, sobald **also** die Entzündung in einiger Stärke die Vorderbeinregionen der Fühlsphären ergriffen hat, ist nach meinen Erfahrungen das Thier dem Tode **verfallen**; man müsste denn künstliche Fütterungen unternehmen, indem **man** die Nahrung in den Rachen einführt, wozu aber die sonstige Unbrauchbarkeit des Versuches nicht verleiten kann.

Ausser den bisher betrachteten vollkommenen habe ich noch die verschiedensten unvollkommenen Abtragungen eines oder beider Stirnlappen am Hunde ausgeführt. Schon wenn man mit dem Schnitte durch die Hemisphäre an seinem medialen und lateralen Ende etwas **weniger genau** dem Verlaufe der Hauptstirnfurche folgt, gehen viel **weniger** Versuchsthiere verloren; und je weiter man sich dort von der Hauptstirnfurche entfernt hält, desto besser sind noch die Chancen der Versuche, bis endlich Querschnitte durch die Hemisphäre vor dem vordersten Punkte der Hauptstirnfurche geführt kaum mehr Verluste zur Folge haben. Dabei kommen die Bewegungsstörungen, bezw. die **abnorme** Haltung des Rumpfes zunächst immer noch derart, wie nach den vollkommenen Abtragungen, zur Beobachtung; und erst wenn der Querschnitt durch die Hemisphäre mehr als 2^{mm} vom vordersten Punkte der Hauptstirnfurche entfernt ist, gestalten sich die Dinge **anders**. Ist der Abstand nur wenig grösser, so zeigen sich **wohl** noch dieselben Störungen in der ersten Zeit nach der Operation, **aber** später sind sie verschwunden; beträgt der Abstand wesentlich **mehr**, so ist der Hund schon von vornherein in seinem Verhalten vom unversehrten Hunde nicht zu unterscheiden. Allerdings habe **ich** manchmal auch dann noch in der Art, wie der Hund sich drehte und dem Fleischstücke nach sich krümmte, gewisse kleinere Abnormalitäten zu entdecken geglaubt; aber sie waren gar zu schwer zu beobachten und liessen sich noch dazu nicht regelmässig wiederfinden, **so** dass nichts darauf zu geben war.

Wo es nicht um eine umfassende Untersuchung zu thun ist, sondern um die einfache Constatirung der Störungen, welche die

Abtragung der Stirnlappen mit sich bringt, und ihre Verschiedenheit von den Folgen anderer (Grosshirnrinden-Exstirpationen) empfiehlt es sich, wie man sieht, gerade das Verfahren zu befolgen, welches ich vor einigen Jahren ausführlich beschrieb¹⁾, und die Hemisphäre dicht vor dem vordersten Punkte der Hauptstirnfurche quer zu durchschneiden. Wenn Hrn. Hertz's und H. de Boyer's an den Stirnlappen verstümmelte Hunde Bewegungsstörungen haben vermischen lassen, so ist in erster Linie daran zu denken, dass die exstirpirten Partien zu klein gewesen sind. Doch ist es auch sehr wohl möglich, dass die Störungen am Rumpfe, da sie ungemein weniger auffällig sind als die Störungen an den Extremitäten und selbst am Nacken nur der Beobachtung sich entzogen haben. Mir selber waren ein Jahr lang an einer ganzen Anzahl von Hunden, welchen ich Stirnlappen abgetragen hatte, die Störungen am Rumpfe völlig gegangen, die ich doch später, nachdem ich sie einmal herausgelassen hatte, in jedem Falle sofort wieder bemerkte.

3. Exstirpationsversuche am Affen.

Beim Affen setzen sich Stirn- und Scheitellappen wie bei den Hunden, von einander ab; und nur in der Richtung der Convexität nach hinten gerichteten Querfurche, wo die rasche Breitenzunahme des vordersten Hemisphärenendes hat, tief in die Substanz einschneidet, ist, soweit erstreckt, eine brauchbare hintere Grenze für den Stirnlappen. Die Furche ist vielfach verschieden als mittlere Stirnfurche, vordere Scheitelfurche u. s. w. bezeichnet. Die vordere Rinde an der oberen Fläche und an dem gelegenen Rande des Stirnlappens hatte ich bei Versuchen²⁾ exstirpiert, und die Folgen waren Beweisen, wie wenn man einem Hunde Stirnlappen der Fühlsphäre zusammen fortgenommen hätte, so hat geringerer Ausdehnung entfernt worden, so hat Beweglichkeit erhalten die einen Male des Halses des Rumpfes, je nachdem die Exstirpation vorn weniger weit sich erstreckt hatte. Das Zusammensetzen jener Rinde aus einer hinteren

¹⁾ Functionen u. s. w. S. 69—70.

²⁾ Functionen u. s. w. S. 72—3. — Ueber die früheren Versuche habe ich fast an

vorderen dem Rumpfe zugehörigen Partie an, und diese beiden Partien schärfer zu scheiden, musste eine erste Aufgabe für die weitere Untersuchung sein. Eine zweite und noch wichtigere Aufgabe aber war, die Exstirpation der Stirnlappen-Rinde überhaupt zu vervollkommen, da bis dahin die ganze Rinde der medialen Seite und ein grosser Theil der Rinde der unteren Seite des Stirnlappens unversehrt stehen geblieben waren. Beide Aufgaben haben sich lösen lassen; und ich will sogleich die Versuche beschreiben, die fast für sich allein allen Anforderungen genügen können, Versuche, welche unseren Stirnlappen-Abtragungen am Hunde sich an die Seite stellen.

Mit einem kleinen Trepan eröffnet man die Schädelkapsel über dem Stirnlappen nicht weit hinter der vorderen Spitze desselben und bricht dahinter mit der Zange in der Richtung auf das mediale Ende der Hauptstirnfurche zu den Knochen weg, bis man die vordere Spitze dieses medialen Endes um etwa 1^{mm} überschritten hat. Für die Orientirung gewährt einen guten Anhalt die von vorn innen nach hinten aussen ziehende Längsfurche, welche im Innern des Hakens der Hauptstirnfurche ihr Ende findet. Danach wird, soweit die Öffnung von vorn nach hinten reicht, das Schädeldach in der ganzen Breite der Hemisphäre abgetragen, so dass einerseits der Sinus in seinem Verlaufe, andererseits der laterale Rand des Stirnlappens zur Ansicht kommt; und die bis dahin unverletzte Dura wird gespalten und in Stücken zurückgeschlagen. Unmittelbar am hinteren Rande der Öffnung geht man nun ebenso, wie ich es oben (S. 759) angab, mit einem dünnen Scalpellstiele zwischen der Falx und der medialen Hemisphärenseite vertical zum Sinus in die Tiefe, bis man auf Knochen stösst, und lässt zwischen dem Scalpellstiele und der medialen Hemisphärenseite das Messer mit nach hinten gerichteter Schneide ebensoweit nachfolgen. Aber man schiebt hier das Messer nicht so, wie oben, gleichfalls vertical zum Sinus ein, sondern ein wenig schief, mit der Spitze nach vorn abweichend, so dass es einen Winkel von 75—80° mit dem Sinus bildet. Unter unveränderter Beibehaltung dieser Neigung des Messers kehrt man dann die Schneide gegen die mediale Hemisphärenseite und zieht das Messer in der Höhe der vorderen Spitze des medialen Endes der Hauptstirnfurche quer durch die Hemisphäre, ohne dass die Spitze des Messers eher die Fühlung mit dem Knochen verliert, als sie den lateralen Rand der Schädelöffnung erreicht hat. Es folgt eine mässige Blutung; und wenn diese durch Andrücken eines Schwämmchens zum Stehen gekommen ist, kann die Wunde durch Nähte geschlossen werden. Ist der Schnitt durch die Hemisphäre richtig geführt, so ist er an der lateralen Seite der Convexität in das laterale Ende der Hauptstirnfurche oder dicht vor dasselbe gefallen, an der

Basis dem Schläfenlappen nahegekommen; und abgetrennt. Hirne ist der ganze Stirnlappen mit Ausnahme des vom Hauptstirnfurche eingefassten Stückes. So kann man auch beide Stirnlappen auf einmal verlieren lassen, indem man die Hemisphären in gleicher Weise operirt; man erspart dann die Trepanation, indem man mit der Knochenzange über den einen hinweg nach der zweiten Seite vordringt.

Das operative Verfahren ist verhältnissmässig leicht und ganz besondere Aufmerksamkeit verlangt der Schnitt durch die Dura mater, welchen man vortheilhaft zuerst an der Leiche üben kann. Sobald das Messer mehr senkrecht geführt wird, ergiesst sich das Blut an der Basis zwischen Dura und Pia nach hinten, und die Thiere gehen zugrunde. Hat man genau in der vorgegebenen Linie operirt, so drohen nur Verluste durch Hirnvorfall, der, zum Tode führt, doch den Versuch immer entwerthet. Man muss vermeiden, durfte schon nicht der abgetrennte Stirnlappen aus der Wundhöhle entfernt werden; aber auch so noch tritt er hin und wieder in den nächsten Tagen ein, und zwar regelmässig, wenn die Thiere aufgereggt und zu heftigen Körperbewegungen veranlasst werden. Deshalb geboten, die Thiere in der ersten Zeit nach der Operation soweit es nur angeht, sich selbst zu überlassen und bei unruhigen Thieren selbst die Behandlung der Wunde auf's äusserste zu beschränken. Kommt es nicht zum Hirnvorfall, so heilt die Wunde unter spärlicher Eiterung, fast wie per primam, und in 7—10 Tagen ist alles vernarbt, nicht anders als wir es in den Fällen beim Hunde gefunden haben. Die Thiere sind darin den ersten Tagen nach der Operation krank, besonders die verunstalteten — das struppige Haar, die heisse Haut, der frequente Puls, der geringe Appetit, der grosse Durst, die Unruhe, unterbrochen manchmal durch Zeiten von Ruhelosigkeit, darüber keinen Zweifel —; aber nach 3—5 Tagen sind diese Erscheinungen verschwunden, die Thiere sind wieder wie zuvor und sie sind nunmehr durch viele Monate bei ungestörter Gesundheit beobachtet.

Es ist eine unvermeidliche Nebenverletzung der Operation jedesmal mit der Abtrennung des Stirnlappens auch der Trigeminus durchschnitten wird; daher der Geruchssinn unserer Thiere vermindert, bezw. ganz aufgehoben ist. Die übrigen Sinne zeigen keinerlei Störung dar, ebensowenig die Gemeingefühle und die sogenannte Intelligenz. Dazu sind die vegetativen Functionen unversehrt. Endlich vollziehen sich auch die willkürlichen Bewegungen alle gerade so, wie beim unverletzten Thiere.

mit Ausnahme einer Gruppe von Bewegungen, an welchen die Rumpfmuskulatur betheiligt ist. Auf diese Bewegungen und unter Umständen die Haltung des Rumpfes sind, vom Geruchssinne abgesehen, die ganzen Abnormitäten beschränkt, welche an unseren Thieren zur Beobachtung kommen.

An dem Affen, welchem ein Stirnlappen abgetrennt ist, laufen die Abnormitäten darauf hinaus, dass derselbe seine Rücken-Lendenwirbelsäule nicht mehr willkürlich nach der der Verletzung entgegengesetzten Seite zu biegen oder zu drehen vermag. Ist z. B. der linke Stirnlappen abgetrennt, so geht oder läuft der Affe wohl im grösseren Bogen rechts- wie linksherum, aber kurz wendet er in der normalen Weise, ob er sitzt, steht, geht, läuft oder klettert, ausnahmslos linksherum, indem er die Rücken-Lendenwirbelsäule nach links dreht oder mit der Concavität nach links krümmt, und nie rechtsherum. Ja, in der ersten Zeit nach der Operation dreht sich der Affe überhaupt gar nicht rechtsherum, denn erst nach einigen Wochen fängt er an, im Hüftgelenk den Rumpf nach rechts zu bewegen. Diese ungewöhnlichen Rechtsdrehungen im Becken sieht man dann, nachdem sie einmal eingetreten sind, mit der Zeit etwas häufiger erfolgen, aber immer bleiben sie doch verhältnissmässig seltene Vorkommnisse gegenüber den normalen Drehungen linksherum. Wird der Affe im Käfig gehalten, so ist schon durch dessen Enge allein, da sie den Affen viel sich zu drehen zwingt, der Ausfall der normalen Rechtsdrehung geradezu auffällig; und sobald man nur beachtet, wie der Affe von der Stange zum Gitter, von diesem zum Boden sich schwingt, wie er von Stange und Gitter aus den Boden absucht, wie er in munterem Spiele den Körper verdreht u. s. w., tritt der häufigen Biegung der Rücken-Lendenwirbelsäule nach links gegenüber das Ausbleiben jeder solchen Biegung nach rechts nicht minder scharf hervor. Natürlich aber sind durch geeignete Versuche, indem man Mohrrübenstücke an der einen und der anderen Seite des Affen hält oder wirft, die bezeichneten Bewegungsstörungen noch besonders schön zu constatiren. Dass man diese Störungen richtig erkannte, daran bleibt kein Zweifel, wenn man schliesslich nach Wochen oder Monaten auch noch den rechten Stirnlappen des Affen abtrennt; denn die Vorzüge der linken Rumpfhälfte des Affen vor der rechten, welche so lange zu beobachten waren, sind dann gänzlich fortgefallen.

Der Affe, welchem beide Stirnlappen abgetrennt sind, vermag seine Rücken-Lendenwirbelsäule weder nach rechts noch nach links zu biegen oder zu drehen und führt von vornherein alle kurzen Wendungen, welche er macht, durch Drehung des Rumpfes im Hüftgelenke aus. Aber er ist noch viel mehr geschädigt; denn er vermag seine

Rücken-Lendenwirbelsäule auch nicht mehr zu beugen und zu strecken so dass überhaupt jede willkürliche Bewegung derselben fortgefallen ist. Sogleich nach der Operation zeigt sich die Rücken-Lendenwirbelsäule auffallend katzenbuckelartig gekrümmt, so dass die hinteren Extremitäten den vorderen abnorm genähert sind; und diese Krümmung bleibt für die Dauer bestehen, immer in gleicher Weise sichtbar ob der Affe sitzt, steht, geht oder läuft. Beim ruhigen Sitzen dadurch eine Absonderlichkeit bedingt, welche für sich allein Affen sofort kenntlich macht: während der unversehrte Affe, wenn er sich nicht gerade ängstlich duckt, die Hinterextremitäten hinter den Vorderextremitäten und die Kniee hinter den Schultern zeigt unser Affe die Kniee vor den Schultern nahe oder dicht unter Kiefer und die Folgeglieder der Hinterextremitäten vor den Vorderextremitäten. In der ersten Zeit springt der Affe gar nicht, weder von selber, noch auf Lockung oder Drohung. Unter den letzten Bedingungen legt er sich höchstens, unter Beugung sowohl der nach vorn gehaltenen Vorderextremitäten wie der nach hinten gehaltenen Hinterextremitäten, mit dem Bauche auf die Tischplatte oder Stange des Käfigs, so dass es ganz den Eindruck macht, als wenn er springen; aber nachdem er eine Weile so gelegen hat, springt er nicht, sondern klettert am Tischfusse herab, bzw. gleitet er mit dem Bauche an der Stange herab und greift, mit den Hinterextremitäten an der Stange hängend, nach dem Gitter, an welchem er sich weiter herablässt. Später, nach einigen Wochen, springt der Affe weder auf intensive Lockung oder Drohung, wenn man ihn am Kletterverhindert; aber dann springt er immer unbeholfen, immer mit katzenbuckelartig gekrümmtem Rücken, immer schliesslich nach vorn und schlagend, so dass er auf die Nase stösst oder doch nur mühsam sich davor bewahrt. Nur beim Klettern sieht man passiv, durch die Wirkung der Extremitäten, die abnorme Krümmung des Rückens verändern und Seitenbiegungen der Rücken-Lendenwirbelsäule zustande kommen. Geradeaus klettert auch der Affe ganz gut, aber jede grössere Änderung der Richtung macht ihm Schwierigkeiten; und wo die Notwendigkeit an ihn herantritt, im Klettern umzukehren, gelingt dies nur durch die ungeschicktesten und verwickeltsten Evolutionen oder er weiss auch gar nicht sich zu helfen und stürzt aus der Höhe herab. Kein Wunder nach alledem, dass ein so munteres und lustiges Treiben, wie es sonst die operierten Affen nach ihrer Heilung, wenn sie nicht gerade blind sind, häufig beobachten lassen, an unseren Affen niemals sich zeigt und dieser immer langsam und schwerfällig in den allgemeinen Körperbewegungen sich darstellt.

Die geschilderten Abnormitäten in irgendwelche Beziehung

Durchschneidung des Tractus olfactorius zu bringen, ginge schon deren Eigenart wegen nicht an, auch wenn der Geruchssinn im Leben des Affen nicht überhaupt die untergeordnete Rolle spielte, dass kaum jemals, selbst bei völliger Blindheit des Thieres, eine Verwerthung dieses Sinnes sich bemerklich macht. Wiederum also, wie bei unseren früheren Versuchen am Stirnlappen des Affen, haben Störungen am Rumpfe als Folgen der Stirnlappen-Verletzung sich herausgestellt. Aber neben dieser Übereinstimmung sind doch mit der Verschiedenheit des Eingriffes auch bedeutsame Verschiedenheiten in den Ergebnissen aufgetreten. Dort, wo unmittelbar von der Hauptstirnfurche an die Rinde des Stirnlappens exstirpiert worden war, hatten zu den Störungen am Rumpfe noch Störungen am Nacken sich gesellt, hatte der einseitig verstümmelte Affe den Kopf stets nach dieser Seite gedreht, der beiderseits verstümmelte Affe den Kopf stets gesenkt gehalten, und waren Drehungen des Kopfes und des Halses nach der entgegengesetzten Seite, bezw. nach beiden Seiten nur unvollkommen ausführbar gewesen: hier, wo wir die der Hauptstirnfurche zunächst befindliche Rinde gerade immer geschont haben, ist jede Störung am Nacken ausgeblieben, haben die Affen Kopf und Hals in durchaus normaler Haltung und Beweglichkeit gezeigt. Damit ist erwiesen, was wir schon früher zu vermuthen Anlass hatten, dass Nacken und Rumpf gesonderte Partien der Stirnlappen-Rinde zugeordnet sind und die dem Nacken zugehörige Rinde an der Hauptstirnfurche gelegen ist. Hinwiederum sind hier, wo mit Ausnahme der der Hauptstirnfurche nächsten Partie der ganze Stirnlappen abgetrennt worden ist, beträchtlichere Störungen am Rumpfe, zumal in der Haltung desselben, aufgetreten, als dort, wo die Rinde der medialen Seite und ein guter Theil der Rinde der unteren Seite des Stirnlappens unversehrt stehen geblieben waren. So dass offenbar auch diese letzteren Rindenpartien des Stirnlappens in functioneller Beziehung zum Rumpfe stehen.

Abweichungen vom beschriebenen Verhalten haben sich nur selten und immer nur für die erste Zeit nach der Operation dargeboten. Ein Affe, welchem beide Stirnlappen abgetrennt waren, zeigte im Verlaufe des dritten Tages wiederholt für die Dauer einiger Minuten klonische Krämpfe der Nackenmuskulatur, durch welche der Kopf nach links und oben gedreht wurde; später war nichts der Art mehr zu beobachten. Zwei andere Affen, welchen der linke Stirnlappen abgetrennt war, hielten am zweiten und dritten Tage nach der Operation den Kopf stets nach links und oben gedreht, und drehten ihn gar nicht, bezw. nur etwa bis zur Normalstellung nach rechts, auch wenn man sie durch rechts vorgehaltene Mohrrübenstücke lockte;

am vierten Tage stand der Kopf normal, und noch an demselben spätestens aber am folgenden Tage wurden die Drehungen des Kopfes nach rechts gerade so wie in der Norm ausgeführt. Selbstverständlich waren danach die Abweichungen nur durch die reactive Entzündung bedingt, welche in diesen Fällen etwas stärker als sonst verlief. Das sind die Abweichungen deshalb interessant, weil sie auch ihrerseits auf's deutlichste lehren, dass die dem Nacken (Halse) zugehörige Rinde zu allernächst hinter unserem Schnitte durch die Hemisphäre und den Kopf- und Extremitäten-Regionen gelegen ist.

Ebendies hat sich dann auch noch durch besondere Versuche darthun lassen. Ich exstirpierte an mehreren Affen bloss die vordere Haken der Hauptstirnfurche eingefasste Rinde eines Stirnlappens, also gerade diejenige Rindenpartie, welche bei den obigen Abtrennungen des Stirnlappens an dessen Convexität hinter dem trennenden Schnitte zurückgeblieben war. Von einem Verluste durch Hirnvorfall abgesehen verheilte die Verletzung immer sehr gut; und regelmässig war der Erfolg, dass der Affe, sonst in allen Stücken ungeschädigt, Drehungen des Kopfes nach der unverletzten Seite nur sehr unvollkommen, manchmal so gut wie gar nicht auszuführen vermochte. In zwei Fällen trug auch der Affe in den ersten Tagen nach der Operation den Kopf nach der Seite der Verletzung abgelenkt, nach dieser Seite und oben gedreht. Weshalb hier nur vorübergehend und in den übrigen Fällen gar nicht die abnorme Haltung des Kopfes auftrat, welche die Versuche der älteren Art, bei welchen die Rinde des Stirnlappens von der Hauptstirnfurche an exstirpiert worden war, nicht haben vermissen lassen, habe ich aus Mangel an Material noch nicht aufklären können. Den Sectionsbefunden nach war bei den letzteren Versuchen die Rinde am medialen Ende der Hauptstirnfurche etwas ausgedehnter, und zwar etwas weiter medialwärts verletzt; und es ist deshalb anzunehmen, dass auch noch eine kleine Rindenportion an der medialen Seite der Hauptstirnfurche dem Nacken zugeordnet ist.

Dass Hrn. FERRIER, welcher ungefähr ebensolche Abtragungen des Stirnlappens an Affen ausgeführt hat, wie ich sie oben beschrieb, die Folgen der Exstirpation ganz entgangen sind, kann wiederum dadurch seine Erklärung finden, dass die Störungen am Rumpfe sehr weniger auffällig sind, als die Störungen an den Extremitäten. Hier kommt, dass Hrn. FERRIER's Beobachtungen, da die reactive Entzündung alle Versuchsthiere rasch dem Tode zuführte, bloss auf den ersten Tage nach der Operation beschränkt blieben, während welche Zeit von den vier Affen mindestens drei in so übler Verfassung sich befanden, dass eigentlich jede Möglichkeit der Untersuchung von vorn

herein ausgeschlossen scheinen musste¹⁾. Wie Hr. FERRIER aber die Apathie, die Schlaftrunkenheit, die Ruhelosigkeit u. s. w. der Affen, die offenbaren Folgen der mechanischen Läsion und der Encephalomeningitis, wie sie bei unglücklichen Versuchen auch nach anderen grösseren Hirnverletzungen sich einstellen, dem Ausfall der Functionen der Stirnlappen hat zuschreiben können, das würde ganz unverständlich sein, wenn nicht eben Hr. FERRIER überall bei seinen Exstirpationsversuchen, was er gerade beobachtete, kritiklos nach vorgefasster Meinung gedeutet hätte²⁾.

Ich habe es schon früher kurz erwähnt und will es an dieser Stelle noch besonders betonen, dass meine Affen, welchen beide Stirnlappen abgetrennt waren, hinsichts der sogenannten Intelligenz durch Monate hindurch ebenso sich verhielten, wie vor der Verstümmelung. In der Richtung sie zu schildern, müsste ich geradezu die Charakteristik des normalen Affen geben. Nur einige Züge will ich darum herausheben. Auch wenn man gar nicht sich mit ihnen beschäftigt hatte, beobachteten sie genau, was im Zimmer geschah, und verfolgten besonders peinlich das Thun und Lassen derjenigen Menschen, von welchen sie abhingen. Sobald ich in einer entfernten Ecke des Zimmers den Stock vom Tische nahm oder sobald der Wärter ebendort den Guttapercha-Handschuh hervorholte, mit welchem er sich beim Ergreifen der Affen vor deren Bissen schützte, geriethen sie in grösste Angst und zogen sich tief in den Käfig zurück. Bewegte ich mich dagegen, wenn auch ganz zufällig, in der Richtung nach dem Kasten hin, aus welchem ich Mohrrüben an sie zu verfüttern pflegte, so suchten sie in freudigster Aufregung möglichst bei der Hand zu sein und hängten sich an das Gitter des Käfigs. Mein Verziehen des Gesichtes, mein Drohen mit dem Zeigefinger genügte, um sie von dem Leckerbissen fernzuhalten, welchen ich gleichzeitig ihnen vorhielt oder vorwarf. Ja, ein solcher Affe, den ich abgerichtet hatte, nahm mir das vorgehaltene Mohrrübenstückchen jedesmal aus der Hand, wenn ich es zwischen Daumen und Zeigefinger gefasst hatte, und griff nie zu, wenn ich es zwischen Daumen und Mittelfinger unterhalb des erhobenen Zeigefingers hielt; im letzteren Falle harrete er geduldig minutenlang aus, bis ich die Stellung der Finger veränderte. Das

¹⁾ Vgl. Philos. Transact. 1875. Part II. p. 433—41; 484—7. — Da FERRIER Gewicht darauf gelegt hat, dass seine Affen noch assen und tranken, so sei bemerkt, dass die Affen — im Gegensatze zu anderen Thieren, z. B. Hunden —, selbst wenn sie dem Tode nahe sind und überhaupt so lange sie nicht bewusstlos oder gelähmt sind, in der Regel noch Nahrung, insbesondere Lieblingsspeisen, zu sich nehmen.

²⁾ Vgl. Functionen u. s. w. S. 6—7; 14—20; 36—9; 63; 128—9. — Verhandlungen der Berliner Physiolog. Ges. 1881—2. No. 15 u. 16. S. 63—4; du Bois-Reymond's Archiv, 1881. S. 455.

lässt, denke ich, mehr als zur Genüge erkennen, dass Aufmerksamkeit, Apperception, Reflexionsfähigkeit u. dgl. m. an diesen Affen nicht geschädigt waren, dass die Hemmungscentren, welche Hr. FERRIER physiologischen Substrate der Aufmerksamkeit sein lässt, diesen Affen nicht fehlten.

4. Reizversuche.

Störungen im Bereiche der Bewegungen also sind es, welche beim Hund wie Affen die Ausschaltung der Stirnlappen mit sich bringen. Störungen der willkürlichen Bewegung und der normalen Haltung beim Hunde des Rumpfes, beim Affen des Nackens und des Rumpfes, alle übrigen willkürlichen wie unwillkürlichen Bewegungen, ferner vegetativen Functionen, die Sinne, die Gemeingefühle und endlich auch die sogenannte Intelligenz erscheinen durch dieselbe Ausschaltung nicht beeinflusst. Ständen diese Erfahrungen für sich allein, so könnte man die Stirnlappen-Rinde als den Sitz motorischer Centren für den Rumpf, bzw. für den Nacken und den Rumpf ansprechen wollen. Aber die Scheitellappen-Rinde, deren partielle Exstirpation gleichfalls Störungen der willkürlichen Bewegung, nur an anderen Körpertheilen zur Folge hat, und welche darum wirklich zuerst als der Sitz motorischer Centren galt, hat sich als zum Gefühlssinne des Körpers denselben Beziehungen stehend erweisen lassen, wie die Sehsphäre zum Gesichtssinne oder die Hörsphäre zum Gehörssinne, hat sich die Fühlsphäre herausgestellt, in welcher die Gefühlswahrnehmung und die Gefühlsvorstellung statthaben, derart dass ihre verschiedenen kleineren Abschnitte verschiedenen Körpertheilen zugeordnet sind: dem Kopfe, dem Vorderbeine, dem Hinterbeine, dem Auge, den Ohren und beim Hunde auch dem Nacken.¹⁾ Ganz unnatürlich wäre es danach, den Untergang willkürlicher Bewegung infolge von Rindenexstirpationen, der beim Scheitellappen auf dem Verluste von Bewegungsvorstellungen beruht, beim Stirnlappen dem Verluste von motorischen Centren zuzuschreiben; und keine andere Auffassung erscheint zulässig, als die, welche auch in der Stirnlappen-Rinde die Fühlsphäre erkennt, wenngleich der unmittelbare Beweis sich hier nicht hat führen lassen. Die Richtigkeit dieser Auffassung wird auch dadurch verbürgt, dass die Scheitellappen-Rinde geradezu eine Ergänzung in der Stirnlappen-Rinde findet, indem für die gesamte Fühlsphäre des Körpers die nicht durch die Scheitellappen-Rinde vertretenen Körpertheile — beim Hunde der Rumpf, beim Affen der Nacken und der Rumpf — durch die Stirnlappen-Rinde hinzukommen.

¹⁾ Functionen u. s. w. S. 41—73.

So ist durch die neue ausgedehntere und vollkommenere Untersuchung erst recht gesichert, was schon die erste Untersuchung uns erkennen liess, dass Stirn- und Scheitellappen-Rinde functionell zusammengehören, und dass, wie die Scheitellappen-Rinde die Kopfreion, die Vorderbeinregion, die Hinterbeinregion u. s. w., so die Stirnlappen-Rinde beim Hunde die Rumpfreion, beim Affen die Rumpfreion und die Nacken-(Hals-)region der Fühlsphäre darstellt.

Und noch eine werthvolle Bestätigung findet diese Erkenntniss von ganz anderer Seite her.

Nach der HH. FRITSCH und HIRTZIG bahnbrechendem Erwerbe, dass von der Convexität des Grosshirns aus innerhalb einer gewissen Partie derselben, und bloss innerhalb dieser Partie, durch elektrische Reizung Muskelbewegungen herbeizuführen sind, dabei verschiedene Muskelbewegungen je nach der Angriffsstelle des Reizes, haben zahlreiche weitere Untersuchungen mit der Reizung der Grosshirn-Oberfläche sich befasst und die reizbaren Stellen mit den Reizerfolgen genauer festzustellen sich bemüht. Die Ergebnisse — unter welchen die letzten von Hrn. HIRTZIG¹⁾ für den Hund, die letzten von Hrn. FERRIER²⁾ für den Affen als die umfassendsten und besten bei der Wiederholung der Versuche unschwer zu erkennen sind — bieten wohl im feineren mancherlei Abweichungen dar, aber im gröberen stimmen sie gut überein. Danach ist beim Hunde und beim Affen, wie wir sogleich mit Bezug auf die früheren Ermittlungen unserer Exstirpationsversuche sagen können, reizbar der Scheitellappen, dessen Rinde sich als die Fühlsphäre erwiesen hat; und es sind die reizbaren Stellen, von welchen aus Bewegungen des Vorderbeines sich herbeiführen lassen, innerhalb der Vorderbeinregion der Fühlsphäre gelegen, die reizbaren Stellen, von welchen aus Bewegungen des Hinterbeines zu erzielen sind, innerhalb der Hinterbeinregion, die reizbaren Stellen für Bewegungen am Kopfe innerhalb der Kopfreion, für Bewegungen des Auges innerhalb der Augenregion, für Bewegungen des Ohres innerhalb der Ohrregion, endlich beim Hunde für Bewegungen des Kopfes und des Halses innerhalb der Nackenregion. Dagegen sind unerregbar der Hinterhauptslappen und der Schläfenlappen, deren Rinde wir als Seh-, bzw. Hörsphäre erkannt haben, und auch, was uns hier im besonderen interessiert, der Stirnlappen.

Wohl hat Hr. HIRTZIG bei der Prüfung des Stirnlappens ausserordentlich häufig auf Anwendung stärkerer Ströme Bewegungen aller Art eintreten sehen, doch waren es Reflexbewegungen von der Dura aus, oder sie waren durch Stromschleifen zu den benachbarten Hirn-

¹⁾ Untersuchungen u. s. w. S. 75—94.

²⁾ Functions etc. p. 141—5. (Übersetzung, S. 155—9.)

theilen bedingt. Auf die »Stromstärke des Zuckungsminimums und die nächst höher liegenden Stromstärken«, welche von den anderen reizbaren Stellen aus Bewegungen veranlassten, reagierte der Stirnlappen nie; hingegen gelang es sogar in einzelnen Fällen, in welchen der Stirnlappen sich gut hatte isoliren lassen, ausserordentlich starke Ströme anzuwenden, ohne dass Zuckungen eintraten.¹⁾ Hr. FERRIER hat anfangs gewisse rasche Bewegungen des Kopfes, und mitunter auch der Athemmuskeln, welche beim Ansetzen der Elektroden auf die vordere Stirngegend eintraten, der Reizbarkeit des Stirnlappens zugeschrieben; aber später, nach Hrn. HIRTZIG'S²⁾ Kritik seiner Untersuchung, hat er die Angaben zurückgenommen und gleichfalls den Stirnlappen als selbst gegen starke Ströme unempfindlich erkannt. Jene Bewegungen, sagt er, »müssen, wie ich nun in voller Übereinstimmung mit HIRTZIG glaube, auf eine Weiterleitung des Stromes zu dem empfindlichen Bulbus olfactorius oder zur Dura mater zurückgeführt, und dürfen daher auch nur als Reflexbewegungen aufgefasst werden«³⁾. Von den anderen Untersuchern hat Niemand Hrn. HIRTZIG und Hrn. FERRIER widersprochen, Niemand einen Reizerfolg vom Stirnlappen aus angegeben. So dass die Unerregbarkeit des Stirnlappens unter den Ergebnissen der Reizversuche mit als das gesichertste erscheinen kann.

Auf dem Standpunkte, zu welchem wir durch die obigen Exstirpationsversuche gelangt sind, hat die Unerregbarkeit dieses Lappens aber offenbar etwas befremdendes. Unvereinbar mit den Ergebnissen der Exstirpationsversuche ist sie freilich nicht. Denn es ist bei der Übung der Reizversuche am Scheitellappen schon beiläufig aufgefallen und kann auch der Aufmerksamkeit gar nicht entgehen: dass immer nur eine beschränkte Anzahl von Bewegungen durch die Reizung der Grosshirn-Oberfläche herbeizuführen ist; dass die Angriffsstelle für die Erzielung einer bestimmten Bewegung bei den verschiedenen Individuen derselben Species innerhalb gewisser Grenzen verschieden sich zeigt und bei manchen Individuen selbst gar nicht aufzufinden ist; dass die für die Herbeiführung der verschiedenen Bewegungen bei einem und demselben Individuum erforderlichen Reizgrössen immer sehr verschiedene, und zwar gesetzmässig verschiedene sind; dass manchmal nur die eine und nicht die andere Reizungsweise zu Erfolgen führt. Der Möglichkeiten sind also genug vorhanden, weshalb die elektrische Reizung am Stirnlappen, trotz dessen unzweifelhafter Be-

¹⁾ HIRTZIG, Untersuchungen u. s. w. S. 82 — 4.

²⁾ Ebenda, S. 63 ff.

³⁾ FERRIER, Functions etc. p. 148. (Uebersetzung, S. 164.) — Vgl. auch p. 157 (S. 171); 230 (256); ferner 134 (146); 144 (158); 232 (259); 287 (324).

ziehung zu Bewegungen, hat erfolglos bleiben können, zumal da nur ein kleiner Theil der Oberfläche des Lappens der Prüfung unterlegen hat. Aber auffallen muss es doch in hohem Grade, dass von zwei functionell zusammengehörigen und nur mit verschiedenen Körpertheilen verbundenen Lappen die Oberfläche des einen in allen ihren kleineren Abschnitten reizbar, die des anderen der Reizung ganz unzugänglich sein soll. Neue Reizversuche am Stirnlappen erscheinen darum dringend geboten, und diese stellen denn auch einen anderen Sachverhalt heraus.

Ich habe die Untersuchung am Hunde und am Affen ausgeführt, beidemale im wesentlichen mit demselben Erfolge, und ich will zuerst vom Stirnlappen des Hundes handeln.

Hr. HRRZIG¹⁾ hat die Kleinheit der Theile, die erforderliche Exstirpation bulbi, die leicht eintretende Erschöpfung des Thieres durch Blutverlust und Schmerz, die möglichen Nebenverletzungen, die Ansammlung von Cerebrospinalflüssigkeit und Wundsecret aus der Umgebung als besondere Schwierigkeiten hervorgehoben, welche der Untersuchung des Stirnlappens sich in den Weg stellen. Indess alle diese Schwierigkeiten lassen sich recht gut überwinden. Am tief narkotisirten Hunde entfernt man mit Trepan und Knochenzange das vordere Schädeldach, die Stirnhöhlen, einen guten Theil der Nasenhöhlen und auch jederseits das Orbitaldach, so dass auf beiden Seiten der ganze vordere Hemisphärentheil mit dem Bulbus olfactorius am vorderen Ende, der Hinterbeinregion²⁾ der Fühlsphäre am hinteren Ende, endlich der obersten Partie der Kopfregion²⁾ der Fühlsphäre am lateralen Ende frei vorliegt. Danach trägt man jederseits die Dura in Stücken vom Sinus longitudinalis an bis zu den Rändern der Wunde ab, jedoch so, dass ganz kleine Zipfel der Dura in Verbindung mit dem Sinus dort erhalten bleiben, wo die Venen an den medialen Enden der Kreuzfurche und der Hauptstirnfurche und oft auch noch eine dritte Vene etwa inmitten des Stirnlappens an dessen medialem Rande zur Dura übertreten, um in den Sinus einzumünden. Ohne dass man den Augapfel exstirpirt, der vielmehr nur durch Haken abgezogen gehalten wird, sind alsdann die obere und die untere³⁾ Fläche jedes Stirnlappens, letztere bis zum Tractus olfactorius, gut

¹⁾ Untersuchungen u. s. w. S. 81.

²⁾ Vgl. Functionen u. s. w. Fig. 3, S. 62.

³⁾ Ich nenne die von oben her sichtbare und schräg von innen nach aussen abfallende Fläche des Stirnlappens die obere, die nach unten hin sich anschliessende und schräg von aussen nach innen abfallende Fläche die untere. Beide Flächen zusammen könnte man auch als convexe laterale Fläche des Stirnlappens gegenüber der ebenen medialen Fläche bezeichnen.

isolirt und zugänglich. Auch bleiben dieselben frei von Cerebrospinalflüssigkeit und Wundsecret; höchstens vorn am Bulbus olfactorius und zur Seite zwischen dem Augapfel und dem Tractus olfactorius sammelt sich langsam ein wenig blutige Flüssigkeit an und wird von Zeit zu Zeit mit einem Schwämmchen aufgenommen. Jeder wesentliche Blutverlust ist dabei vermieden, wenn die geöffneten Knochenvenen sogleich mit Schwammpröpfen verstopft wurden; und wenn selbsterst einmal trotz aller Vorsicht eine der vorgenannten Venen an der Schnittstelle geschnitten wird oder reißt, so genügt doch schon das Andrücken eines kleinen Stückchens Feuerschwamm, die Blutung sogleich zu hemmen. Die Vorbedingungen für die elektrischen Prüfungen sind mithin beim Stirnlappen, wenngleich mühsamer, doch ebenso gut zu erfüllen, wie beim Scheitellappen.

Erst mit den Prüfungen selbst wird das Moment gesetzt, das die Untersuchung ungemein erschwert. Mit dem galvanischen Strom nämlich kommt man am Stirnlappen nicht zu Erfolgen, selbst nicht mit dem Strome der viergliederigen Grove'schen Säule; und noch mächtigere Säulen zu verwenden, wird man schon der übermäßigen Elektrolyse wegen Bedenken tragen. Auf die Inductionsströme dann nach angewiesen, muss man aber deren üble Folgen mit in den Kauf nehmen, die Nachwirkungen, die hier um so mehr sich geltend machen als man, um die Reizerfolge gut zu constatiren, verhältnissmässig starke Ströme für zehn Secunden und mehr benutzen muss. Soll nicht geschehen, dass schon sehr früh, vielleicht gar schon mit dem ersten Reizerfolge Krämpfe oder selbst ein ausgebildeter epileptischer Anfall dem mühsam vorbereiteten Versuche ein Ende machen, dürfen die reizenden Ströme die gerade erforderliche Stärke nicht überschreiten, und es muss ein richtiger Grad der Narkose getroffen sein. Ich kann es empfehlen, dem mittelgrossen Hunde 0.05—0.0 Morphium muriat. subcutan zu injiciren, nach ca. 30 Minuten die Äthernarkose zu beginnen und diese bis gegen das Ende der Operation fortzusetzen; wenn dann die Ätherwirkung vorüber, ist der Hund etwas ausreichend und damit gerade passend narkotisirt. Immerhin bleibt auch so die Zahl der Prüfungen, welche sich vornehmen lassen, die Nachwirkungen störend sich einmischen, eine beschränkte, so dass wo man noch zu tasten und nicht bloss bereits gewonnene Ergebnisse zu controliren hat, ein beträchtlicher Aufwand an Thieren und Arbeitskraft unvermeidlich ist.

Ich habe das gewöhnliche du Bois'sche Schlitteninductorium in den Laboratorien mit einem kleinen DANIELL'schen Elemente im primären Kreise benutzt und durch Öffnen eines in den secundären Kreis genommenen du Bois'schen Schlüssels die Inductionsströme dem Gehirne

zugeleitet, an dessen Oberfläche die geknüpften Platindraht-Elektroden, gewöhnlich mit 3—4^{mm} Abstand, mit der Hand angelegt waren. Vor der Untersuchung des Stirnlappens und auch im Verlaufe derselben habe ich immer einzelne Prüfungen am Scheitellappen vorgenommen, um dessen Erregbarkeit festzustellen und daran den Gesamtzustand des Gehirns zu schätzen. Dieser war der Untersuchung günstig, wenn ich von der Hinterbeinregion aus Bewegungen des Hinterbeines bei ca. 12^{cm}, von der Vorderbeinregion aus Bewegungen des Vorderbeines bei 12—10^{cm}, von der Nackenregion aus Bewegungen des Kopfes und des Halses bei ca. 8^{cm} Rollenabstand erhielt. War die Erregbarkeit des Scheitellappens wesentlich kleiner, so traten beim Angriffe des Stirnlappens wohl noch dieselben Erfolge, aber auch regelmässig bald Krämpfe ein. Ich will deshalb für die zum Vergleiche dienenden Angaben, welche ich über den Rollenabstand zu machen habe, die letzteren Versuche ausser Acht lassen und mich auf die ersteren besseren Versuche beschränken, wenn ich jetzt die Ergebnisse am Stirnlappen zusammenstelle.

Liegen die Elektroden an der oberen Fläche des Stirnlappens einige Millimeter vor der Hauptstirnfurche und etwas lateral von deren medialem Ende, dort ungefähr, wo eine flache Längsfurche von vorn nach hinten zieht oder an ihrer Stelle eine Impression sich findet, so tritt auf Reizung bei 7—6^{cm} Rollenabstand Stillstand der Athmung ein mit maximaler Inspirationsstellung des Thorax und auch, wie die Beobachtung bei geöffnetem Abdomen lehrt, des tetanisch contrahirten Zwerchfells; nach Aufhören der Reizung dauert der Inspirationstetanus noch eine Weile an, dann ist die Athmung zunächst beschleunigt und kehrt allmählich zur Norm zurück. Manchmal geht auch dem Inspirationstetanus eine beschleunigte Athmung voraus, wobei unter grösseren Inspirationen und kleineren Expirationen Thorax und Zwerchfell mehr und mehr der maximalen Inspirationsstellung sich nähern, bis sie schliesslich in dieser verharren. Die Bauchmuskeln sind während der Reizung erschlafft und nehmen, wenn sie vor der Reizung activ an der Expiration theilhaftig waren, erst gegen Ende der Nachwirkung der Reizung ihre frühere Thätigkeit wieder auf. Die Reizstelle ist regelmässig zu finden; und es ist eine mässige Verschiebung der Elektroden zulässig, ohne dass der Reizerfolg eine Veränderung erfährt. Sind aber die Elektroden beträchtlicher verstellt, gleichviel ob sie medialwärts dem Sinus oder nach vorn dem Bulbus olfactorius oder nach hinten der Hauptstirnfurche oder endlich lateralwärts dem Tractus olfactorius genähert sind, so bleibt jedesmal der angegebene Erfolg aus, und es wird überhaupt gar keine oder eine sogleich zu besprechende entgegengesetzte Einwirkung auf die Athmung erzielt. Jeder

Gedanke an Stromschleifen, sei es zur Dura, sei es zu benachbarten Hirntheilen, als Ursache der Inspirationsbewegungen ist damit überhaupt ausgeschlossen.

Liegen die Elektroden der unteren Fläche des Stirnlappens gerade inmitten derselben an, so tritt auf Reizung bei 7 — 6^{mm} Rollenabstand entweder durch starken Tetanus der Bauchmuskeln maximale Expiration ein, oder die Bauchmuskeln contrahiren sich ausserordentlich häufig, aber immer nur wenig ausgiebig, und treiben so nur kurzen Stössen, gewissermassen ruckweise, Zwerchfell und Thorax in die Ruhestellung; erst bei längerer Dauer der Reizung schiebt sich eine sehr rasche und tiefe Inspiration ein. Nach Aufhören der Reizung setzen sich der Tetanus, bezw. die stossweisen Contractionen der Bauchmuskeln noch eine Weile fort, dann lassen sie nach, und die Athmung kehrt in der alten Weise, wie vor der Reizung, wieder. Ob bei dieser Athmung die Expirationsmuskeln der Bauchwand ganz untheilhaft waren oder aber grosse und langdauernde Contractionen vollführten, ist für den Reizerfolg nicht von Bedeutung. Einigemal habe ich die Reizstelle an einer oder auch an beiden Hemisphären nicht finden können. Hat man sie gefunden, so ist nur eine beschränkte Veränderung der Elektrodenstellung zulässig, wenn der angegebene Reizerfolg sich nicht verlieren soll. Sind die Elektroden nach hinten an die Hauptstirnfurche gerückt, so zeigen sich bei unveränderter Athmung Lippen-, Kiefer- und Zungenbewegungen. Sind die Elektroden medialwärts verschoben, so ist die Reizung anscheinend wirkungslos, oder es kommt zu jenem Inspirationstetanus, der uns vorher bekannt geworden ist. Endlich wenn die Elektroden nach vorn oder lateralwärts dem Bulbus oder Tractus olfactorius genähert sind, bleibt die Reizung entweder erfolglos, oder es stellen sich Niesen und Husten seltener Winseln ein: Erfolge, welche ebenso, nur noch in verstärkter Masse, dann zu beobachten sind, wenn die Elektroden unmittelbar den Bulbus oder Tractus olfactorius oder den Wundrand vorn an die Nase berühren, während unter diesen Umständen Tetanus oder frequente kleine Contractionen der Bauchmuskeln niemals vorkommen. Es ist demnach wiederum nicht daran zu denken, dass Stromschleifen zu den Nachbartheilen den Reizerfolg bedingen, welchen wir von der Mitte der unteren Fläche des Stirnlappens aus erhalten.

Liegen endlich die Elektroden mit ihrem gewöhnlichen Rollenabstand oder noch besser mit einem grösseren Abstände von 5^{mm} und mehr auf der oberen Fläche des Stirnlappens an oder dessen medialer Fläche, welche man durch Seitwärtsziehen der Falx in grosser Ausdehnung freigelegt hat, und wird bei 5 — 4^{mm} Rollenabstand gereizt, so folgen Bewegungen der Rücken-Lendenwirbelsäule: Streckung oder

Seitwärtsbiegung oder seltener Drehung derselben. Ist zunächst Streckung oder Seitwärtsbiegung erfolgt, so kann es dabei bleiben; öfters jedoch kommt es zu einem raschen Wechsel, indem an die Stelle der anfänglichen Streckung die Seitwärtsbiegung tritt, bezw. die anfängliche Seitwärtsbiegung nach der der Reizung entgegengesetzten Seite in die Streckung und danach wiederum in die Seitwärtsbiegung nach der der Reizung gleichen Seite übergeht; die anfängliche Drehung nach der der Reizung entgegengesetzten Seite macht regelmässig sehr rasch der Seitwärtsbiegung nach ebendieser Seite Platz. Alle die Rumpfbewegungen überdauern eine Weile die elektrische Reizung, welche man, um den Eintritt von Krämpfen zu verhüten, möglichst kurz bemessen muss; auch so noch gesellen sich manchmal Nackenbewegungen — Bewegungen des Kopfes und des Halses — hinzu. Befinden sich die Elektroden an der Stelle, von welcher aus bei schwächerer Reizung Inspirationstetanus zu erhalten ist, so tritt jetzt in der Regel intensive Streckung zugleich mit dem Inspirationstetanus ein. Im übrigen sind mir selbst durch eine grosse Reihe von Versuchen die Bedingungen nicht klar geworden, unter welchen die eine oder die andere Rumpfbewegung zur Erscheinung kommt.

Und auch an diesen Rumpfbewegungen haben Stromschleifen, welche aus dem Stirnlappen in die Nachbarschaft übertreten, keinen Theil.

Was Hr. Hirtzig¹⁾ als Folgen der Reizung der Dura anführt, dass das Thier den Kopf zurückwirft und die Rückenmuskeln sich contrahiren, das trifft wohl für gar nicht oder sehr unvollkommen narkotisirte Thiere zu, nicht aber für unsere gut narkotisirten Hunde. Bei diesen hatte die direkte elektrische Reizung der Dura, ob die Elektroden grosse zurückgeschlagene Lappen derselben oder kleine Zipfel an den Wundrändern oder endlich die Falx zwischen den abgezogenen Stirnlappen berührten, gar keine Bewegungen oder doch nur Augenlidzucken zur Folge; und höchstens wenn die Narkose nicht mehr gut war, trat, was ich schon oben erwähnte, Winseln ein. Mit Reflexbewegungen von der Dura aus haben also die Rumpfbewegungen nichts zu schaffen. Und dass sie überhaupt nicht ausserhalb der Hirnsubstanz ihren Ursprung nehmen, dafür liefert den klaren Beweis schon der Umstand an sich allein, dass, sobald wir die Reizung verlängern, jedesmal epileptiforme Krämpfe oder selbst ein ausgebildeter epileptischer Anfall an die Rumpfbewegungen sich anschliessen, wie es doch für den Fall der Reizung der Hirnsubstanz charakteristisch ist.

Durch die Stromschleifen aber, welche in die dem Stirnlappen benachbarten Hirntheile einbrechen, können vom Bulbus oder Tractus

¹⁾ Untersuchungen u. s. w. S. 22; 82.

olfactorius und ebenso von der Kopfregion der Fühlsphäre aus Rumpfbewegungen nicht herbeigeführt sein, weil die directe elektrische Reizung dieser Theile stets, wie wir wissen, ganz andere Folge hat; und nur die Nackenregion der Fühlsphäre darf dem Verdachte unterliegen, weil Hr. Hirtzig¹⁾ auf Reizung des lateralen Theiles dieser Region neben Nacken- oder Halsmuskeln auch Rumpfmuskeln und zwar beiderseitig, sich hat bewegen sehen. Indess Hr. Hirtzig's Beobachtung ist nur dann zu machen, wenn die Reizung der Nackenregion bei 5—6^{cm} Rollenabstand erfolgt; bei schwächerer Reizung kommen immer ausschliesslich Nacken- (Hals-) Muskeln in Bewegung von der medialen Partie der Region aus bei ca. 7^{cm} Rollenabstand die hintere Halsmuskulatur, von der lateralen Partie aus schon bei 9—8^{cm} Rollenabstand die vordere Halsmuskulatur. Beruhte unser Reizerfolg am Stirnlappen nur auf Stromschleifen zur Nackenregion, so müsste er danach unter allen Umständen in Nackenbewegungen allein oder mit Rumpfbewegungen combinirt, und nie in Rumpfbewegungen allein bestehen. Gerade im Gegentheile aber sehen wir auf Reizung des Stirnlappens immer Rumpfbewegungen, theils allein, theils zusammen mit Nackenbewegungen, auftreten und nie Nackenbewegungen allein; ja, wo die Nackenbewegungen sich zu den Rumpfbewegungen hinzugesellen, lässt in der zu grossen Dauer oder in der zu grossen Intensität der Reizung der Grund oft deutlich sich erkennen. Mag es also auch bei der Reizung des Stirnlappens nicht auszuschliessen sein, dass die zu den Rumpfbewegungen hinzutretenden Nackenbewegungen durch Stromschleifen zur Nackenregion veranlasst sind, so müssen doch die Rumpfbewegungen dort vom Stirnlappen selbst herbeigeführt sein. Dass von der Nackenregion aus auf starke Reizung Rumpfbewegungen eintreten, kann dann, ohne dass man Stromschleifen zum Stirnlappen in Anspruch nimmt, seine einfache und ungezwungene Erklärung darin finden, dass die Markstrahlen von vorn nach hinten zieht und demgemäss die vom Stirnlappen kommenden Fasern, bei genügender Verstärkung der Reizung, ihrem Verlaufe unter der Nackenregion erregt werden.

Was ich soweit für den Hund ausgeführt habe, gilt nun ebenso auch für den Affen, bei welchem die elektrischen Reizungen des Stirnlappens, wie ich schon sagte, im wesentlichen dieselben Ergebnisse liefern. Das operative Verfahren bietet hier gar keine Schwierigkeiten, wenn man sich, wie ich es immer that, auf die Prüfung der oberen und der medialen Fläche und dazu noch des vordersten Theiles der unteren Fläche des Stirnlappens beschränkt; auch hat man weniger, als beim Hunde, unter den Krämpfen im Gefolge der I

¹⁾ Untersuchungen u. s. w. S. 48.

zung zu leiden. Befinden sich die Elektroden innerhalb des Hakens der Hauptstirnfurche oder etwas medialwärts von deren medialem Endstücke, so folgen auf die Reizung bei ca. 9^{cm} Rollenabstand Nackenbewegungen¹⁾, und zwar von der mehr lateralen Partie aus Contractionen der vorderen, von der mehr medialen Partie aus Contractionen der hinteren Halsmuskulatur. Weiter vorn erhält man bei 7—6^{cm} Rollenabstand an der von vorn innen nach hinten aussen ziehenden Längsfurche und medialwärts von derselben tetanische Inspirationsstellung des Thorax und des Zwerchfells, dagegen in einigem Abstände lateralwärts von derselben Furche Tetanus der Bauchmuskulatur. Bei 6^{cm} Rollenabstand verbindet sich nicht selten mit dem Inspirations-tetanus Streckung der Rücken-Lendenwirbelsäule. Endlich treten bei ca. 5^{cm} Rollenabstand regelmässig von der medialen Partie der oberen Fläche, wie von der medialen Fläche, wie auch von dem vordersten Stücke der unteren Fläche des Stirnlappens aus heftige Rumpfbewegungen auf, Streckungen und Seitwärtsbiegungen, die bei etwas längerer Dauer der Reizung leicht in ausgebreitete epileptiforme Krämpfe übergehen.

Die beträchtliche Reizgrösse, deren es für die Herbeiführung der Rumpfbewegungen vom Stirnlappen aus bedarf, kann nur auf den ersten Blick überraschen. Hrn. Hirtzig²⁾ ist es nicht entgangen, dass, um beim Hunde den Orbicularis palpebrarum, den Augapfel, die Vorderextremität, die Hinterextremität, den Nacken in Bewegung zu setzen, jedesmal der Reihe nach der Reiz zu verstärken ist; und er hat die Erklärung darin gesucht, dass die zu bewegendende Last und damit der erforderliche Kraftaufwand zunimmt. Wirklich bestätigte sich ihm auch eine darauf gegründete Vermuthung, indem er an der blossgelegten Nackenmuskulatur einzelne Muskeln auf einer oder beiden Seiten schon dann sich contrahiren sah, wenn die die Nackenregion treffenden Ströme noch zu schwach waren, als dass Kopf und Hals in Bewegung kamen. Ganz dem entsprechend habe ich nach Blosslegung der Rückenmuskulatur auf Reizung des Stirnlappens manchmal schon bei 6—8^{cm} Rollenabstand, unter voller Ruhe der Rumpfwirbelsäule, Contractionen einzelner Rückenmuskeln auf einer oder beiden Seiten beobachtet. Nicht bloss thatsächlich, sondern auch ganz gut in Rücksicht auf Hrn. Hirtzig's Erklärung schliessen sich daher nunmehr der vorhin gegebenen Reihe noch Brust und Bauch und endlich die Rücken-Lendenwirbelsäule an. Nur ist zu bemerken, dass ausser der Stärke

¹⁾ Auf Reizung der Umgebung des medialen Endstückes der Hauptstirnfurche hat auch Hr. FERRIER Drehung des Kopfes erhalten. Functions etc. p. 143. (Übersetzung, S. 158.) — Vgl. auch HIRTZIG, Untersuchungen u. s. w. S. 133.

²⁾ Untersuchungen u. s. w. S. 91—2; 48.

der reizenden Ströme auch noch die Dauer der Reizung, wie Hr. FERRIER¹⁾ wollte, von Bedeutung ist. Ohne jedes feiner mittel ist es für die mediale Partie der Nackenregion und für den Stirnlappen leicht zu constatiren, dass, um Bewegung vorzurufen, die reizenden Inductionsströme hier länger e müssen, als überall sonst am Scheitellappen. Der zu gering dauer möchte ich es darum auch zuschreiben, dass mit c vanischen Strome von der medialen Partie der Nackenregion selten, vom Stirnlappen aus gar nicht ein Reizerfolg zu erhal

Doch diese und mancherlei andere annoch dunkle Thi welche bei den Reizversuchen aufstossen, aufzuklären, ist hi sowenig unsere Sache, wie die noch fehlende Verbindung im V nisse zwischen den Reiz- und den Exstirpationserfolgen herz Uns genügt hier, dass die vermeintliche Unerregbarkeit de lappens sich als eine Täuschung erwiesen hat, und dass vo lappen aus mittels elektrischer Reizung gerade so Bewegung Hunde des Rumpfes, beim Affen des Nackens und des Rump herbeiführen lassen, wie von der Vorderbeinregion, der Hi region, der Ohrregion u. s. w. der Fühlsphäre im Scheitellap Bewegungen des Vorderbeines, des Hinterbeines, des Ohres Dadurch ist die Richtigkeit dessen, was unsere Exstirpations ergaben, dass die Stirnlappen-Rinde beim Hunde die Rump beim Affen die Rumpfregeion und die Nacken- (Hals-) region d sphäre darstellt, noch besonders verbürgt. Und neu hinzug ist die Einsicht, dass unsere Rumpfregeion ihren Namen ir Umfange verdient. Denn wenn ich auch bloss hin und w Hunden, welchen beide Stirnlappen abgetragen waren, Störu Schnüffeln und Bellen beobachtet habe, so dass ich, zumal Schwierigkeit der Constatirung, gar kein Gewicht darauf ha dürfen, so ist doch nach den Erfolgen der Reizversuche a lappen nicht wohl daran zu zweifeln, dass unsere Rumpfregeion der normalen Haltung und der willkürlichen Bewegung der wirbelsäule auch noch die willkürlichen Brust- und Bauchbew beherrscht.

5. Schlussbemerkungen.

Einfach ist nunmehr die Stellung anzugeben, welche d lappen-Rinde innerhalb der ganzen Grosshirnrinde zukomm den Sinnessphären, in welche die Grosshirnrinde — gleichm beiden Hemisphären — zerfällt, der Schsphäre, der Hörsph Fühlsphäre u. s. w., in deren jeder die specifischen Empfir

¹⁾ Functions etc. p. 131—2. (Übersetzung, S. 143—4.)

Wahrnehmungen und Vorstellungen eines Sinnes zustandekommen und die zugehörigen latenten Erinnerungsbilder ihren Sitz haben, bildet die Stirnlappen-Rinde zusammen mit der Scheitellappen-Rinde die Fühlspähre und ist denjenigen Körpertheilen zugeordnet, welche nicht durch die Scheitellappen-Rinde vertreten sind: dem Rumpfe, bezw. dem Nacken und dem Rumpfe. In dem Masse, wie jeder andere Rindenabschnitt, hat dann auch die Stirnlappen-Rinde theil an der sogenannten Intelligenz, dem Inbegriffe und der Resultirenden aller primären Sinnesvorstellungen und der aus diesen weiter entwickelten complicirteren Vorstellungen; und zwar ist sie an der Intelligenz betheiligt mit denjenigen einfachen und verwickelteren Vorstellungen, welche die Gefühlswahrnehmung von seiten der mit ihr verknüpften Körpertheile zur Grundlage haben.

Aber wie ist denn der Widerspruch zu lösen, dass entgegen den Ergebnissen des Versuches Pathologie und vergleichende Anatomie so sehr anderes über die Stirnlappen lehren, dass Hr. HRTZIG, Hr. FERRIER und Hr. WUNDT in den höheren Seelenthätigkeiten, der Aufmerksamkeit, der Apperception u. dgl. m. die Leistungen dieser Lappen haben annehmen können? So drängt sich unabweislich jetzt die Frage auf, und ihrer Beantwortung darf ich mich zum Schlusse nicht entziehen.

Die vermeintlichen Lehren der Pathologie verflüchtigen sich bei näherem Zusehen geradezu in ein Nichts.

Wenn das Vermögen der Aufmerksamkeit und Gedankensammlung bei Idioten gering und unvollkommen ist, so sind dort in der Regel nicht die Stirnlappen mangelhaft entwickelt, wie Hr. FERRIER sagt, sondern die Stirnlappen und zugleich auch die anderen Lappen des Grosshirns. Einzelnen Fällen, in welchen die Stirnlappen vollkommen oder zum grössten Theile zerstört waren oder fehlten, stehen andere Fälle gegenüber, in welchen die Stirnlappen ganz normal waren; und für die ersteren Fälle ist es durchaus fraglich, ob nicht die übrigen Lappen, wenn auch nicht in dem Grade wie die Stirnlappen, doch gleichfalls geschädigt oder unentwickelt waren.

Dass beim paralytischen Blödsinn vorzugsweise die Stirnlappen erkrankt sind, würde, wenn es richtig wäre, nichts beweisen können. Aber es ist nicht einmal richtig, da man die diffuse Encephalomeningitis, welche zur progressiven Paralyse führt, die mannigfachsten Läsionen hat setzen sehen; und die Psychiater sind jetzt gerade auf dem besten Wege, die Abnormitäten der paralytischen Irren ebenso auf die Läsionen der verschiedenen Rindenpartien zurückzuführen, wie ich vor Jahren nach meinen Versuchen den »Blödsinn« habe zergliedern können.

Weiter, dass Krankheiten der Stirnlappen besonders ausgezeichnet sind durch Blödsinn oder allgemeine geistige Degradation, und dass

Verletzungen der Stirngegend bleibende Störungen der geistigen keiten und Eigenschaften mit sich bringen, das lässt sich bloss los und ganz willkürlich einzelnen Erfahrungen entnehmen, w eine sehr viel grössere Zahl gegentheiliger Erfahrungen gege steht. Darüber ist auch so sehr alles einig, dass, so vielfach letzten Zeit die Localisation der Hirnkrankheiten auf Grun gesammten vorliegenden Materials studirt worden ist, doch von Seite Schlüsse jener Art sind gezogen worden.

Endlich ist selbst das nicht zuzugeben, dass ansehnliche letzungen der Stirngegend ohne alle Bewegungs- und Sinnesstör verlaufen sind. Richtig ist nur, dass solche Störungen nicht den worden sind: und das will wenig sagen bei der Entwick welche wir die Grosshirn-Pathologie neuerdings im Gefolge der Biologie haben nehmen sehen. Hat man doch als Folgen von Räsionen, welche man ehemals ganz symptomlos verlaufen lie grosser Zahl Bewegungsstörungen erkannt und auch Sinnesstör herausgefunden, welche früher der Beobachtung ganz entgangen v

Nicht minder schlecht sehen wir es dann um die Lehre der gleichenden Anatomie bestellt.

Die vergleichende anatomische Betrachtung des Stirnlappens behrt vorderhand noch der wichtigsten Grundlage, indem die grenzung des Lappens weder auf Grund der Entwicklungsgesch noch auf Grund des Baues oder der anatomischen Verbindunge Lappens erfolgen kann, sondern bloss auf die Furchung der oberfläche sich stützt. Und selbst bei dieser so wenig bedeut Abgrenzung herrscht noch Willkür in der Wahl der hinteren furchen und in der Art, wie man zu dieser Furche die Grenze ergänzt. Ob man nun aber die hintere Grenze des lappens für den medialen Theil der Convexität am Sulcus cuneus bzw. Rolandi oder an der Hauptstirnfurche¹⁾ und für den lateralen Theil der Convexität an der Fissura Sylvii oder wiederum an der Hauptstirnfurche annehmen will, jedenfalls muss man bei der Vergleichung verschiedener Thiere dieselbe Begrenzung überall fest und darf nicht, wie es zu geschehen pflegt, beim Hunde und bei der Katze die Hauptstirnfurche, beim Affen und beim Menschen die Fissura Sylvii am lateralen Theile der Convexität die Grenze lassen. Wir können dann nicht schwanken, für die Hauptstirnfurche durchweg als Grenze uns zu entscheiden. Oben gebot es der

¹⁾ Beim Menschen ist unsere Hauptstirnfurche diejenige Furche, welche in ihrem einen Stücke als die senkrechte, in ihrem anderen Stücke als die Stirnfurche bezeichnet. Vgl. ECKER, Die Hirnwindungen des Menschen. schweig 1869. Fig. 1, S. 7.

siologische Standpunkt; denn hinter jener Furche liegen die Armregion und die Kopfreion der Fühlspäre gleichmässig nicht nur bei der Katze, beim Hunde und beim Affen, sondern auch beim Menschen, da ja dessen sogenannte untere (dritte) Stirnwindung, deren Läsion die ataktische Aphasie — den Verlust von Bewegungsvorstellungen für Lippen, Kiefer, Zunge — setzt, vollkommen der vorderen Partie der Kopfreion der Thiere entspricht. Hier verlangt dasselbe der Umstand, dass nur so die anatomische Unterlage zu gewinnen ist, auf welche es gerade ankommt.

Wirklich nämlich stellt sich so für die Säugethiere, welche bequem der Untersuchung zugänglich sind, ein gewisser Parallelismus zwischen der relativen Grösse des Stirnlappens und der Höhe der Intelligenz heraus. Das ist gar nicht zu verkennen; und es ist nicht richtig, was LONGET meint, dass das Schaaf hier aus der Reihe fällt. Mich stört nur, dass, wenn der Unterschied der relativen Grösse des Stirnlappens zwischen Hund und Affen dem Sprunge entsprechen soll, welchen dort die Intelligenz vollzieht, der so viel grössere Sprung, welchen die Intelligenz vom Affen zum Menschen macht, so wenig am Stirnlappen des Menschen sich documentirt. Denn vergleicht man, was allein vergleichbar ist, und begeht man nicht den Fehler, dass man die relative Grösse des Stirnlappens, auf welche es hier nur ankommen kann, mit seiner absoluten Grösse verwechselt, so kann man den Stirnlappen des Menschen dem des Affen gegenüber gar nicht auffallend mehr in Grösse und Faltung entwickelt finden, als es der Gröszen- und Faltungszunahme des ganzen Grosshirns entspricht. Ebenso sehe ich, wenn unter den Menschen selber mit der höheren Intelligenz eine grössere Ausbildung oder Faltung des Stirnlappens sich verbindet, die letztere immer mit einer entsprechend grösseren Ausbildung oder Faltung des ganzen Grosshirns verknüpft.

Doch davon ganz abgesehen, ist es ein anderes, jenen ungefähren Parallelismus zu erkennen, ein anderes, darauf hin den Stirnlappen die höheren Seelenthätigkeiten zuzuschreiben. Mit letzterem, wo es geschah, hat man die Grenzen dessen verkannt, was aus der vergleichenden Anatomie an sich zu entnehmen ist. Einen derartigen Schluss zu ziehen, dafür gebrach es schon an der Sicherheit, dass gleichmässig bei allen den Thieren die Grosshirnrinde zwischen denselben Furchen als Grenzen mit qualitativ genau denselben, nicht mehr und nicht weniger Leistungen betraut ist; und dafür fehlte weiter der bei irgendeinem der Thiere geführte Nachweis, dass durch die Schädigung der Stirnlappen eine Schädigung der höheren Seelenthätigkeiten bedingt ist. Nichts weiter als eine Vermuthung, brauchbar für die anderweitigen Untersuchungen, war es mithin, was jener

Parallelismus hinsichtlich der Functionen der Stirnlappen an die Hand gab; und die Vermuthung hat die Probe nicht bestanden, der Versuch hat sie jetzt als unrichtig erwiesen.

Die willkürlichen Deutungen und die unberechtigten Schlüsse ausgeschieden, widersprechen also Pathologie und vergleichende Anatomie in der Wirklichkeit nirgend den Ergebnissen des Versuchs. Aber diese Ergebnisse verhelfen uns auch noch zu einem richtigen Verständnisse der beiden einzigen Thatsachen, auf welche wir der eben gehaltenen Musterung stiessen, des ungefähren Parallelismus welcher zwischen der relativen Grösse des Stirnlappens und der Höhe der Intelligenz besteht, und der anscheinenden Symptomlosigkeit selbst ansehnlicher Verletzungen der Stirngegend. Dass offenbar gerade die beiden Thatsachen im Vereine es waren, welche so lange zur falschen Auffassung der Stirnlappen-Leistungen verführten, verleiht der besseren Einsicht hier einen besonderen Werth.

In der Reihe der betrachteten Säugethiere wächst ähnlich, die Intelligenz, auch die Beweglichkeit des Rumpfes: und diese, nicht jene, ist es, welche in der Entwicklung des Stirnlappens zum Ausdruck kommt. Für den Affen und den Menschen ist überdies noch eine besondere Vergrösserung des Stirnlappens dadurch gesetzt, dass die Nackenregion, sonst hinter dem Stirnlappen gelegen, hier, nicht destens zu einem ansehnlichen Theile, gleichfalls dem Stirnlappen zufällt. Ist nun auch nach Abzug dieser Region der Stirnlappen Affen noch immer verhältnissmässig sehr gross, so hat doch Abstand vom Hunde zum Affen jetzt nicht mehr das Störende vorher, zumal da die Rumpfregeion ausser der willkürlichen Bewegung auch die normale Haltung des Rumpfes beherrscht und deshalb beim Affen häufige, beim Menschen regelmässige aufrechte Haltung noch mit in Rechnung zu bringen ist.

Erinnern wir uns andererseits, dass die Brust- und die Bauchbewegungen, ferner die normale Haltung und sogar auch noch Theil der Bewegungen der Rumpfwirbelsäule von jeder Hemisphäre aus beiderseitig beherrscht sind, so lassen sich beim Menschen Störungen in alledem nach ansehnlicher Verletzung der Stirnlappen erst dann erwarten, wenn diese Verletzung eine beiderseitige symmetrische unter Umständen also, welche naturgemäss nur sehr selten sich wirklich finden und noch seltener die Constatirung der Störungen zulassen werden. Unsymmetrische Verletzungen beider Stirnlappen oder die ausgedehnte Verletzung eines einzelnen Stirnlappens werden aber günstigstenfalls bloss Störungen für die Seitwärtsbiegung und Drehung der Wirbelsäule mit sich bringen, Störungen, welche gegenüber den auffälligen Bewegungsstörungen am Arme, am Beine,

Köpfe u. s. w. sehr zurücktreten, und an deren Beachtung man noch kaum gedacht hat.

Die Berechtigung, unsere Ermittlungen am Affen so, wie ich es eben that, auf den Menschen zu übertragen, kann, weil es nur um die grössten Functionen der Hirntheile sich handelt, schon an sich keinem Bedenken unterliegen, vollends aber nicht, nachdem die vorausgesetzte Übereinstimmung beim Affen und beim Menschen für andere Grosshirnpartien bereits mehrfach nachgewiesen ist. Täusche ich mich nicht sehr, so liegen sogar schon pathologische Erfahrungen vor, welche mit unseren Versuchsergebnissen im Einklange sind. Denn ich finde bei der Durchsicht der pathologischen Litteratur für Idioten, für Mikrocephalen, für Fälle ausgedehnter Stirnhirn-Läsionen manchmal den krummen Rücken, die vornübergebeugte Haltung, auch die Unfähigkeit zu normalem Stehen und Gehen — bei freier Beweglichkeit der Glieder — verzeichnet. Indess mag bei der Gesamtbeschaffenheit des Materials von einer Bestätigung unserer Ermittlungen vorerst keine Rede sein. Bessere pathologische Ergebnisse werden nicht ausbleiben, nachdem der alte Aberglaube von den höheren Seelenthätigkeiten im Stirnhirn durch die Erkenntniss von dessen Leistungen beseitigt ist.

Ausgegeben am 27. Juli.

1882.
XXXVII.

SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

27. Juli. Sitzung der philosophisch-historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. CURTIUS.

1. Hr. WEBER las: Über den Kupakshakaucikâditya des Dharmasâgara.

Die Mittheilung folgt umstehend.

2. Vorgelegt wurde die von Seiten des Hrn. Prof. Dr. D. H. MÜLLER in Wien an den vorsitzenden Secretar und Hrn. DILLMANN gemachte briefliche Mittheilung, dass der in den Zeitungen gemeldete Tod des Dr. SIEGFRIED LANGER sich leider bestätigt habe; eine Mittheilung, welche die Theilnahme der Classe um so mehr in Anspruch nahm, da dieselbe in ihrer letzten Sitzung beschlossen hatte, die wichtigen Forschungsreisen des Dr. LANGER mit 1200 Mark aus ihren Mitteln zu fördern. Der junge Gelehrte ist am Wadi Bonna von seinen verrätherischen Begleitern aus dem Stamme Daëri während des Badens ermordet worden. Seine Papiere sollen in's Wasser geworfen sein.

Über den
Kupakshakaṇḍikāditya des Dharmasāgara,
Streitschrift eines orthodoxen Jaina,
 vom Jahre 1573.

Von ALBR. WEBER.

Bei der Durchmusterung der seit dem 10. November 1852 für die hiesige Königliche Bibliothek erworbenen Sanskrit- und Prākṛit-Handschrift, behufs Fortsetzung meines 1853 erschienenen Verzeichnisses des damaligen Bestandes derselben, traf ich u. A. auch auf das oben genannte Schriftchen, von dem ich hier kurzen Bericht erstatten will.

Leider ist die zudem sehr incorrect und flüchtig¹⁾ geschriebene Handschrift nur ein Fragment. Sie besteht aus 29 Blättern (eigentlich nur 28, denn das fünfte ist als 5 und 6 paginirt), die Seite zu 1 bis 5 Zeilen Text in der Mitte, zu 47—54 akshara, und zu 13 bis 19 Zeilen Commentar darüber und darunter, zu 58—60 akshara.

Darauf ist enthalten das erste Buch (viçrāma), mit 100²⁾ Prākṛit-āryā, und 21 vv. des zweiten Buches des oben genannten Werkes, welches seinerseits vermuthlich aus elf dergleichen Capiteln bestehen mag, da das erste allgemeinen Inhalts ist, und die folgenden Capitel wohl eben einzeln je eine der zehn heterodoxen Secten, deren Widerlegung den Inhalt des Textes bildet, behandeln werden; zu 1,2 wird nämlich ausdrücklich bemerkt, dass die siebente Secte in dem achten viçrāma, der auch noch zu 1,40 citirt wird, zur Darstellung kommt. — Der jedem Verse beigegebene, meist sehr ausführliche Commentar in Sanskrit rührt von dem Verfasser selbst her.

Derselbe giebt theils im Text selbst, theils im Commentar sehr bestimmte Auskunft über sich. Er verherrlicht im Eingange in drei Versen (3—5) seine drei nächsten guru, den Ânandavimalasûri, den siri Vijayadânasûri und den siri Hīravijayasûri, bekennt

¹⁾ Daher viele Auslassungen, die am Rande nachgetragen sind.

²⁾ Anscheinend 101; die Zahl 89 ist bei der Verszählung übersprungen.

sich resp. speciell als Schüler des Letzteren, und giebt als Datum der Abfassung das Jahr samvat 1629, AD. 1573, an.

Völlig hierzu stimmende Angaben finden sich in der Gurvāva einem anderen Schriftchen desselben Dharmasāgara vor, in welcher die sechzig Patriarchen der Jaina-Kirche, von Sudharma, dem ersten Nachfolger Mahāvira's an, bis auf seine eigene Zeit aufzählt wobei er denn dieselben mit den eben genannten drei, also 1 (58.) Ānandavimalasūri (geb. Vikr. 1547, † 1596), (59.) Vijayanāsūri (geb. 1553, † 1622), den er auch als seinen eigenen Lehrer bezeichnet,¹⁾ und (60.) Hiravijayasūri (geb. 1583) beschliesst. Auch die Gurvāvali ist in Prākṛit und der Selbstcommentar dazu in Saṁskṛit verfasst; wir haben darüber, resp. über die höchst interessanten synchronistischen Angaben, welche Dh. in seinen Commentar dicht verflochten hat, demnächst einen eingehenden Bericht von Dr. J. KLATT zu erwarten. Es finden sich darin allerhand Berührungspunkte mit dem Inhalt der Schrift, die uns hier beschäftigen soll, s. im Verlaufe.

Der Zweck dieser Schrift nun wird schon durch ihren Titel kuvakkhakosiasahassakiraṇa (so in 1,99 und in der Überschrift des Capitels 1) d. i. kupakshakauçikasahasrakiraṇa, oder kürzer kauçikāditya (so im Eingangsverse des Commentars) »Sonne der Eulen der Irrlehre« deutlich genug angegeben. Sie soll, die Sonne bei ihrem Aufgang die unheilvoll krächzenden Eulen scheucht, so ihrerseits die Irrlehrer verstummen machen und scheuchen. In diesem freundlich-urbanen Tone ist dann weiter auf die Darstellung selbst gehalten. Man kennt ja die Art, wie orthodoxe Eiferer gegen abweichende Ansichten vorzugehen pflegen, und die milden Jaina Indiens geben in dieser Beziehung ihren orthodoxen Brüdern in anderen Kirchensystemen nichts nach. — Es handelt sich nun im Übrigen hierbei nicht etwa um die alten sieben Schismen (ninhaga, nihnava), welche schon in den heiligen Texten selbst erwähnt werden,²⁾ sondern um zehn noch zur Zeit der Abfassung selbst bestehende neuere Irrlehren, die in 1,8, sowie in 1,71 aufgeführt und im Commentar dazu, resp. zu 1,1, speciell erörtert

¹⁾ mādrīçām api çishyāṇām çrutādidāne Vaiçramaṇānukāri.

²⁾ Die beiden ersten fallen noch in die Lebenszeit Vira's selbst, das erste nämlich die bahuraya (°ta) unter Jamālī in Sāvathī in das Jahr 14 nach seiner Erlangung der Einsicht, — das zweite, die jivapaesia, unter Tisagutta in Usabhapura in das Jahr 16 darnach; — das dritte Schisma, die avvattaya unter Āsāḍha (in Verbindung mit dem Muria, Maurya, Balabhadda in Rāyagiha) in Seabiā fällt in das Jahr nach Vira's Tode, — das vierte, die sāmucheā, unter Āsamitta in Mihilapura in das Jahr 220 darnach, — das fünfte, die dokiriya, unter Gaṅga in Ullamattra (Ullugā°, Ullukā°) in 228 (in Verbindung mit Ayyarakkhia und Pūsamitta), — das sechste, die terāsia, unter Chaluga in Purimaṁtaramji (?) in 544, — das siebte die abaddhia, unter Gotthāmāhila in Dasapura in 584. So nach Āvaçyaka mjj. 8,94

werden. Dieser letztere Umstand setzt uns glücklicher Weise, unter Heranziehung der entsprechenden Angaben im Schol. der Gurvāvali,¹⁾ in den Besitz der nöthigen Information, obschon von der Einzeldarstellung über die zehn Secten uns eben nur die ersten 21 vv. des zweiten Capitels vorliegen, in welchem die erste derselben verhandelt wird. Das erste Capitel nämlich beschäftigt sich in seinen 100 vv. ex professo nicht mit ihnen, sondern vielmehr (von v. 10 an bis 94) mit dem Wesen der Kirche selbst, dem tirthasvarūpam, und zwar handelt es sich hierbei denn also um die Çvetāmbara-Form derselben, die dem Verfasser, einem eifrigen Kämpen, als die einzig orthodoxe gilt.

Die betreffende Untersuchung ist eine sehr eingehende. Das tirtham, die Kirche also, um es kurz zu sagen, wird zunächst definirt als eine aus den vier Gruppen: sādhu sādhi çrāvaka çrāvikā, d. i. dem männlichen und weiblichen Clerus und den männlichen und weiblichen Laien bestehende Gemeinschaft (caūvvaṇṇo saṃgho), welche von einem bestimmten Stifter, tirthakara, gegründet ist, deren es in fortlaufender Reihenfolge 24 giebt, von Ṛishabha als dem ersten an, bis auf Pāsa (Pārçva) und Vira, welcher letztere der Stifter des jetzt bestehenden tirtham ist. Und zwar muss ein solcher Stifter durch den Besitz der höchsten Einsicht, kevalajnāna, womit die Erinnerung an alle Vorgeburten etc. verbunden ist, zur Gottwürde selbst gelangt sein. Die Lehre desselben, durch ununterbrochene Tradition weiter fortgeführt, führt den Namen āgama, resp. siddhānta. Die Ansprüche der kupākshika, Irrlehrer, dass auch sie zum tirtham gehören, resp. selbst ein tirtham bilden, sind haltlos²⁾, da ihre Stifter nicht die Eigenschaften haben, die einem tirthakara zukommen. — An der Spitze der Clerus, der sādhu, steht ein sūri, Patriarch, der von Sudharma abwärts, welcher seinerseits durch Vira nominirt war, je immer durch seinen Vorgänger in seine Stelle eingesetzt worden ist; die Lehrer der kupākshika (lumpākādi) haben schon darum keinen Anspruch auf den Titel sūri, weil ihnen eben die richtige Inthronisation fehlt. Auch das sūtram derselben ist kein wirkliches sūtram, sondern hat nur den Schein eines solchen. Auf Geschriebenes (pustaka) ist überhaupt nicht sowohl Gewicht zu legen³⁾, als vielmehr auf die richtige Überlieferung! Die kupākshika speciell schieben dem Vira ganz falsche Lehren unter. Sie sind resp. aus der richtigen Lehre gefallen (pavayanaū bhatthā, pravacanato bhrashtāḥ), weil ihnen die richtige Unterordnung unter den guru fehlt (guruparatamtavirahī) und sie sich in

¹⁾ Vergl. auch die Angaben bei WILSON Sel. works 1,339 ff. ed. Rost.

²⁾ ete daçā 'py atirthakaramūlakā na tirtham, kiṃtu marumaricikāyāṃ jalābhāsa iva tirthābhāsas tirthabāhyāḥ.

³⁾ atha pustakavādino yad eva pustake likhitam tad eva pramāṇam na punaḥ paramparāyātām api 'ti vadanti, tad asamyak.

der Darstellung von Abwegen gefallen (ummaggaparūvaṇarasiā).¹ Zwar wird im Schol. an dieser Stelle (2,2), wie schon vorher ein im Texte selbst (1,71 fg.), je die Hauptlehre einer jeden der zehn Sekt aufgeführt, was für uns bei dem fragmentarischen Charakter des Manuscriptes zur Bestimmung der Stellung derselben, unter einander sowie eben zur orthodoxen Lehre selbst, von erheblicher Wichtigkeit

Vorauszuschicken ist hier noch, dass nach Dh. (zu 1,9) unter den von ihm behandelten zehn Secten, nämlich 1—3 und die digambara, paurnimāyaka, aushṭrika und pāṇacandra, aus dem tīrtham direct hervorgegangen sind, drei dagegen, nämlich 4—die stanika (?!), sārḍhapaurṇimāyaka und āgamika, Abzweigungen der zweiten Secte (paurn.), drei endlich, nämlich 7—9, die lumpkaṭuka und vaṃdhyā, weder aus dem tīrtham, noch aus einer Abzweigung desselben, sondern rein aus sich selbst, svata eva smikanimittakāḥ, hervorgegangen sind (so jedoch, dass er 9 eine Abzweigung aus 7 bezeichnet). — Dh. bemerkt im Übrigen noch, dass ausser den von ihm aufgeführten zehn Secten es noch andere gebe, welche die eine oder andere Lehre in Abrede stellten¹). Dass sie seien sämmtlich mit jenen auf gleiche Stufe zu stellen. (Daher würden dann also auch jene »minor sects« einzureihen sein, denen WILSON a. a. O. S. 341 fg. spricht.)

1. An der Spitze stehen denn nun also hier die khavaṇaya (1 resp. khamāṇa (1,37-71. 2,3), d. i. kshapaṇaka, im Schol. auch, zwar in stetem Wechsel, als digambara, nagnāṭa, boṭika bezeichnet. Und zwar handelt es sich hierbei um eine specielle Wiedererweckung des alten Gymnosophistenthums,²) welche (2,4) in das Jahr nach Vira,³) d. i. nach der Rechnung, die den Beginn der Vikra Aera 470 nach Vira verlegt, in das Jahr Samvat 139 = AD. gesetzt wird. In dieses Jahr wird resp. das Auftreten der Bodhi auch in der Âvaçy. nijj. 8,92 verlegt, und die dortigen Angaben stimmen auch im Übrigen genau zu dem, was uns hier darüber berichtet wird, nur dass gerade des hauptsächlichsten Umstandes, Nacktheit nämlich, die aber freilich wohl durch den Namen Boḍiya selbst markiert ist,⁴) dort nicht direct gedacht wird.⁵)

¹) upalakshaṇād anye 'py upadhānādyapalāpinas tathābhūtā evā 'vagaṃtavya

²) S. WILSON l. c. S. 339.

³) Unter dem vierzehnten Patriarchen Vajrasena, der Gurv. zufolge.

⁴) In Haribhadra's Schol. (ṣishyahitā) daselbst zu 8,59 durch Pauṭika erklärt, was jedoch unklar bleibt. Ich denke vielmehr an mahr. boḍanā bare uncovered (das dings hauptsächlich vom Kopf), boḍakāviṇem to bare, strip, denude, to make look naked.

⁵) disertis verbis wird dieselbe freilich auch hier im Texte nicht aufgeführt, ja auch nicht durch den Namen markiert, denn der Text hat eben nur die Namen

Dharmasāgara selbst im Eingange seines Commentars auf jene Stelle des Āvacy. hinweist, so halte ich es für zweckmässig, sie hier zunächst anzuführen:

chavvāsasayāi navuttarāi (— zu viel) tañā siddhim gayassa Virassa |
to Bodhiāna ditthi Rahavirapure samuppannā || 92 ||

(in einer andern Handschrift lautet das zweite Hemistich:

Rahavirapure nayare khamanā pāsamdiya jāyā ||)

Rahavirapuram nayaram Divagam uyyānam Ayyakanhe a |

Sivabhūiss' uvahimmi a pucchā¹⁾ therāna kahanā ya || 93 ||

ūhāe pannattam²⁾ Bodhiya³⁾ Sivabhūi³⁾ uttarāhi imam |

micchādamsanam inamo⁴⁾ Rahavirapure samuppannam || 94 ||

Bodhi³⁾ Sivabhūio Bodhalingassa hoi uppatti |

Ko(m)dinna-Kuṭṭavirā paramparāphāsam⁵⁾ uppannā || 95 ||

Hier dagegen heisst es (2, 4):

tass' uppatti navahi a chavvāsasaehi Viranivvāṇa |

Rahavirapure kambalakohāu Sahassamallāu || 4 ||

Und im Schol. dazu wird nun ausführlich berichtet, wie folgt:

In dem Dipaka-Hain bei Rathavirapura hatte sich Āryakṛishṇa niedergelassen. In derselben Stadt lebte ein königlicher Diener (rājasevakah), Sahasramalla mit Namen, auch Çivabhūti genannt, der des Nachts sich immer umhertrieb und so spät nach Hause kam, dass seine Frau sich schliesslich, weil sie dies nicht länger ertragen konnte, bei seiner Mutter beklagte. »Kind! wenn's so steht, schlafe du heute! ich will wachen«, sagte diese, und als nun ihr Sohn kam und die Öffnung der Thür verlangte, sagte sie zornig zu ihm: »gehe du hin, wo um diese Zeit die Thüren auf sind.« Von Zorn und Stolz getrieben, ging er fort und fand (die Erzählung ist hier sehr unklar) Aufnahme unter einer Schaar von Asketen (sādhu), mit denen er fortzog. Nach einiger Zeit kamen sie wieder zurück, und Çivabhūti erhielt von dem König, der ihm wohlwollte, eine kostbare wollene Decke. Seine Lehrer verboten ihm aber, dieselbe zu tragen, und er begnügte sich damit, sie täglich, wenn er heimkehrte, zu betrachten (saṃbhālayati). Um ihm auch diesen Hang zu benehmen, ward dieselbe einstmals, wäh-

form khavanaya, khamana; trotzdem aber ist sie darin voll anerkannt, denn es wird dagegen, nicht nur im Comm., sondern auch im Texte selbst, direct polemisiert. — S. im. Übrigen über die Nacktheit der Asketen das in meiner Abh. über die Bhagavati 2, 198. 239, 76. 310 Angeführte, und zu BUDDHA's Polemik dagegen s. Dhammapada ed. Fausböll d. 240. 244. 299. 398.

¹⁾ puvva° Haribh.

²⁾ ūhayā svatarkabuddhyā prajñaptam prāṇitam Haribh.

³⁾ Ohne Casusendung, blosses Thema; so oft in diesen kārīkās.

⁴⁾ inamo besteht aus enam, enad, und der affigirten Partikel o.

⁵⁾ sparcaṃ Har.

rend er weg war, zerschnitten und daraus Lappen zum Trocknen (Füsse für die sādhu gemacht; er ward darob zwar sehr erzürnt, blieb aber bei ihnen. Als nun dann einst der Lehrer einige Stellen aus der Schrift über die jinakappa erklärte, worin als der ganze für einen Jin nōthige upadhi, Besitz, nur ein rajoharanam und eine mukhavastril d. i. ein Besen, um den Staub fortzufegen (damit man nicht mit ein lebendes Wesen tritt), und ein Lappen vor dem Munde (damit man nicht etwa beim Athemholen ein Insect verschluckt), bezeichnet wird, frug Çivabhūti, warum man nicht danach handle. Auf seine Antwort, dass dies seit Jambūsvāmin¹⁾ abgekommen und jetzt nicht mehr ausführbar sei, erklärte er, dass doch offenbar nur so ein volles nishparigrahatvam, die Freiheit von allem irdischen Hab' und Gut, erreichbar sei, und da auch die frühern Jina ohne Kleidung gegangen seien, so sei dies eben auch das allein Richtige. Alle Einwürfe des guru nicht achtend, zog er darauf aus und lebte fort dem entsprechend. Seine Schüler aber, die seine Lehre zunächst fortpflanzten, waren Kaundinya²⁾ und Koṭṭavīra.

Es sind im Übrigen speciell neun Gründe, welche die digambara nach Dharmasāgara (zu 2,6) für die Nacktheit anführen, und die er seinerseits in eingehender Weise berichtigt (fol. 25^a bis 27^a):

1. die Kleidung ist nämlich jinānupadishṭa, von den Jina nicht vorgeschrieben, —
2. murchāhetu, giebt Anlass zu Eigendünkel³⁾ u. dgl.,
3. bhayaḥetu, desgl. zu Furcht vor Verlust durch Diebe, —
4. krodhāḥetu, desgl. zu Zorn etc. in solchem Falle, —
5. durdhyānaḥetu, verleitet zu schlechtem Sinnen (zieht vom richtigen dhyānam ab),
6. parishahasānārtham, schützt gegen die sogenannten parishaha, 6 duldproben, d. i. Hitze, Kälte, Stiche der Insecten u. dgl., wogegen der rechte Asket unempfindlich sein soll, —
7. pravacanagauravam, (? die ist mir nicht recht klar, ob etwa: sie leistet der Würde beim Vortrag Vorschub, während er durch sich selbst wirken sollte⁴⁾), —
8. arhānabhyupagata, sie ist von den (alten) arhant selbst nicht adoptirt worden, —
- und endlich 9. jinakalpikānabhyupagata, sie ist in den jin

¹⁾ Es ist dies der zweite Patriarch nach Vira, während Çivabhūti der Guṇavali zufolge 12 Generationen später unter dem vierzehnten Patriarchen lebte.

²⁾ Man gedenkt hier unwillkürlich an die eigenthümliche, etwas verächtliche Stellung, welche dieser Name im Mahābhāṣya einnimmt, s. Ind. Stud. 13, 387. 3. Der neben ihm daselbst in ähnlicher Stellung erscheinende Name Mātḥara wird Anuyogadvārasūtra (s. Bhagav. 2, 248) unter den Vertretern des loiyam nānam angeführt.

³⁾ name 'dam ity evamrūpeṇa rāgānushaṅgaḥ.

⁴⁾ Dh. hat hierzu nur Folgendes zur Widerlegung: vastrābhāve pravacana kḥi sāyā ('ne riramsāyā?) evā 'dhyaksha(!)siddhatvāt, gauravam tu, dūrāpāstam iti, d. wohl, »wenn der Lehrer nackt ist beim Vortrage, haben die Zuschauer nur ihn Scherz dabei; von Würde kann dann gar keine Rede sein.«

kalpa-Vorschriften nicht enthalten. In seiner Widerlegung dieser neun Gründe führt Dh. allerhand Stellen aus der Schrift, dem āgama, an, speciell eine, welche das Tragen der Kleidung aus Rücksichten der Scham und des Ekels und zum berechtigten Schutz gegen die parīshaha verordnet. Wenn man ganz consequent sein wolle, müsse man ja auch das rajoharaṇam und die mukhavastrikā bei Seite lassen, denn die seien doch auch noch parigraha; auch müsste man dann eigentlich auch den Leib selbst, die Nahrung u. s. w., vor allem aber das Wissen u. s. w. aufgeben, denn alles das kann auch sehr zum Schaden gereichen. Das Beispiel der tīrthakara besage gar nichts, denn die seien alle ohne Gleichen (nirupama).

Mit besonderer Energie wendet sich Dh. sodann weiter zu dem zweiten Kernpunkt in der Lehre der digambara, dahin lautend¹⁾: dass die Weiber von der Erlösung (mukti) ausgeschlossen seien, eine Lehre, die zweimal sogar ganz speciell (1, 71 und Schol. zu 2, 2) als das eigentliche Kennzeichen derselben angeführt wird. Es ist diese Lehre einfach eine Consequenz der ersten. Weil nämlich das Weib nicht nackt gehen kann, aus Gründen der Scham und des Ekels, so ist es eo ipso ausser Stande, die höchste Stufe in der Befreiung von allem irdischen Anhang zu erreichen. Die Legende berichtet zwar, dass die Schwester des Āvabhūti selbst, seinem Beispiel folgend, in der That auch ihre Kleidung abgelegt habe und nackt in die Stadt um Almosen zu betteln gegangen sei. Eine Hetäre fasste sie jedoch glücklicher Weise gleich beim Eingang ab, und umhüllte sie wieder, gegen ihren Willen, indem sie dabei von der Furcht geleitet ward, dass ihr eigenes Gewerbe leiden würde, wenn die Leute in der Stadt einen solchen widerwärtigen Anblick vor Augen bekämen. Und Āvabhūti, dem die Sache²⁾ vorgetragen ward, erliess denn auch ein Verbot an seine Schwester³⁾. Die Frauen gehen somit auch bei den Digambara bekleidet, gelten ihnen aber gerade darum eben als unfähig zur Erlösung; sie seien schwächer als die Männer und durch die ihrem Geschlecht nun einmal anhaftenden Mängel verhindert, sich zu gleicher geistiger Abstraction von allem Irdischen, wie dieselbe in dem Nacktgehen ihren vollendeten Ausdruck findet, zu erheben. Dharmasāgara nun geht (von 2, 19 ab, und zwar wie er angiebt in 24 Versen, also noch erheblich über das vorliegende Fragment, das ja mit v. 21 abbricht, hinaus) die Gründe und Gegengründe hierfür einzeln durch. In dem,

¹⁾ s. WILSON l. c. S. 340.

²⁾ eṣha vyatikaraḥ, ein Lieblingsausdruck des Dh.

³⁾ tato 'nena -vivastrā yoshin nitarāṃ bibhatsā 'tilajjaniyā ca bhavati- 'ti vicimtya proktā 'sau: tishṭha tvam ittham api, na tyaktavyaṃ tvayai 'tad vastraṃ, devatayā hi tave 'dam pradattam iti.

was von seiner Darstellung vorliegt, wendet er sich zunächst dagege dass das Weib schwach (durbalā), resp. schwächer als der Ma sei. Es gebe demselben in Bezug auf Körperbeschaffenheit¹⁾ samgh yana samhanana, Tüchtigkeit satta sattva, Rechtgläubigkeit sammat samyaktva, Entschlossenheit in der Entsagung virāiparināma virat und sonstiger Tugendübung wie Freigebigkeit u. s. w. nichts nac Die Mütter der tirthakara, heiligen Patriarchen, gehörten auch zu d Weibern, und es habe daher das Weib eine ganz besonders star Liebe zu der Jaina-Lehre (teṇa jīṇadhamme thīṇaṇ tivvo rāgo), a Grund wovon sie denn auch von der siebenten Hölle befreit seien (teṇa ṇa sattamigamaṇaṃ). Im Schol. hierzu führt Dh. speciell aus, da die Liebe der Mutter zum Sohn viel zärtlicher sei, als die des Vate: wofür er sich u. A. auf den Gram der Marudevi als ihr Sohn Rishab Asket wurde (pravrajita) beruft. — In der Religiosität, in dem Häng an der Kirche seien die Frauen notorisch den Männern sogar üb legen, und zwar nicht bloss in der Jetztzeit, sondern von altersh wofür er allerhand Beispiele aus der heiligen Legende (Mṛigāvatī der Gemahlin des Kauçāmbī Königs Çatānika, Sorge um Vira; eben: die der Revati bei der Krankheit Vira's nach dem Rencontre m Mamkhaliputta) sowie den Umstand anführt, dass der Tradition (āgam. zufolge die Zahl der weiblichen Anhänger der tirthakara von Rishab an stets doppelt so gross war, als die der männlichen. — Und wen auch anderseits die Schrift ganz Recht darin habe, dass dem Weib viel Böses anhafte, so sei doch gerade das Verdienst dēr Frauen die Alles das überwinden, um so grösser, und stünden dieselbe daher sogar über den Männern, freilich nicht Alle über Allen, abe doch eben Einzelne über Einzelnen, und damit — hier bricht di Handschrift ab, vermuthlich folgte etwa — sei denn eo ipso gegeben dass auch das Weib zur Erlösung gelangen kann. Dharmasāga hätte hier noch anführen können (vielleicht hat er es gethan), da sogar einer der heiligen 24 tirthakara selbst ein Weib war. Mal nämlich, der Neunzehnte in der Reihe, war, s. die Angaben in de Kalpāntarvācyāni zu Kalpas. 1, 19, eigentlich eine Prinzessin Mall Tochter des Mithilā-Königs Kumbha (und der Prabhāvatī), welcl in voller Jugendblütthe von sechs Prinzen umworben dieselben mittel einer ihr gleichenden goldenen Puppe zur richtigen Erkenntniss brach und zur Asketschaft bekehrte. (S. resp. noch das bei den Kharata resp. den Āṇcalika Bemerkte.)

¹⁾ Hier ist er sehr kurz, während dies gerade dēr Punkt ist, von dem digambara ausgehen.

²⁾ Es wird dies auf eine ausdrückliche Bestimmung des Vira zurückgeführt, dies auf Bitten seiner Mutter, aus Liebe zu ihr, so angeordnet habe.

Die dritte Lehre der digambara wird in 2, 3 mit den Worten: **(jēna vāṇiāe | ṇa) muṇei (muttim) bhuttim kevaliṇo kavalabhoissa || angeführt**, wobei denn wohl das ṇa¹⁾ nicht bloß zu vāṇiāe muttim, sondern auch zu bhuttim k. k. gehört? Danach verwerfen sie die für **den kevalin**, Asketen (? eigentlich die höchste Stufe eines solchen, **ein Arhant**) festgesetzte Art zu essen, dass er nämlich, um seinen **Hunger** zu stillen, immer nur je einen Bissen zu essen habe. Was **sie** nun aber eigentlich ihrerseits in dieser Hinsicht lehren, wird mir **aus** den Schol. a. a. O. nicht klar, und die betreffende Specialdarstellung im Verlauf des 2. Cap. fehlt ja eben.

In der Gurvāvali erwähnt Dh. die Digambara mehrfach. So eine Niederlage ihres berühmten Führers Kumudacandra in einer durch Jaysinhadeva König von Anahillapura veranstalteten Disputation gegenüber dem ṇi Devasūri, einem Schüler des 40^{sten} Patriarchen Municandra-sūri († samv. 1178), seit welcher Zeit jene Stadt »bis auf heute« den Digambara verschlossen blieb. Sodann eine weitere Disputation mit denselben am ṇi Çatrumjaya von Seiten des 46^{sten} Patriarchen Dharmaghoshasūri († samv. 1357).

Für die übrigen neun Gruppen der kupākshika sind wir unter den obwaltenden Umständen auf nur wenige Verse des Textes und auf die Angaben im Schol. theils dazu theils in der Einleitung beschränkt, und es dienen hier denn also die Angaben zur Gurvāvali zu willkommener Ergänzung. Ich schicke zunächst die Aufzählung der zehn Namen in 1, 8 voraus:

khavanaya-puṇṇima-kharayara- pallaviā saddhapuṇṇimā-”gamiā |
paḍimā-muṇi-ari vaṃjhā (!) pāso puṇa sampai²⁾ dasamo || 8 ||, —
reihe daran die Aufführung der Hauptlehren derselben, im Text
(1, 71—75):

evaṃ khalu titthagaram itthimuttim nisehagam khamanā 1 |
puṇṇimiā 2 puṇa puṇṇima- pakkhiadakkham jīṇam bīṇti || 71 ||
itthiṇam jīṇapūā- paḍisehaparāyaṇam pi kharayarayā 3 |
aṃcāliā 4 aṃcalayam parūvayamtaṃ pi saddhānam || 72 ||
phalapūāi niseham kuṇamānam saddhaponṇimo (!) 5 ariham |
suadevithuipamuham paḍisehamtaṃ nu āgamiā 6 || 73 ||
jīṇapaḍi^omāi ni^oseho- vaesakusalam la[vaṃti lumpāgā 7 |
so nach dem Schol.; das zweite Hemistich fehlt ganz || 74 ||
vijo (!) 8 vannaṇiṇo paḍimam mottūṇa lumpagam saccam |

¹⁾ welches übrigens erst von zweiter Hand zugefügt ist.

²⁾ sampratiçabdena etatprakaraṇakaraṇakāle daçānām api vidyamānatvam asūci;
es hindert dies nicht, dass zu 1, 2 die Secten 1—6 als alt jīṇa, die Secten 7—10
als ādhunika modern, bezeichnet werden, da diese Bezeichnung sich auf die Entstehungs-
zeit derselben bezieht.

aṇumittakanmabamḍhaṃ dhammam a bhāsaṃtam avi Pāso 10 || 75 |
sowie im Schol. zu 2,2:

unmārgaprarūpaṇarasikāḥ, unmārgaḥ: strīmuktnishedha-¹,
turdaṣṭipākshikanishedha-², parvātiriktadinaposhadhanishedha-³, sā
yikāḍau ṣrāddhamukhavastrikānishedha-⁴, jinabimbānām purāḥ ph
direjā (pūjā!) nishedha-⁵, ṣrutadevatāstutinishedha-⁶, jinapratī
nishedha-⁷, samprati gurudṛikpa¹)thāvatāranishedha-⁸, paramparāg
prāyovahuvidhinishedha-⁹, jinapūjādishu sādḥūpadeṣanishedha-¹⁰,
mukhalakṣaṇaḥ, tasya prarūpaṇā tadvyavasthāpanāya kuyū
udbhāvanā, tatra rasikāḥ, —

und gehe sodann dazu, dieselben einzeln durchzumustern.

2. Die puṇṇima, puṇṇimīa, paurṇimāyaka (in der G
°mīyaka); paurṇimāyakāḥ punaḥ pūrṇimāyām pākshikavyavasthā
yo dakṣhaḥ tam jinam bruvamti Schol. zu 1,71. Diese Secte geht
Candraprabhācārya, den Bruder des in der Gurv. 40^{ten} Patriarchen
Municandrasūri († Vikr. 1178), zurück. Es liegt somit zwischen ih
Auftreten und dem der an erster Stelle genannten Secte ein Zeitr
von über 1000 Jahren, und da die folgenden acht Secten noch s
sind, so befremdet es eigentlich, dass Dh. (zu 1,2) die ersten sechs Se
zusammenfassen und sie so den letzten vier gegenüber (die
freilich erst dem Jahrhundert, in dem er selbst lebte, angehö
zum Theil in die jüngste Vergangenheit vor ihm fallen) als jīr
alt, bezeichnen kann.²) Faktisch sind im Verhältniss zu den Digam
alle die übrigen neun Secten: ādhunika; nur jene sind: jīrṇa.
Über die Entstehung der paurṇim° im Jahre Vikr. 1159 (AD. 1103) g
Dh. zur Gurvāvali unter No. 40 noch nähere Angaben als hier.
Neid auf den bei Gelegenheit der festlichen Aufstellung eines J
bimba durch einen reichen frommen Laien entfalteten Pomp se
Bruders, des Patriarchen, war es, der dem Candraprabha den
danken eingab, eine Secession, und damit die Stiftung einer eig
Gemeinde ins Werk zu setzen. Er gab vor, im Traum von
Padmāvatī einen Auftrag erhalten zu haben (ṣrāddhapratishṭhā p
māpākshikaṃ ce 'ty ubhayam apy anādisiddham tvam prarūpaya)
blieb bei seiner Neuerung trotz aller Warnungen des saṃgha, der
schliesslich ausstiess. Der Patriarch schrieb selbst zu seiner Wi
legung eine Schrift (in 70 Versen), die pākshikasaptatikā. — W
nun eigentlich die Neuerung selbst bestand, ist nicht völlig l
Dh. bezeichnet den Candraprabha hier (zu 1,2) als: caturdaṣṭyapaksh

¹) gpa in der Handschrift; só hier vielfach! ebenso wie auch sonst noch h
finales g mit virāma (statt k).

²) .. te tu sutarām tīrthabāhyā eve 'ti shaṭ kupākshikā jīrṇā iti janaprasid
athā "dhunikānām caturṇām madhye lumpākamatam ...

gata, und citirt eine Stelle aus der den Paurṇimāyaka zugehörigen kshetrasamāsavrittippaṣastī in Sanskrit, in welcher neben dem C. auch auf ṣṛi Dharmaghoshādayah¹⁾, und auf eine auf ṣṛi Bhadreṣvarasūri zurückgehende zweite Abzweigung (ṣākha) hingewiesen wird, so wie eine Stelle (in Prākṛit) aus der caritrapaṣastī des ṣṛi Asamatīrtha, wonach die Punnima-Lehre aus dem Vaḍagaccha, aus ihr das Saddhapunnimaṃ, und daraus wieder (der Wortlaut ist hier aber nicht ganz klar) der Kharayara hervorgegangen sei. Aber eine directe Erklärung dessen, was unter dem pūrṇimāpaksha zu verstehen ist, liegt nicht vor. Selbstverständlich handelt es sich dabei um den Vollmond, und zwar eben wohl um die Verlegung einer für den Vierzehnten (den Tag vor dem Vollmond) bestimmten Feier (caturdaṣipākshika zu 2,2) auf den Vollmondstag selbst? — Im weiteren Verlaufe (zu 1,7) wird für diese Secte auch noch der Name Rākāraktāḥ (Rākā = Vollmond), oder kürzer Rākāḥ allein, angegeben, und zwar werden dieselben dabei auch als upadhānanishedhaka, Verwerfer des upadhāna (?) bezeichnet. — Die unter 4—6 folgenden Secten sind nach Dh. spätere Abzweigungen der paurṇimāyaka.

3. Die kharatara oder aushṭrika, gestiftet Vikr. 1204 (AD. 1148) durch Jinadattācārya. Die Angaben Dh.'s über sie gehen erheblich auseinander. Während nämlich dem Text in 1,71 zufolge, s. oben, der kharatara dem Vīra fälschlich die Ansicht unterstellt, er habe den Frauen die Verehrung des Jina verboten²⁾, lässt sich Dh. im Comm. dazu darauf gar nicht ein und spricht vielmehr von einem Verbot des poshadha für andere Tage als die parvan³⁾; zu 1,2 aber bezeichnet er gar den Jinadatta als strijīnapūjotthāpaka, d. i. als Aufsteller⁴⁾ des Cultes eines weiblichen Jina! Und der letzteren Angabe entspricht, was Dh. zur Gurvāvali berichtet. Zur Zeit des 41^{ten} Patriarchen (ṣṛi Ajitadevasūri) fand bei Gelegenheit einer durch Jinavallabha berufenen (Synodal-)Versammlung zu deren Verherrlichung eine Feier statt, bei welcher Jinadatta die Cāmuṇḍā um ihren Segen anging⁵⁾, auf Grund wovon dann diese Versammlung als Cāmuṇḍika bezeichnet ward. Als nun aber in der Stadt sich das Gerücht von der Aufstellung und Verehrung eines weiblichen Jina verbreitete, fürchtete

¹⁾ Zu scheiden von ṣṛi Dharmaghoshasūri, dem 46^{ten} Patriarchen in der Gurvāvali Dh's.

²⁾ Ebenso Dh. im Comm. zu 1,7 strijāṃ Jinapūjānishedhakakharatara.

³⁾ parvātirikṭadinaposhadhanishedhapaṛāyaṇaṃ Kharatarāḥ; ebenso zu 2,2.

⁴⁾ Das Wort utthāpaka kann dem Zusammenhange nach hier nur diese Bedeutung haben; ulthāpana freilich finden wir bei den lumpāka (s. unten) gerade in der entgegengesetzten Bedeutung.

⁵⁾ Jinavallabhavyavasthāpitaṃ vidhisamgham eva ṣaraṇikṛitya tadvriddhaye mithyādrig (!) cāmuṇḍā "rādhitā.

sich Jinadatta vor Schlägen¹⁾ und floh auf einem Kameelwagen²⁾ Jāvalapura. Davon bekam er den Spitznamen Aushṭrika, der ihn erzürnte, dass er weiter dann wegen seiner immer steigenden Rauheit fernerer Spitznamen Kharatara erhielt³⁾. Wenn nach einer alten g in Prakṛit, die Dh. anführt (dieselbe enthält auch das Datum: Vikr. 1 die Entstehung der Kharahara (h statt der yaṣṛuti) nicht auf datta, sondern auf den Zorn des Jinavallaha zurückgeführt werden sei dies darauf beruhend, dass er eben jenen vidhisamgha berief (m desselben war), der in Folge des Auftretens des Jinadatta die Na aushṭrika, kharatara u. s. w. erhielt.

Weiteres liegt nun zunächst für die Kharatara hier nicht. Sehr bedeutungsvoll ist nun aber, dass, während Kharatara somit als Name einer ketzerischen Secte erscheint, dieser Name so s. WILSON am a. O. S. 337, als der eines der vornehmsten zahlreichsten Geschlechter der Jaina erscheint, das resp. WILSON von dem Patriarchen⁵⁾ Jineçvara who lived AD. 1024 (sa 1080), gegründet wurde, während von Jinadatta ibid. berichtet wird, dass er 1148 (das wäre gerade unser hiesiges Datum samvat 1 die »Ośwāl family and the madhya khartara branch« gegründet und dass er ein sehr berühmter Lehrer gewesen sei, dessen Fusstapfen »in plaster or stone« noch jetzt in einigen Tempeln, as at Bhel in Benares, erhalten seien. Nach Tod, bei WILSON S. 346 Pontiff of the Kharatara Gacha has 11000 clerical disciples scattered over India, the single community of Ośwāl numbers 100.000 families. Ich vermute nun, dass die Feindseligkeit unseres Dh. hier gegen Kharatara darauf beruht, dass er dem mit ihnen rivalisirenden T gacha angehört. Es ergibt sich dies aus seiner Verherrlichung

¹⁾ strijinapūjotthāpanena samghatādanabhayāt; hier ist utthāpana also Aufstellen.

²⁾ ushṭravāhano.

³⁾ sa nāmaçravaṇāj jātakrodhena sarosham bhāshamāṇaḥ kharataraprakṛitī jātaḥ kharatara ity asyā 'khyā 'taḥ. Sollte kharatara etwa auch geradezu: K bedeuten können? cf. khara, Esel, Maulthier, und die Bildung aṣvatara aus vatsatara aus vatsa.

⁴⁾ Von (58) Ānandavimalasūri bemerkt Dh. speciell, dass er die Kharatara Jessalmer etc. (Jesalamervādau) bekehrt habe.

⁵⁾ Der 40. bei WILSON; bei Dh. fehlt dieser Name; in die angegebene fällt bei ihm (36) Sarvadevasūri.

⁶⁾ Mehrere der Autoren und Schreiber der hiesigen Manuscripte bezeichnen als zum Kharatara-Gaṇa gehörig. Der in Calc. 1880 im Druck erschienene Ratna ist von einem Mitgliede des Vṛihat-kharataragacha zusammengestellt. Es giebt zwei eigene paṭṭāvalī der Kharatara, mit deren Bearbeitung, neben der von Gurvāvalī, Dr. J. KLATT ebenfalls für den Indian Antiquary beschäftigt ist. Der J Patriarch des Gacha heisst Jinamuktisūri, s. BÜHLER, Sitz. Ber. der phil. kl. der Wiener Akad. 1881 S. 579.

selben, unmittelbar nachdem er den zehn kupākshika jeden Anspruch auf Zugehörigkeit zum tīrtham abgesprochen hat. Er wirft sich da nämlich die Frage vor, ob nicht dieselben Gründe auch gegen den doch auch erst Vikr. 1285 AD. 1219 durch çri Jagaccandrasūri aus dem Vaṭagacha heraus gebildeten Tapāgacha angeführt werden könnten? Er verneint dies aber, indem er darauf hinweist, dass Jagaccandra, nicht, wie Candraprabha etc., unter Hervorhebung einer gegensätzlichen Lehre von dem Vaṭagacha sich abgelöst habe, sondern dass er nur, ähnlich wie Ānandavimalasūri,¹⁾ gegenüber dem im Werk lässig gewordenen Clerus (pramādaṇa kriyācithilam sādhusamudāyam parityajyn), der Anweisung seines eigenen guru folgend, die seit Sudharmasvāmin in ununterbrochener Reihenfolge überlieferte reine Lehre (daṇḍavidhacakraṇasāmācārikriyām) durch sein asketisches Leben (tapo'bhigraheṇa) wieder zu Ehren gebracht, und vom König dafür den Beinamen Tapā iti erhalten habe, von welcher Zeit ab der Vaṭagana diesen Namen: Tapā iti führe.²⁾ Und zwar habe eben zur Zeit nur diejenige kirchliche Gemeinschaft Anspruch darauf, wirklich zum tīrtham, zur Kirche, zu gehören, die ihrerseits zum Tapāgana sich zähle, keine andere; atas tapāgaṇasambandhy eva sādhu-ādisamudāyas tīrtham samprati Bharatakshetre, nā 'nya iti bodhyam. — Ganz entsprechend berichtet Dh. denn auch, und zwar zum Theil mit denselben Worten, in der Gurvāvali, dass Jagaccandrasūri, der resp. darin sogar direct als Patriarch (No. 44) fungirt, von dem Könige (ein Name ist nicht genannt) zunächst³⁾ den Ehrennamen Hiralā-Jagaccandra, und danach dann noch das birudam: tapā erhalten habe.

Es ergibt sich hieraus als Resultat, dass in unserem Werkchen hier eine specielle Parteischrift zu Gunsten der Ansprüche des Tapāgacha, als allein berechtigter, orthodoxer Ausdruck der Kirche zu gelten, vorliegt.

4. Die pallavia,⁴⁾ oder amcalia, auch bloss amcala oder stanika (?! so bei 1,7.9); gestiftet Vikr. 1213 (AD. 1157), beruhen wie die sārđhapaurṇimāyaka und die āgamika auf den paurṇimāyaka (sind

¹⁾ Hiermit ist offenbar der in Dh.'s Gurvāvali an 58. Stelle (s. oben) genannte Patriarch gemeint, von dem er ibid. berichtet, dass er harte Kämpfe mit den Vertretern der kumata geführt habe, s. unten.

²⁾ Gerade so wie unter den Patriarchen Susthita und Supratibuddha (No. 9 in der Gurv.) der Kauṭikagaṇa, unter Candrasūri (No. 15) der Candragacha, und unter U(d)dyotanasūri (No. 35) resp. Sarvadevasūri der Vaṭagacha selbst ins Leben gerufen sei.

³⁾ Weil er sich in dem öffentlichen Disput mit 32 Digambara-Lehrern in Āghāḍa-pura unspaltbar hart wie der Diamant, hirakavad abhedya, erwiesen hatte.

⁴⁾ pallavo vastrāṃcalaḥ tam eva sāmāyikādaḥ çrāvakāṇām upadiçati 'ti pallavika amcalikaḥ.

resp. pau^okamūlakāḥ) und gelten daher wie diese als ausgestos tīrthabāhyāḥ. In der Gurvāvali giebt Dh. Biṇapagrāma als den an, wo das āṃcalikamatam »paurṇimiyakaikāksha-Narasinhopādhy Nādhicrāvīkābhyām« d. i. doch wohl: durch den zu den Paurṇimāy gehörigen einäugigen Narasinhop^o und durch die Laienschwe Nādhī entstanden sei.¹⁾ Hier erscheint somit ein Weib als di bei einer Sectenstiftung betheiligt. Näheres liegt nicht vor. Aus Namen, resp. aus dem Schol. zu 1, 8, 2, 2 ergibt sich nur so viel, die Gläubigen (crāvaka, crāddha) bei der Begehung der sāmāyika -Handlungen statt der mukhavastrikā sich des Kleidzipfels zu bedie hatten, wohl eben um das Antlitz, resp. den Mund damit zu bedeck — Zu 1, 7 bezeichnet Dh. die stanika (? oder ob sūtika zu lesen als: crāddhānam pratikrāntinīshedhaka, d. i. wohl als: den Gläubi die Beichte verbiethend (?).

5. Die saddhapuṇṇima, sārddhapaurṇimāyakāḥ; gestiftet V 1236 (AD. 1180); hervorgegangen aus den paurṇimāyaka, und z nach Dh. zur Gurvāvali »paurṇimiyaka-Narasinhāsūritāḥ«, wele Narasinha denn also von dem soeben genannten, der ja auch noch Beinamen ekāksha trägt, zu scheiden ist. Weiter liegt zunächst ni vor; der Name scheint etwa anzudeuten, dass die Anhänger di Secte die betreffende Feier nicht bloss am Vollmond begingen, sondern auch die Hälfte (des vorhergehenden Tages, der caturdaṣi?) hin nahmen, und die Textangabe in 1, 73³⁾ scheint hinzuzufügen, dass sie di die Darbringung von Früchten als Zeichen der Verehrung verbo

6. Die āgamia, āgamika, auch tristutika (oder sru?) genannt Gestiftet Vikr. 1250 (AD. 1194), und zwar nach Dh.'s Angabe zur G āvali durch den paurṇimiyaka Devabhadra und durch den āṇca Çilaguṇa⁵⁾, in der Nachbarschaft (parisare) des çrī Çatrumjaya. Name tristutika, dreifache stuti, Lobpreisung ühend (?), steht mit Angabe des Textes selbst in 1, 73, wonach die āgamika die l preisung etc. der suadevi, çrutadevatā⁶⁾, d. i. der Göttin der (ligen) Überlieferung, verwerfen, in entschiedenem Widerspruch⁷⁾; ebenso führt auch der Name āgamika selbst vielmehr auf eine g

¹⁾ Anders WILSON l. c. S. 340 »the Anchalika-doctrine to Jinēśvara in 11

²⁾ Oder heisst sāmāyikādaḥ hier: bei Beginn des sāmāyika?

³⁾ phalapūjādiniśhedham kurvaṃtam arhaṃtam Schol.

⁴⁾ so in einem die Jahresdaten für die ersten fünf Secten enthaltenden Vers dem crāddhavidhiviniṣcaya, der auch zur Gurv. citirt wird. Ebenso: āgamikas & tikāḥ bei Dh. hier zu 1, 8.

⁵⁾ paurṇimiyakāṃcalikamatānirgatābhyām.

⁶⁾ çrutadevatāstutipramukhaṃ pratishedhayāṃtam āgamikaṃ; ebenso im S zu 2, 2.

⁷⁾ die Lesart trisrutika würde uns hierüber hinaus heben.

besondere Betonung des âgama, der heiligen Lehre, welche alles eher, als gerade diese Verwerfung erwarten lässt. Zur Sache selbst liegt mir jedoch zunächst weiter nichts vor.

Die bisherigen sechs Secten bezeichnet Dh. (s. oben) als jirṇa, alt, die folgenden vier als âdhunika, modern. Jedenfalls nehmen diese in seinen Augen eine weit wichtigere Stellung ein, als zum wenigsten die unter No. 4—6 genannten drei Abarten der paurnimâ-yaka, und man merkt seinen Angaben hier wie in der Gurvâvali den zum Theil noch ganz frischen Groll an.

7. Die paḍimâri, lumpāga, d. i. pratimâri, lumpaka¹⁾ oder lumpāka. Gestiftet Vikr. 1508 (AD. 1452) durch einen Schreiber Lumpaka; und zwar wird dabei der Umstand speciell erwähnt, dass diese Secte sich nicht auf lebendige Überlieferung, sondern nur auf ein Buch gründe, kevalapustakamûlaka. Ihre Lehre ist gegen die Herstellung von Jina-Bildern²⁾ gerichtet. Zu 1, 9 findet sich aber ferner noch die Angabe, dass von den unter 7—9 aufgeführten drei Secten die beiden ersten, Lumpāka-Kaṭukau, »grihasthau« »im Hause lebend«, d. i. also (s. unter 8) Gegner der Asketschaft, des Clerus, seien (die dritte wird als eine Abzweigung der ersten bezeichnet: vamdhyas tu lumpākân nirgataḥ). Damit hängt es denn wohl zusammen, dass es als eine Eigenthümlichkeit dieser Secte angeführt wird, dass sie »veshadhara« habe (tanmate veshadharâḥ), d. i. wohl dass bei ihnen Laien die »Tracht der Asketen« tragen, resp. als Patriarchen fungiren(?). Und zwar berichtet Dh. ganz speciell noch, dass diese veshadhara Vikr. 1533 (AD. 1477) von einem gewissen Bhâṇa, gebürtig aus Prâgvâta, wohnhaft in Araghattaka bei Mârodî, ausgegangen seien³⁾ (oder wie er sich zur Gurv. ausdrückt, dass ri° Bhâṇa ihr erster veshadhârin gewesen sei.)⁴⁾ Das Genauere über ihre Entstehung werde unter ihrem Namen im achten viçrâma auseinander gesetzt werden. Bei dieser Secte sei ihr Stehen ausserhalb der Lehre (pravacanabâhya) auch für Kinder, Hirten und Weiber notorisch. — Zur Gurv. erwähnt Dh. speciell zwei Fälle, wo Anhänger der Lumpāka-Secte dieselbe verlassen und sich wieder bekehrt hätten; unter (57)

¹⁾ WILSON l. c. S. 34 hat irrig lampaka. In der Gurv. findet sich ebenfalls wohl irrig unter Nr. 54 auch die Form lumka (lumkā khyâl lekhaât... lumkā matam pravrittam), an anderer Stelle dagegen richtig lumpāka, welcher Name: »Zerbrecher« also etwa unseren »Bilderstürmern« entsprechen könnte.

²⁾ jinabimba Dh. zu 1, 8; in der Gurv. ist jinapratimothâpanaparam nicht etwa auf die Aufrichtung von Jinabildern (s. oben), sondern auf deren Beseitigung zu beziehen, denn das pratimāvairitvam ist der Charakter dieser Secte.

³⁾ Mârodipratyâsannâraghattakavâstavya Prâgvâtajñâtiya Bhâṇakhyâd eva pravrittâḥ.

⁴⁾ tanmate veshadharâs tu sam 1533 varshe jâtâḥ, tatra prathamô veshadhâri ri° Bhâṇakhyo 'bhût.

çri Hemavimalasûri nämlich deren drei: ri^{c1}) Hânâ, ri^c Çripati, Gaṇapati, und unter (60) Hiravijayasûri einer: ri^c Meghaji, ihr Füh (Lumpakamatâdhipatiḥ) in Ahmedâbâd. Auch von der Lumpâka Morabi etc. (Morabyâdau) berichtet er ihre Bekehrung im Allgemeinen durch (58) Ânandavimalasûri.

Dh. bemerkt im Übrigen auch noch zu 1,8, dass die Bildfeindschaft der Lumpâka ebenso zu verstehen sei, wie die mu Feindschaft der Kaṭuka, nämlich als eine unbedingte. Eigentlich se ja freilich sämtliche kupâkshika »pratimâvairiṇas«; da sie näm die von dem Tirthakṛit gestiftete Kirche verlassen und ihr zum Tr ihre Neuerungen eingeführt hätten, womit denn also ihre Feindsch gegen den Tirthakṛit selbst constatirt sei, so wäre es ungereimt, i ihnen Liebe zu seinem Bildniss zu erwarten: katham tatpratimâma sidhyati 'ti svayam evâ 'loçyam.

8. Die muni-ari, resp. kaṭuka; und zwar ergibt sich letzte Name, da der Text von 1,7^b fehlt (s. oben), nur aus den Schol des Dh., resp. aus der Gurv. Gestiftet, und zwar der letzteren folge, denn in unserem Fragment hier finde ich nichts darüber an geben, Vikr. 1562 (AD. 1506), durch einen gewissen Kaṭuka. We auch alle die zehn Secten, die digambara etc.²⁾, Feinde der muni sei bemerkt Dh. zu 1,8, so hätten sie doch³⁾ eine jede ihren eigenen Gu der den Anschein wenigstens eines sâdhu, Clerikers, trage⁴⁾, und u der sâdhu-Würde betraut sei; die Kaṭuka dagegen lehnen dies sell dem blossen Namen nach ab, indem sie sagen: »muni komme uns nie zu Gesicht:« kaṭukas tu »nâ 'smaddrigpatham (kp!) âyâmti munay iti nâmamâtrenâ 'pi tatsvikâraçûnya iti kaṭuka eva munivairitve prasiddhaḥ.⁵⁾ Oder wie es bei ihm zur Gurv. heisst: »samprati s havo na drigpatham (kp!) âyâmti« 'ti prarûpaṇâpara-Kaṭukanân grihasthât tristutikamatavâsitât kaṭukanâmnâ matotpatih.

Aus dem hier (cf. auch das Schol. zu 2,2) hinzugefügten: jetzt »je kommen keine sâdhu (mehr) vor«, scheint hervorzugehen, dass Kaṭ ein Laie, grihastha, war, der den Glauben an die Möglichkeit, den seiner Zeit bestehenden Clerus zu reformiren, verloren hatte⁶⁾ und da

¹⁾ dies ist wohl die Abkürzung eines dieser Secte für ihre Patriarchen, veshadh (s. soeben), eigenen Titels; ob etwa rishi?

²⁾ yady api munivairiṇo digambarâdayo daçâ 'pi bhavaṃti.

³⁾ Es sollte heissen: so hätten doch die Übrigen...

⁴⁾ tathâ 'pi sâdhvâbhâsam svakiyaṃ-svakiyaṃ guruṃ sâdhutvena pratipannâ.

⁵⁾ Dies besagt doch wohl, dass der Name kaṭuka »scharf, beissend, rigoros« eben gerade diese Stellung der Secte markiren soll.

⁶⁾ Ein höchst interessanter Synchronismus mit unserer eigenen Reformat die ja auch ihre lumpâka, Bilderstürmer, hatte. — Speciell wäre im Übrigen s wohl an die ähnliche, dem Clerus als Solchem feindliche Stellung unserer Ka »Rigorosen«, Pietisten, zu denken.

nur auf die Laien noch seine Hoffnung setzte. In Dh.'s Commentar zu dem leider im Text (1, 74) fehlenden Hemistich liegt im Übrigen, eigenthümlich genug, eine erheblich weniger scharfe Fassung der Stellung der Kaṭuka vor; denn es heisst daselbst: tīrthārdha(m) cṛāvakaṣṛāvikālakṣaṇam api pramāṇam vadamtaṁ arhamtaṁ Kaṭukā (bruvanti); danach würde es sich somit hier nur darum handeln, dass »der (zweiten) Hälfte des tirtham, der männlichen und weiblichen Laienschaft, auch Auctorität« zukomme, womit denn also doch das Gleiche eo ipso auch für die andere Hälfte, die sādhu und sādhvī, den männlichen und weiblichen Clerus, zugestanden wäre. Wie dieser Widerspruch in Dh.'s eigenen Angaben zu lösen ist, non liquet. — Ein fernerer Widerspruch ist ja auch der, dass er zur Gurv. den Kaṭuka als von dem tristutikamata, d. i. der āgamika-Secte (s. oben), »durchräuchert« d. i. doch wohl: beeinflusst, bezeichnet während er hier zu 1, 9, s. oben, jede Beziehung der Kaṭuka zum tirtha sowohl wie zu den tirthanirgata, in Abrede stellt.

9. Die Vamjha, d. i. vamdhyā, oder vija, bija; ersterer Name in 1, 8 und im Schol. zu 1, 2, 9, der andere in 1, 75, im Schol. zu 1, 8, 75 und in der Gurv. Gestiftet Vikr. 1570 (AD. 1514). Der Zwiespalt der Namen ist vielleicht dahin zu erklären, dass vamdhyā Name der Secte, vija dagegen der des Stifters ist? Im Schol. zu 1, 8 heisst es nämlich: vadho (vamdhyo?) lumpākamatān nirgato Bijākhyā-nāmā veshadharah, tasmāt pravrittasya matasya loke vijāmati 'tīrthārdhā, und in der Gurv. . . lumpākamatān nirgatya Vijā-nāmnā veshadhareṇa vijānāmnā matam pravartitam. Ihr Hervorgehen aus der Lumpaka-Secte wird mehrfach erwähnt, und speciell heisst es in 1, 75, dass sie die (ganze) lumpaka-Lehre, mit Ausnahme der (Verwerfung der) Bilder, für wahr hielten¹⁾. Das Epitheton vāṇavihiṇa, welches Bija dabei erhält, erklärt Dh. durch vāṇair akārādibhir dravyaṣṛutahetubhir api hinah¹⁾, und will ihn damit also wohl als einen ungebildeten Analphabeten bezeichnen? Sollte der Name vamdhyā, unfruchtbar, baar, etwa ein dem entsprechender Spitzname sein? — Offenbar mit wortspielerischer Absicht erzählt Dh. in der Gurv. unter (58) Ānamdāvimālasūri, dass derselbe durch Bekehrung der Kharatara in Jessalmer, der Anhänger(?) der Vijāmatī(?) in Mevātadeṇa, und der Lumpaka etc. in Morabi etc. den Samen der Rechtgläubigkeit gesät habe, dessen reiche Früchte noch jetzt notorisch seien²⁾.

¹⁾ lumpākamate pratimāṇagikāras, tad asatyam, cesham tu satyam iva vadamtaṁ arhamtaṁ . . ; nach den Angaben zu 2, 2 verwerfen sie eben einen grossen Theil der traditionellen Vorschriften überhaupt.

²⁾ Mevātadeṇa ca Vijāmatiprabhritin . . pratibodhya samyaktvabijam upatam and anekadhā vṛddhim upagatam adyā pi pratitam.

10. Die Secte der Pāsa, Pāṣa, oder Pāṣacandra (zu 1, Gurv. gestiftet Vikr. 1572 (AD 1516). Genannt nach Pāṣacan aus dem Tapāgaṇa selbst, resp. aus dem im Nāgapura an Zweige desselben, stammt. Mit dieser Herkunft aus dem 7 hängt es daher wohl zusammen, dass Dh. zu 1,9 die Pāṣaca tīrthān nirgata bezeichnet, während er unmittelbar vorher zu 1 gleichzeitiger Bezeugung jener Herkunft, die Lehre des Pā als »grossentheils dem Lumpākamata ähnlich«¹⁾ bezeichnet, letztere er ja sonst als jeglicher Beziehung zum tīrtham entstellt. Die speciellen Angaben im Übrigen, die wir 1,75 Lehre desselben vorfinden,²⁾ geben immerhin, so dürftig sie die Annahme an die Hand, dass es sich bei ihm einmal nicht, allen den übrigen neun hier genannten Secten, nur um äussere Dinge, die in den Bereich des vinaya fallen, sondern um eine innere, dogmatische Differenz handelte. Seine Meinung schiedharma, dem Gesetz, eine, »ob auch nur geringe«, Beimischung karmabandha, Fesselung durch das Werk, die Werkthätigkeiten schreiben (?). Zu 2,2 freilich wird auch für ihn ganz besond. Gegnerschaft gegen den Unterricht durch die sādhu betont.

Nach Dh. Angabe in der Gurv. hatte Pāṣacandra in 1 ihm emporgehobenen (vyudgrāhite), d. i. wohl zu seinem Quartier gemachten (?), Viramadgrāma eine Disputation mit (5) davimalasūri, in der er unterlag, und auf Grund wovon dann vi sich zur rechten Lehre bekehrten, bhūyān jano Jainadharmam.

So weit Dh.'s Angaben über die zehn Irrlehren.

Nicht ohne Interesse ist es nun aber, wie er gegenüber ihm denselben aufgehefteten Stigma, dass sie sämmtlich auf Nagen ohne Auctorität beruhen, seinerseits diejenigen Fälle zuräumen sucht, in denen auch im tīrtham selbst Neuerungen vorliegen.³⁾

Er geht zunächst davon aus, dass die Satzungen des tīrtham auf dem āgama, der autoritativen Überlieferung beruhen. Anscheinend nicht der Fall sei, liege das nur an der oberflächlichen Einsicht dessen, der dies annimmt.

Von der einen jener Neuerungen sodann, der Annahme der Veränderung, welche die tīrthakara ihrerseits nicht kannten, haben v

¹⁾ anumātram api karmabandho yatra evaṃvidhadharmam manishamā 'rhamtam vadati.

²⁾ Pāṣacandro Nāgapuriya-Tapāgaṇān nirgatya prarūpanayā prāyo matasadriṣaḥ.

³⁾ Über die Entstehung des Tapāgacha s. oben.

oben gesehen, dass sie auf Jambū, den zweiten Patriarchen, zurückgeführt wird, und dass sie sich eben doch auch auf allerhand Stellen im āgama, resp. speciell darauf gründet, dass das Beispiel der tīrthakāra in dieser Beziehung, weil sie eben unvergleichlich, nirupama, seien, für die spätere Zeit nicht in Frage komme.

Ein zweiter Punkt ist die Verlegung der paryuṣaṇā von dem Fünften (pañcamī) auf den Vierten (caturthī) durch Kālakasūri.¹⁾ Da nun einmal — erklärt Dh. schlankweg — seit Kālakasūri das tīrtham den Vierten, nicht den Fünften, feiere, so sei es auch für einen Kuhhirten klar²⁾, dass, wer dies nicht thue, ausserhalb des tīrtham stehe. Vor Rishabha's parinayana sei auch die Ehe mit der leiblichen Schwester statthaft gewesen, seitdem aber sei sie durch Consensus omnium (sārvajaninapravṛtti) verboten.

Ein dritter Fall bezieht sich darauf, dass in dem von ॐ Vajrasvāmin überlieferten Texte eines den pañcanamukkāra³⁾ verherrlichenden Verses (eso pañcanamukkāro savvapāvapanāsano | maṅgalāṇaṃ ca savvesiṃ paḍhamam havaī maṅgalam ||) sich die Lesart havaī findet, während die frühere Lesart hoi gewesen sei. Dh. stellt dies zunächst ganz in Abrede, da ja die Lesart havaī, wie der ganze āgama, ewig, anādisiddha sei. Auch liege nirgendwo ein Anhalt dafür vor, dass ॐ Vajrasv. im Texte des āgama irgend etwas geändert habe. Ihm dies nachzusagen, während nichts der Art vorliege, sei aber sehr unrecht; und ebenso verfehlt sei es, seine Autorität, die mit der der tīrthakṛit selbst auf gleicher Stufe stehe, wie aus einem Lobspruche des ॐ Bhadrabāhusvāmin hervorgehe, in Frage zu stellen⁴⁾. Übrigens, selbst einmal den Fall angenommen, dass die Lesart havaī von Vajrasvāmin herrühre (V^omikṛita), so müsse man sich ihr doch fügen, theils schon eben darum, weil sie von V. herrühre, theils aber darum, weil eben auf Grund dessen das tīrtham Mahāvira's die-

¹⁾ S. JACOBI in ZDMG 34, 290.257. Kalpasūtra S. 115. Es geschah dies nach Dh.'s Gurvāvalī unter dem 12^{ten} Patriarchen ॐ Sihagiri.

²⁾ gopālasya 'pi pratitam.

³⁾ namo arihaṃtāṇaṃ, n. siddhāṇaṃ, n. āyariyāṇaṃ, n. uvajjhāyāṇaṃ, n. loe savvasāhūṇaṃ; s. JACOBI Kalpas. S. 33 u. 99. — Vajrasvāmin ist der 13^{te} Patriarch in Dh.'s Gurvāvalī, resp. der letzte Daçapūrvin.

⁴⁾ ... tam Vaghara(Vayara!)risiṃ namamsāmi (Āvaçy. 8.45) 'ity ādistutivacanaiḥ ॐ Bhadrabāhusvāmiprabhritibhiḥ mahāpurushaiḥ stuto yugapradhāno'py āgamavyavahāri ॐ Vajrasvāmi sarvajanapratitāḥ, āgamavyavahāriṇaṃ cā 'jñā na tīrthakṛid-ājñāto bhinnā, atas tadājñanollamghanam tīrthakṛitāṃ apy ājñāyā ullamghanam āvaçyakam iti dvitīyo 'pi mahādoshah. Hierbei bleibt denn freilich von Dh.'s Standpunkt aus räthselhaft, wie Vajrasvāmin, No. 13 in seiner Gurvāvalī, von dem um 7 Generationen früheren Bhadrabāhu, No. 6 ebendasselbst, der letzte daçapūrvin resp. von dem letzten caturdaçapūrvin, gelobt worden sein kann!

selbe nun einmal adoptirt habe; wer dagegen handele, scheide eo ipso aus dem tirtham aus¹⁾. Wer im tirtham bleiben wolle, müsse sich dem Verdict desselben anbequemen, gerade wie dies bei der Verlegung des paryushanā auf den Vierten der Fall sei. — Wenn denn nun Einige, die sich als Abkömmlinge des Keçikumāra aus dem Geschlecht des Pārçvanātha bezeichnen, angeben, dass bei ihnen traditionell die Lesart hamaṅgalam überliefert sei, diese Lesart somit, da ihre Quelle sogar ūbhavira noch hinausgehe, den Vorzug verdiene²⁾, nun so sei auch die anscheinende Diamantbau (?sudhānimānaḥ) hinfällig (nirastah). Da die Abkunft von Keçikumāra habe in der Gegenwart, wo nur die Abkunft von Sudharma (dem ersten Patriarchen) gelte, gar nichts bedeuten³⁾. Zudem habe sich ja auch Keçikumāra, da er bei çri Gāutama die fünf mahāvratā⁴⁾ angenommen habe, der Kirche Virā's angeschlossen. Virā aber habe dieselbe eben nur dem Sudharmasvām übergeben. Die Herren möchten sich daher simpel als Jünger der Sudharmasvāmin erklären, da zu einer Jüngerschaft im Anschluss an Pārçvanātha jeder Anlass fehle (çri Pārçvanāthatirthikabhavane prayojanābhāvāt). Wenn im Übrigen unter den Abkömmlingen des Keçikumāra so treffliche sthavira gewesen wären, so würden çri Bhadrabāhu et al. wohl deren Namen in der Sthavirāvali etc. aufgeführt haben, was aber nicht der Fall sei, tāni ca leçato 'pi no 'tkirtitāni⁵⁾. Wenn aber ferner die Abkömmlinge des Keçik. behaupten, es sei falsch, da die Nichtannahme der Lesart haviṁ māṅgalam von der Kirche ausschliesse, denn »unsere Commune, die wir hoi-maṅgalika sind, d. h. die Lesart hoi m. haben, ist die Kirche«⁶⁾, nun, so laufe dies »

¹⁾ anyathā tirthabāhyatā çakraçatāir api parākartum açakyā.

²⁾ Pārçvanāthasaṁtānīyasya Keçikumārasya 'patyānām asmākam paramparāya hoi māṅgalam iti pāthah çri Viratirthād api purātanaḥ kenā 'pi parākartum çakyate. Gemeint ist hier der im zweiten upāṅga als Bekehrer des Seyaviyā-Kōm Paesi auftretende Pāsāvaccijje (Pārçvāpatyīya) Kesi nāmaṁ kumāre. — Schlüsse dies upāṅga befinden sich einige Heilrufe an Pārçva und seine suya vāni (çrutasya vāni), die, entsprechend den obigen Angaben, auf eine noch moderner Zeit bestehende Verehrung des Pārçva hinführen. — Auch im Uttara Cap. 29 erscheint Kesi als Schüler des Pāsa. — Das Metrum erweist hoi als ältere Lesart!

³⁾ je ayyattāe samaṇā niggamthā viharāṁti te Sohammāvacciyya tti pravānavaçanāt Keçikumārāpatyavatasatkarāṇe gauravābhāvāt.

⁴⁾ S. Bhagavati 1, 185. JACOBI im Indian Antiquary 9, 160 1880.

⁵⁾ Den Zusatz: tasnāt çriKeçikumārasaṁtānavyatikarāḥ (die ganze Geschichte mit der Abkunft von K.) çri Gāutamavat saṁjāta iti saṁbhāvyaṭe verstehe ich nicht recht. Sollte er bedeuten: »wie von çri Gāutama keine apatyāni da sind«, so ist es auch mit Keçik. sein, d. i. ebenso wenig giebt es deren von Keçik.?

⁶⁾ Keçikumārāpatyānām hoi - māṅgalikānām asmākam āsmākiṇasaṁudhā tirtham.

eine Schändung des heiligen Textes hinaus¹⁾. Zwei echte tîrtha könne es nicht geben. Wenn daher die hoi-maṅgalika das tîrtham bilden, so stünden die havaï-maṅgalika ausserhalb desselben. Damit würden dann aber nicht nur Vajrasvâmin etc., die Vertreter der Lesart havaï²⁾, sondern ganz ebenso auch Bhadrabâhusvâmin etc., und deren Werke: *Āvaçyakaniryukti* etc., in denen wie wir oben sahen Vajrasvâmin verherrlicht wird³⁾, beschimpft. — Und wenn nun auch Jene demgegenüber diese Absicht ganz in Abrede stellen, und nur behaupten wollen, dass, als Keçikumâra sich durch Annahme der fünf mahâvrata bei çri Gautama an den Weg der Çvetâmbara⁴⁾ anschloss, çri Gautama denselben trotz der kleinen Differenz in Bezug auf den Wortlaut bei der Berichtformel⁵⁾ aufnahm, diese Differenz somit zugab, resp. darüber hinweg sah, und dass Keçik. resp. dieselbe nicht aufgab, so sei dies einfach falsch, denn der Wortlaut jener Formel wie das ganze Cermoniell, zu dem sie gehört, sei — in den tîrtha aller 24 tîrthakṛit stets ein und derselbe gewesen!⁶⁾ Denn sonst hätten ja, wenn man Textdifferenzen dabei statuiren, die zahllosen Schüler des Rishabha (ersten tîrthakṛit) bei dem Auftreten des Ajita (zweiten tîrthakṛit), die Schüler dieses wieder bei dem Auftreten des dritten tîrthakṛit, und so fort bis auf Vira (den vierundzwanzigsten tîrthakṛit) hin, je immer den bisherigen Text vergessen und den neuen lernen müssen!

Mit diesem die hartnäckigen hoi-maṅgalika unstreitig niederschmetternden Knalleffect sind dieselben für Dh. zunächst abgethan. Er macht sich jedoch hierauf selbst den Einwurf, wie es denn nun wohl komme, dass er unter solchen Umständen die hoi-maṅgalika nicht auch, geradeso wie die zehn andern Seeten, als ausserhalb des tîrtham stehend betrachte und behandle, und beantwortet diesen Einwurf sodann durch den Hinweis auf die sonstige freundliche Haltung derselben zum tîrtha, sowie auf ihre mannigfachen Verdienste um Bekehrung Andersgläubiger, kshatriya etc., auf Grund dessen sie theils den Namen *tippanaka-çrâvakâs* erhalten hätten⁷⁾, theils auch die von ihnen verfassten Werke

¹⁾ *sâmpratânâm âgamasyaï 'vâ 'mânyatâ syât.*

²⁾ *yadi hoi-maṅgalikâs tîrtham tarhi havaï-maṅgalikânâm atîrthatvâpattya çri Vajrasvâmyâdinâm amânyatâ syât.*

³⁾ *tadamânyatâyâm ca çri Bhadrabâhuprabhṛitipraṇitânâm çri Āvaçyakaniryuktayâdinâm apy amânyatâ spluṭai 'va.*

⁴⁾ wörtlich: *çvetavarnâdyupetanepathya.*

⁵⁾ *pratikramanâdisamâcâryâm hoi maṅgalam iti pâthe sann api kimcid (!) bhedaḥ çri Gautamasyâ 'py abhimato, na Keçikumâreṇa parityaktaḥ.*

⁶⁾ *namaskârâdishadâvaçyakapâṭhasya pratikramanâdyanushṭhânasya ca caturviṅçater api tîrthakṛitâm tîrtheshu bhedâbhavât.*

⁷⁾ *vidyâdicamatkâreṇâ 'nyatîrthikabhaktân kshatriyâdin pratibodhya çrâvakikṛitâraṇatâ, ata eva teshâm tippanakaçrâvakâ iti rūḍhiḥ.*

vom tirtham approbirt (angikṛita) seien. — Nun, bei dieser Milde liegen denn wohl also ganz persönliche, zeitgenössische Motive zu Grunde. Die hoi-maṅgalika hatten durch ihre Gelehrsamkeit und ihr Wissen Einfluss in hochstehenden Kreisen und Dh. sieht sich somit, bei aller principiellen Differenz, denn doch veranlasst, ihnen gegenüber die Krallen etwas einzuziehen. Man kann hieraus entnehmen, dass auch bei den rechtgläubigen Jaina, geradeso wie anderswo, der Satz: where is a will there is a way, seine Geltung hat.

N a c h t r a g.

Zu S. 807 Note ¹). Dr. KLATT theilt mir mit, dass in der Kharatara-Liste die Secte: Launka heisst; und dass Tod, Travels in Western India p. 357, sie ebenfalls Lonka nennt. Er sagt daselbst Folgendes über sie: »The Lonkas are deists; they worship the »One« alone and »not in temples made by art«, which they never enter. The mountain-top and sylvan solitude are deemed by them more fitting places to pour forth their homage.«

Auch bei W. MILES, on the Jainas of Gujerat and Marvar, Trans. R. As. Soc. III p. 364, werden sie: Lunka genannt. Derselbe berichtet auch S. 365 über die: Anchlia, Âṇcalika, S. 367 über: the Carvā Miti, d. i. das Kaṭukamatam, S. 369 über die Digambara.

1882.

XXXVIII.

SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

27. Juli. Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. DU BOIS-REYMOND (i. V.).

1. Hr. HOFMANN machte zwei Mittheilungen: 1. Über Alkylbromstickstoff; 2. Zur Geschichte der Chinoline.

2. Hr. EWALD legte eine Mittheilung des Hrn. Prof. W. DAMES vor: Über den Bau des Kopfes von Archaeopteryx.

3. Hr. KRONECKER las: Über die Subdeterminanten symmetrischer Systeme.

4. Hr. HELMHOLTZ machte eine Mittheilung: Zur Thermodynamik chemischer Vorgänge. Zweiter Beitrag. Versuche an Chlorzink-Kalomel-Elementen.

Die Mittheilungen 2., 3. und 4. folgen umstehend.

Über den Bau des Kopfes von *Archaeopteryx*.

Von W. DAMES.

(Vorgelegt von Hrn. EWALD [s. oben S. 815].)

Bei der Untersuchung der im Besitz des hiesigen königlichen mineralogischen Museums befindlichen *Archaeopteryx*, deren Resultate in einer ausführlichen, von Abbildungen begleiteten Beschreibung dargelegt werden sollen, ist durch Blosslegen der bisher noch von Gesteinsmasse bedeckt gewesenen Skelettheile zunächst eine genauere Einsicht in den Bau des Kopfes erlangt worden.

Als das Exemplar für die hiesige Sammlung erworben wurde, sah man auf der freiliegenden rechten Seite des Schädels zwei grosse Öffnungen, von denen die hintere, unter dem Schädeldach gelegene, unschwer als Augenöffnung erkannt werden konnte, und zwar um so leichter, als in derselben ein wohlerhaltener, knöcherner Augenring liegt, der aus einzelnen, schuppenartig übereinanderliegenden Plättchen besteht, ganz so, wie bei sehr vielen der lebenden Vögel. Der vordere Rand dieser Augenöffnung wird durch einen schmalen Knochen gebildet, der, etwas nach hinten gewendet, bis zur Basis des Schädels hinabreicht. Dieser Knochen, der nunmehr als das Lacrimale zu deuten ist, bildet zugleich die hintere Begrenzung einer zweiten, grossen und gerundet-dreieckigen Öffnung, in deren Mitte ein zerquetschtes, aus dem natürlichen Zusammenhange mit den übrigen Schädeltheilen gerissenes Knochenstück liegt. Diese Öffnung ist von denjenigen Autoren, welche über den Kopf der *Archaeopteryx* Mittheilungen gemacht haben, als Nasenloch gedeutet worden, so von C. Vogt¹⁾ und von O. C. Marsh²⁾. — Es zeigte sich nun, dass der vordere Theil des Schädels noch unter der Gesteinsmasse verdeckt lag, und erst durch sehr sorgfältiges Entfernen derselben ist der Schädel nunmehr in seinen Conturen völlig freigelegt. Hierbei ergab sich das wichtige Resultat, dass vor der bisher als Nasenloch gedeuteten noch eine vordere, dritte Öffnung liegt, welche,

¹⁾ Revue scientifique, 2^e Série, XVII. 1879. p. 242.

²⁾ British Association for the Advancement of Science at York. 1881.

schief zur Längsaxe des Schädels gestellt, eine spitz-elliptische Form und eine Länge von 9^{mm} besitzt. Sie ist hinten durch eine sehr Knochenbrücke von der mittleren Öffnung getrennt, oben und von einem sehr schmalen Knochen (Theilen des Zwischenkiefers) begrenzt und erreicht die Spitze des Schädels nicht; vor ihr liegt ein circa 4^{mm} langer, gleichseitig-dreieckiger Knochentheil, welcher die Spitze des Schnabels bildet. Diese Öffnung ist es, welche Nasenloch anzusprechen ist und ganz vom Zwischenkiefer umschlossen wird. Durch die Auffindung derselben ist nun eine viel größere Ähnlichkeit mit dem Schädel lebender Vögel hervorgetreten, als bis jetzt zu erkennen vermochte. Wie beim Vogel liegen Öffnungen auf der Seite des Schädels, eine hintere — Augenöffnung — eine mittlere, umschlossen vom Lacrimale hinten und Zwischen- und Oberkiefer vorn und unten, eine vordere — Nasenöffnung ganz im Zwischenkiefer. Durch diese Analogie mit dem Schädel lebenden Vögel ist aber auch das Studium der übrigen Schädeltheile wesentlich erleichtert. So wird das zerquetschte Knochenstück der mittleren Öffnung als der innere, aufsteigende Theil des Oberkiefers anzusehen sein und ein langer, an der Schädelbasis hinlaufender, durch den Augenring zum Theil verdeckter Knochen als Theil des Vomer, resp. der Gaumenbeine. Weiter ist das Quadratb wenn auch seiner genaueren Gestalt nach nicht mehr zu erkennen doch deutlich sichtbar, und dicht vor ihm ein kleiner, nur wenig aus dem Gestein hervorstehender Knochen, der seiner Lage nach das Pterygoid sein kann. Vom Schädeldach ist wenig erhalten, gesehen von der mit Kalkspath ausgefüllten Gehirnhöhle eigentlich nur Bruchstücke der Frontalia. Das Hinterhaupt fehlt.

Ein weiteres durch die Entfernung der Gesteinsmasse erzielt Resultat betrifft die Bezeichnung. Zwei kleine, unter der mittleren Öffnung stehende Zähne waren schon vor der Blosslegung deutlich sichtbar. Nach derselben sind nun im Ganzen zehn Zähne zu erkennen, welche im Kiefferrande stehen. Der vorderste von ihnen ist circa 2^{mm} von der Schnabelspitze entfernt; jedoch sind Anzeichen dafür, dass vor ihm noch ein oder zwei Zähne gestanden haben, die die Zahnreihe also bis zur Spitze des Schnabels reichte. Die Zähne sind circa 1^{mm} lang, zuckerhutförmig, sehr spitz und — soweit das an einzelnen kleinen Stellen mit wohlerhaltener Oberfläche erkennen lässt — glänzend glatt, ohne senkrechte Furchen oder Streifen. Zwischenräume von kaum 1^{mm} Länge trennen die einzelnen Zähne von einander. MARSH nahm l. c. an, dass die Zähne nur im Zwischenkiefer ständen, da der letzte noch unter dem Nasenloch befindlich sei. Nachdem aber der Nachweis beigebracht ist, dass die Zähne

als Nasenloch betrachtete Öffnung in der That die mittlere der drei auf einer Schädelseite befindlichen ist, ist vielmehr anzunehmen, dass die Bezahnung sich nicht auf den Zwischenkiefer beschränkte, sondern auch auf den Oberkiefer, wenigstens den vorderen Theil desselben, erstreckte. Ferner hat MARSH die Vermuthung ausgesprochen, dass die Zähne in einer Rinne standen; aber auch dafür hat die bisherige Untersuchung keine Beweise oder Anhaltspunkte geliefert; es scheint vielmehr, dass jeder Zahn in einer besonderen Alveole steht. — Der Unterkiefer ist noch in seiner natürlichen Lage, d. h. in seiner Gelenkung am Quadratbein und mit dem oberen Rande dicht am Schädel anliegend erhalten. Er zeigt einen postarticularen, nach hinten gewendeten Fortsatz, ähnlich wie er z. B. bei der Gattung *Anser* vorhanden ist. Die Lage des Unterkiefers, also die des geschlossenen Schnabels, verhindert zu beobachten, ob auch im Unterkiefer Zähne stehen, was ich mit MARSH für wahrscheinlich halte. Unter dem Unterkiefer liegt ein Theil eines nadelförmigen Zungenbeinhornes, wie solches bei lebenden Vögeln in ganz gleicher Ausbildung gekannt ist. — Die vielen sehr wichtigen Beziehungen, welche die *Archaeopteryx* im Schädelbau auch zu den Pterosauriern zeigt, werden in der ausführlichen Beschreibung derselben zur Erörterung kommen.

Schliesslich sei noch erwähnt, dass die noch nicht beendete Blosslegung des Schultergürtels bis jetzt ergeben hat, dass derjenige Theil, welchen C. Vogt¹⁾ als Coracoïden deutet, sich bei genauerer Untersuchung nicht als Knochen, sondern als Gesteinsmasse erwiesen hat, so dass erst nach Entfernung derselben der Bau des Schultergürtels, soweit die Erhaltung es erlaubt, erkannt werden kann. Alle Folgerungen, welche aus der Beschaffenheit dieser Skelettheile auf die Beziehungen der *Archaeopteryx* zu Vögeln und Reptilien gezogen werden können, werden sich somit noch ergeben müssen.

¹⁾ L. c. S. 242, Fig. 18.

1990

1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990

1990
1990

1990
1990

1990
1990

1990
1990

1990
1990

1990
1990

Die Subdeterminanten symmetrischer Systeme.

Von L. KRONECKER.

Bei Gelegenheit der Vorlesungen über die Theorie der Determinanten, welche ich in diesem Sommer an der hiesigen Universität halte, bin ich zu einigen, wie ich glaube, neuen Resultaten bezüglich der symmetrischen Systeme gelangt, die ich nebst ihren Anwendungen auf die algebraische Theorie der quadratischen Formen im Folgenden mittheilen will. Ich schicke zu diesem Zwecke Einiges über die Subdeterminanten beliebiger Systeme voraus.

Ich bezeichne zwei Systeme von n^2 Grössen

$$a_{ik}, a'_{ik} \quad (i, k = 1, 2, \dots, n)$$

als »reciprok«, wenn deren Zusammensetzung das »Einheitssystem« δ_{ik} ergibt, das heisst also, wenn

$$\sum_i a_{hi} a'_{ik} = \delta_{hk} \quad (h, i, k = 1, 2, \dots, n)$$

ist und $\delta_{kk} = 0$ oder $\delta_{kk} = 1$ ist, je nachdem die beiden Indices von einander verschieden oder einander gleich sind. Hiernach wird die Summe von Determinanten-Producten

$$\sum |a_{gi}| \cdot |a'_{ik}| \quad \left(\begin{array}{l} g = g_1, g_2, \dots, g_m \\ h = h_1, h_2, \dots, h_m \\ i = i_1, i_2, \dots, i_m \end{array} \right),$$

wenn dieselbe auf alle Combinationen von je m Zahlen i_1, i_2, \dots, i_m erstreckt wird, offenbar gleich der durch die Index-Systeme $(g_1, g_2, \dots, g_m; h_1, h_2, \dots, h_m)$ charakterisirten Subdeterminante des Systems δ_{gi} , also gleich Eins oder Null, je nachdem die beiden Systeme g_1, g_2, \dots, g_m und h_1, h_2, \dots, h_m mit einander vollständig übereinstimmen oder nicht. Daraus ergibt sich unmittelbar jener JACOBI'sche Hauptsatz über die Subdeterminanten (vergl. BALTZER's Determinanten-Buch V. Auflage, §. 7, S. 63), welcher sich folgendermaassen aussprechen lässt:

Zwei Systeme entsprechender Subdeterminanten von reciproken Systemen sind selbst einander reciprok, und da andererseits auch das System der adjungirten Subdeterminanten, dividirt durch die Determinante, das reciproke eines Subdeterminanten-Systems ist, so ist die Adjungirte einer jeden Sub-

determinante, dividirt durch die Determinante, gleich der entsprechenden Subdeterminante des reciproken Systems.

Bei dieser Fassung des JACOBI'schen Satzes erhellt übrige dass die scheinbar allgemeineren FRANKE'schen Entwicklungen 61. Bande des Journals für Mathematik (vergl. BALTZER's Determinanten Buch V. Auflage S. 68 und 69) vollständig darin enthalten sind. Der selbe Satz lässt sich auch einfach aus der Gleichung

$$\sum_i (u_{hi} + a_{hi}) a'_{ik} = \delta_{hk} + \sum_i u_{hi} a'_{ik} \quad (h, i, k = 1, 2, \dots)$$

herleiten, wenn darin die n^2 Grössen u_{hi} als Unbestimmte aufgefasst werden. Denn wenn man auf beiden Seiten die Determinante nimmt, so kommt

$$|u_{gh} + a_{gh}| \cdot |a'_{ik}| = |\delta_{gk} + \sum_h u_{gh} a'_{hk}| \quad (g, h, i, k = 1, 2, \dots, n)$$

und indem man die Coefficienten des Products $u_{g_1 h_1} u_{g_2 h_2} \dots u_{g_m h_m}$ auf beiden Seiten mit einander vergleicht, erlangt man die Relation

$$|a'_{ik}| \cdot \text{adj} |a_{gh}| = |a'_{gh}| \quad \left(\begin{array}{l} g = g_1, g_2, \dots, g_m \\ h = h_1, h_2, \dots, h_m \\ i, k = 1, 2, \dots, n \end{array} \right)$$

welche jenen Satz über die Subdeterminanten enthält.

Bedeutet nunmehr (a_{ik}) ein symmetrisches System, so dass $a_{ik} = a_{ki}$ ist, und setzt man

$$U_{ik} = \sum_{g,h} a_{gh} u_{gi} u_{hk} \quad (g, h, i, k = 1, 2, \dots, n)$$

so repräsentiren die Grössen U_{ik} die allgemeinen Transformirten der Grössen a_{ik} , da sie durch Substitution mit den unbestimmten Coefficienten u_{ik} daraus gebildet sind. Für die Subdeterminanten des Systems U_{ik} besteht die Gleichung:

$$|U_{ik}| = \sum_{(g)(h)} |a_{gh}| \cdot |u_{gi}| \cdot |u_{hk}| \quad \left(\begin{array}{l} g = g_1, g_2, \dots, g_m \\ h = h_1, h_2, \dots, h_m \\ i = i_1, i_2, \dots, i_m \\ k = k_1, k_2, \dots, k_m \end{array} \right)$$

wo sich die Summation auf alle Systeme von je m Indices $(g_1, g_2, \dots, h_1, h_2, \dots, h_m)$ bezieht. Jede Subdeterminante der Grössen U_{ik} ist eine »Form« der Unbestimmten u_{ik} , deren einzelne Coefficienten die sämtlichen verschiedenen Subdeterminanten (m^{ter} Ordnung) Systems (a_{ik}) gebildet werden. Zwischen den verschiedenen Ausdrücken

$$|u_{gi}| \cdot |u_{hk}|, \quad \left(\begin{array}{l} g = g_1, g_2, \dots, g_m \\ h = h_1, h_2, \dots, h_m \\ i, k = 1, 2, \dots, n \end{array} \right)$$

welche mit den verschiedenen Subdeterminanten $|a_{gh}|$ multiplicirt existiren aber lineare Relationen und zwar genau dieselben, welche zwischen diesen Subdeterminanten selbst bestehen, wenn die Grössen a_{ik} ebenfalls als unbestimmte Grössen betrachtet werden. Da nämlich bei der Transformation der quadratischen Form

$$\sum_{g,h} a_{gh} x_g x_h \quad (g, h = 1, 2, \dots, n)$$

die Summe von n Quadraten die Grössen a_{gh} die Gestalt

$$a_{gh} = \sum_r \frac{f_{gr} f_{hr}}{\phi_r} \quad (g, h, r = 1, 2, \dots, n)$$

men, in welcher f_{gr} , ϕ_r ganze ganzzahlige Functionen der Grössen g, h, r bedeuten, und da also

$$|a_{gh}| = \sum_{(r)} \frac{|f_{gr}| \cdot |f_{hr}|}{\phi_{r_1} \phi_{r_2} \dots \phi_{r_m}} \quad \begin{pmatrix} g = g_1, g_2, \dots, g_m \\ h = h_1, h_2, \dots, h_m \\ r = r_1, r_2, \dots, r_m \end{pmatrix}$$

so erscheinen die Subdeterminanten $|a_{gh}|$ als Aggregate von u_{gi} und u_{hk} :

$$|a_{gh}| = \sum_{i,k} u_{gi} |u_{hk}| \quad \begin{pmatrix} g = g_1, g_2, \dots, g_m \\ h = h_1, h_2, \dots, h_m \\ i, k = 1, 2, \dots, m \end{pmatrix}$$

Alle zwischen diesen Ausdrücken bestehende lineare Relation hat auch eine ebensolche für die entsprechenden Subdeterminanten $|a_{gh}|$ zur Folge. Andererseits muss aber auch jede Relation zwischen den Subdeterminanten $|a_{gh}|$ eine ebensolche für die Producte $|u_{gi}| \cdot |u_{hk}|$ zur Folge haben, da man ja an Stelle des symmetrischen Systems a_{gh} das System u_{gi} setzen kann.

$$\sum_k u_{gk} u_{hk}$$

und dabei die Summation auf die Werthe $k = 1, 2, \dots, m$ beschränken kann.

Setzt man der Einfachheit halber $A_1, A_2, A_3, \dots, A_v$ für die verschiedenen Subdeterminanten $|a_{gh}|$ und $P_1, P_2, P_3, \dots, P_v$ für die entsprechenden Producte

$$|u_{gi}| \cdot |u_{hk}| \quad \begin{pmatrix} g = g_1, g_2, \dots, g_m \\ h = h_1, h_2, \dots, h_m \\ i, k = 1, 2, \dots, m \end{pmatrix}$$

so wird

$$|U_{ik}| = A_1 P_1 + A_2 P_2 + A_3 P_3 + \dots + A_v P_v \quad (i, k = 1, 2, \dots, m),$$

wenn A'_1, A'_2, \dots, A'_u irgend welche von einander linear-unabhängige lineare Functionen der Subdeterminanten A bedeuten, durch die sie sich sämtlich linear ausdrücken lassen, so dass also

$$A_h = \sum_g c_{hg} A'_g \quad \begin{pmatrix} g = 1, 2, \dots, u \\ h = 1, 2, \dots, v \end{pmatrix}$$

analog

$$P_h = \sum_g c_{hg} P'_g \quad \begin{pmatrix} g = 1, 2, \dots, u \\ h = 1, 2, \dots, v \end{pmatrix}$$

so ist

$$|U_{ik}| = \sum_{h,g,g'} c_{hg} c_{hg'} A'_g P'_{g'} \quad \begin{pmatrix} g, g' = 1, 2, \dots, u \\ h = 1, 2, \dots, v \end{pmatrix};$$

Haupt-Subdeterminante

$$|U_{ik}| \quad (i, k = 1, 2, \dots, m)$$

ist demnach dargestellt als eine lineare homogene Function der Subdeterminanten A von einander linear-unabhängigen Subdeterminanten des Systems u_{gi} .

Systems (a_{ik}) und zwar so, dass die Coefficienten von einem linear-unabhängigen ganzen Functionen der Unbestimmten u_{ik} sind. Diese wesentliche Eigenschaft der Subdeterminanten des Systems folgt nämlich unmittelbar daraus, dass die Determinante

$$\left| \sum_h c_{hg} c_{hg'} \right| \quad \left(\begin{matrix} g, g' = 1, 2, \dots \\ h = 1, 2, \dots \end{matrix} \right)$$

als Summe von Quadraten, von Null verschieden ist, und sie ist eine Eigenschaft aller Subdeterminanten $|U_{ik}|$, nicht bloss derjenigen, welche als Haupt-Subdeterminanten bezeichnet worden sind, d. h. welche i und k übereinstimmende m Werthe haben, weil jede Subdeterminante sich leicht als ein Aggregat von Subdeterminanten eines transformirten Systems so darstellen lässt, dass darin eine Haupt-Subdeterminante mit einem unbestimmten Coefficienten multiplicirt erscheint.

Dass zwischen den Subdeterminanten allgemeiner symmetrischer Systeme identische lineare Relationen bestehen, scheint nicht bemerkt worden zu sein. Ich habe folgende Relationen gefunden:

$$|a_{gh}| = \sum_r |a_{ik}|$$

($g = 1, 2, \dots, m$; $h = m + 1, \dots, 2m$); ($i = 1, 2, \dots, m-1, r$; $k = m + 1, \dots, r-1, m, r+1, \dots, 2m$) wo sich die Summation rechts auf die Werthe $r = m + 1, m + 2, \dots, 2m$ bezieht. Die Richtigkeit der Relation erhellt unmittelbar, wenn man die sämtlichen $m + 1$ Subdeterminanten nach den Gliedern der letzten Horizontalreihe entwickelt, nämlich nach derjenigen, welche in den $m + 1$ Subdeterminanten durch die $m + 1$ Werthe $i = m, m + 1, \dots, 2m$ charakterisirt sind.

Ich bemerke noch, dass die Haupt-Subdeterminanten:

$$|U_{ik}| \quad (i, k = 1, 2, \dots)$$

in jene Determinanten $(n + p)$ ter Ordnung übergehen, welche Hr. DARBOUX in seiner Abhandlung in LIOUVILLE's Journal (II. Sér. Tome XIX. S. 3) aufgestellt und mit Φ_p bezeichnet hat, wenn man $p = n - m$ setzt, und für die dort mit X'_k bezeichneten Grössen die Reciproken der bestimmten u_{ik} nimmt. Die von Hrn. DARBOUX entwickelten Eigenschaften der Determinanten Φ_p treten durch diese Bemerkung Evidenz.

(Fortsetzung folgt.)

Zur Thermodynamik chemischer Vorgänge.

Zweiter Beitrag.¹⁾

Versuche an Chlorzink-Kalomel-Elementen.

Von H. HELMHOLTZ.

Es lag mir daran für die thermodynamischen Theoreme, die ich in meiner unter dem 2. Februar d. J. der Classe gemachten Mittheilung aus dem zweiten Axiom der mechanischen Wärmetheorie hergeleitet hatte, genauer quantitativ durchgeführte experimentelle Prüfungen an geeigneten Beispielen anzustellen. Die Zahl der dafür passenden Fälle ist bisher nicht gerade gross. Um die Anwendbarkeit der Theoreme zu prüfen, muss die betreffende chemische Veränderung in mindestens zwei verschiedenen Weisen zu genau messbarer und reversibler Arbeitsleistung verwendet werden können. Dies ist zunächst möglich für die Änderung der Concentration von Lösungen. Eine solche kann durch Verdunstung, beziehlich Niederschlag von Dämpfen, aber auch durch Elektrolyse herbeigeführt werden.

Dass die Unterschiede der elektromotorischen Kraft galvanischer Elemente, welche durch Unterschiede in der Concentration der als Elektrolyte angewendeten Salzlösungen hervorgebracht werden, aus den Dampfspannungen dieser Lösungen thermodynamisch berechnet werden können, zeigen schon die Versuche von Hrn. JAMES MOSER, welche derselbe zur Prüfung meiner unter dem 26. November 1877 der Akademie mitgetheilten Theoreme angestellt hat.²⁾ Aber in jenen Beispielen hängt der Erfolg wesentlich von der Geschwindigkeit ab, mit der die elektrolytische Fortführung verschiedener Bestandtheile in der Flüssigkeit vor sich geht. Dadurch wird eine weitere Verwickelung der Vorgänge eingeführt, die in Rechnung gezogen werden muss, und

¹⁾ S. oben S. 22.

²⁾ WIEDEMANN'S Annalen d. Physik u. Chemie. Bd. III. S. 216—219; — Bd. XIV.

über deren Grösse, namentlich in concentrirteren Lösungen bisher wenige, für unseren Zweck hinreichend vollständige Messungsreihen vorliegen. Von der Einmischung dieses Processes aber können wir uns frei machen, wenn wir galvanische Elemente mit einer Flüssigkeit und einer unlöslichen depolarisirenden Substanz anwenden, solche von LECLANCHÉ, PINCUS, WARREN DE LA RUE, LATIMER CLARK u. A. gebaut worden sind. Diese Ketten, zu denen auch die in meiner letzten Mittheilung erwähnten Kalomelketten gehören, sind allerdings nicht im Stande starke dauernde Ströme zu geben, aber zur Messung elektromotorischer Kräfte nach POGGENDORFF's Methode der Compensation sind sie zum Theil sehr geeignet, da sie dabei nur stromangewendet werden. Bei diesen Versuchen kann man auch die von mir vorgeschlagenen Kalomelketten recht wohl anwenden, um den compensirenden Strom zu erzeugen. Die Bestandtheile einer solchen Kette sind:

Zink,

Chlorzinklösung (fünf bis zehn Procent Salz enthaltend),

Kalomel, fein gepulvert,

Quecksilber.

Zwei solche Elemente nebeneinander verbunden, geben in einem Kreise von 10 000 SIEMENS'schen Widerstandseinheiten einen Strom, der Monate lang ohne merkliche Polarisirung der Elektroden andauern kann, und bei Anwendung eines sehr empfindlichen Galvanometers ausreicht, um Unterschiede von einem Milliontel der elektromotorischen Kraft eines DANIELL'schen Elements noch erkennen zu lassen. Die elektromotorische Kraft dieser Ketten wird durch Temperaturschwankung sehr wenig beeinflusst (sie steigt um etwa 0.0002 ihres Betrages bei 1° C.) und ihr Widerstand ist verschwindend gegen den von 100 SIEMENS' Einheiten. Nach Durchgang stärkerer Ströme ist allerdings Polarisirung vorhanden, ebenso stört mechanische Erschütterung, wobei Quecksilberfläche theils gedehnt, theils zusammengezogen wird, und von Hrn. G. LIPPMANN beobachteten elektromotorischen Kräfte auftritt. Aber in den Elementen, welche über fünf Procent ZnCl_2 in der Lösung enthalten, verschwinden diese Störungen der Regel nach in fünf bis zehn Minuten. Bei noch stärker verdünnter Lösung werden die Elemente aber so empfindlich gegen Erschütterungen, dass der Magnet-Galvanometers hier in Berlin wenigstens unter dem Einflusse der von der Strasse kommenden Vibration fortdauernd unruhig hin- und hergeht.

Da Chlorzink unter den für galvanische Elemente geeigneten Salzen dasjenige ist, für dessen Lösungen die ausführlichste Reihe von Beobachtungen der Dampfspannung vorliegt, so habe ich auch die beschriebenen Kalomel-Elemente den Messungen unterworfen.

Verläufe der Versuche stellten sich freilich dabei einige Schwierigkeiten heraus, die zu ihrer vollständigen Lösung die Hülfe eines in chemischen Arbeiten gewandteren Beobachters verlangen würden.

Berechnung der freien Energien in Salzlösungen.

Ein Strom, der in der Richtung vor sich geht, wie ihn die elektromotorische Kraft dieser Elemente zu erregen strebt, löst Zink auf, während eine äquivalente Menge des Kalomels reducirt wird und ihr Chlor abgibt. Es entsteht also neugebildetes Zinkchlorid ZnCl_2 , was in die Lösung übergeht. Andererseits zerfällt ungelöstes festes Quecksilbersalz Hg_2Cl_2 in Hg_2 , welches sich dem übrigen Quecksilber zumischt, und Cl_2 , welches an das Zink tritt. Bei umgekehrter Stromrichtung wird im Gegentheil Zink aus der Lösung reducirt und neues Mercurchlorid gebildet. Bei verschiedener Concentration der Flüssigkeit ändert sich in diesen Vorgängen nur, dass das neugebildete Zinkchlorid in eine anders concentrirte Lösung desselben Salzes eintritt, beziehlich das ausgeschiedene aus einer solchen austritt. Ausser den chemischen Kräften, welche die Bildung des Chlorzinks auf Kosten des Kalomels begünstigen, kommen also noch in Betracht diejenigen, welche das gebildete Chlorzink in wässrige Lösung überzuführen suchen; diese werden in verdünnten Lösungen, wie gleich von vorn herein zu vermuthen ist, wirksamer sein, als in concentrirteren. In der That zeigen die Versuche sogleich, dass die verdünnten Lösungen den Elementen grössere elektromotorische Kraft geben.

Wenn man, wie es bei den Versuchen geschah, zwei Elemente mit verschiedenen concentrirten Lösungen einander entgegensetzt, so wird ein Strom, der durch beide geht, im einen so viel ZnCl_2 bilden, als im andern zerlegt wird, und im ersten so viel Hg_2Cl_2 zerlegen, als im zweiten gebildet wird. Aber wenn in eine verdünntere Lösung Chlorzink eintritt, und dieselbe Quantität aus einer concentrirteren austritt, so wird dies ein Vorgang sein, der Arbeit leisten, also auch als elektromotorische Kraft einen Strom erregen kann. Dieser Process ist übrigens bei geringer Stromintensität, bei welcher die dem Quadrate derselben proportionale Wärmeentwicklung im Schliessungsbogen verschwindet, und nur die der Intensität direct proportionalen Grössen zu beachten sind, vollkommen reversibel.

Nun können wir aber die Concentration von solchen Lösungen auch auf einem zweiten, vollkommen reversiblen Wege, nämlich durch Verdunstung ändern.

Es sei w die Menge Wasser in der Lösung eines Salzes und s die Menge Salz. Um die beiden Bestandtheile von einander zu trennen,

wird ein Arbeitsaufwand nöthig sein, und zwar für jedes Mi der Lösung ein Aufwand von gleicher Grösse, der aber je Concentration verschieden sein kann. Setzen wir

$$\frac{w}{s} = h \dots \dots \dots$$

so wird der Arbeitsaufwand für jede Masseneinheit eine Function h sein müssen, die wir mit F_h bezeichnen wollen, also für sammt vorhandene Lösung wird die ihrer Bildung entsprechende freie Energie sein:

$$\mathfrak{F} = (w + s) F_h \dots \dots \dots$$

oder mit Berücksichtigung von Gleichung 1

$$\mathfrak{F} = s(1 + h) F_h \dots \dots \dots$$

Wenn wir die Wassermenge sich ändern lassen durch Verdunstung oder Niederschlag von Wasser, während s constant bleibt, v

$$\frac{\partial \mathfrak{F}}{\partial w} = s \frac{\partial}{\partial h} [(1 + h) F_h] \frac{\partial h}{\partial w}$$

oder mit Berücksichtigung des Werthes von h

$$\frac{\partial \mathfrak{F}}{\partial w} = \frac{\partial}{\partial h} [(1 + h) F_h] \dots \dots \dots$$

Diese Grösse, multiplicirt mit dw , giebt die Arbeit an, welche bei jeder reversible Überführung der Wassermenge dw bei constanten Temperatur aus reinem Wasser an die Lösung zu verrichtet ist. Bezeichnen wir mit p den Druck des Dampfes, mit v das specifische Volumen seiner Masseneinheit, so wird zu setzen sein

$$\frac{\partial \mathfrak{F}}{\partial w} = - \int_{h=\infty}^{h=h} p \cdot dv \dots \dots \dots$$

Vernachlässigt sind dabei die kleinen Änderungen im Volumen tropfbaren Flüssigkeiten, da diese in den hier zunächst berücksichtigten Fällen gegen das Dampfvolumen verschwinden. Übrigens hat die Schwierigkeit, die Formeln in dieser Beziehung zu vervollständigen.

Bezeichnen wir in Gleichung 2 die Werthe von p und v für den gesättigten Dampf des reinen Wassers, d. h. dem Werthe, welcher bei der Sättigung entsprechen mit P und V , so haben wir bei Berechnung des Integrals in Gleichung 2 drei Perioden zu unterscheiden. Erstens müssen wir die Wassermenge dw aus reinem Wasser verdampfen lassen, d. h. als entsprechenden Betrag des obigen Integrals die Arbeit

$$P \cdot V \cdot dw.$$

Dann müssen wir den Dampf ausser Berührung mit Wasser sich ausdehnen lassen, bis er das specifische Volumen v_h des gesättigten Dampfes erreicht.

ung stehenden gesättigten Dampfes hat; dies giebt zum Integrale
en Betrag

$$dw \int_v^{v_h} p \cdot dv.$$

Endlich ist der Dampf in Berührung mit der Salzlösung unter dem
constant bleibenden Drucke p_h zu comprimiren. Dies giebt den letzten
Betrag

$$- p_h \cdot v_h \cdot dw.$$

Folglich ist

$$\frac{\partial \mathfrak{F}}{\partial w} = - P \cdot V - \int_v^{v_h} p \cdot dv + p_h \cdot v_h,$$

oder nach partieller Integration

$$\frac{\partial \mathfrak{F}}{\partial w} = \int_p^p v \cdot dp = - \int_h^\infty v \cdot \frac{\partial p}{\partial h} \cdot dh \dots \dots \dots \left. \right\} 2_a$$

Da nach Gleichung 1, das $\frac{\partial \mathfrak{F}}{\partial w}$ eine Function von h allein ist, ebenso
rechts v und p nur Functionen von h sind, kann die Gleichung 2_a
nach h differenzirt werden, und ergibt

$$\frac{\partial^2}{\partial h^2} [(1 + h) F_h] = v_h \cdot \frac{\partial p}{\partial h} \dots \dots \dots \left. \right\} 2_b$$

Nach den Auseinandersetzungen in §. 1 meines ersten Beitrags ist
die Grösse $-\frac{\partial \mathfrak{F}}{\partial w}$, als die Kraft zu bezeichnen, mit der Wasser
von der Lösung angezogen wird. Gleichung 2_a lehrt deren Betrag
aus dem Dampfdruck berechnen.

Andererseits erhalten wir aus Gleichung 1_b, wenn wir nach s
partiell differenziren

$$\frac{\partial \mathfrak{F}}{\partial s} = (1 + h) F_h - h \frac{\partial}{\partial h} [(1 + h) F_h] \dots \dots \dots \left. \right\} 2_c$$

Wenn ein galvanischer Strom von der Intensität J durch eines
unserer Elemente geht, und q diejenige Menge des Salzes bezeichnet,
welche durch die Stromeinheit in der Zeiteinheit aufgelöst wird,
so wird in t Secunden durch die Auflösung des Salzes der vor-
handene Energievorrath vermehrt um

$$\frac{\partial \mathfrak{F}}{\partial s} \cdot J \cdot q \cdot t = J \cdot q \cdot t \left\{ (1 + h) F_h - h \cdot \frac{\partial}{\partial h} [(1 + h) F_h] \right\} \dots \dots \left. \right\} 2_b$$

Nun ist die Arbeit, welche eine elektromotorische Kraft A ver-
richtet, wenn ein Strom J während der Zeit t in der Richtung, nach

der A wirkt, durch den Leiter fließt, gleich AJt , vorausgesetzt, dass die Einheit von A dieser Bestimmung entsprechend gewählt ist.

Ich werde im Folgenden nach Ampères und Volts rechnen; dabei muss aber dann auch die Arbeit der Dämpfe in den entsprechenden Einheiten, nämlich *cg.* 10^{-9} für Masse, *cm.* 10^9 für Längen und Secunden für die Zeit, berechnet werden. Die in *C. G. S.* Maass berechnete Arbeit der Dämpfe ist also mit 10^{-7} zu multipliciren, um sie in jenes Maass zu übertragen.

Aus Gleichung 2_b folgt also:

$$A = -q \left\{ (1 + h) F_k - h \frac{\partial}{\partial h} [(1 + h) F_k] \right\} \dots \dots \dots \left. \right\} 2_c$$

und mit Berücksichtigung von Gleichung (2)

$$\frac{\partial A}{\partial h} = qh \cdot \frac{\partial^2}{\partial h^2} [(1 + h) F_k] = q \cdot h \cdot v \cdot \frac{\partial p}{\partial h} \dots \dots \dots \left. \right\} 2_d$$

Das Zeichen ist hier so gewählt, dass ein die metallische Basis des Salzes auflösender Strom und die in seiner Richtung wirkende elektromotorische Kraft gleichzeitig als positiv gelten.

Haben wir Ausscheidung des Salzes in einer Zelle mit dem Verdünnungswerthe h_0 und Auflösung in einer anderen vom Werthe h_1 , so wird durch Integration nach h aus der Gleichung 2_d gefunden:

$$A_1 - A_0 = q \int_0^1 h \cdot v \cdot \frac{\partial p}{\partial h} \cdot dh \dots \dots \dots \left. \right\} 2_e$$

Diese Gleichung lässt die den Unterschieden des Wassergehalts der Lösung entsprechenden elektromotorischen Kräfte aus den Dampfspannungen berechnen.

Da bei den Temperaturen unter 40° die Dichtigkeit auch der gesättigten Dämpfe reinen Wassers sehr klein ist, so können wir die Grösse v durch die Gesetze der vollkommenen Gase bestimmen, und indem wir mit V_0 und P_0 die Grössen von v und p für reines Wasser bei der absoluten Temperatur Θ bezeichnen, können wir setzen

$$\frac{P_0 \cdot V_0}{\Theta} = \frac{p \cdot v}{\mathfrak{S}} \dots \dots \dots \left. \right\} 3$$

und

$$A_1 - A_0 = \frac{\mathfrak{S} q \cdot P_0 \cdot V_0}{\Theta} \int_0^1 h \cdot \frac{\partial \log \cdot p}{\partial h} \cdot dh \dots \dots \dots \left. \right\} 3_a$$

Da für das Chlorzink noch keine Beobachtungen über Dampfspannung bei verschiedenen Temperaturen vorliegen, ist es nützlich, noch folgende Beziehungen zu bemerken.

Wenn wir die Gleichung 2_a nach der absoluten Temperatur \mathfrak{S} differenziren, so erhalten wir

$$\frac{\partial^2 A}{\partial h \cdot \partial \mathfrak{S}} = q \cdot h \cdot \frac{\partial^2}{\partial h^2} \left[(1 + h) \frac{\partial F}{\partial \mathfrak{S}} \right] \dots \dots \dots \left. \vphantom{\frac{\partial^2 A}{\partial h \cdot \partial \mathfrak{S}}} \right\} 4$$

und wenn wir 4 mit \mathfrak{S} multipliciren und von 2_d abziehen, giebt es

$$\frac{\partial}{\partial h} \left\{ A - \mathfrak{S} \cdot \frac{\partial A}{\partial \mathfrak{S}} \right\} = q \cdot h \cdot \frac{\partial}{\partial h} \left[\frac{\partial \mathfrak{F}}{\partial w} - \mathfrak{S} \cdot \frac{\partial^2 \mathfrak{F}}{\partial \mathfrak{S} \cdot \partial w} \right] \dots \dots \dots \left. \vphantom{\frac{\partial}{\partial h}} \right\} 4_{\text{a}}$$

wobei zu berücksichtigen ist, dass $\frac{\partial \mathfrak{F}}{\partial w}$, also auch dessen Differentialquotient nach \mathfrak{S} die Grössen w und s nur implicite in h enthalten. Nun ist aber, wie in dem früheren Aufsätze gezeigt wurde,

$$\mathfrak{F} - \mathfrak{S} \cdot \frac{\partial \mathfrak{F}}{\partial \mathfrak{S}} = U$$

und U die gesammte innere Energie, freie und gebundene zusammengekommen. Daher ist $\frac{\partial U}{\partial w}$ auch nur Function von h und $\frac{\partial U}{\partial w} \cdot dw$ bezeichnet das mechanische Äquivalent der Wärmemenge, welche bei dem Zusatz der Wassermenge dw zur Salzlösung zugeführt werden muss, um die Temperatur der Lösung constant zu halten, wenn das Wasser entweder direct und ohne Leistung äusserer Arbeit oder unter Rückverwandlung von letzterer in Wärme zugesetzt wurde.

Setzen wir also $-\frac{\partial U}{\partial w} = W$, so ist W die durch Verdünnung mit der Gewichtseinheit Wasser zu entwickelnde Wärmemenge, ebenfalls nur eine Function von h und \mathfrak{S} , und Gleichung 4_a wird:

$$\frac{\partial}{\partial h} \left\{ A - \mathfrak{S} \cdot \frac{\partial A}{\partial \mathfrak{S}} \right\} = - q \cdot h \cdot \frac{\partial W}{\partial h} \dots \dots \dots \left. \vphantom{\frac{\partial}{\partial h}} \right\} 4_{\text{b}}$$

Daraus folgt, dass bei Lösungen, welche bei weiterer Verdünnung keine Wärme entwickeln oder latent machen, die von der Concentration der Lösung abhängigen Theile der elektromotorischen Kraft proportional der absoluten Temperatur wachsen müssen, da dann

$$\frac{\partial A}{\partial h} = \mathfrak{S} \cdot \frac{\partial^2 A}{\partial \mathfrak{S} \cdot \partial h}$$

wird, oder

$$d(\log \mathfrak{S}) = d \left(\log \frac{\partial A}{\partial h} \right)$$

$$\frac{\partial A}{\partial h} = C \cdot \mathfrak{S}$$

sein muss. Da für reines Wasser ($h = \infty$), $W = 0$ wird, ist bei negativem Werthe von $\frac{\partial W}{\partial h}$ die Grösse W selbst nothwendig positiv

und umgekehrt. Also wenn Verdünnung Wärme erzeugt, wird $\frac{\partial A}{\partial h}$

langsamer wachsen müssen, als die absolute Temperatur, im gegen-
theiligen Falle schneller.

Führen wir die Annahme 3 in 2_a ein, so wird

$$\frac{\partial A}{\partial h} - \mathfrak{S} \cdot \frac{\partial^2 A}{\partial h \cdot \partial \mathfrak{S}} = q \cdot h \cdot \frac{V_o \cdot P_o}{\Theta} \cdot \mathfrak{S} \cdot \frac{\partial^2}{\partial h \cdot \partial \mathfrak{S}} [\log p] = -qh \cdot \frac{\partial W}{\partial h}.$$

Also

$$-\frac{\partial W}{\partial h} = \frac{V_o \cdot P_o}{\Theta} \cdot \mathfrak{S} \cdot \frac{\partial^2}{\partial h \cdot \partial \mathfrak{S}} (\log p).$$

Dies integrirt nach h bis $h = \infty$, wo $W = 0$ sein muss, giebt

$$W = \frac{V_o \cdot P_o}{\Theta} \mathfrak{S} \cdot \frac{\partial}{\partial \mathfrak{S}} \left[\log \frac{P}{p} \right] \dots \dots \dots \} 4.$$

welche Gleichung die Verdünnungswärme aus den Temperaturänderungen
der Dampfspannungen zu berechnen erlaubt, oder letztere aus ersterer.

Zur Berechnung der Versuche.

Bei Salzlösungen von geringem Salzgehalt hat Hr. WÜLLNER ge-
funden, dass naehin

$$P - p = \frac{b}{h} \cdot P \dots \dots \dots \} 5$$

wo b eine von der Natur des Salzes abhängende Constante bezeichnet,
welche bei einigen Salzen auch von der Temperatur unabhängig
erscheint. Dies in Gleichung 3_a gesetzt würde ergeben

$$A_1 - A_o = \frac{\mathfrak{S} P_o \cdot V_o}{\Theta} q \cdot b \log \cdot \left(\frac{h_1 - b}{h_o - b} \right) \dots \dots \dots \} 5_a$$

Beim Chlorzink sind verhältnissmässig hohe Concentrationen an-
wendbar, für welche die einfache WÜLLNER'sche Formel der Gleichung 4
nicht mehr zureicht. Ziemlich gut passt auf die Beobachtungsreihe
von Hrn. JAMES MOSER über die Dampfspannung von Chlorzinklösungen
eine Formel zweiten Grades

$$P - p = \frac{\mathfrak{A}}{h} + \frac{\mathfrak{B}}{h^2} \dots \dots \dots \} 6$$

Aus dieser lässt sich der Werth von p auf die Form bringen

$$p = \mathfrak{B} \left[\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{h} \right] \left[\frac{1}{\beta} - \frac{1}{h} \right]$$

worin $-\alpha$ und β die Werthe von h sind, die in Gleichung 6 den
Werth $p = 0$ ergeben würden. Daraus ergiebt sich

$$A_1 - A_o = \frac{q \cdot P_o \cdot V_o \cdot \mathfrak{S}}{\Theta} \left\{ \beta \cdot \log \left(\frac{h_1 - \beta}{h_o - \beta} \right) - \alpha \cdot \log \left(\frac{h_1 + \alpha}{h_o + \alpha} \right) \right\} \dots \dots \} 6_a$$

Die Coefficienten \mathfrak{A} und \mathfrak{B} habe ich aus den MOSER'schen Beobachtungen nach der Methode der kleinsten Quadrate bestimmt und die Werthe gefunden

$$\mathfrak{A} = 4 \cdot 17.1608$$

$$\mathfrak{B} = 16 \cdot 1.9559.$$

Die Vergleichung der darauf gegründeten Rechnung mit den Beobachtungen ergibt für 20°.2 C. in Millimetern Wasserdruck:

$4 \cdot \frac{1}{h}$	$P - p$		Differenz
	berechnet	beobachtet	
1	19.127	19.50	+ 0.373
2	42.145	39.83	- 2.315
3	69.085	69.87	+ 0.785
4	99.938	101.9	+ 1.961
5	134.701	133.6	- 1.101

Der Werth von P ist nach der Dampfspannungs-Tabelle von MAGNUS gesetzt gleich 239.79^{mm} Wasser von 20°.2 C. Daraus, und aus den Werthen von \mathfrak{A} und \mathfrak{B} ergeben sich die Werthe von

$$\alpha = 0.24545$$

$$\beta = 0.53171.$$

Für ein Ampère ist q nach den neueren Bestimmungen von F. KOHLRAUSCH auf Silber bezogen 0.0011363^{gr} per seed., also bezogen auf Zn Cl_2 gleich $\frac{136}{216}$ Mal dieses Betrages, nämlich

$$q = 0.00071545.$$


Für $P_0 V_0$ ist für 0° der für sehr kleine Dichtigkeiten des Wasserdampfes geltende theoretische Werth genommen in C. G. S. Maass

$$P_0 \cdot V_0 = 1.25985 \cdot 10^9.$$

Ich werde die nach der obenstehenden Interpolationsformel 6 mit den angegebenen Werthen \mathfrak{A} und \mathfrak{B} berechneten Werthe der elektromotorischen Kraft als »berechnet nach a« aufführen. Da bei der Vergleichung der berechneten und beobachteten Dampfspannungen, wie sie oben gegeben ist, einige Differenzen vorkommen (z. B. bei 2 und 4), welche grösser sind als die der Einzelbeobachtungen des Hrn. Moser untereinander, und da möglicher Weise Bildung von Hydraten des Salzes verschiedenen Gang der Function für verschiedene Concentrationen bedingen könnte, so habe ich noch eine zweite Rechnung angestellt, wobei ich eine wie 6 gebildete Formel auf je drei aufeinanderfolgende beobachtete Werthe anwendete, zwischen denen die betreffenden Concentrationen der betreffenden Elemente lagen. Die davon herrührenden

Werthe, werde ich als »berechnet nach b« bezeichnen. Die beiden Rechnungen differirten für die kleineren Intervalle ziemlich erheblich von einander. Die Summe aber für die elektromotorische Kraft der grösseren Intervalle stimmte ziemlich gut.

Ein Hinderniss für exacte Ausführung der Messungen bildet die grosse Neigung des Chlorzinks, basische Salze zu bilden. Die Normallösung, durch deren Verdünnung die anderen Concentrationen gebildet wurden, musste so gewählt werden, dass sie in den Elementen bei Zimmertemperatur kein Zink mehr unter Wasserstoffentwicklung lösen konnte; dazu musste sie ein wenig basisches Chlorzink enthalten. Und andererseits durfte sie nicht so viel von dem letzteren enthalten, dass beim Verdünnen mit reichlichen Quantitäten Wasser Niederschläge von stärker basischem Salz gab. Diese beiden Bedingungen geben eine ziemlich schmale Grenze für die Zusammensetzung der Flüssigkeiten. Meine Lösung enthielt nach der Bestimmung ihres Zink- und ihres Chlorgehaltes auf 100^{gr}



Ich glaube annehmen zu dürfen, dass Hr. Moser's Lösung ähnlicher Art waren, kalt mit Zink gesättigte Chloridlösungen, da bei seinen Versuchen dieselben beiden Bedingungen einhalten musste wie ich. Leider hat er über diesen Punkt, sowie über die Art, wie er die Concentration der Lösungen bestimmt hat, in seinen Publicationen nichts angegeben.

Der Werth der Kalomel-Elemente in Volts wurde durch Ermittlung ihres elektrolytischen Aequivalents bestimmt, bei einem in Siemens-Einheiten gemessenen Widerstande. Da ich den Werth des elektrolytischen Aequivalents des Silbers aus den Messungen von F. Kohlrausch entnommen hatte, schien es mir am sichersten, den dazu gehörigen von demselben Beobachter bestimmten Werth der Siemens'schen Widerstandseinheit zu nehmen, nämlich 0.9717 des theoretischen Ohm. Darnach ergab sich die elektromotorische Kraft meiner compensirten Kalomel-Elemente, die durch die 10 000 Widerstandseinheiten wirksam gleich 1.043 Volt. Da aber die bisherigen Bestimmungen der Beobachter für den absoluten Werth der Siemens-Einheit noch 3 Procent auseinandergehen, und also der Werth meiner Elemente in Volts doch nur unsicher auszudrücken sein würde, habe ich schließlich vorgezogen, die berechneten Werthe auf die elektromotorische Kraft meiner Kalomel-Elemente zu reduciren.

Da ausser diesen Unsicherheiten auch noch, wenn auch Ungleichheiten der verschiedenen Zinkstäbe sich geltend zu

schiienen, welche auf die Werthe der kleineren Intervalle verhältnissmässig merklichen Einfluss hatten, wird es genügen, hier die Resultate für das grösste Concentrations-Intervall anzugeben, welches sich anwenden liess zwischen $h = 0.8$ und $h = 9.1992$, zwischen $17^{\circ}7$ und 21° C.

Elektromotorische Kraft.

Beobachtet	{	Maximum:	0.11648
		Minimum:	0.11428
Mittel aus 13 Tagen:...			0.11541.
Berechnet	{	a:.....	0.11579
		b:.....	0.11455

Ausserdem habe ich einen Thermostaten construiren lassen, in den die sechs verschiedenen zu compensirenden Elemente gleichzeitig eingesetzt werden konnten. Es wurde zwischen $35^{\circ}.1$ und $36^{\circ}.1$ C. beobachtet:

Maximum 0.11609

Minimum 0.11524

Mittel von 8 Tagen 0.11569.

Daraus ergibt sich, dass der von den Concentrations-Unterschieden abhängige Theil der elektromotorischen Kraft fast gar nicht mit der Temperatur sich ändert.

Also ist das $\frac{\partial^2 A}{\partial \vartheta \cdot \partial h}$ der Gleichung 4_b nahehin gleich Null, woraus

folgt, dass $\frac{\partial W}{\partial h}$ negativ sein muss. Da $\frac{\partial A}{\partial h}$ positiv ist, und da W für $h = \infty$ (d. h. reines Wasser zu reinem Wasser gesetzt) nothwendig gleich Null wird, so muss W für alle Lösungen von Chlorzink positiv sein. Wasserzusatz muss Wärme entwickeln. Dass das der Fall ist, und auch ungefähr in dem zu erwartenden Grade, haben mir vorläufige Versuche schon gezeigt. Aber genaue Berechnungen und Messungen werden dafür erst nach genauer Bestimmung des Ganges der Dampfspannungen und elektromotorischen Kräfte möglich sein.

Die elektromotorische Kraft zwischen den Metallen aber nimmt bei der Erwärmung in dem schon oben angegebenen Grade zu, d. h. die Kalomelkette gehört, wie ich schon in der Einleitung meines ersten Berichtes erwähnt habe, zu den Wärme bindenden Ketten, die zum Theil auf Kosten der thermometrischen Wärme der umgebenden Körper arbeiten.

Ein bemerkenswerther Zug in diesen Vorgängen scheint zu liegen, dass die Anziehung des Wassers zu dem zu lösenden einen so grossen Theil der wirksamen chemischen Kräfte zwischen sich gegenseitig verdrängenden Elementen (Zink und Quecksilber) machen kann. In den vorliegenden Messungen beträgt die motorische Kraft der Lösung allein etwa nur ein Achtel der ganzen Kraft der concentrirteren Lösungen. Aber die Kraft der Lösung kann sich bei den weiteren Verdünnungen, welche nicht mehr eine ausreichende Constanz für genauere Messungen hatten, noch vermehren, und nach der in Gleichung 5_a gegebenen Formel lässt sich diese Kraft bei immer weiter wachsenden Werthen von b jedem beliebigen Grade steigern. Daraus würde folgen, dass verdünnten Lösungen oder in ganz salzfreien Säuren Metalle, sonst als unlöslich in der betreffenden Säure betrachteten, sich zu einer gewissen Grenze unter Wasserstoffentwicklung auflösen können. Ich bemerke, dass ganz ähnliche Verhältnisse auch bei der Lösung der Gase nach der mechanischen Wärmetheorie statthaben müssen, woraus sich zum Theil ganz veränderte Ansichten über das Wesen der galvanischen Polarisation ergeben möchten.

Untersuchung über den Bau und die Function des pflanzlichen Hautgewebes.

Von Dr. MAX WESTERMAIER.

(Vorgelegt von Hrn. SCHWENDENER am 13. Juli [s. oben S. 747].)

Hierzu Taf. XIII.

Die mikroskopische Forschung im Gebiete der Botanik ist gegenwärtig mehr als früher darauf gerichtet, die Beziehungen zwischen Structur und physiologischer Leistung zu ermitteln. Dieser Forschungsrichtung fällt die Aufgabe zu, die Anatomie der Pflanzen aus einer blossen Darstellung von Structurverhältnissen immer mehr zu einer Lehre von dem Bau und der Function der Zellformen und Gewebesysteme zu erweitern.

Nicht fehlt es an Anregung, diesen Bestrebungen sich anzuschliessen, Denn jeder Versuch, unsere sämtlichen anatomischen Kenntnisse mit dem über die Functionen der Gewebe Bekannten zu einem harmonischen Ganzen zu vereinigen, bringt uns auf's Neue die Erkenntniss, dass wir für viele anatomische Verhältnisse, sogar für ganz verbreitete Erscheinungen, jene Beziehung zwischen Anatomie und Physiologie nicht zu definiren vermögen.

Die folgenden Zeilen enthalten im Rahmen einer vorläufigen Mittheilung das Resultat einer anatomisch-physiologischen Untersuchung, welche sich auf das Hautgewebesystem bezieht. In dieser Arbeit versuchte ich, den physiologischen Hintergrund für meist längst bekannte Structurverhältnisse, welche an dem genannten Gewebesystem zu beobachten sind, unserem Auge näher zu rücken.

Während unsere Kenntnisse über die Function der Cuticula und des Periderms einstweilen als befriedigend betrachtet werden können, befinden wir uns bezüglich der anderen Seiten, welche das pflanzliche Hautgewebesystem der anatomisch-physiologischen Betrachtung darbietet, noch ziemlich im Unklaren.

Für's Erste kommt der wässerige Inhalt der gewöhnlichen Epidermiszellen und der Elemente des mehrschichtigen epidermalen Wasser-

gewebes in Betracht; insbesondere lenkt auch die Dünnhcit der Radialwände jener Zellen die Aufmerksamkeit des Beobachters auf sich. Den eben genannten zwei Eigenschaften (Wassergehalt, Dünnhcit der radialen Wände) entspricht eine zweite wichtige Function des Hautgewebesystems, wenn wir als erste die Wirksamkeit der Cuticula (mit Einschluss der Cuticularschichten) betrachten.

Ausser den eben erwähnten anatomischen Eigenschaften zeichnen uns das epidermale Gewebesystem, und zwar sowohl das einfache als das mehr- und vielschichtige, eine Reihe von Einrichtungen mechanischer Art (Dicke der Aussenwände, Auftreten von Skelettzellen u. s. w.). Dieselben stehen in Beziehung zu einer dritten Function des Hautsystems. Diese beiden Functionen sind in Nachstehendem etwas eingehender erörtert.

Betreffs des wässerigen Zellinhalts hat bekanntlich schon PRINGSHEIM (PRINGSHEIM's Jahrbücher VIII) die Idee ausgesprochen, dass man in jenen epidermalen wasserführenden Zellen, wie sie z. B. bei *Piperaceae* zu beobachten sind, ein Wasserversorgungssystem zu erblicken habe. Er begründete dieselbe insbesondere durch das Ergebniss seiner Studien über die äusseren Lebensverhältnisse jener Pflanzen, welchen reichliches Wassergewebe zukömmt. Hierin liegt ein werthvoller Hinweis, den die Natur giebt, und auf welchen der genannte Forscher zurückgewiesen hat. Als hinreichend zur Begründung der Lehre von der Function des epidermalen Wassergewebes kann man aber diesen Hinweis nicht betrachten. Denn mit Recht wird die Frage aufgeworfen, ob das in Rede stehende System factisch im Stande ist, den Wasserverlust zu Gunsten des übrigen Gewebes zu tragen, oder ob, sobald dasselbe in erheblichem Maasse Wasser verliert, nicht auch nothwendig das Leben des betreffenden Organs gefährdet sei. Wäre Letzteres der Fall, dann müsste die Idee eines Wasserversorgungssystems als unzutreffend von der Hand gewiesen werden; der Wink der Natur wäre dann eben noch nicht richtig verstanden.

Die Function eines Wasserversorgungssystems kann nun thatsächlich vom epidermalen Wassergewebe geleistet werden, sowohl vom vielschichtigen als vom einschichtigen. Die physiologische Grundlage dieser Behauptung sind Versuche, die ich mit lebenden Pflanzen (*Perezomya latifolia*, *Tradescantia discolor*, *Iuzula maxima*) angestellt habe. Während die beiden ersteren der eben genannten Pflanzen ein verstärktes epidermales Gewebe besitzen, kommt der letzteren eine einschichtige (hohe) Epidermis zu.

Die Wassergewebezellen dieser Pflanzen erwiesen sich als fähig, Wasserverluste bei lang dauernder Trockenheit zu ertragen und alsdenn bei erneuter Zufuhr wieder zu ersetzen, und zwar nahmen sie gegen

dem assimilirenden Gewebe vorzugsweise den Verlust auf sich. Während sie nämlich bei Wassermangel grosse Formveränderungen (starke Collabescenz in radialer Richtung) zeigten, wurden die unter ihnen befindlichen Assimilationszellen gar nicht deformirt oder liessen nur geringe Spuren des Wasserverlustes erkennen.

Von Wichtigkeit in dieser Hinsicht ist ferner folgende physiologische Thatsache. Das Gewebe einer Mohrrübe, einer Wurzel, trocknet in anderer Weise aus, als man dies an manchen dem Vertrocknen preisgegebenen Blättern beobachten kann. Bei ersterer lässt sich ein irgendwie deutlich hervortretender Unterschied im Verhalten der Zellen bei dem von aussen nach innen fortschreitenden Austrocknen nicht konstatiren, es sind nicht allenfalls gewisse Zellkomplexe mit grösserer wasseranziehender Kraft ausgerüstet. Daher machen sich die Spuren des Wasserverlustes von aussen nach innen allmählig in ungefähr gleicher Weise geltend. Hingegen zeigt ein mit »Hypoderm« versehenes abgetrenntes Blatt von *Tradescantia discolor* deutlich, dass sich die ersten und stärksten Collabescenzercheinungen im Allgemeinen in den am Assimilationsgewebe entweder dicht anliegenden oder demselben genäherten Wassergewebeschichten einstellen, während die äussersten Zellschichten noch wasserreich sind. Bei einem Sedum-Blatt mit innerem farblosen Wassergewebe hingegen zeigte dieses letztere starken Collapsus, während die nach aussen gelegenen Assimilationszellen im Allgemeinen noch intakt waren. Es ist somit den assimilirenden Zellen die Kraft zuzuschreiben, Wasser, wenn ihnen solches durch die Verdunstung entzogen wird, aus den Zellen des Wassergewebes an sich zu reissen.

Bei reichlicher Wasserzufuhr füllt sich das während des Wassermangels schwächer oder stärker collabirte epidermale Wassergewebe wieder an. Das Wasserquantum, welches bei *Peperomia latifolia* abwechselnd abgegeben und wieder aufgenommen wird, erwies sich bei einem Versuch als sehr beträchtlich. Es betrug mehr als das Volumen des gesammten grünen Blattgewebes. (Zum Vorausgehenden vergl. ferner Fig. 3.)

Zu dem geschilderten Verhalten der epidermalen Wasserzellen steht also gerade die Dünnhheit der Radialwände in naher physiologischer Beziehung; diese Structur eignet sich selbstverständlich vorzüglich zu jenem blasebalg-ähnlichen Spiel.

In deutlicher Beziehung zu diesem Vorgange steht, wie ich annehme, weiterhin die Thatsache, dass in jenen Fällen, in welchen Verstreitungsvorrichtungen zum Schutz des grünen Gewebes vorhanden sind (*Olea europaea*, *Kingia australis*¹⁾), die senkrecht zur Epidermis

¹⁾ TSCHIRCH, Linnaea IX. 3 u. 4.

stehenden Streben nur bis zur Innenwand der epidermalen Sch gehen.¹⁾

Es liegt die Vermuthung nicht ganz ferne, dass auch jene phylogisch dunkle Verschleimungs-Metamorphose der Epidermis-Innenwand (RADLKOEFER, *Serjania* 1875, S. 100 ff.) so zu deuten ist, dass abwechselnd Speicherung und Abgabe von Wasser in diesen Polsträumen statt hat.

Weiterhin lassen sich mehrere Kategorien von Strukturverhältnissen zu der Function des epidermalen Wasserversorgungssystems in Beziehung setzen. Die hier zu nennenden Structuren betreffen

1. den Flüssigkeitsverkehr innerhalb des epidermalen Wassergewebes selbst, insbesondere eine gewisse Continuität dieses Gewebesystems;
2. den Verkehr zwischen dem epidermalen Wassergewebe und dem Assimilationsystem;
3. den Zusammenhang mit dem Leitbündelsystem.

Da auf eine eingehende Erörterung dieser Verhältnisse hier nicht eingegangen werden muss, sind dieselben in Folgendem nur in Kürze gedeutet.

Ad 1. Was den Flüssigkeitsverkehr innerhalb des epidermalen Wassergewebes selbst betrifft, so sind neben den verbreiteten Erscheinungen der Dünnwandigkeit der Radialwände und ihrer Poren Einrichtungen erwähnenswerth, welche das vollständige Collabiren gewisser Epidermispartien erschweren oder verhindern, wodurch nämlich die Continuität unseres Gewebesystems an jenen Stellen verhältnissmässig gesichert erscheint.

Theils sind es cystolithenähnliche Bildungen (Fig. 6), welche an der Innenwand gewisser Epidermiszellen in Gestalt eines Kegels ins Lumen vorspringen (DUVAL-JOUE, *Mém. de l'Acad. de Montpellier* 1861 p. 227, citirt nach DE BARY *Vergl. Anatomie* p. 34; vergl. auch MOHL *Zeit.* 1861); in anderen Fällen ist es das Vorkommen von sogenannten secundären Epidermiszellen über den Skeletsträngen (HABERLANDT, *Entwicklungsgesch. d. mech. Gewebesyst.* Taf. I, Fig. 6 und endlich ziehe ich als eine dritte Kategorie von Strukturverhältnissen, welche zur Sicherung der Continuität des epidermalen Wassergewebes dienen, die Erscheinung heran, dass in gewissen Fällen epidermale wasserführende Gewebe über den Bastzellcomplexen an

¹⁾ Bei den Blättern von *Cerantonis siliqua* gelang es mir nicht, nach Trocknen einer Topfpflanze oder beim Austrocknen abgetrennter Blätter jenen Zustand zu beobachten, in welchem die Epidermiszellen allein Collabescenz zeigten. Der Grund hierfür liegt vielleicht darin, dass für bestimmte Pflanzen nur eine mässige Gegendigkeit des Wasserverlustes jene Differenz im Verhalten der grünen und farbigen Zellen zur Geltung kommen lässt.

schichtiger ist, als über den grünen Zellen (Fig. 2), oder an jenen Stellen aus höheren Zellen mit stärkeren Radialwänden besteht.

Die Frage, warum alle diese Einrichtungen gerade über den Skelettheilen sich befinden, muss ich noch offen lassen. Doch muss betreffs der erwähnten secundären Epidermiszellen, sowie mit Beziehung auf die Vermehrung der wasserführenden Zellschichten über den Stereomkomplexen, ein Punkt hervorgehoben werden. Vom rein mechanischen Standpunkt aus ist nämlich bei biegungsfesten Organen jedes Zurückweichen der Skeletzellen von der Peripherie als Schwächung zu betrachten. Ist dieses Vorkommniss dennoch zu beobachten, so ist dasselbe vom allgemeinen physiologischen Standpunkt aus zu beurtheilen und erscheint als Concession des mechanischen Systems gegenüber einer Forderung des Hautgewebesystems.

Ad 2. Da der Flüssigkeitsverkehr zwischen dem epidermalen wasserführenden Gewebesystem einerseits und dem Assimilationsgewebe andererseits ein physiologisches Bedürfniss ist, so kann es nicht auffallen, wenn manche anatomische Verhältnisse gemäss dieser Forderung gestaltet sich erweisen. Betrachten wir nämlich Organe, bei welchen aus physiologischen Rücksichten mechanischer Natur stark verdickte Stereomelemente zwischen Epidermis und Assimilationszellen liegen. Dies trifft z. B. zu im Stamm von *Casuarina equisetifolia* (SCHWENDENER, Mech. Princ. S. 147) und in den Blättern von *Podocarpus salicifolia*. In beiden Fällen zeigt das mechanische Gewebe in der That Unterbrechungen zu Gunsten der obigen Forderung. (Fig. 1 u. 4.)

Ad 3. Die Gefässe und gefässartigen Elemente können in ihrer Gesammtheit als ein inneres Wassergewebe dem als Mantel ausgebildeten epidermalen Wassergewebe zur Seite gestellt werden.

Das Gefässsystem dient aber zugleich auch der Leitung von Wasser, wie aus dem anatomischen Befund zur Genüge hervorleuchtet, wenn uns auch alle näheren Kenntnisse hierüber fehlen. In Fällen weitgehender Arbeitstheilung kann es nun nicht überraschen, wenn die Communication zwischen den beiden wasserführenden Systemen durch besondere Einrichtungen erleichtert und gefördert erscheint. Unter diesem Gesichtspunkt lässt sich die Thatsache betrachten, dass die farblosen Zellen, welche die Gefässbündel der Blätter vielfach begleiten und nach den Beobachtungen von SACHS¹⁾, DE VRIES²⁾ und HABERLANDT³⁾ als specifisches Ableitungssystem anzusprechen sind, keineswegs selten mit dem epidermalen Wassergewebe zusammen fliessen. Ein schönes Beispiel hierfür liefert uns das Blatt von *Ficus elastica* (Fig. 5). Durch

¹⁾ PRINGSHEIM's Jahrb. III.

²⁾ Landw. Jahrb. herausgeg. von NATRUSIUS und THIEL 1878.

³⁾ PRINGSHEIM's Jahrb. XIII.

Vermittlung dieser farblosen Zellen ist zwischen den wasserleitenden Gefäßbündelelementen und dem epidermalen Wasserversorgungssystem der Flüssigkeitsverkehr erleichtert, und es läge hiernach eine zweite Function der »farblosen Scheiden« (oder Schienen) in der Herstellung dieser Communication.

Wenn aus obigen Versuchen die Leistungsfähigkeit des epidermalen Wassergewebes als Wasserversorgungssystem folgt, so liegt nahe, mit wenigen Worten die Parallele zu ziehen zwischen dem Gewebe und dem Gefäßsystem. Letzteres ist ein baumartig verzweigtes und mit vielfachen Anastomosen versehenes System, welches das Innere der Pflanzen durchzieht und durch seine Structur nicht bloss der Speicherung sondern wesentlich auch der Leitung dient. Seine Elemente (Gefässe, Tracheiden) collabiren nicht, sind vielmehr durch Ring-, Spiral-, Netzfaseru u. s. w. oder Dickwandigkeit geschützt, sie enthalten daher bei Wassermangel verdünnte Flüssigkeit. Neben diesem inneren, einem Röhrensystem vergleichbaren Wassergewebe ist ein als »Mantel« ausgebildetes vorhanden, das epidermale Wassergewebe, dessen Eigenschaften vorhin Gegenstand der Besprechung waren.

Das verstärkte epidermale Wassergewebe tritt auch local auf. Die »*cellules bulliformes*« DUVAL-JOUVE's (Annal. des sciences nat. Ser. VI. I. p. 316) oder »Gelenkzellen« TSCHIRCH's (Sitzungsber. d. Ver. d. Prov. Brandenb. XXIII) bei gewissen Grasblättern fassen als Längsstreifen verstärkten epidermalen Wassergewebes auf. Ihr Verhalten bei Trockenheit (Collabiren) bedingt, wie die oben genannten Autoren näher verfolgten, naturgemäss eine Einrollung und Einfaltung der Blattfläche.

Natürlich verdienen auch jene Ansichten künftighin noch eine strenge Prüfung, denen zufolge das epidermale Wassergewebe als Schirm gegen Lichtstrahlen, sowie gegen Wärmestrahlung fungiren soll (s. PRINGSHEIM, Jahrb. Bd. VIII). In letzterer Hinsicht ist aber nicht bloss die Erwärmung der Pflanze durch Insolation, sondern auch umgekehrt die Ausstrahlung aus dem Pflanzenkörper in Betracht zu ziehen. Vorstehenden sollte unter Absehung von den eben angeregten Punkten nur die Idee des Wasserversorgungssystems einer eingehenderen Prüfung unterzogen werden.

Eine dritte physiologische Bedeutung des Hautgewebes besteht darin, eine Hülle von gewisser mechanischer Widerstandsfähigkeit (insbesondere Steifigkeit) um empfindlichere innere Gewebe theile darzustellen.

Die Untersuchung jener Structurverhältnisse, welche dem pflanzlichen Hautgewebe in dieser seiner mechanischen Function als

schliessende und widerstandsfähige Hülle zukommen, lenkt die Aufmerksamkeit des Anatomen auf Erscheinungen anderer Art, als die bisher erörterten.

Der lückenlose gegenseitige Verband der Epidermiszellen gestaltet sich zu einem noch festeren durch Vergrösserung der Verwachsungsflächen (•wellige• Epidermis). Die Aussenwand der Epidermiszellen erhält durch ihre grössere Dicke eine höhere Steifigkeit. Letztere erfährt weitere Steigerungen durch aussteifende Leisten (hieher die Ansätze der Radialwände, sowie die weiter nach innen vorspringende Verdickung derselben). Auch bei mehrschichtigen epidermalen Wassergeweben treten die bezüglichen Verhältnisse zu Tage.

Der Umstand, dass in manchen Fällen die wellige Verbiegung der Radialwände sich nur auf den äusseren Theil derselben beschränkt, gleichwie auch jene Thatsache, dass bei *Aloë*- und *Agave*-Blättern die Verdickung der Radialwände nicht bis zur Innenwand sich erstreckt, sind Erscheinungen, welche sich gleichfalls mit dem oben erörterten Spiel des epidermalen Wassergewebes (Collabescenz in radialer Richtung) in physiologischen Connex setzen lassen.

Figurenerklärung.

Fig. 1. Bastrippe aus dem Stamm von *Casuarina equisetifolia*; die dünnwandigen Zellen zwischen den Stereomelementen erleichtern den Flüssigkeitsverkehr zwischen dem epidermalen Wassergewebe und dem Assimilationssystem. (600)

Fig. 2. Mehrschichtiges Wassergewebe über einer Bastrippe im Stamm von *Spartium album*. (250)

Fig. 3. Skizze, den Habitus des Wassergewebes von *Peperomia latifolia* im Blattquerschnitte darstellend; der vorliegende Zustand ist dann zu beobachten, wenn die betreffende Pflanze längere Zeit Wassermangel litt, und ihr entnommene Blattquerschnitte kurze Zeit in Wasser gelegt werden. Die äussersten Zellen (in der Tafel oben) sind nicht collabirt, dagegen die nächstinneren noch ziemlich stark; die innersten, dem grünen Gewebe anliegenden waren schwächer collabirt, sind aber schon wieder turgescent geworden.


Fig. 4. Querschnitt der Blattoberseite von *Podocarpus salicifolia*, eine der Unterbrechungsstellen des mechanischen Gewebes zeigend. (250)

Fig. 5. Bündel aus dem Blattquerschnitt von *Ficus elastica*; Communication zwischen Gefässbündel und epidermalem Wassergewebe. Bei *m* liegt eine schmale Zelle mit milchsaftartigem Inhalt. *L-L* = *Leptom*. (120)

Fig. 6. Radialschnitt aus dem Halm von *Eriophorum latifolium*, mit Kegelzellen und gewöhnlichen Epidermiszellen; *a* Aussenwand; *b* Bastfaser. (600)

Ausgegeben am 3. August.





Westermaier del.

C. Laue lith.

Westermaier, Hautgewebesystem.

1882.

XXXIX.

SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.



19. October. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. MOMMSEN.

1. Hr. MOMMSEN las: Über das feriale Cumanum.
2. Vorgelegt wurde der Bericht des Hrn. PUCHSTEIN über die nach dem Nimrud-dagh im Auftrage der Akademie ausgeführte Reise. Die Mittheilung wird in den nächsten Sitzungsberichten erscheinen.
3. Hr. LEPSIUS legte eine Abhandlung vor: Über die babylonische halbe Elle des Hrn. OPPERT. Die Mittheilung folgt mit diesem Sitzungsbericht.
4. Es wurde Mittheilung gemacht von dem Tode des Ehrenmitgliedes Grafen RUDOLF VON STILLFRIED-RATTONITZ in Berlin, gestorben am 9. August, des auswärtigen Mitgliedes Hrn. LIOUVILLE in Paris, gestorben am 9. September, des auswärtigen Mitgliedes Dr. FRIEDRICH WÖHLER in Göttingen, gestorben am 23. September und des correspondirenden Mitgliedes Dr. KARL HALM in München, gestorben am 9. October d. J.
5. Durch Ministerialverfügungen vom 24. und 28. Juli und 15. August werden dem Hrn. Prof. Dr. ENGLER in Kiel als Reiseunterstützung 800 Mark, dem Hrn. Prof. Dr. HÜBNER hierselbst zur Fortführung der Paläographie römischer Inschriften 1200 Mark, dem Hrn. Prof. Dr. GERHARDT in Eisleben zur Herausgabe des 5. Bandes der philosophischen Schriften LEIBNIZENS 900 Mark und dem Privatdocenten Hrn. Dr. KARL CHUN in Leipzig zur Erforschung der Schwimmpolypen bei Gibraltar oder Madeira 1000 Mark angewiesen.

6. Durch Schreiben des Kanzlers des Ordens pour le mérite wurde mitgetheilt, dass den Vorschlägen der Akademie entsprechend dem Chemiker Hrn. JEAN BAPTISTE JOSEPH BOUSSINGAULT in Paris, dem Chemiker Hrn. PIERRE MARCELLIN BERTHOLET in Paris, dem Geologen Hrn. BERNHARD STUDER in Bern, dem Astronomen Hrn. OTTO STRUVE zu Pulkowa und dem Archäologen Hrn. GIUSEPPE FIORELLI in Rom der Orden pour le mérite für Wissenschaften und Künste von Sr. Majestät dem Kaiser verliehen worden ist.

Nochmals über die Babylonische halbe Elle des Hrn. OPPERT.

Von R. LEPSIUS.



Hr. JULES OPPERT hatte im Jahre 1877 eine Vertheidigung seines *Etalon des mesures assyriennes*, dessen Unhaltbarkeit ich in einem Aufsatze »Die Babylonisch-Assyrische Längenmafstafel von Senkereh« nachgewiesen hatte, an unsere Akademie eingeschickt, welche in dem Monatsbericht vom 6. December abgedruckt wurde. Meine Antwort erfolgte in derselben Nummer, wie ich glaubte, hinreichend vollständig und deutlich. Es ging aber eine Replik von ihm ein, die unter dem 4. Februar 1878 aufgenommen wurde. Da der Anfang unserer Streitsache von mir ausgegangen war, hielt ich mich für verpflichtet, nochmals eine Antwort zu geben, die für Jedermann, namentlich aber für Hrn. OPPERT, verständlich sein mußte. Gleichwohl hat er nicht versäumt, seine abgethane Sache, so oft er Gelegenheit dazu fand, als für ihn fortbestehend zu erklären, und die alten Scheingründe dafür zu wiederholen. Ich führe hier nur die Göttinger Gelehrten-Anzeigen 1878 S. 1056 ff. und ebendasselbst 1882 S. 823 an. Was er dort sagt, habe ich nicht noch einmal widerlegt.


Zuletzt hat er aber das Thema nochmals vorgebracht und zwei neue Beweise von gleichem Werthe wie die früheren für seine Sache zugefügt, während der Sitzungen des jüngsten Orientalisten-Kongresses in Berlin. Was er gesprochen hat, liegt jetzt in dem vor kurzem erschienenen Bande der Verhandlungen dieses Kongresses¹⁾ vor. Diese beiden Zuthaten sollen im Folgenden beleuchtet werden.

Es handelt sich um die Bedeutung des Grundmaßes des ganzen babylonisch-assyrischen Längensystems, dessen Name babylonisch *u*, assyrisch *ammāt* lautet. Dieses Maß halte ich mit allen Assyriologen, außer OPPERT, für die »Elle« (hebräisch *'ammāh*); OPPERT dagegen für die »halbe Elle« oder »Spanne«.

¹⁾ Zweiter Theil, erste Hälfte, I. p. 235 ff.

Nun sagt er S. 247 der Verhandlungen nach einer Recapitulation seiner alten Gründe Folgendes: »Noch ein anderer Ausspruch w
»auf das *u* als Halbelle hin, wo die Annahme der Elle widersin
»erschieden wäre. Assurbanabal sagt von dem Getreidesegen un
»seiner Regierung (V. 1, 46): »Fünf Spannen hoch erhob sich d
»Getreide aus seinen Keimen, und die Länge der Ähre war fü
»Sechstel Spanne.« Einem drei Meter hohen Kornhalm giebt es nich
»so wenig wie eine achtzehn Zoll lange Ähre; die Hälfte bildet sch
»eine sehr achtbare Grösse, und dieser rühmt sich der assyrisch
»König.«

Ich habe diese Angabe näher angesehen und gefunden, da
5 Ellen, zu 0^{m,525} die babylonische Elle, womit Hr. OPPERT übere
stimmt, gerechnet, nicht 3^m betragen, sondern 2^{m,62} = 8' 4".  ist ein stattliches, aber keineswegs selbst in unserem Klima un
reichtes Maass der Halme. Dagegen sind für die Ähre $\frac{5}{6}$ 
0^{m,463} = 17"; also zwar nicht 18", wie OPPERT sagt, aber doch
einer Grösse, die schwer anzunehmen ist, selbst wenn hier, wie no
wendig anzunehmen ist, nicht von ganzen Feldern, sondern von e
zeln Ähren, die man fand, die Rede war. Es kam also zunäc
darauf an, den Originaltext in Bezug auf die $\frac{5}{6}$ des *u* zu prüf
Ich bat meinen verehrten Kollegen, Hrn. Prof. SCHRADER, in d
citirten Text diese Zahl anzusehen. Dies geschah und er fand n
 $\frac{5}{6}$, sondern $\frac{2}{3}$. Die Stelle lautet nach ihm: »Gott Rammān (C
»Wettergott) liefs Regen herabströmen, er öffnete die Tiefen (Ström

5 *u* das Getreide schofs empor, die Länge der Ähre (betrug) 
»d. i. ein Zweidrittheil (sc. des *u*)«, und fährt dann fort: »Das Zeic
»ist das Ideogramm für 40 Sechzigstel, das ist $\frac{2}{3}$, assyr. *šan*
»Woher $\frac{5}{6}$ kommen soll, ist mir unfafsbar.«

Hiernach wendet sich nun die ganze Stelle nicht für, sond
entschieden gegen Hrn. OPPERT, und wird für jeden, der sich n
die Zeit nehmen will, das bisher über die Sache Gesagte nachzules
zu einem palpablen Beweise, dafs *u* oder *ammāt* nicht die halbe, s
dern die ganze Elle ist.

Der König will den Erntesegen unter seiner Regierung ho
preisen und sagt, das Getreide sei 5 Ellen, das heifst, es sei 2^m
= 8, 4" hoch gewachsen; die Ähren aber seien $\frac{2}{3}$ Elle, das he
0^{m,35} = 13 $\frac{1}{2}$ " grofs geworden. Nun sagt J. W. KRAUSE in sei
»Abbildungen und Beschreibung aller bis jetzt bekannten Getre
arten« S. 13 vom Waizen, dafs die Ähren des *triticum durum*
sehr lang werden, nämlich mit den Grannen 13" bis 14", das s
gerade 0^{m,35}. Davon ist die Körner-Ähre nur ungefähr 5" ho

Es aber im Alterthum, und so in unserer Stelle, die Grannen mitgerechnet waren, liegt auf der Hand. Zum Beweise dienen auch die ägyptischen Darstellungen der Ähren und ihre Benennung. Im Todtenbuche Kap. 110 sind sie dargestellt mit langen Grannen und so ähnlich. Die Maße werden im 109. Kapitel angegeben, aber in den verschiedenen Exemplaren in verschiedenen offenbar zum Theil unrichtigen Verhältnissen. Die richtigen Zahlen finden sich in den ägyptischen Papyrus, zum Beispiel in dem Berliner des Nechtunen. Hier ist das Getreide, *beti*, der Elysäischen Felder angegeben mit 7 Ellen Höhe; ihre Ähren, *schemesu*, von 2 Ellen, ihre Stiele, *āutu*, 5 Ellen. Aus den 5 und den 2 Ellen setzt sich demnach die ganze Pflanze zusammen zu 7 Ellen, also mit den Grannen, die nicht ausgeschieden werden. Das ist die angenommene Höhe der Getreidefelder an diesem jenseitigen Aufenthaltsorte der gerecht Verstorbenen. Das Stroh stand gegen die Ähren sehr zurück. Ein Ort für die Grannen allein ist nicht bekannt und wird in diesen Texten nirgends gebraucht; denn auch das spätere Wort *uschemu* heisst die Ähre im Allgemeinen, wie leicht nachzuweisen.

Dafs nun Fälle von so grofsen Ähren, deren Korntheil auch verhältnismäfsig weit gröfser war als bei uns, gerade in Babylonien häufiger vorkamen, um in einer solchen Inschrift vorgeführt zu werden, geht aus den Stellen bei den Alten über die auferordentliche Kornfruchtbarkeit in jenem Lande hervor. Herodot (1, 193) sagt, »von allen Ländern, die er kenne, sei Babylonien bei weitem das beste für die Getreidefrucht; diese sei für gewöhnlich 200fältig, wenn sie aber die ergiebigste ist, so sei sie 300fältig.« Dasselbe wiederholt 4, 198, wo er auch von dem Libyschen Kinyps (in dem heutigen Tripolis) sagt, dafs hier die Kornfrucht, ganz verschieden von allen übrigen Theilen des sterilen Libyens, wie in Babylonien, 300fältig sei. Auch STRABO (XVI. S. 1077, D.) spricht von der 300fältigen Frucht in Babylonien. Diese Vervielfältigung beruht natürlich auf der Vergrößerung der Halme aus demselben Einen Korne. Jedoch wird derselbe Fruchttrieb sich auch in den Ähren gezeigt und sie ebenso vermehrend fruchtbar und lang gemacht haben.

Nehmen wir aber mit Hrn. OPPERT an, dafs nur 5 halbe Ellen gemeint waren, so würde das gepriesene Maximum der Ähren nur 10 Ellen gewesen sein, das sind nicht ganz 7", also unter der Mittelgröfse.

Noch unglücklicher stehen die Zahlen gegen Hrn. OPPERT in Bezug auf die ganzen Halme. Diese sollen fünf Ellen lang sein, und das ist allerdings eine grofse Länge, wie sie hier in einer pomphaften Inschrift erwartet werden mufs. Denn wenn auch nicht drei Meter, wie Hr. OPPERT las, so werden doch $2^m,62 = 8' 4''$ von den Halmen

mit der Ähre zuweilen bei uns erreicht, um wie viel mehr in Babylonien. Wenn wir aber davon nur die Hälfte, also $1^m,31 = 4'$ nehmen, so bleibt das so erheblich unter der mittleren Höhe des Waizens, daß es sicherlich dem König nicht in den Sinn gekommen wäre, in einer Inschrift, in welcher auch die größten Übertreibungen nicht hätten auffallen können, den Erntegott Rammân als besondere Segensspender für einen Getreidewuchs von $4' 2''$ anzurufen. Ein schlagenderer Beweis für *u* als ganze, nicht als halbe Elle, konnte nicht vorgebracht werden.

Hr. OPPERT theilt aber ebendasselbst einen noch wunderbarer Beweis für sein Grundmaß der halben Elle mit, indem er Folgendes erzählt. In Paris sind zwei Statuen angekommen, welche dieses Maß ausgehauen auf dem Schofse tragen. Hr. DE SARZEC hat sie in Chaldäa gefunden; sie sind aus »dioritischem schweren Porphyren« den man auch in Ägypten wiederfindet,« (S. 238) und mit sumerischen Inschriften versehen. Der Ort der Ausgrabung ist chaldäisch d. i. babylonisch, nicht assyrisch, aber auch nicht Babylon selbst, sondern anderswo; der Ort soll noch verschwiegen werden. Die gefundenen Monumente bestehen aus sechs Statuen und verschiedenen Basreliefs. Fünf Statuen, »die entweder in Menschengröße oder etwas kleiner sind«, gehören einem »Könige« an, von dem man schon früher Zieg besaß (S. 236). In den Inschriften aber »nennt er sich niemals König« und braucht nur den sumerischen, arisch anklingenden Titel »*pat-en*« »Er ist Herrscher von *Sir-pur-la-ki*, vielleicht *Sirtella* auszusprechen« (S. 242). »Sein Name schreibt sich ohne Variante mit den Zeichen »*ka-nam-a*«, den man bis auf weiteres *Gudea* lesen kann.« »Sein Zeitalter ist ungewiß; es kann aber in das dritte Jahrtausend vor Christus gesetzt werden« (S. 241). »Der König rühmt sich seiner Bauten, und citirt »*Maggan* — also die sinaitische Halbinsel oder den dem Rothen Meere nahe gelegenen Theil des Nillandes (S. 230); aus dessen Steinbrüchen er die harten Steine gewann, dann *Mekuhha*, von wo er Gold und Holz holte« (S. 243). »Die Statuen sind alle kopflos; dagegen finden sich noch zwei Köpfe, einer mit einem Turban bedeckt, wie ihn noch die Araber jener Gegend tragen, mit turanischem, ein anderer, vollständig kahl, mit scheinbar hamitischem Typus« (S. 237).

Zwei nur von den vier sitzenden Statuen — es ist nicht gesagt ob in oder unter Lebensgröße — zeichnen sich besonders aus. Die eine (B) stellt »den König dar, der vor sich eine Tafel mit einem »Mauerplan und einem Maße von 270 Millimeter (weiter unten S. 271) »trägt, in der Form eines Lineals, das nach zwei Seiten hin abgedacht ist. Es ist an einer Seite abgebrochen; doch existirt auf der andern sitzenden Figur (A), die dieselbe Tafel, doch glatt und ganz

•Plan vor sich hat, das Mafs vollständig. Wir haben hier also den •einzigsten bis jetzt vorhandenen babylonischen Mafsstab« (S. 245). Er fährt dann (S. 247) fort: »Die ganze erhaltene Halbelle (A) hat •15 Einkerbungen, die Enden eingerechnet« (also nur 14 Theile) »in •folgender Entfernung: A. 0. 0^m,009. 0^m,019. 0^m,023. 0^m,034. 0^m,081. 0^m,09. 0^m,108. 0^m,190. 0^m,221. 0^m,236. 0^m,248. 0^m,253 — hier finden sich noch •kleinere Theilungen — 0^m,271. Auf der anderen Seite ist noch ein- •gekerbt 0^m,172. »Es ist sehr leicht zu sehen(?), dafs diese Ein- •kerbungen sich auf die Sechzigtheilung beziehen, und zwar sind in A •die Achtel und Siebenachtel ausgedrückt. Die Skala liest sich also •einfach so in 60 Theilen: für A haben wir: 0, 2, 4, 5, 7½, 18, 20, •24, 42, 49, 52½, 55, 56, 60.« Diese dunkeln Worte sind so zu verstehen. Wenn wir uns an A halten (denn das in der Mitte ab- gebrochene B ist gänzlich überflüssig zu betrachten), und die Länge von 0^m,271, welche hier OPPERT's halber Elle gleich sein sollen, in 60 Theile (seine *ongles*) theilen, so kommt auf jedes Sechzigstel 0^m,0045. Wenn wir dann jede Nummer der ersten Reihe mit 0,0045 dividiren, so erhalten wir die zweite Reihe, welche die Entfernungen der einzelnen Striche der ersten Reihe in *ongles* ausdrückt. Da nun aber diese Entfernungen der Striche niemals genau mit einem *ongle* zusammen- fallen, so sind die Zahlen der zweiten Reihe immer zu vollen *ongles* abgerundet worden. Nur am Ende, zwischen 0,253 und 0,271, finden sich zu viele Striche in ganz kleinen Entfernungen, die Hr. OPPERT hier nicht weiter betrachtet. Unter diesen Zahlen der zweiten Reihe finden sich nun zwei, die am nächsten mit 7½ und 52½ *ongles* übereinstimmen. Von diesen ist die erste ⅓ von 60 und die zweite ⅗ von 60. Das hält er für absichtlich herbeigeführt, um die Achtel und Siebenachtel seiner halben Elle dem Betrachter klar zu machen, obgleich in seinem Mafssystem nirgends eine Abtheilung in Achtel der halben Elle überhaupt vorkommt. Solche Spielereien, die keines- wegs so »einfach«, wie er sagt, aus seiner irre führenden Ausdrucks- weise heraus zu verstehen sind, erlaubt sich Hr. OPPERT hier ernst- haft vorzulegen.

Das Ungereimteste bei der ganzen Sache ist aber das, dafs der Babylonische halbe Fufs gar nicht die Länge des besprochenen Streifen hat, weder 270 noch 271 Millimeter, sondern nur 262 enthält. Hr. OPPERT stellt nämlich zwei halbe Ellen von verschiedener Länge auf. Die eine assyrische, welche er nach der unrichtig gemessenen Mauer von Charsabad zu 0^m,274 bestimmt (ETALON S. 14. 28. 38), ist die gröfsere, und entspricht einer ganzen Elle von 0^m,548. Die andere babylonische halbe Elle aber nimmt er mit allen übrigen Gelehrten, gleich der ägyptischen, zu 0^m,262 an, also die ganze Elle zu 0^m,526.

Nun ist es ja klar, daß wir es hier bei einem alten chaldäischen Denkmale aus Babylonien mit sumerischer Inschrift¹⁾ nur mit der babylonischen Halbelle zu 0^m,262 zu thun haben können, nicht mit der assyrischen, die er zu 0^m,274 rechnet. Dieser letzteren aber setzt er, ohne ein Wort darüber zu verlieren, sein »Mafs« der Statue mit 0^m,270 oder 271 gleich. Dieses wäre also gar nicht ein babylonisches Mafs, sondern ein assyrisches, was weder er, noch irgend wer hier suchen kann.

Mit einem Worte Hr. OPPERT's Auffindung des babylonischen Grundmaßes in Form eines Lineals auf dem Schofse einer altbabylonischen Statue mit Mafseinschnitten ist gleichfalls eine gänzlich verfehlte ungesunde Idee. Das Lineal wird eine Borde des Kleides sein mit beliebig aufgetragenen Strichen oder etwas Ähnliches; und auch der »Bauplan« wird nur eine Tafel zu liturgischen Zwecken sein. Hr. DE SARZEC empfehle ich, die beiden Statuen von mehreren Seiten, so daß man das »Lineal« deutlich sehen kann, photographisch zu publiciren.

Ich füge hier endlich noch einige Worte hinzu über den Aufsatz des Hrn. AURÈS: *Essay sur le système metric assyrien* (avec 2 pl.)²⁾, in welchem er eine neue Erklärung der Tafel von Senkereh geben will. Er kennt aber nur, was G. SMITH in der Ägypt. Zeitschrift 1872, S. 109 ff. und was OPPERT in seinem Etalon 1875 darüber gesagt haben, und weiß nichts von meinen Aufsätzen darüber in der Ägypt. Zeitschrift 1877 S. 49 ff., noch von meinen Discussionen mit OPPERT in den Schriften der Berliner Akademie, noch auch von OPPERT's späteren Wiederholungen in den Göttinger Gelehrten Anzeigen.

Er kennt daher überhaupt nicht die Form der Tafel, wie sie früher war, sondern nur die unrichtige Publication, wie sie vom brittischen Museum in den *Cuneiform Inscr. of Western Asia*, vol. IV. 1875 pl. 40 gegeben wurde, nicht meine Photographie des Stückes, noch meine Restauration desselben. Er nimmt im Widerspruch mit dem Original gleich hohe Zeilen in jeder Columnne an und ergänzt nach oben, ähnlich wie OPPERT, welcher die rechte Columnne zu c. 60 Zeilen berechnet, statt zu 36, ungefähr 24 Zeilen zu viel auf einem Stück Thon, welches so nie existiren konnte. In dieselbe Unordnung gerieth ihm natürlich die linke Seite der Tafel, und seine Gesamttergänzung von 65 neuen Zeilen ist nun um 29 Zeilen zu

¹⁾ Doch geht aus dem, was Hr. OPPERT sagt, nicht hervor, daß auch die Statue mit dem ungebrochenen »Mafsstabe« eine Inschrift trägt.

²⁾ In dem *Recueil de travaux relatifs à la philol. et archéol. Égyptiennes et Assyriennes* vol. III, livr. 3 et 4. Paris. 1882. 8.

rofs ausgefallen. Nach seiner Erklärung wären auf beiden Seiten, auf der assyrischen und auf der babylonischen, gar keine concreten Maße angegeben, sondern nur abstracte Zahlen, die auf ganz verschiedene Verhältnisse angewendet werden konnten, und hier vorgsweise nicht auf Längenmaße, sondern auf Gewichte Bezug hatten (S. 171). Er fragt, warum man lesen will:

1 parasange	= 30 stades.....	statt 1 talent
1 stade	= 60 sa od. décempèdes	» 1 mine forte
1 décempède	= 2 qanu od. passus ..	» 1 sicle
1 passus	= 6 empan.....	» 1 drachme
1 empan.....		» 1 obole.

Er versteht also die ausgeschriebenen Worte *uban*, *ammat* (= *u*), *u* gar nicht, welche allein schon beweisen, daß hier von Längenmaßen die Rede ist. Als solche erkennt sie auch OPPERT an, erklärt nur falsch, indem er *uban* nicht als Finger, sondern als *ongle*, *ammat* = *u* nicht als Elle, sondern als halbe Elle oder Spanne, und *u* nicht als Ruthe von 6 Ellen, sondern als canne von 6 Spannen erklärt. Selbst die Bemerkung des Hrn. AURÈS S. 172, daß die hl 9 auf der linken Seite immer in 2, auf der rechten in 3 Reihen in Keilen geschrieben werde, bewährt sich nicht; beide Zeichen lesen sich auf beiden Seiten ohne Unterschied. Das Verständniß der Inschrift hat demnach durch diese Arbeit nichts gewonnen.

Neue Beobachtungen über den Befruchtungsact der Gattungen Achlya und Saprolegnia.

Von N. PRINGSHEIM.

(Vorgelegt am 8. Juni [s. oben S. 611].)

Hierzu Taf. XIV.

Die letzten histologischen Elemente, welche als Träger der sexuellen Function erkannt sind, erscheinen auch in einigen Abtheilungen des Pflanzenreiches in der im Thierreiche typischen Form von Samenkörper und Ei. Allein vorwiegend finden sich bekanntlich in den Zeugungsvorgängen der Gewächse solche Conjugationsformen der Geschlechtszellen vertreten, in welchen die bei der Zeugung functionell wirksamen Elemente ihrer Form nach bisher nicht unterschieden werden konnten.

Die ganze grosse Reihe dieser copulativen Befruchtungsvorgänge bei Phanerogamen, Pilzen, Florideen und copulirenden Algen steht so dem Zeugungsacte durch Samenkörper und Eier histologisch noch fremdartig gegenüber. Zumal in den einfachsten Formen der Copulation erscheint der Zeugungsact unter Verlust des charakteristischen morphologischen Momentes, welches ihn überall sonst auszeichnet, als eine blosse Vermischung von formlosem Protoplasma.

Ich war stets geneigt, in den letztgenannten Fällen noch eine Lücke in den Beobachtungen zu vermuthen. Die reiche Formenmannigfaltigkeit der Befruchtungsvorgänge, die im Pflanzenreiche bereits vorliegt, darf mit Recht als eine zusammenhängende Stufenfolge von Entwicklungsformen des Zeugungsactes angesehen werden, welche phylogenetisch mit dem Zeugungsacte, der durch Samenkörper und Eier vermittelt wird, verbunden sind. Es liegt daher die Vermuthung nicht fern, dass auch die letzten Sexualelemente in den scheinbar noch abweichenden Zeugungsformen eine zur Gestalt der Samenkörper und Eier ansteigende, oder doch mit ihr verwandte Bildungsreihe von Formen durchlaufen.

Die Untersuchung der copulativen Befruchtungsvorgänge kann in dieser Richtung keineswegs schon als abgeschlossen gelten. Dass

aber die hier supponirten, von dem übrigen Protoplasma der schlechtszelle unterscheidbaren Samenkörper, wo sie existiren, in ihrer Gestalt von den bekannteren Formen der frei beweglichen Spermatozoen nothwendig abweichen müssen, bedarf keiner besonderen Hervorhebung. Es folgt schon aus der Bekanntschaft mit den Formen der Copulationsvorgänge.

Für einige copulative Befruchtungsvorgänge, welche ich als höhere Formen der Copulation bezeichnen möchte, so namentlich für den Befruchtungsact der Saprolegnien und Phanerogamen, schien die Annahme der Existenz bestimmt geformter Samenelemente nothwendig geboten und ich habe dies auch wiederholt ausgesprochen. Allein bisher fehlten mir entscheidende Beweise für meine Annahme. Ich glaube diese jetzt durch neue Beobachtungen zunächst für Saprolegnien gefunden zu haben.

Ich theile dieselben hier mit als einen weiteren Beitrag zu meiner von der genetischen Entwicklung der Samenelemente im Pflanzenreich und glaube, dass die beobachteten Erscheinungen, wenn nicht irre, eine neue Form und Modalität nachweisen, in welcher die befruchtende Protoplasma auf das Ei übertragen wird. Im Uebrigen hänge hiermit muss ich zugleich die ganz abweichenden Angaben, welche DE BARY neuerdings über den Befruchtungsact bei Gattungen *Achlya* und *Saprolegnia* ausgesprochen hat, nothwendig mit einer kurzen Kritik unterziehen und glaube deshalb meine Mittheilung mit einem kurzen Rückblick auf die Geschichte des Gegenstandes den gegenwärtigen Stand der Befruchtungsfrage bei *Achlya* und *Saprolegnia* beginnen zu sollen.

Der Befruchtungsvorgang der Saprolegnien, im Vergleich mit dem der Gattungen *Saprolegnia* und *Achlya*, erinnert durch die Art der hienach beschriebenen Befruchtungsschläuche, welche die Antheridien hineinschieben, auffallend an den Befruchtungsvorgang bei den gametophyten Pflanzen, nämlich an die Pollenschläuche. Seitdem ich als ich diesen Befruchtungsact auffand, habe ich die einzigen homologen Vorgänge bei den Saprolegnien beobachtet.

Nach allen begleitenden Erscheinungen, welche während des Herantretens der Befruchtungsschläuche in der Ausbildung und Reifung der Oosphaeren wahrgenommen werden, liess sich schon damals nicht daran zweifeln, dass hier ein wirklicher, eigenthümlicher Befruchtungsact vorliegt, obgleich derselbe offenbar von den anderen tallophytischen Befruchtungsvorgängen, die man damals kannte, bedeutend abwich.

Dieser von mir vertretenen Auffassung haben sich dann, wie bekannt, unbeschadet einzelner Divergenzpunkte, auch alle folgenden Beobachter der betreffenden Vorgänge übereinstimmend angeschlossen, obgleich ein materieller Übergang befruchtender männlicher Formelemente in die Oosphaeren hier nicht mit Sicherheit constatirt werden konnte.

Dieselben Organe, die ich für die *Saprolegnien* nachgewiesen und für Sexualorgane erklärt hatte, sind alsdann, wie gleichfalls bekannt, später von DE BARY auch bei den Peronosporéen aufgefunden und auch hier conform meiner Auffassung bei den *Saprolegnien* als Sexualorgane gedeutet worden.

Ferner habe ich noch gleichzeitig nachgewiesen, dass in den Gattungen *Saprolegnia* und *Achlya* die männlichen Sexualäste öfters fehlen, und dass diese mehr oder weniger rein weiblichen Formen trotzdem ihre Eianlagen zur Reife und zur keimfähigen Entwicklung bringen. Ich habe nun schon vor Jahren gezeigt,¹⁾ dass hier ein Fall ächter Parthenogenesis vorliegt und dass man daher bei den Arten der Gattungen *Saprolegnia* und *Achlya* sexuelle und parthenogenetische Formen zu unterscheiden hat.

Dies ist ungefähr, so kurz als möglich zusammengedrängt, der positive Inhalt dessen, was über die wesentlichen Befruchtungsvorgänge bei den *Saprolegnien* seither als erwiesen galt.

In der neuesten Zeit ist nun aber von DE BARY²⁾ gegen die hier dargelegte Auffassung der Sexualvorgänge bei *Saprolegnia* und *Achlya* ein unerwarteter Widerspruch erhoben worden.

Während DE BARY früher meine Ansicht getheilt und in seinen Schriften vertheidigt hat, negirt derselbe jetzt die Existenz eines Befruchtungsactes in den Gattungen *Saprolegnia* und *Achlya* völlig. Er hält zwar die von mir gegebene Deutung der Organe, um die es sich hier handelt, als Sexualorgane für die beiden Familien, bei welchen sie

¹⁾ Jahrb. f. wiss. Bot. Bd. IX. S. 192 u. f.

²⁾ A. DE BARY und WORONIN, Beiträge zur Morphologie und Physiologie der pfl. Vierte Reihe. (Abhandlungen der Senkenberg. naturf. Gesellschaft. Bd. XII.) Jf. a. M. 1881. Ich citire hier immer die Seitenzahlen des besonders paginirten

vorkommen, den Saprolegnieen und Peronosporeen, nach wie vor verändert aufrecht; auch bringt er selbst eine neue Reihe von Beobachtungen bei, welche die Existenz eines Befruchtungsactes für ein Gattungen der Familie, z. B. für *Pythium*, in der Weise, wie ihn behauptet hatte, und ferner ebenso für die Peronosporeen erweist. Allein er behauptet, dass die drei Gattungen *Saprolegnia*, *Achlya* *Aphanomyces* im Laufe der Zeit »apogam« geworden sind. Es sind die männlichen Sexualorgane derselben auch dort, wo sie in ihrer morphologischen Ausbildung vollkommen erhalten sind, ihre phylogische Function schon eingebüsst haben. Die Gattungen *Pythium*, *Phytophthora*, *Peronospora* sollen dagegen nach DE BARY, obgleich wesentlich ganz dieselben, und nicht einmal so vollkommen entwickelte Sexualorgane besitzen, ihre Sexualität noch unverändert beibehalten haben.

Dieser Vorstellung haben sich dann auch ohne weitere Prüfung ein jüngere Botaniker angeschlossen¹⁾. Ich halte demgegenüber auch jetzt die beiden Gattungen *Saprolegnia* und *Achlya* meine frühere Behauptung von der Existenz einer Sexualität bei den Saprolegnieen noch aufrecht und glaube auch die Lücke in der Beobachtung des Befruchtungsactes, die hier noch vorhanden war, ausfüllen zu können.

Die Hypothese der Apogamie, welche DE BARY für die mit männlichen Sexuallästen versehenen Saprolegnien und Achlyen aufstellt, ist, wie ich meine, ein leicht zu widerlegender Irrthum.

Gerade in diesen beiden Gattungen sind die männlichen Organen, Antheridien und Befruchtungsschläuche, unter dem ganzen Kreis der hierher gehörigen Pflanzenformen am allervollkommensten ausgebildet und dies muss schon von vorn herein gegen die Auffassung DE BARY einnehmen.

Auch glaube ich, dass die bisher bekannten Erfahrungen schon und für sich allein hinreichen, um die Existenz eines Befruchtungsactes bei diesen Pflanzen zu erweisen. Das charakteristische Zusammenwirken aller biologischen Entwicklungs-, Wachstums- und Reifungs-Acte

¹⁾ Z. B. FALKENBERG in seinem Aufsätze »Die Algen im weitesten Sinne« SCHENK Handbuch der Bot. Bd. II. S. 299. — Ferner A. FISCHER in »Untersuchungen über die Parasiten der Saprolegnieen«. Jahrb. f. wiss. Bot. Bd. XIII. S. 288, und ich bei der Correctur dieser Zeilen sehe, auch GÖBEL in seinen soeben erschienenen Grundzügen der Systematik etc. S. 104—108, ohne meine entgegenstehenden Angaben auch nur zu berücksichtigen, welche immerhin schon deshalb Beachtung oder Erwähnung verdient hätten, weil doch die Kenntniss der eigenthümlichen Form des Befruchtungsactes, der bei Saprolegnieen und Peronosporeen auftritt, erst durch meine Untersuchungen über *Pythium*, *Saprolegnia* und *Achlya* eröffnet worden ist. Ob das letzte Wort über die Histologie des Zeugungsactes bei *Pythium* und Peronosporeen schon gesprochen ist, wird vielleicht bald die Zukunft lehren.

nungen in den Antheridien, Befruchtungsschläuchen und Oosphaeren ist nur aus dem Zwecke der Befruchtung zu erklären.

Zu diesen Erscheinungen, auf die ich 1857 aufmerksam machte, rechne ich:

1. schon die Existenz der Befruchtungsschläuche, deren physiologische Bedeutung ja unverkennbar ist;
2. das Anwachsen der Antheridien an bestimmte Stellen der Oogonien, die ich früher für Löcher, später für Copulationswarzen erklärte;
3. das charakteristische Hineinwachsen der Befruchtungsschläuche bis an und zwischen die Oosphaeren;
4. die gänzliche oder theilweise Entleerung des Inhaltes der Antheridien und der Befruchtungsschläuche gerade während der Befruchtungsperiode, d. h. dann, wenn die individualisirten Oosphaeren sich mit Membranen umgeben.

Diese biologischen Vorgänge, welche ich damals nicht bloss für *Saprolegnia* und *Achlya*, sondern namentlich auch für *Pythium* genau festgestellt habe, in Verbindung mit den allgemeinen Sätzen, die sich schon aus meinen ersten Untersuchungen über die Sexualität der Tallophyten ergeben hatten, wonach

1. die ruhenden Sporen der Zoosporeen als befruchtete Eier erkannt wurden, und
 2. im Zeugungsacte der Pflanzen eine »materielle Vereinigung« der männlichen Zeugungselemente mit den Oosphaeren stattfindet,
- führen schon zu dem Schlusse, dass auch bei den Saprolegnieen ein Befruchtungsact vorliegt, und dass zugleich ein Übergang von befruchtenden protoplasmatischen Elementen aus dem Inhalte der Befruchtungsschläuche in die Oosphaeren hier vorausgesetzt werden muss.

Ich glaube, dass diese Schlüsse auch gegenwärtig noch ihre volle Berechtigung haben.

Aber der letztere Punkt, den ich soeben berührt habe, die materielle Vermischung der Zeugungsstoffe, welcher seit meinen Beobachtungen an *Vaucheria* und *Oedogonium* bei den Untersuchungen von Befruchtungsvorgängen mit Recht in den Vordergrund gestellt wird, war bei den Saprolegnieen von mir nicht direct wahrgenommen worden.

Der neuere Widerspruch, den DE BARY erhebt, geht nun von dieser noch vorhandenen Lücke in der Beobachtung aus.

Die Hypothese der Apogamie, welche DE BARY für die Saprolegnieen aufstellt, gründet sich, wie ein eingehendes Studium seiner umfangreichen Schrift belehrt, nämlich nicht auf neue positive Thatsachen über den Reifungsprocess der Oosphaeren, welche einen Befruchtungsact mit Nothwendigkeit ausschliessen, sondern stützt sich wesentlich

nur auf eine negative Beobachtung, darauf nämlich, dass es nicht geglückt ist, bei *Saprolegnia* und *Achlya* einen Übergang protoplasmatischer Substanz aus den Befruchtungsschläuchen die Oosphären und eine offene Communication zwischen beider direct wahrzunehmen.

Bei seinen sorgfältigen Untersuchungen der Saprolegnieen Peronosporeen findet DE BARY einerseits nach Anlegung der Befruchtungsschläuche an die Oosphären offene Communication und Übergang protoplasmatischen Inhaltes nur bei *Pythium* und *Phytophthora*, dagegen weder offene Communication, noch sichtbaren Übergang von Substanz bei *Peronospora*, *Saprolegnia*, *Achlya* und *Aphanomyces*, und er schließt hieraus, dass ein Befruchtungsact nur für *Pythium* und die Peronosporeen anzunehmen sei, bei *Saprolegnia*, *Achlya* und *Aphanomyces* aber nicht. Consequenter wäre es allerdings meiner Meinung nach den Sexualact dann auch für *Peronospora* zu negiren, denn bei dieser Gattung war ja offene Communication und Übertritt von Protoplasma nicht zu beobachten.

Ich glaube aber, wie ich gleich hier bemerken will, den Nachfolgenden den Beweis liefern zu können, dass eine offene Communication zwischen den Sexualzellen kein nothwendiges Postulat für die Existenz eines Befruchtungsactes ist, und dass der Übergang von Substanz unter Formen stattfinden kann, die sich dem Beobachter leicht entziehen, wenn sie nicht in den Kreis der von ihm gekannten Bildungen gehören.

Bei *Saprolegnia* und *Achlya* lässt sich DE BARY allerdings in seiner Auffassung noch von der Existenz der von mir nachgewiesenen parthenogenetischen Formen bestimmen, und ausserdem veranlassen ihn auch noch theoretische Vorstellungen über den Stammbaum der Pilze, so dass in den Saprolegnieen einen sicheren Fall der von ihm vertheidigten Apogamie zu erblicken, welche er, wie es scheint, jetzt allgemein für die Pilze anzunehmen geneigt ist.

Doch dies sind im Grunde nur vergleichende, morphologische und phylogenetische Deductionen, denen durch positive Befunde der Beobachtung leicht entzogen werden kann, auf dem sie stehen.

Die Saprolegnien und Achlyen, welchen die männlichen Geschlechtsorgane fehlen, sieht DE BARY nämlich nicht, wie ich dies gethan habe, als für parthenogenetische Formen der sexuellen Species an, die unter wechselnden Umständen entstehen können, sondern hält sie für besondere Rassen dieser Species¹⁾. Die Entstehung dieser Rassen

¹⁾ Anknüpfend an den Widerspruch, der hier zwischen DE BARY und der Natur der parthenogenetischen Formen der Saprolegnieen besteht, will ich jetzt beiläufig kurz erwähnen, dass auch die vielfachen sonstigen

Interdrückung der männlichen Äste, die übrigens, wie ich gezeigt habe, bald eine mehr, bald eine weniger vollständige ist, betrachtet er nun als Beweis dafür, dass die männlichen Äste bei den Sapro-

welche DE BARY in Nebenpunkten in der citirten Abhandlung gegen meine Angaben bei den Saprolegnien erhebt, wie z. B. gegen die über die Keimungsdauer der parthenogenetischen Sporen, über die Structur der Achlya-Sporen, über die Bedeutung der Copulationswarzen u. s. w., sachlich durchaus unbegründet sind, und nur in einem wenig gerechtfertigten Misstrauen gegen die Genauigkeit und Sorgfalt meiner Untersuchungen ihre Erklärung finden.

Was zuerst die parthenogenetischen Formen betrifft, so bezweifelt DE BARY die Richtigkeit meiner Angaben über ihre Entstehung in der Cultur bei *Achlya polyandra*, weil die *Saprolegnia monoica*, die er untersuchte, in ihren sexuellen Charakteren im Laufe einer ganzen Anzahl von Generationen constant blieb. Aber er findet doch selbst, dass bei *Saprolegnia asterophora* und *Aphanomyces* -die Antheridien oft (nicht immer) ausbleiben, wenn der Rasen alt wird- (S. 76 des Separatabdrucks); ähnlich wie ich dies zuerst gerade für *Achlya polyandra* behauptet hatte. Allein er geht noch weiter und erklärt meine Angaben bei *Achlya polyandra* aus einer Verwechslung mit nebenastlosen Saprolegnien, die sich in meine Culturen eingeschlichen hätten und die ich für die nebenastlosen Formen der *Achlya polyandra* gehalten haben soll. Als Beweis für diesen Irrthum führt er ferner an, dass auch meine Beschreibung der Structur der Achlya-Sporen falsch ist, und dass die nebenastlosen Pflanzen in meinen Culturen schon nach der Beschreibung, die ich von dem Bau ihrer Oosporen gebe, gar nicht in den Entwicklungskreis einer *Achlya*, sondern in den einer *Saprolegnia* gehören mussten. Die Structur der Oosporen der Achlya-Arten, namentlich von *Achlya polyandra* und *prolifera*, soll sich nämlich nach DE BARY sehr auffallend und wesentlich von der der Saprolegnien unterscheiden. Der bekannte, grosse sog. Fetttropfen, welcher bei den Saprolegnien das Centrum der Oospore einnimmt, soll bei den Achlya-Arten seitlich liegen.

Diese ganze Erklärung meines vermeintlichen Irrthums geht aber von falschen Prämissen aus und der Irrthum liegt hier in der That nicht auf meiner Seite.

Ich kenne die Pflanze nicht, die DE BARY *Achlya polyandra* nennt, und will daher meinerseits keine Erklärung des Widerspruchs zwischen seinen und meinen Angaben über die Structur der Achlya-Sporen versuchen. Dagegen halte ich für die von mir untersuchte *Achlya polyandra*, welche in ihren Charakteren durchaus mit der Pflanze übereinstimmt, die HILDEBRAND so genannt hat, die Richtigkeit meiner Angaben über den Bau ihrer Oosporen in allen Punkten aufrecht. Sie besitzen durchaus den typischen Charakter der Oosporen der Saprolegnien: centraler Fetttropfen, peripherisches Körnerplasma mit einer Vacuole in demselben, in welcher noch ein Zellkern liegt (Fig. 13). ganz so oder doch wesentlich so, wie bei den Saprolegnia-Arten und wie ich es früher (Jahrb. f. wiss. Bot. Bd. IX S. 198) beschrieben und dort auf Tafel XVII und XX wiederholt abgebildet habe. Dasselbe gilt übrigens auch von den Oosporen der *Achlya racemosa* und *lignicola* (Fig. 12b). Die von DE BARY für *Achlya polyandra* angegebene seitliche Lage des Fetttropfens unter völligem Zurückdrängen des Körnerplasma auf die andere Seite tritt bei der von mir untersuchten *Achlya polyandra* nur bei Anwendung eingreifender Reagentien nach dem Tode ein (s. h. Fig. 3, 5, 6).

Achlyen und Saprolegnien unterscheiden sich daher keineswegs, wie DE BARY will, generell schon durch den Bau ihrer Oosporen. Schon die zahlreichen Figuren der Oosporen meiner *Achlya polyandra* in meiner Abhandlung Taf. XVII Bd. IX der Jahrbücher, die doch immerhin einiges Vertrauen verdienen, hätten DE BARY überzeugen können, dass seine Vermuthung über meine vermeintlichen Irrthümer und Verwechslungen nicht zutrifft.

Die parthenogenetischen Formen der *Achlya polyandra* existiren daher nicht nur, so ich getrost versichern darf, sondern sie sind auch nebenastlose Formen der mit den meisten versehenen Exemplare, zu denen sie specifisch gehören.

legnieen ihre physiologische Bedeutung verloren haben und folgert aus, dass sie auch bei den sexuellen Formen, obgleich sie hier mit ihren Antheridien und Befruchtungsschläuchen noch vollkommen erhalten sind, ihre Function nicht mehr ausüben.

DE BARY erklärt allerdings die nebenastlosen Formen, die bei verschiedenen Nebenästen versehenen Species der Saprolegnieen wiederkehren, für besondere Rassen und hierauf gründet sich in den meisten biologischen Fragen sein Widerspruch gegen meine Angaben. Der Unterschied scheint mir factisch nicht gross. Es ist mir das eigene Eingeständniss von DE BARY, dass diese nebenastlosen Formen keine sichere Charaktere zeigen, welche sie von den Formen mit Nebenästen unbedeutend spezifisch unterscheiden, und dass er selbst bei *Saprolegnia asterophora* und *Apomyces* das Verschwinden oder Zurückgehen der Antheridien in der Cultur beobachtet hat (l. c. S. 104 u. 76). Dies eben habe ich von den parthenogenetischen Formen behauptet und darauf (l. c. 197—198) ihre Entstehung zurückzuführen gesucht. Aufstellung von Rassen scheint mir eine durch vielfache Generationen erhaltene Stanz gewisser habitueller Merkmale zu gehören, wie sie z. B. bei den Rassen uncultivirten Naturpflanzen durch Hunderte von Generationen zu Tage tritt. Jeder verlangt doch die Feststellung der Existenz von Rassen eine durchgeführtere Untersuchungssreihe, als sie die über wenig aufeinanderfolgende Generationen ausgeführten Untersuchungen an Saprolegnien gewähren können.

Muss man aber zugeben, dass die nebenastlosen Formen spezifisch von denen mit Nebenästen nicht verschieden sind, dann fallen auch die Schlüsse über die Keimdauer der parthenogenetischen Oosporen in meinem Sinne aus, und die von DE BARY gefundenen Zahlen (S. 80 der Separatausgabe) widerlegen nicht, sondern bestätigen vielmehr, richtig interpretirt, die von mir gefundene Thatsache, dass die parthenogenetischen Sporen der Saprolegnieen früher keimen, als die befruchteten.

Dass daneben auch spezifische Unterschiede in der Keimungsdauer sich geltend machen, ist hierbei ohne Belang.

Was endlich die Copulationswarzen betrifft, so erkenne ich hier den Irrthum in welchem DE BARY gegen mich im Recht ist, bereitwillig an. Die Stellen, an welchen sie hervortreten, sind nicht offene Löcher, wie ich dies 1850 behauptet und DE BARY selbst 1852 bestätigt hatte, sondern es zieht sich regelmässig jedesmal nur ein äusserst feines Häutchen über sie hinweg. Dagegen entspricht, und ist biologisch wichtiger, die organologische Deutung, die ich von ihnen 1873 (f. wiss. Bot. IX. S. 208) gegeben habe, genau dem wirklichen Thatbestande. Sie sind für die Copulation mit den Nebenästen vorbestimmte Bildungsorgane der Oogonien und verrathen, wo sie vorhanden sind, deutlich den activen Antheil, welchen die Oogonien an dem Copulationsacte nehmen. Dass sie bei manchen Arten wenig oder gar nicht ausgebildet sind, in anderen Fällen zu sterilen Ästen auswauchsen, ändert an ihrer ursprünglichen morphologischen Bestimmung ebensowenig, als der Umstand, dass es Fälle giebt, wo Antheridien zwischen zwei zu sterilen ausgewachsenen Papillen sitzend gefunden werden. Nicht jede Narben-Zelle erfüllt ihre Bestimmung und Pollenkörner findet man unter Umständen auch in den Copulationshaaren und doch ist die Narbe die vorgebildete Empfängnisstelle für den Pollen.

Die Erscheinungen sprechen zu deutlich, wenn man zahlreiche und verschiedene Fälle überblickt, als dass die Überzeugung von dem bestehenden Verhältnisse nicht dem Beobachter unmittelbar aufdrängen sollte. Namentlich dort, wo eine gewisse Regelmässigkeit in Zahl und Anordnung der Nebenäste und der Copulationswarzen herrscht, wie bei *Achlya racemosa* und *lignicola* und wo bei nahe benachbarten Oogonien die Nebenäste nicht nur an die Papillen des Oogonium anwachsen, sondern in welchem sie entstanden sind, sondern oft auch in ganz auffallender Weise die Papillen der ihnen nicht angehörigen Oogonien aufsuchen und mit ihnen copuliren.

Der Fall liegt aber bei den *Saprolegnieen* offenbar nicht anders, als in anderen ähnlichen Beispielen, wo neben bisexuellen rein weibliche, parthenogenetische Formen auftreten, deren Entstehungs- und Bildungsgeschichte unbekannt ist.

Wollte man so schliessen, so würde z. B. die parthenogenetische *Chara crinita* als Beweis dafür gelten müssen, dass alle *Characeen* — Charen und Nitellen — apogam sind trotz der Existenz ihrer Antheridien und Samenkörper, denn auch bei diesen ist die materielle Vereinigung des Samenkörpers mit der Eianlage noch nicht direct beobachtet.

Versuche, wie bei Charen, die directe Beobachtung durch das Experiment zu ersetzen, sind allerdings bei *Saprolegnieen* kaum ausführbar, allein dies muss eben bei der Beurtheilung nach der einen wie nach der anderen Seite zur grösseren Vorsicht mahnen.

Keinesfalls kann die Existenz parthenogenetischer Formen an und für sich gegen die Existenz des Sexualactes bei den sexuellen Formen entscheiden und ich führe dies hier auch nur an, um zu zeigen, dass das Hauptgewicht in DE BARY'S Hypothese der Apogamie der *Saprolegnieen* in seinem negativen anatomischen Befunde des Sexualactes bei *Saprolegnia* und *Achlya* liegt.

Das Endurtheil wird daher von der Sicherheit und Beweiskraft abhängen, welche diesem negativen Befunde zukommen.

Wie gross die Schwierigkeiten einer directen Beobachtung des Befruchtungsactes gerade bei den *Saprolegnieen* sind, geht schon aus der Geschichte des Gegenstandes hervor. Trotz der zahlreichen Beobachter herrscht noch immer wenig Übereinstimmung und man ist in der That mit Sicherheit bei den beiden Gattungen, um die es sich hier handelt, nicht über die Thatsache hinausgekommen, die ich bereits in meinem Aufsätze im Jahre 1857 constatirt habe, dass die Befruchtungsschläuche bis an die Oosphaeren vordringen und sich ihnen anlegen.

Für die Existenz des Befruchtungsactes nahm ich schon damals als fernere Andeutungen noch in Anspruch, erstens die sichtbare Entleerung des Schlauchinhaltes, die stets constatarbar ist, wenn auch

Ich glaube, dass DE BARY selbst, wenn er erst von dem Zeugungsacte bei *Saprolegnia* und *Achlya* überzeugt sein wird, auch die Copulation zwischen Copulationswarze und Nebenast anerkennen wird. Es ist eine Copulation gerade so, wie die zweier aufeinander zuwachsender Verbindungspapillen copulirender Zellen von *Spirogyren*, die auch ein besonderer, von der eigentlichen Vermischung der Plasmakörper beider Zellen verschiedener und zu unterscheidender Act ist. In diesem Sinne habe ich von einer Zerlegung der Copulationsacte in zwei gesonderte Acte gesprochen: Copulation der Mutterzellen der Sexualelemente einerseits, und Copulation oder Vereinigung der letzten wirksamen Plasmagebilde andererseits, wie z. B. bei *Saprolegnia*, *Achlya* und *Spirogyra* (Jahrb. f. wiss. Bot. IX. S. 219 und XI. S. 18—19).

ein Theil des Inhaltes in den meisten Fällen noch zurückbleibt; für das plötzliche Erscheinen von Plasma-Elementen, die offenbar früher dem Inhalte der Befruchtungsschläuche angehört hatten, ausserhalb der Schläuche und in der Umgebung der Oosphaeren gerade in der Zeit, wenn die Befruchtung stattfinden musste. Da die Plasma-Elemente, die ich hier im Auge habe, vor dem Vordringen der Schlauchspitze zu den Oosphaeren nicht vorhanden sind, so können sie auch nicht mit jenen protoplasmatischen Bildungsresten des Oogoniuminhaltes verwechselt werden, die hin und wieder bei der Entstehung und Bildung der Oosphaeren zurückbleiben, ohne bei deren Bildung verwandt zu werden.

Diese Umstände schienen deutlich für einen Austritt der befruchtenden Substanz aus den Schläuchen zu sprechen und zeigten zugleich, dass hier ebenso wie in anderen Fällen, z. B. bei *Vaucheria*, nicht der gesammte Inhalt der Antheridien bei der Befruchtung verbraucht wird.

DE BARY legt auf diese Erscheinungen geringeren Werth. Das Verschwinden des Inhaltes in den Befruchtungsschläuchen könne, meint er, davon herrühren, dass derselbe bei dem Wachsthum der Schläuche Verwendung finde, oder vielleicht bei der Athmung verbrannt werde. Sonderbarer Weise bleibt aber der Inhalt der Stängelschläuche der Saprolegnien und auch der der Tragzellen der Antheridien trotz Wachsthum und Athmung bestehen, und dieser bemerkenswerthe Substanz-Verlust, der gerade an der Stelle, wo er hier eintritt, so bedeutungsvoll ist, müsste in einer mehr befriedigenden, andern Weise erklärt werden, wenn man die nächstliegende Annahme, dass der verschwundene Inhalt für die Zwecke der Befruchtung verwendet sei, zurückweisen und nicht gelten lassen will.

Auch das Vorhandensein der differenten plasmatischen Bildungen neben den Oosphaeren und ausserhalb der Befruchtungsschläuche hält DE BARY für bedeutungslos, da er annimmt, dass alle hier auftretenden Körper ohne Ausnahme nur unverbrauchte Reste des Bildungsplasmas der Oosphaeren sind, was jedoch, wie ich bereits oben hervorgehoben habe, unbedingt nicht richtig ist.

Den entscheidenden Beweis aber für seine Annahme, dass gar keine Befruchtung stattfindet, sieht DE BARY endlich darin, dass die Befruchtungsschläuche sich zwar an die Oosphaeren anlegen, in feste Berührung mit ihnen gerathen, aber keineswegs mit ihnen verwachsen, sondern zeitlebens geschlossen bleiben und bei Anwendung von Reagentien sich immer von den Oosphaeren in geschlossenen Zustände zurückziehen. Er behauptet von *Saprolegnia ferax*.¹⁾ »Um über eine offene Communication ins Klare zu kommen

¹⁾ A. a. O. S. 41. 42.

men, wurden geeignete Exemplare mehrfach im Momente des festesten Aufsitzens des Schlauches getödtet, immer mit dem gleichen Erfolge: das aufsitzende Ende des Schlauches zeigte sich immer geschlossen. Zumal bei der Einwirkung verdünnter Chlorzinkjodlösung nimmt, in Folge der Wasserentziehung, der Schlauch nach allen Richtungen an Grösse ab. Sein aufsitzendes Ende blieb hierbei nie mit dem Ei in Verbindung, sondern trennte sich von diesem und zog sich relativ weit zurück, umgeben von zarter, aber völlig geschlossener Membran.

Ebenso erklärt er von *Achlya polyandra*:¹⁾ »Eine Öffnung des Schlauches findet hier so wenig statt, wie bei *Saprolegnia*..... Die Berührung der Schläuche mit den Eiern scheint hier, soweit sich dergleichen bestimmen lässt, weniger innig zu sein als bei *Saprolegnia*.«

Diese Angaben DE BARY's beruhen jedoch auf einer unvollständigen Beobachtung.

Es gehört hier viel Geduld dazu, um sich von dem wirklichen Thatbestande zu überzeugen, allein es steht unzweifelhaft fest, dass zahlreiche Schlauch-Enden, welche an die Oosphaeren herantreten und die Befruchtung ausführen, mit denselben an einer, wie es scheint, vorbestimmten Stelle innig und untrennbar verwachsen (Fig. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10). Nur wenn die Reagentien angewendet werden bevor die feste Verbindung und Verwachsung der Schläuche mit den Oosphaeren erfolgt ist, dann tritt der von DE BARY beschriebene Fall ein, dass der Schlauch sich von dem Ei, welches er zu berühren im Begriff war, weit und mit geschlossener Membran zurückzieht (Fig. 12, a). In diesen Fällen hat aber auch keine Befruchtung stattgefunden und die Eier reifen auch nicht, wie es der Vergleich der Oosphaeren in a, b, c, Fig. 12 deutlich zeigt.

Wendet man dagegen die geeigneten Reagentien, z. B. das von DE BARY benutzte Chlorzinkjod oder auch andere Contractionsmittel der Zelle und passende Tinctionsflüssigkeiten an, so findet man jedesmal, wenn überhaupt die Lage des Präparates eine genaue Beobachtung gestattet, die befruchtende Schlauchspitze mit der Oosphaere nicht nur vollständig, sondern auch unlöslich verwachsen (Fig. 4, 5, 6, 9, 10). Es findet hier dasselbe Verhältniss, wie beim Pollenschlauche statt; es gelingt bei verschiedenen, mechanischen und chemischen Einwirkungen eher den Befruchtungsschlauch zu zerreißen, als ihn von der Oosphaere, mit der er verwachsen ist, zu trennen.

So habe ich das Verhalten in zahlreichen Fällen constant bei *Achlya polyandra* gefunden. Um sich hiervon zu überzeugen, ist weiter nichts nöthig, als gut ausgebildete und reichlich fructificirende Exemplare dieser Pflanze, welche zahlreiche Befruchtungsschläuche in die

¹⁾ A. u. O. S. 53. 54.

vielsporigen Oogonien hineinschicken, vorsichtig mit Chlorzinkjod u noch besser, in passender Weise nacheinander, mit Chlorzinkjod u Anilinblau zu behandeln (Fig. 4, 6). Die meisten Befruchtungsschläuche wird man allerdings zwischen dem Haufen der Oosporen sich verlieren sehen, ohne dass es bei der äusserst verschiedenen Lage d Oosphaeren gelingt, die Verwachsungsstelle zwischen Schlauch u Oosphaere, wie es hierbei absolut nöthig ist, im Profil zu erblicken aber bei genügender Ausdauer wird man, namentlich unter den peripherisch gelegenen Oosphaeren, Fälle genug finden, die eine genaue Beobachtung zulassen, und diese zeigen mit Evidenz das von mir geschilderte Verhalten, die feste und untrennbare Vereinigung von Oosphaere und Schlauchspitze (vergl. die Figuren-Erklärung). Die peripherischen Oosporen der grösseren und mehr cylindrischen Oogonien zeigen oft auch äusserst schön, dass regelmässig an jeder Oosphaere eine Spitze der Befruchtungsschläuche herantritt (Fig. 1).

Äusserst deutliche und durch ihre Grösse für die Beobachtung günstige Fälle der Verwachsung liefern bei glücklicher Lage auch solche Oogonien, bei welchen der Inhalt ausnahmsweise nur zu einer einzigen grossen Oosphaere sich gestaltet (Fig. 4, 9).

Diese feste und untrennbare Vereinigung von Oosphaere und Befruchtungsschlauch findet ebenso, wie bei *Achlya polyandra*, auch bei *Achlya racemosa* und *lignicola* statt. Bei *Achlya polyandra* zeigt aber die Verwachsungsstelle ferner noch eine bemerkenswerthe, äusserst charakteristische Eigenthümlichkeit.

Die Oosphaere ist an der Stelle, an welcher die Verwachsung vorgenommen ist, zu einer deutlichen, über ihren Umriss scharf vorspringenden Papille ausgezogen (Fig. 3 a, 4, 5, 6, 9, 10) und man sieht nun, dass nach der Befruchtung die entstehende Oosphaeren-Membran sich zwangsweise längs ihres ganzen Umrisses ausbildet, an der vorspringenden Papille anfänglich aber noch fehlt. Man sieht deutlich, dass die Verwachsung hier zwischen der Schlauchspitze und der nackten, noch membranlosen Papille der Oosphaere stattgefunden hat. Ob diese Papille der Oosphaere schon vor der Verwachsung vorhanden war, oder die nackte Stelle der Oosphaere, an welcher die Verwachsung stattfand, erst in Folge derselben zur Papille ausgewachsen oder vorgezogen ist, darüber geben meine bisherigen Beobachtungen keine sichere Auskunft. Doch weisen vielerlei Umstände darauf hin, dass die Verwachsung in der That an einer vorher bestimmten Stelle der Oosphaere stattfindet. In den Fällen, in welchen zahlreiche Oosphaeren in einem Oogonium gebildet werden und in einem kugeligen Haufen zusammenliegen, wie dies ja für *Achlya polyandra* die Regel ist, scheinen dies zur Verwachsung bestimmten Stellen der Oosphaeren sämmtlich nach

dem Centrum des Haufens gerichtet und somit einander zugekehrt. Hierdurch namentlich wird die Beobachtung der Verwachsungsstellen so sehr erschwert. Dies erklärt aber zugleich das Verhalten der Befruchtungsschläuche, welche man gewöhnlich direct in das Centrum des Oosphaeren-Haufens hineinwachsen sieht, und erst dort bilden sich, meist unter fortlaufender, gleichsam sympodialer Verzweigung, jene sehr kurzen Zweigspitzen aus, welche mit den hier benachbarten Oosphaeren an den vorbestimmten Stellen verwachsen.

Das Zweckmässige in diesem Verhalten spricht gleichfalls deutlich genug für die eintretende Function. Unter den mehr unregelmässig gelegenen, von dem zusammenliegenden Haufen getrennten Oosphaeren finden sich dann die für die directe Beobachtung günstigeren Fälle (Fig. 1, 6).

Die Existenz der Verwachsungspapillen bei *Achlya polyandra* erweist wiederum den activen Antheil, welchen die weiblichen Sexualzellen an dem Befruchtungsacte nehmen. Doch bemerke ich, wie bereits hervorgehoben, dass diese Papillen nur bei *Achlya polyandra* in den befruchteten Oosphaeren constant auftreten; bei den Formen der *Achlya lignicola* und *racemosa* sah ich immer nur feste Verwachsung, aber keine deutlich bemerkbare Papille.

Über den bei dieser Verwachsung stattfindenden Übergang von Schlauchinhalt in die Oosphaere giebt aber die Beobachtung im Innern der Oogonien allerdings keinen genügenden Aufschluss.

Man sieht nichts Anderes, als dass die Schlauchspitze der Oosphaere fest aufsitzt (Fig. 1—10) und dass der Schlauch mehr oder weniger merklich an Inhalt verliert und es ist kaum festzustellen, ob während der ganzen Dauer der Verwachsung die feste Begrenzungslinie, welche der Wand der Schlauchspitze entspricht, noch sichtbar ist oder nicht. Meist sieht man sie allerdings völlig deutlich; ebenso oft erscheint sie aber undeutlich oder verwischt oder gequollen (Fig. 4, 6, 9). Das Verständniss dieses Verhaltens wird sich aus den Erscheinungen ergeben, auf die ich weiter unten zu sprechen komme. In den seltensten Fällen erhält man eine Andeutung einer Communication zwischen Ei und Schlauchinhalt und gelangt dazu innerhalb dieser Übergangsstelle, protoplasmatischen Inhalt zu beobachten (Fig. 6). Hierauf lege ich jedoch bei meiner Auffassung des hier stattfindenden Vorganges weniger Werth. Dagegen ist es von grösserem Belang, dass die angewachsenen Spitzen der Schläuche nach ihrem Herantreten an die Oosphaeren, wie dies immer constatirbar ist, inhaltsärmer werden. Oft erscheinen sie völlig leer, immer aber hat ihr Inhalt, verhältnissmässig zu seiner ursprünglichen Fülle, in Masse deutlich verloren (Fig. 1, 3, 9, 10, 16, 17).

Die unmittelbare Beobachtung direct an der Verwachsungsstelle hat mich somit, trotz der angewandten Mühe, wie bereits erwähnt nicht weiter geführt. Dagegen, glaube ich, gewähren die Erscheinungen, welche es mir noch gelang, an den Antheridien und in den Befruchtungsschläuchen aufzufinden, einen weiteren Aufschluss über den materiellen Vorgang, der sich hier offenbar zwischen Oosphäre und Befruchtungsschlauch abspielt.

Bei genauerer Aufinerksamkeit auf den Inhalt der Antheridien und Befruchtungsschläuche bei *Achlya polyandra* und bei den verschiedenen Formen, welche die *Achlya racemosa* und *lignicola* bilden, wird man bald wahrnehmen, dass in dem Protoplasma derselben eigenthümliche Bildungen auftreten, welche sich von den übrigen protoplasmatischen Bestandtheilen des Inhaltes sehr auffallend unterscheiden. Sie bestehen aus einer homogenen, das Licht eigenthümlich brechenden, plasmatischen Substanz, welche Farbstoffe in hohem Grade und weit stärker als das übrige Protoplasma aufspeichert (Fig. 4, 8).

Es werden diese Bildungen daher durch Tinctionen jeder Art namentlich durch Färbungen mit Anilin- und Karmin-Präparat leichter kenntlich. Sie sind nicht zu verwechseln mit jenen kleinen spindelförmigen Zellkernen, welche SCHMITZ bei den Saprolegnien auffand; sie sind grösser als diese und zeigen, was namentlich wesentlich ist, deutliche, wenn auch äusserst langsame und träge amöboide Bewegung.¹⁾

Von diesen Bildungen finden sich immer nur wenige im Inhalte der Antheridien. Auch sind sie nicht immer gut ausgebildet; häufig erscheinen sie nur wie stärkere, mehr oder weniger homogene Protoplasma-Ansammlungen, die hin und wieder noch einzelne differente Körperchen in ihrer homogenen Substanz zeigen, und sie liegen bevor sie sich förmlich individualisirt haben, gleichsam wie Kerne in den Ecken der Maschen, welche das Protoplasmanetz hier oft bildet (Fig. 13, 14). Ihre normale Ausbildung und ihre völlige Individualisirung und Sonderung vom übrigen Protoplasma scheinen sie erst zu erreichen, wenn die Antheridien schon Befruchtungsschläuche in Oogonien hineingetrieben haben (Fig. 2 a, b, c; Figur 11 a.) Vorher erscheinen sie wenigstens gewöhnlich noch nicht vom übrigen Protoplasma durchweg scharf gesondert.

¹⁾ Vielleicht sind die Plasma-Abschnitte, welche SCHMITZ (Sitzungsber. niederrh. Gesellsch. f. Natur- und Heilkunde zu Bonn. 4. Aug. 1879) in den Antheridien von *Aphanomyces laevis* beschreibt, den Gebilden, die ich hier meine, verwandt. Ich hatte seitdem noch nicht Gelegenheit, sie zu vergleichen. DE BARY erwähnt bei *Aphanomyces scaber* nicht; ich vermute, dass unter den Abschnitten, die SCHMITZ hier vorübergehend erwähnt, die Bildungen verborgen sind, die ich im Auge habe.

Auf der genannten späteren Entwicklungsstufe der Antheridien **aber** wird man diese Gebilde, wenn man erst auf sie aufmerksam geworden ist, leicht auffinden, und es lässt sich mit voller Deutlichkeit beobachten, dass sie nicht nur amöboide Bewegungen **ausführen**, sondern auch äusserst langsam von Ort zu Ort **in** den Antheridien und den Befruchtungsschläuchen hin und **her** wandern, namentlich aber auch in die kurzen Zweige der Befruchtungsschläuche eintreten, welche an die Oosphaeren **anwachsen** (Fig. 11a, a, a, 18 bis 23).

Diese Körper erinnern in ihrer Beschaffenheit und ihrer Bewegung **sofort** an die Spermatozoiden, welche CORNU bei *Monoblepharis* beschreibt¹⁾ und dort mit den Oosphaeren sich direct vereinigen sah.

Wie diese Bildungen bei *Achlya* und *Saprolegnia* aus den Befruchtungsschläuchen austreten, dies kann man nun direct an den merkwürdigen freien Befruchtungsschläuchen beobachten, die ich bei *Achlya racemosa* schon vor Jahren beschrieben habe²⁾.

Man gewinnt so eine Vorstellung über den Vorgang, der sich bei *Achlya* und *Saprolegnia* an den Verwachungsstellen zwischen Befruchtungsschlauch und Oosphaere so geheimnissvoll abspielt.

Bei allen Formen, die zu *Achlya racemosa* und *lignicola* gehören, entstehen derartige freie oder äussere Befruchtungsschläuche, wie **ich** sie genannt habe, regelmässig. Sie treten aus der Rückenfläche der Antheridien, welche der Oogoniummembran nicht angeschmiegt ist, hervor, und wachsen, anstatt ins Oogonium hinein, frei in die umgebende Flüssigkeit. Sie können aber auch an anderen Stellen der Antheridien entstehen, z. B. an secundären Antheridien der männlichen Äste (Fig. 29b), die sich oft unter dem End-Antheridium noch ausbilden³⁾. Auch bei anderen Achlyen sowohl als Saprolegnien finden sie sich (Fig. 2, b), wenn auch hier nur äusserst selten und fast nur ausnahmsweise.

In ihrer Entwicklung stimmen diese freien Befruchtungsschläuche völlig überein mit den inneren, in die Oogonien hineinwachsenden. Sie sind Fortsätze der innersten Schicht der Antheridienwand, welche unter Durchbrechung der äusseren Schichten bruchsackartig hervortritt und zu jenen Schläuchen auswächst. (Fig. 16a, 31a, a, 15, 17, 18—20; 21—28 u. s. w.) Sie verhalten sich nur insofern etwas abweichend, als sie meist unregelmässige Formen annehmen, d. h. nicht immer so regelmässig cylindrische Schläuche bilden, wie die

¹⁾ Ann. d. sc. nat. 5. série I. XV. S. 82 u. f.

²⁾ Jahrb. f. w. Bot. Bd. IX. S. 215 u. f. Taf. XIX. Fig. 2, 3.

³⁾ Man vergl. auch den oben angeführten Aufsatz in den Jahrbüchern Bd. IX.

inneren Befruchtungsschläuche. Sonst verhalten sie sich aber dieselben völlig gleich. Namentlich sah ich sie nie zu längeren Ästen auszuwachsen, sondern, nachdem sie die geringe ihnen zukommende Länge erreicht haben, die ungefähr der der inneren Befruchtungsschläuche gleichkommt, wird ihr Wachsthum sistirt und ist für immer beendet. Sie gehen später auch unter den gleich zu beschreibenden Erscheinungen zu Grunde; ganz so, wie die inneren Befruchtungsschläuche, nachdem diese die Befruchtung vollzogen haben.

Auch in diesen äusseren oder freien Befruchtungsschläuchen findet man nun die vorher erwähnten amöboiden Bildungen, die ich in ihrer physiologischen Function für die Samenkörper der *Achlya* halte und wegen ihrer Form und Bewegung als »Spermamöben« bezeichnen will (Fig. 18—23). Sie entstehen theils hier direct, theils wandern sie aus dem Antheridium ein.

Mit ihrer trägen Bewegung gelangen sie an die Spitze des Schlauches, oder an eine seitliche, einem kurzen Zweige entsprechend Ausbuchtung desselben (Fig. 18, 19, 21—23). Hier sammelt sich dann gewöhnlich mehr oder weniger von dem Protoplasma des Schlauches an, oder vielmehr sie nehmen dasselbe in sich auf (Fig. 15, 26) und nun sieht man im Laufe mehrerer Stunden die Spermamöbe allein, oder in Verbindung mit dem aufgenommenen Plasma, in einer schwer zu beschreibenden Weise aus dem Schlauche hervortreten (Fig. 23, 27, 28). Nicht so, wie die Schwärmsporen der Chytridie und ähnlicher Zellenparasiten durch die Zellmembranen einwandern, auch nicht so, wie farblose Blutzellen durch die Gefässwände hindurchtreten; sondern das ganze in der Ausbuchtung oder Spitze des Schlauches befindliche Plasma wird hier gleichsam, als wäre es eine zähflüssige Masse, durch die Membran des Schlauches hindurchgedrückt (Fig. 15, 27, 28), wobei die Membran selbst zwar meist sichtlich eine Auflockerung oder gallertartige Quellung erleidet, aber doch in ihren Umrissen wesentlich erhalten bleibt.

In den Zwischenstadien des Vorganges sieht man den sich hervordrängenden protoplasmatischen Inhalt theils noch innerhalb, theils schon ausserhalb des Schlauches und die Membran desselben scheint an dieser Stelle undeutlich und verwischt, gerade so, wie gewöhnlich auch während des Befruchtungsactes an der Verwachsungsstelle zwischen Schlauch und Oosphäre zu erscheinen pflegt (Fig. 4, 9 u. s. w.).

Nach dem Austritt erscheint der Schlauch hinter der ausgetretenen Masse wieder geschlossen (Fig. 23b, 28); allein seine Begrenzungsfläche erscheint etwas zurückgetreten und der Schlauch erscheint kürzer als früher, so dass man den Eindruck gewinnt, als ob die ganze

Plasma erfüllte Spitze sich abgelöst und der Schlauch sich wieder geschlossen hätte. Zudem erfolgt häufig der Austritt auch nur unvollkommen und der Durchtritt des Protoplasma wird noch vor seiner Vollendung gestört. Der Austritt aus den freien Befruchtungsschläuchen kann endlich auch auf jedem Entwicklungsstadium derselben, z. B. schon bei ihrem beginnenden Hervorbrechen aus dem Antheridium, wie bei a Fig. 16, erfolgen.

Die ausgetretene Masse selbst endlich, sei sie eine einzelne Spermamöbe gewesen, wie in Fig. 22, oder eine grössere, mit derselben verbundene Protoplasma-Ansammlung, wie in Fig. 28, bleibt regelmässig an der Stelle, wo sie hervortrat, liegen und geht hier ohne jede weitere Entwicklungserscheinung zu Grunde.¹⁾

Dies Verhalten erleichtert die Deutung der beobachteten Bildungen und zerstreut die letzten Bedenken, welche über ihren Werth noch aufsteigen könnten.

Der Verdacht liegt ja hier, wie in ähnlichen Fällen, nahe, dass die beschriebenen Spermamöben vielleicht nicht zur Pflanze gehören, sondern irgendwie auf unbeachteten Wegen eingedrungene Parasiten sind. Dagegen sprechen nun alle Erscheinungen, die ihr Auftreten und ihr Verhalten begleiten. Vor Allem, dass sie nach keiner Seite irgend eine Spur von Entwicklung zeigen.

Auch bei der sorgfältigsten Prüfung findet man die Bildungen, von denen hier die Rede ist, an keiner anderen Stelle der Pflanze, als in den Antheridien und Befruchtungsschläuchen. Auch hier fällt ihre Entstehung erst mit der Zeit der Befruchtungsreife der Oosphaeren zusammen.

Wären sie trotz alledem eingedrungene Parasiten, so müssten sie in den Zellen, in welchen sie gefunden werden, doch irgend welche Entwicklungsstadien durchlaufen, Wachstumserscheinungen zeigen, oder Ruhezustände, oder Vermehrungs- oder Reproductionsorgane bilden u. s. w. Von Alledem findet sich hier keine Spur.

Sollten sie etwa, wofür unter Ento-Cellularparasiten mir kein Beispiel bekannt ist, bestimmt sein, in der unvollkommenen Form, in der sie eintraten, aus der Nährzelle wieder auszutreten, so müsste man erwarten, dass sie ihre ferneren Entwicklungsstadien nach dem Austritt aus den Schläuchen beginnen. Aber der Nachweis ist leicht, dass sie nach dem Austritt jedesmal unmittelbar vor der Austritts-

¹⁾ Schon früher habe ich diesen Austritt des Plasma aus den freien Befruchtungsschläuchen gesehen und beschrieben (Jahrb. f. wiss. Bot. IX. S. 215—216), aber die histologischen Details des Vorganges nicht so genau verfolgen können. Es erschien mir damals, als ob der Austritt einen mehr plötzlichen Charakter hätte und stossweise, aber nicht so langsam, erfolge. Namentlich habe ich damals die Spermamöben nicht aufgefunden, oder vielmehr übersehen. Hierin unterscheidet sich meine gegenwärtige Beschreibung des Vorganges von der früheren, schon vor 9 Jahren gegebenen.

stelle ohne jede weitere Entwicklung unfehlbar zu Grunde falls sie nicht etwa, wenn der Austritt im Innern eines Oogonium auf eine zu befruchtende Oosphaere stossen.

So leicht daher auch bei diesen schwierigen und die Geduldigsten erschöpfenden Beobachtungen ein Übersiehen eines solchen Punktes, oder ein Irrthum sich einschleichen kann, so ist doch nicht, dass jeder sorgfältige Beobachter aus dem Zusammenhange aller Erscheinungen zu denselben Schlüssen gelangen wie ich selbst.

Auch über den Werth der freien Befruchtungsschläuche kein Zweifel sein. Sie sind, dies zeigt die unmittelbare Beobachtung der inneren Befruchtungsschläuche gleichwerthige Bildungen. Die Wand obliterirt später nach dem Austritt der Spermatiden, so, wie die Wände der inneren Befruchtungsschläuche nach der Befruchtung zu Grunde gehen. Man findet schliesslich an ihnen nur noch der völligen Zerstörung anheimfallende Reste ihres feibrigen protoplasmatischen Inhaltes und sieht daher zuletzt die Antiferment nur noch mit der seitlichen Öffnung versehen, aus welcher der Befruchtungsschlauch hervorgetreten war, und vor der nun nur die Reste des unverbrauchten Protoplasma befindlich sind (Fig. 10). Solche Zustände sind schon in meinem älteren Aufsätze Jahrb. Bot. IX. Taf. XIX. abgebildet.

Die an den äusseren Befruchtungsschläuchen beobachteten Erscheinungen lassen sich nun offenbar mit voller Berechtigung auf die inneren Befruchtungsschläuche und ihre Verwachsungsstelle mit den Oosphaeren übertragen; um so mehr, als ich hinzufügen kann, dass ich bei *Achlya polyandra* in einigen Fällen den gleichen Vorgang des Plasmaaustrittes auch im Inneren der Oogonien beobachtet habe. Zwar hier an den blinden Endigungen solcher Zweige der inneren Befruchtungsschläuche, die keine Oosphaere erreicht hatten, etwa bei *a* Fig. 8. Man darf daher annehmen, dass auch an der normalen Verwachsungsstelle der Schläuche mit den Oosphaeren, etwa bei *a* Fig. 4 und 9 — die Spermatide und das begleitende oogenomene Plasma die Membran des Schlauches in derselben durchdringt, um dann mit der Oosphaere zu verschmelzen. Hier wird vielleicht auch jene feste Verbindung hervorgerufen, die zwischen beiden besteht.

In einzelnen Fällen glaubte ich sogar, an der Verwachsungsstelle selbst diesen Übertritt gesehen zu haben, doch gestehe ich, dass die Beobachtung hier in so seltenen Fällen gelingt und unter so ungünstigen Umständen erfolgt, dass es schwer wird, ohne Täuschung und subjective Auffassung mit absoluter Bestimmtheit zu sein.

unterscheiden. Allein die sicher constatirten Thatsachen genügen, um ich meine, zur richtigen Deutung des Vorganges. Ferner erklären auch die in ihrem Verständniss noch dunkel gebliebenen Erscheinungen, die mir und Anderen wiederholt aufgefallen sind. Namentlich und vor Allem das schon besprochene Auftreten von Plasma-standtheilen, die aus den Befruchtungsschläuchen herrühren, frei der Nähe der Oosphaeren. Da das Protoplasma, wie ich oben schrieb, auch im Inneren der Oogonien aus den blinden Endigungen der Befruchtungsschläuche in der geschilderten Weise hervortreten kann, so mag der Vorgang vielleicht häufiger auch zwischen dem Mündungen der Oosphaeren an solchen Schlauchspitzen eintreten, die keine Oosphaeren erreichen. So können dann plötzlich in dem Raume neben den Oosphaeren zerstreute Plasmabestandtheile aus den Schläuchen sichtbar werden, die vorher nicht da waren und die auch nicht Bildungsreste des ursprünglichen Protoplasma der Oogonien sind.

Um endlich Deutung und Beobachtung so viel als möglich zu gewinnen, will ich, bevor ich weitere Schlüsse aus dem Gesehenen ziehe, hier zunächst noch diejenigen neuen Thatsachen, auf welche ich hier aufmerksam mache und über welche kein Zweifel sein kann, wiederholen.

Diese sind:

1. Man findet constant bei den Arten der Gattung *Achlya* eine feste, untrennbare Verwachsung zwischen Befruchtungsschlauch und Oosphaere (Fig. 3, 4, 9, 10).
2. Bei *Achlya prolifera* ist diese Verwachsungsstelle an der Oosphaere zu einer vorspringenden Papille gestaltet, an welcher sich die Membran der Oosphaere erst zuletzt bildet, erst nachdem sie an der übrigen Peripherie derselben bereits früher schon als eine durch Reagentien abhebbare Membran erkennbar ist.
3. Sowohl bei *Achlya polyandra*, als bei *Achlya racemosa* und *lignicola* treten zur Zeit der Befruchtungsperiode im Protoplasma der Antheridien regelmässig erst ungenauer begrenzte, dann deutlicher individualisirte Plasmabildungen mit amöboider Bewegung — die Spermamöben — auf. Diese wandern in die Befruchtungsschläuche hinein.
4. Die Spermamöben besitzen die Fähigkeit allein für sich, oder mit Fortreissung und unter Aufnahme von Schlauchplasma, welches sie in sich oder um sich ansammeln, durch die Membran des Schlauches hindurchzutreten, ohne dass in dieser ein deutlicher oder offener Communicationscanal sichtbar wird.

5. Das Austreten der Spermaöben und des Plasma erfolgt an den blinden Enden der Befruchtungsschläuche. Ich sah dasselbe sowohl an den freien, äusseren Befruchtungsschläuchen bei *Achlya racemosa* und *lignicola*, als auch an den inneren Befruchtungsschläuchen der *Achlya polyandra*, die normal ins Innere der Oogonien hineinwachsen.
6. Die ausgetretenen Spermaöben und Protoplasma-massen bleiben dort, wo sie ausgetreten sind, liegen und gehen hier ohne Weiterentwicklung zu Grunde.

Der normale Befruchtungsact von *Achlya* und auch von *Saprolegnia* — denn nachdem was ich von *Saprolegnia* weiss, zweifle ich nicht, die beobachteten Erscheinungen auch auf *Saprolegnia* auszudehnen — würde sich demnach wie folgt gestalten:

Ein mit amöboider Bewegung ausgestattetes, individualisiertes Plasmagebilde, welches hier die Function des Samenkörpers besitzt, durchdringt plasmodienartig die Membran des mit der nackten Oosphaere an einer vorgebildeten Stelle copulirten Befruchtungsschlauches und vereinigt sich unmittelbar mit der Oosphaere.

Dieser nach mehreren Richtungen hin bemerkenswerthe Befruchtungsact schliesst sich so sehr an den von *Monoblepharis*, dass dieser geradezu als das nächste Entwicklungsglied der Reihe erscheint.

Die träg-bewegliche Spermaöbe, welche bei *Achlya* noch geschlossenen Befruchtungsschläuchen zur Oosphaere geleitet wird, wie bei *Monoblepharis* mit Unterdrückung des leitenden Befruchtungsschlauches zum freien, selbständigen Spermatozoid, welches in der Gestalt kaum noch von der Spermaöbe abweicht, aber schon eine Cilie besitzt und ein selbständigeres Dasein führt. Für andere Gattungen der Saprolegnieen und Peronosporen darf man die Existenz der Spermaöben mindestens supponiren, die Beobachtungen von SCHMITZ an *Aphanomyces*, die ich oben bereits anführte, geben hierfür schon wenigstens eine Andeutung.

Systematisch scheint nun kein Grund vorhanden, die Familie der Saprolegnieen in dem Umfange, in dem ich sie früher gefasst habe, zu zerreißen und *Pythium* von derselben auszuschliessen. Ein Streit hierüber wäre für die vorliegende biologische Aufgabe ziemlich unfruchtbar. Ich selbst trage jetzt kein Bedenken mehr, auch *Monoblepharis* in den Kreis der Saprolegnieen hinein zu ziehen. Es würde dann in derselben Familie — jedenfalls in dem Umfange desselben Zeugungstypus — von *Pythium* an aufwärts bis zu *Monoblepharis* schon eine fortlaufende Entwicklungsreihe in der Ausbildung der Samenzellen

elemente vorliegen, die sich wesentlich vielleicht nur durch die grössere **Individualisierung** und **Beweglichkeit** der Spermatamöben unterscheiden möchte.

In dieser Reihe bilden die Gattungen *Saprolegnia* und *Achlya* **nicht**, wie DE BARY will, Beispiele einer bis zum Functionsverlust gesteigerten Degradation der Zeugungsorgane, vielmehr, wie ich glaube, **die** zur Zeugung durch freie, selbständige Spermatozoiden ansteigenden **Übergänge**. Die parthenogenetischen Formen in dieser Familie können **aber** über den Geschlechtsact der sexuellen Formen Nichts **aussagen**; sie verhalten sich auch hier zu den sexuellen nicht anders, **wie** in anderen Fällen. Auf das gleiche Verhältniss bei *Chara crinita* habe ich bereits hingewiesen.

Die Existenz rein weiblicher Formen mag, wenn man will, mit einer hypothetischen Vorstellung von Apogamie in Zusammenhang gebracht werden, sie lässt aber auch andere Deutungen zu. Die **theoretische** Würdigung der Erscheinungen, die hier in Frage kommen, **gehört**, wie mir scheinen will, überhaupt vor der Hand noch in jene **dunklen** Gebiete der Sexualitäts-Lehre, in welcher die speculative **Naturwissenschaft** noch das Wort führt, die empirische Forschung **aber** kritisch und skeptisch bei Seite steht.

Dass es zahlreiche geschlechtslose Individuen und Generationen **gibt**, ist gewiss. Ob hieraus schon die Apogamie von Arten und **ganzer** Classen von Organismen folgt, darf mit Recht bezweifelt werden.

Die durch eine beschränkte Anzahl von Generationen beobachtete **Geschlechtslosigkeit** eines Organismus, der ja vielleicht auf ungeschlechtlichem Wege in begrenzter Zeit sich fortpflanzen kann, ist nicht einmal ein Beweis des Geschlechts-Mangels, um wie viel weniger ein **Beweis** des Geschlechts-Verlustes. Das Geschlecht könnte ja durch **Entwicklungsbedingungen**, die wir bei der absoluten Unkenntniss von **der** wahren Bedeutung des Geschlechtes, in der wir uns befinden, **gar** nicht übersehen, in zahlreichen Generationen nur vorübergehend **unterdrückt** sein; wie dies ja entschieden eine Unzahl von Beispielen in der Natur täglich erweisen.

Es könnte ferner ein geschlechtsloser Organismus, selbst wenn schon mit Sicherheit entschieden wäre, dass er unter keinen Umständen Sexualität zeigt, die Sexualität vielleicht noch gar nicht erreicht haben. Phylogenetisch lassen sich Rückbildungen kaum von **Entwicklungsstufen** unterscheiden.

Zur Behauptung eines eingetretenen Geschlechts-Verlustes gehört **doch** der empirische Nachweis, dass das Geschlecht einst da war. **Diesen** Beweis, worauf es eben ankommt, für den besonderen Fall, **in** den es sich handelt, auch empirisch zu führen, dürfte schwer

sein, wenn man sich nicht mit mehrdeutigen vergleichende Betrachtungen über verwandte Organismen, die ein Geschlecht besitzen, begnügen will.

Doch ist es nicht meine Absicht, hier noch weiter in die theoretisirenden und noch controversen Gebiete der Sexualität einzudringen. Es genügt mir gezeigt zu haben,

dass die Saprolegnien kein glücklich gewähltes pirisches Beispiel für die Existenz und die Entstehung der Apogamie sind.

Andere Consequenzen für die Sexualitätslehre liegen bei Beurtheilung der Sexualitätserscheinungen der Saprolegnien vor und diese mögen hier noch ihre Besprechung finden.

Die materielle Vereinigung der Zeugungsstoffe ist unzweifelhaft ein nothwendiges und auch, wo sie direct beobachtet werden kann, ein charakteristisches Merkmal des sich vollziehenden Befruchtungsactes. Schon die physiologischen Erfahrungen sprechen ja im Grossen für die materielle Betheiligung des männlichen Samenelementes am Zeugungsacte. Die Botanik darf sogar für sich in Anspruch nehmen, diese für das Verständniss der Zeugung so wichtige Thatsache durch die histologischen Untersuchungen des Zeugungsactes der niederen Gewächse wissenschaftlich ausser allen Zweifel gestellt worden zu sehen. Ich selbst darf daran erinnern, dass ich schon in meinen Abhandlungen über die Befruchtung der Algen für die Theorie der materiellen Vereinigung der Sexualelemente im Zeugungsacte eine Entschiedenheit eingetreten bin und dieselbe dort durch die unzweideutigen Beobachtungen des Actes auch als thatsächlich erwiesen habe.

Dennoch fand ich, wie bekannt, nicht sogleich allgemeine Zustimmung bei den Morphologen. Selbst so hervorragende Forscher auf dem Gebiete der Zeugungslehre, wie HOFMEISTER, THURET, COHN traten damals zum Theil noch die alte Aristotelische Contact-Theorie der Zeugung, wonach nur eine dynamische Einwirkung des männlichen Samens bestehen sollte.¹⁾

Gegenwärtig, nach den zahlreichen übereinstimmenden Beobachtungen, welche wir über die histologischen Vorgänge beim Befruchtungsacte besitzen, wird ein Zweifel über den materiellen A

¹⁾ Man vergleiche hierüber meine Schrift „Zur Kritik und Geschichte der Untersuchungen über das Algengeschlecht“, Berlin bei HIRSCHWALD 1856 S. 65 u. f.; ferner den Nachtrag zu dieser Schrift in meinen Jahrbüchern f. wiss. Bot. Bd. II S. 474—476, die Anmerkung unter dem Text.

²⁾ Vergl. HENSEN, Physiologie der Zeugung, Leipzig 1881, S. 238 u. Handbuch der Physiologie von HERMANN.

er männlichen Samenelemente an dem Producte der Zeugung wohl nicht mehr aufkommen können.

Dass daneben, wie es einige neuere Morphologen auf zoologischem Gebiete wollen,²⁾ noch eine besondere Reiz- oder Contactwirkung des männlichen Samens auf das Ei bestehen solle, scheint mir eine überflüssige Annahme, da in den vorhandenen Beobachtungen nirgend ein zwingender Grund für dieselbe vorliegt.

Alle Erscheinungen der Bewegung, des Wachstums und der Entwicklung, die wir als Folgen der Befruchtung auffassen, erklären sich zur Genüge aus Wirkungen der Kräfte, die dem Stoffe anhaften, welcher bei der Vereinigung der Sexualproducte von der männlichen Geschlechtszelle an die weibliche abgegeben wird.

Was wir mit Sicherheit wissen, ist nur, dass ein solcher Stoff — ein Product der männlichen Sexualorgane — in das Ei, oder die stellvertretende weibliche Geschlechtszelle körperlich aufgenommen werden muss, und es ist Aufgabe der histologischen, Forschung in jedem einzelnen Falle diesen Übergang auch sichtbar darzulegen.

In den zahlreichen Fällen, in welchen die Sexualproducte als Samenkörper und Ei zusammentreten, oder als plasmatische Inhaltsparthien der Sexualzellen unmittelbar zusammenfliessen, ist dieser Übergang bekanntlich entweder direct zu sehen oder doch unschwer zu beurtheilen. Dagegen hat man über denselben bisher nichts Sicheres oder Entscheidendes in allen den Fällen copulativer Befruchtung constatiren können, in welchen, wie bei Phanerogamen, Gymnospermen, Florideen, Pilzen der Übergang des männlichen Samenelements in die weibliche Zelle durch geschlossene Membranen hindurch stattfinden muss.

Es herrschen hierüber nur mehr oder weniger wahrscheinliche Muthmassungen.

Es wäre nun schon an sich nicht absolut undenkbar, dass hier der männliche Zeugungsstoff in flüssiger Form, im Zellsaft gelöst und optisch nicht unterscheidbar, die trennende Membran durchdringt.

Liesse sich solch ein flüssiger Zeugungsstoff in einzelnen Fällen überzeugend nachweisen, so wäre die Schwierigkeit gehoben, und schon dieser Möglichkeit gegenüber sollte man in der Negirung der Function copulirender Zellen vorsichtig sein.

Mir selbst erscheint allerdings diese Möglichkeit sehr fern zu liegen. In Übereinstimmung mit allen Erfahrungen über den Sitz der biologischen Functionen in der Zelle muss man, wie ich glaube, auch die sexuelle Function ausschliesslich für das Protoplasma in Anspruch nehmen und unter dieser Voraussetzung, von welcher wohl die meisten Morphologen ausgehen werden, erscheint allerdings für die

genannten Fälle copulativer Befruchtung in dem V geschlossener Membranen noch ein Hinderniss für den männlichen Zeugungsstoffe zu bestehen.

Nun liegen aber schon verschiedene Andeutungen und über den Durchtritt plasmatischer Substanz durch geschlossene Wände vor. Neuerdings hat auch CORNU bei der Beobachtung conidienbildung einer Nectria auf einen solchen Fall hingewiesen, sogar ausserhalb der Sexualitätsphaere zu liegen scheint so weit, daraus zu schliessen, dass dem Plasma, als so allgemein die Fähigkeit zukommen möchte, durch geschlossene Wände zu wandern. Er sagt:¹⁾ »Dans le Nectria tout se passe si le plasma avait émigré des divers articles de la spore traversant cinq cloisons, jusqu'à la spore nouvelle et si tenu avait été employé à la former.

Quelle que soit l'interprétation qu'on lui donne, le résultat est pas moins acquis. Une substance colloïde telle que le plasma peut donc cheminer à travers une membrane close, mais vivante, sans que les phénomènes compliqués de la vie, d'une manière en apparence aux lois de l'endosmose.«

Er fügt hier noch hinzu, dass derselbe Vorgang auch bei der Befruchtung der Phanerogamen stattfinden möchte, bereits lange früher, worauf ich noch zurückkommen werde, schon SCHACHT ausgesprochen hatte.

In dem vorliegenden Befruchtungsacte von *Achlya* beobachtet man den Übertritt von Protoplasma durch geschlossene Wände direkt, ohne Hülfe von amöben-artigen Mitteln, gleich beobachten, dass er sich mit Hülfe von amöben-artigen Mitteln vollzieht und dass sichtbare Wege — wenigstens mit unwirksamen Mitteln sichtbare — in der Membran nicht zu finden sind.

Es ist daher durchaus nicht unumgänglich nöthig, bei der Befruchtung der Zellen nach einem offenen Communicationscanal für den befruchtenden Protoplasma zu suchen.

Keineswegs aber erscheint es geboten oder notwendig, dass eine offene Communication fehlt, kurzweg die Sache zu läugnen.

Dieser auf rein negativ-empirischem Boden fussende Schluss ist deshalb nicht haltbar, weil er von der meist thörichten Annahme ausgeht, dass die bekannten Processe in dem Gebiete, dem sie angehören, schon die vorhandene Mannigfaltigkeit der Natur erschöpfen.

Gerade die Sexualitätslehre liefert instructive Beispiele im Gegentheil. Die Behauptung, dass ein Organismus keine Sexualität besitzt, ist eine Behauptung, die nur durch die Beobachtung widerlegt werden kann.

¹⁾ Comptes rendus 1877. T. LXXXIV. p. 133—135.

weil die bereits bekannten Zeugungsvorgänge bei demselben nicht eintreten, ist schon mehrfach durch die Auffindung neuer Zeugungsformen widerlegt worden. Denn Form und Wege der Zeugungsstoffe und der Ort ihres Auftretens haben schon wiederholt zu unerwarteten und überraschenden Erkenntnissen geführt. Wer hat vor seiner Entdeckung an einen Befruchtungsact nach Art der Florideen gedacht, oder die Paarung von Schwärmsporen vermuthet, bevor sie gesehen war!

Von dem bezeichneten negativen Standpunkt aus wäre es z. B. vor der Entdeckung der Florideenbefruchtung leicht gewesen — und ist auch versucht worden — den Beweis zu führen, dass die Florideen geschlechtslos und ihre Spermatozoiden degenerirte Organe sind. Es war nur nöthig zu zeigen, dass nicht die Kapselsporen und nicht die Tetrasporen von den Spermatozoiden befruchtet werden.

Die Homologie der Organe mit allen ihr anhängenden Zweifeln scheint mir daher in unsicheren Fällen noch immer mehr positiven Werth zu besitzen, als eine bloss negative Beobachtung und die Voraussetzung eines Befruchtungsactes wird deshalb bei augenscheinlich zweckmässigen, auf die Fructificationsvorgänge bezüglichen Copulationserscheinungen auch in solchen Fällen nicht abzuweisen sein, in welchen die unmittelbare Beobachtung nicht sogleich die materiellen Substrate unterscheiden lässt, welche die sexuelle Vereinigung eingehen.

Hierin besteht allerdings gegenwärtig noch eine wesentliche Lücke in den histologischen Beobachtungen der Zeugungsvorgänge bei Pilzen Florideen, Gymnospermen und Phanerogamen.

Die Erscheinungen bei *Achlya* können dazu beitragen, diese Lücke auszufüllen. Jedenfalls steht, soviel darf man mit Sicherheit behaupten, der bemerkenswerthe Vorgang bei *Achlya* gewiss nicht isolirt da, und man darf wohl die Vermuthung aussprechen, dass auch in anderen Fällen die protoplasmatische Überführung durch geschlossene Membranen, dort wo sie in der Zeugung vorausgesetzt werden muss, nicht als formloses Protoplasma geschieht, sondern an die Gestaltung derselben zu Spermamöben oder ähnlichen plasmodien-artigen Sexual-elementen gebunden ist¹⁾.

¹⁾ Dass unbewegliche Samenkörper und solche mit amöboiden Bewegungen auch bei Thieren (Crustaceen, Nematoden) vorkommen, ist bekannt. Es verdient aber besondere Erwähnung, dass SCHNEIDER (Monographie der Nematoden. Berlin 1866 S. 279) gezeigt hat, dass unbewegliche Spermatozoiden der Nematoden ihre amöboiden Bewegungen erst im Uterus annehmen. Es erinnert dies offenbar an die Erscheinung bei *Achlya*, wo die Spermatozoiden erst vor der Befruchtung bewegungsfähig zu werden scheinen. Sollte dies allgemeiner der Fall sein, so läge hierin ein Wink, unbewegliche Samenkörper, deren Existenz ja auch bei Pflanzen denkbar ist, leichter aufzufinden und als solche zu erkennen.

Mehr als eine Andeutung und ein Fingerzeig für weitere Untersuchungen kann diese Vermuthung vor der Hand nicht sein. Dass aber z. B. bei Florideen nothwendig eine Fortführung des Zeugungsstoffes durch geschlossene Zellen stattfinden muss, habe ich schon 1877 mit Bezug auf meine Auffassung des Generationswechsels der Florideen nachgewiesen¹⁾. Nimmt man, wie ich es für wahrscheinlich halte, an, dass hier und bei Ascomyceten ähnliche distincte Sexualelemente im Copulationsacte mitwirken, so verliert auch die Abweichung der Flechten von den Ascomyceten im Befruchtungsacte ihren störendsten Charakter und es erscheint in diesem Punkte wenigstens die Einheit der Ascomyceten wieder hergestellt.

Abgesehen nun von den berührten tallophytischen Befruchtungsvorgängen liegt aber, wie ich hier noch etwas ausführlicher darlegen möchte, die Existenz von Spermatophyten namentlich beim Befruchtungsacte der Gymnospermen und Phanerogamen äusserst nahe.

Hierbei leitet mich zunächst die Analogie und die homologe Ausbildung der Pollenschläuche mit den Befruchtungsschläuchen der Saprolegnieen. Die morphologische und physiologische Verwandtschaft dieser Bildungen ist ja, wie ich mehrfach hervorgehoben habe, gar nicht zu verkennen.

Dass sie in beiden Fällen die leitenden Organe der männlichen Zeugungsstoffe sind, ist zweifellos. Auch die Art, wie sie die Eier aufsuchen und wie z. B. bei Cupressineen der Pollenschlauch bei der Mehrzahl der Archegonien an jedes Ei besondere, kleine Auszackungen absendet, erinnert offenbar an die Verzweigungen der Schläuche und die Bildung der Schlauchspitzen für jedes Ei bei *Saprolegnia* und *Achlya*.

Diese äusseren Aehnlichkeiten bedürfen keine weitere Ausführung. Allein auch darin herrscht in beiden Fällen Übereinstimmung, dass bei augenscheinlicher copulativer Befruchtungsform, wie sie in der Verwachsung der Schlauchspitze mit den weiblichen Sexualzellen gegeben ist, diese selbst schon deutlichere Eiform annehmen, die ja sonst erst den Zeugungsformen eigenthümlich ist, bei welchen auch die männlichen Spermatozoiden mitwirken. Man darf daher diesen durch die Befruchtungsschläuche charakterisirten Befruchtungstypus als eine Mittelbildung oder Übergangsstufe zwischen Copulation und Zeugung vermittelst freier Spermatozoiden und Eier auffassen.

Der dunkle Punkt im Befruchtungsacte der Phanerogamen und Gymnospermen, der durch directe Beobachtung noch nicht aufgeklärt ist, ist die Art, wie der männliche Zeugungsstoff aus dem Pollenschlauche austritt. Hier wie dort bei den Saprolegnieen fand di

¹⁾ Jahrb. f. wiss. Bot. XI. S. 13—15.

ung an der Verwachsungsstelle zwischen Schlauchspitze und weiblicher Zelle ihre Grenze. Schon 1856 habe ich es für undenkbar¹⁾, dass die sexuelle Function bei den Phanerogamen von einer durch die Membran des Pollenschlauches durchschwitzbaren Flüssigkeit ausgeübt werde.

Eine klare, unzweideutige Darstellung über den eigentlichen Verlauf des Vorganges, der hier stattfindet, findet sich auch jetzt noch der betreffenden Literatur nicht.

STRASBURGER, der befähigste und unverdrossenste Beobachter derselben, war früher mit HOFMEISTER und Anderen zu der Annahme geneigt, dass der Austritt der Zeugungsstoffe hier auf diosmotischem Wege erfolge²⁾. Gegenwärtig hält er es — wie es scheint im Anschluss an CORNU — für wahrscheinlich³⁾, »dass das Protoplasma nicht auf diosmotischem Wege, sondern direct die Membran des Pollenschlauches und respective auch des Embryosackes passirt.« Er sagt hierüber noch: »Der Gedanke eines diosmotischen Substanz-Austausches ist hier schlechterdings, wenn man den Vorgang an so vielen Objecten studirt hat, kaum noch zu fassen. Dieselbe Kraft aber, welche das ganze Protoplasma während des Wachstums der Schläuche durch deren Spitze getrieben hat, wird nun auch das Fortschreiten des Protoplasma in der Richtung des Embryosackes veranlassen. Geformte Inhaltskörper müssen freilich gelöst werden, bevor das Plasma die Membranen passirt, es dürfte als homogene zähflüssige Masse durch dieselbe gehen. Dabei ist nicht zu vergessen, dass es meist nur zarte und jedenfalls gequollene Zellwände sind, die durchsetzt werden.«

Mit gleicher Entschiedenheit hat sich in einem seiner letzten Urtheile über Befruchtung schon im Jahre 1865 der oft verkannte NACHT gegen einen diosmotischen Durchtritt der Zeugungsstoffe ausgesprochen und eine Ansicht geäußert, die ich hier reproduzire, weil sie der gegenwärtigen Darstellung des Vorganges am nächsten kommt. Er erklärt dort⁴⁾: »Es wird mir überdies bei der Auflockerung der Pollenschlauchmembran und ihrer festen Verbindung mit dem Fadenapparat wahrscheinlich, dass die Vermischung des Pollenschlauchinhaltes mit dem Inhalte der Protoplasmaugel nicht auf dem Wege

¹⁾ Zur Kritik und Geschichte der Untersuchungen über das Alpengeschlecht. *Bot. Zeit.* 1856, S. 72.

²⁾ Zellbildung und Zelltheilung, erste Auflage 1876. S. 295 »Der Inhalt des Pollenschlauches dringt jedenfalls in gelöster Form in das Ei ein«.

³⁾ Über Befruchtung und Zelltheilung, 1878. S. 58. Über die Rolle, die hierbei Kernsubstanz spielen soll, weiter unten.

⁴⁾ Die Blüthe und die Befruchtung von *Santalum album* in: *Jahrb. f. wiss. Bot.* IV. S. 18.

der Diosmose, vielmehr direct erfolgt, und dass der Fadenapparat als Vermittler dieser Vermischung dient.*

Aus diesen Angaben geht so viel hervor, dass man allgemein von der Vorstellung, dass es sich um rein diosmotische Processe handelt, ganz abgekommen ist, und dass die genauesten Beobachter den Eindruck erhalten haben, dass das Protoplasma als solches direct übergeführt wird.

Wie ist dies aber bei geschlossener Pollenschlauchmembran zu denken?

Das Protoplasma für eine zähflüssige Substanz zu erklären (STRASBURGER l. c.), hebt die Schwierigkeit nicht.

Von einer allgemeinen Eigenschaft des Protoplasma, als solches »Zellwände zu durchwandern« (CORNU l. c.), kann doch wohl nicht die Rede sein, da als analoge Fälle nur ganz vereinzelte Erscheinungen angeführt werden können, die überdies noch andere Deutungen zulassen.

Ebenso geht die Vorstellung einer »allgemeinen Wegsamkeit« der Zellwände für feste Körper und Protoplasma, welche STRASBURGER neuerdings für die Erklärung der Erscheinung heranzieht¹⁾, offenbar weit über die Erfahrung hinaus. Die Structur und die Permeabilität der Siebröhren, die ihn hierbei leitet, kann doch unmöglich zu allen Gewebe ohne Ausnahme ausgedehnt werden. Ausserdem gehören die Erscheinungen, die hier vorliegen, augenscheinlich einem ganz anderen Kreise von Vorgängen an. Sie fallen in die Reihe der Veränderungen, welche die Zellwände beim Ein- und Austritt von parasitären Bildungen, und in manchen Fällen auch bei der Entlassung von Reproductionskörpern aus ihren Mutterzellen erleiden.

Die Durchbohrung der Wände — sichtbar oder nicht — erfolgt hier immer sichtlich unter dem Einflusse des ein- oder auswandernden Körpers. Sie ist die Wirkung einer von diesem ausgehenden, chemischen oder mechanischen Ursache. Die Wände behalten hierbei auch keineswegs ihre normale Beschaffenheit, wenn man auch nicht sieht, dass sie perforirt sind.

Allein nicht jedes beliebige Protoplasma vermag diese Wirkung auszuüben. Es gehören eigenthümlich gebaute und befähigte Organismen, oder für diesen Zweck eigens vorgebildete Fortpflanzungskörper oder Zellen — Zoosporen, Keimschläuche, Samenkörper, farblos Blutzellen u. s. w. — dazu, um die Wände zu durchbohren, oder sie in den permeablen Zustand zu versetzen. Bekanntlich besitzen die Spermatozoen der Thiere, die auch theilweise amöboide Eigenschaften zeigen, diese Fähigkeit in hohem Grade. Der von CORNU angeführte

¹⁾ Bau und Wachsthum der Zellhäute 1882. S. 246 u. f.

Es lässt sich vielleicht auch hier unterbringen. Bei der von STRASBURGER¹⁾ noch herangezogenen Beobachtung von WORONIN an *Uromyces* wirkt ja unzweifelhaft ein selbständiges Plasmodium der Erscheinung mit.

In Verbindung mit allen schon berührten Analogien, welche die Saprolegnien darbieten und mit Hinweis auf meine Beobachtung an *Achlya* erscheint es mir daher nahezu gewiss, dass auch bei dem Austritt des Protoplasma aus den Pollenschläuchen Spermamöben der ähnliche Samenkörper, die sich wie Plasmodien verhalten, eine active Rolle übernehmen.

Ich glaube nicht, dass die vorhandenen Beobachtungen trotz ihrer Zahl und ihrer Genauigkeit die Existenz derartiger Bildungen der Pollenschlauchspitze ausschliessen. Die Angaben, dass alle röhrenförmigen geformten Bestandtheile in der Pollenschlauchspitze der Saprolegnien zur Zeit der Befruchtung bereits geschwunden sind, beziehen sich bei STRASBURGER²⁾ und Anderen wesentlich auf das Verschwinden des Zellkernes und seiner nächsten Abkömmlinge. Man achtete bei den neueren Untersuchungen vorwiegend an eine unmittelbare Betheiligung des Zellkernes am Vorgange der Befruchtung und die Bemühungen waren wesentlich darauf gerichtet, den vorausgesetzten Antheil des Pollenschlauchkernes nachzuweisen. Es galt in erster Linie immer das Verhalten dieses Zellkernes zu constatiren und die neueren Beobachter constatiren übereinstimmend auch nur, dass an dem unmittelbaren Übergang des Zellkernes, als solchen, in seiner röhrenförmigen Gestalt, nicht zu denken sei, sondern dass dieser vor der Befruchtung jedesmal verschwindet oder sich auflöst.³⁾

Hieraus folgt aber schon keineswegs die Unmöglichkeit der Existenz von Bildungen im Pollenschlauchende, wie ich dieselben voraussetzte, an die man bei der Untersuchung gar nicht gedacht hat. So kleine, amöben-artige Wesen, wie bei *Achlya*, aus fast homogener Substanz, die zumal, meist vom übrigen Protoplasma verdeckt, ihre Existenz erst durch ihre amöben-artigen Bewegungen verrathen, können bei der geringen Anzahl, in welcher sie voraussichtlich, wie in den Befruchtungsschläuchen der *Achlya*, so auch in den Pollenschläuchen auftreten mögen, unter den eigenthümlich schwierigen Umständen, welche die Untersuchungen im Pollenschlauche darbieten, sich auch dem Auge des sorgsamsten Beobachters nur zu leicht entziehen.

¹⁾ Bau und Wachsthum der Zellhäute 1882. S. 248.

²⁾ Befruchtung und Zelltheilung 1878. S. 52 u. f.

³⁾ STRASBURGER l. c. S. 56.

Dazu kommt, dass das Vorhandensein eigenthümlicher, Bildungen im unteren Ende des Pollenschlauches wenigstens Coniferen schon feststeht.

Die Bedeutung und das weitere Schicksal dieser Bildungen, von HOFMEISTER längst aufgefunden und beschrieben sind, und Entstehung STRASBURGER auf Theilungen des Zellkernes der Pollenzelle zurückführt, ist unbekannt, allein es ist nicht unscheinlich, dass sie zu den von mir supponirten Sexualelementen des Pollenschlauches genetisch in Beziehung stehen, wenn sie nicht diese Sexualelemente selbst sind.

Für diese Vermuthung und die von mir vorausgesetzte Function derselben scheint mir endlich, abgesehen von ihrer genetischen Beziehung zum Zellkern, namentlich noch der bisher nicht gehobene Umstand von Bedeutung, dass sie gerade dort in großer Anzahl auftreten, wo, wie bei Juniperus, ein Pollenschlauch reiche Archegonien befruchten muss.

Im nahen Zusammenhange mit der Aufgabe, die ich hier vorsetze, in den copulativen Befruchtungsvorgängen der Pflanzen noch die wesentlichen Structurelemente zu unterscheiden, welche im Sexualact die nothwendige Vereinigung ausführen, stehen auch meine Bedenken gegenüber den auftauchenden Zeugungshypothesen, die gerade dasjenige Moment, welches ich im Zeugungsacte für das Wesentliche halte, die Vereinigung morphologisch und functionell unwerthiger Bildungen, aus der Darstellung des histologischen Vorganges der Zeugung ausschliessen wollen.

Am Schlusse meines Aufsatzes mögen diese Bedenken hier eine Stelle finden.

Die mehrfachen Erfahrungen, welche über die Vereinigung zellkernartigen Bildungen im Ei der Thiere nach der Befruchtung vorliegen, haben bekanntlich auf zoologischem Gebiete zu der von OSCAR HERTWIG¹⁾ vertretenen Auffassung geführt, »dass die Zeugung allgemein auf der Copulation zweier Zellkerne — des Kerns des Spermatozoids und des Eikerns — beruht.« Diese Deutung des Zeugungsvorganges, welche die Sexualität ihrer wesentlichen Bedeutung im Zellbildungsprocess aufgehen lässt, hat STRASBURGER auch in die Botanik eingeführt. Zugleich erweitert er dieselbe noch dahin,

¹⁾ O. HERTWIG, Beiträge zur Kenntniss der Bildung, Befruchtung und Entwicklung des thierischen Eies in: Morpholog. Jahrbuch I. III. IV, besonders III. S. 278; u. s. w. — Die hierher gehörige zoologische Literatur vergl. auch in den citirten Werke von HENSEN, Physiologie der Zeugung.

nicht bloss die Zellkerne der Sexualzellen sich verbinden, sondern, »dass es überhaupt die gleichwerthigen Theile der copulirenden Zellen sind, welche sich im Geschlechtsacte vereinigen«, und hierin soll eben das Wesentliche des Zeugungsactes¹⁾ bestehen.

STRASBURGER stützt seine Ansicht auf den Nachweis der Existenz und der Annäherung zweier zellkernartigen Bildungen im Embryosack, deren eine er, wie HERRWIG, für den Spermakern — hier den Kern der Pollenschlauchzelle — erklärt und ausserdem vornehmlich noch auf die Erscheinungen an copulirenden Schwärmsporen im Paarungsacte derselben.

Nach meinen eigenen Beobachtungen vermag ich mich der Beurtheilung und Auffassung des Thatsächlichen, welche diesen Vorstellungen und den allgemein daraus gezogenen Folgerungen zu Grunde liegt, nicht anzuschliessen.

Ich glaube nicht, dass man die Zellkerne der Sexualzellen als die unmittelbaren, die Zeugung ausführenden Gebilde bezeichnen darf, wenn auch vielleicht als die Bildungsorgane der an sich ungleichwerthigen und ungleichartigen Sexualelemente.

Die Vorstellung, dass der histologische Vorgang der Zeugung in der Copulation gleichwerthiger Elemente — Zellkerne u. s. w. — besteht, ignorirt die in allen Fällen deutlicher Geschlechtsdifferenz scharf hervortretenden histologischen Verschiedenheiten der copulirenden Zellen und ihrer Bestandtheile. Das Wesen der Zeugung beruht, soweit es überhaupt verständlich ist, auf einer reciproken Beziehung ungleichartiger und ungleichwerthiger Elemente und drückt sich dem entsprechend auch in der Verschiedenheit und Ungleichartigkeit der histologischen Bildungen aus, welche sich im Zeugungsacte vereinigen, wenn auch in ganz vereinzelt Fällen diese Verschiedenheit noch nicht mit Sicherheit mikroskopisch demonstrirbar ist. Wie alle organischen Bildungen lassen sich allerdings Samenkörper und Ei und deren Theile zuletzt nothwendig auf das Schema der allgemeinen Structurelemente der Zelle — des Zellkerns und des Zellplasma — zurückführen. Es kann ja nach unseren gegenwärtigen Vorstellungen gar keine histologischen Bildungen geben, welche nicht als Theile von Zellen, von Zellkernen oder Zellplasma, zu deuten wären. Trotzdem giebt es in den verschiedenen Geweben specifisch differente Bildungsproducte der Zellen.

Als solche sind auch jene letzten, männlichen und weiblichen, Sexualelemente zu bezeichnen, welche im Geschlechtsacte die Verbindung eingehen. Sie sind unbeschadet ihres histologischen Charakters als

¹⁾ Über Befruchtung und Zelltheilung. Jena 1878. S. 75 u. f.

Zellen oder Zellenbestandtheile und unbeschadet ihrer Entstehung nach histologischer Definition gleichartigen Elementen dennoch specifisch differenzirte Bildungsproducte der Sexualzellen und als solche unter sich zugleich äusserst verschiedene Dinge.

Keineswegs kann der ins Ei eindringende Samenkörper oder sein Kopf, oder das aus dem Pollenschlauche, oder dem Befruchtungsschlauche von *Achlya*, austretende Plasmagebilde als identisch betrachtet werden mit dem Zellkerne einer vegetativen Zelle. Ebenso wenig wie der im Ei zurückbleibende Rest des Keimbläsches identisch ist mit dem Keimfleck, oder gar mit dem Nucleolus einer vegetativen Zelle.

Auch scheinen mir die objectiven Thatsachen, die in den Beobachtungen vorliegen, gar nicht die Verschmelzung zweier Zellkerne im Ei und noch weniger die Identität des einen verschmelzenden Körpers mit dem Zellkern der männlichen Sexualzelle zu erweisen.

Soweit ich die zoologischen Beobachtungen übersehe, scheint es gewiss, dass es sich um die Vereinigung von zwei wesentlich verschiedenen Dingen handelt, von denen weder das eine identisch mit dem Zellkern oder Nucleolus des Eies, noch das andere identisch mit dem Zellkern des Spermatozoids ist, obgleich sie höchst wahrscheinlich Abkömmlinge oder auch Producte des einen und des anderen sind. Man kann nach diesen Beobachtungen gar nicht daran zweifeln, dass hier zwei specifisch verschiedene ungleichwerthige Dinge sich mit einander verbinden. Das Werthvolle und Neue an diesen Beobachtungen liegt eben darin, dass, wie man annehmen darf, ein Theil oder ein Product des die Befruchtung ausführende Spermatozoids mit dem Reste oder einem Producte des Keimfleckes zusammentritt und dass, wie es scheint, aus dieser Vereinigung der Zellkern des befruchteten Eies hervorgeht.

Der Ausdruck, »dass die Zeugung auf einer Copulation der Zellkerne beider Sexualzellen beruht«, entspricht daher keineswegs den thatsächlichen Vorgängen und man hat deshalb in jedem Zeugungsvorgange die differenten Gebilde, die sich verbinden, noch genauer zu bestimmen¹⁾.

Auf botanischem Gebiete tritt der Mangel einer entscheidenden Beweisführung der hier aufgestellten Behauptung, womöglich, noch

¹⁾ Es scheint mir daher auch sachgemässer mit Fol. (Sur les phénomènes times de la fécondation. Comptes rendus 1877) von einem »pronucleus mâle« und »pronucleus femelle« zu reden und vielleicht wäre es noch richtiger, auch diese an die normale Structur des Zellkerns erinnernden Ausdrücke fallen zu lassen und die beiden im Ei erscheinenden Bildungen vorläufig ohne jede Präjudicirung ihres histologischen Werthes als Samenstern und Eistern (Spermaster und Onaster) zu bezeichnen.

scharfer hervor. Die Angaben bei STRASBURGER¹⁾ gestatten nicht nur, sondern verlangen nach den vorliegenden Figuren eine andere, als die von ihm gegebene Deutung.

Die Vorstellung, dass der Zellkern des Pollenschlauches sich auflöst und die alte Kernsubstanz unter Erhaltung ihrer Eigenschaften durch die Membran des Pollenschlauches hindurchdringt, um dann im Ei von Neuem sich zu einem Zellkern zu sammeln, welcher mit dem ursprünglichen Zellkern der Eianlage verschmilzt, erscheint mir als eine kaum annehmbare, hypothetische Ausfüllung der in der Beobachtung vorhandenen Lücke. Mir erscheint es für wahrscheinlicher, dass der sog. Spermakern eben nur die durchgetretene Spermamöbe ist, welche immerhin genetisch aus dem Zellkerne des Pollenschlauches entstanden sein mag.

Die Identität der zweiten Bildung mit dem Zellkern des Embryobläschens ist mindestens fraglich. Vielleicht liegt ferner in den beiden sich berührenden Bildungen bei *Picea*, *Monotropa*, *Orchis* (l. c. T. II. Fig. 71, Taf. IV. 128. 129. u. s. w.) gar keine Verschmelzung, sondern vielmehr die Entstehung eines »pronucleus femelle« im Sinne von FOL vor.

Übrigens bemerke ich, dass ich gleichfalls das plötzliche Auftauchen einer neuen Bildung im Ei — scheinbar eines neuen Zellkernes neben dem alten (Fig. 1b) — auch bei *Achlya* öfters nach der Verwachsung der Befruchtungsschlauchspitze mit dem Ei beobachtet habe. Allein ich wage über den Werth dieser Bildung noch nichts Positives auszusagen, zumal ich dieselbe Erscheinung auch an parthenogenetischen Oosporen der *Saprolegnia ferax* gesehen habe.

Die erweiterte Verschmelzungstheorie aber, wie sie STRASBURGER in der Botanik vertritt, wonach im Zeugungsacte nicht bloss die Zellkerne, sondern überhaupt die gleichwerthigen Theile der Sexualzellen verschmelzen, und hierin der durchgreifende Charakter der Zeugungsvorgänge liegen soll, ist, wenn man die Erscheinungen genau analysirt, eine Vorstellung, die, wie ich finde, nicht einmal für diejenigen Fälle, für welche sie zunächst entwickelt wurde, für die Paarung der Schwärmsporen durchführbar ist.

Gerade die charakteristischen Structurelemente der Schwärmsporen — Cilien und rothe Punkte — gehen sichtlich keine Verschmelzung ein. Über eine Verschmelzung anderer, distincter Structurelemente hat die unmittelbare Beobachtung des Paarungsactes bisher keine Auskunft gegeben. Auch eine Beziehung der Zellkerne ist hier noch nicht einmal nachgewiesen. Noch viel weniger wie gesagt die

¹⁾ L. c. S. 51, 56, 57 u. s. w.

Copulation anderer, als selbstständige Bildungen erkennbare Formelemente.

Was die Beobachtung thatsächlich gezeigt hat, ist ganz allein nur das Zusammenfließen der beiden copulirenden Schwärmspore von der sogenannten Mundstelle an — dem Empfängniss- oder Befruchtungsflecke — längs der Peripherie der Spore bis zur beendigten Gestaltung einer in sich abgeschlossenen einheitlichen Bildung.¹⁾

Von einer Verschmelzung gleichwerthiger Theile kann hi im wahren Sinne des Wortes ebensowenig, wie bei anderen Zeugungsvorgängen, z. B. beim Befruchtungsacte von *Vaucheria*, dem von *Fucus* dem der Moose und Farnkräuter ernstlich die Rede sein.


So lange man noch genöthigt ist, den Sexualvorgang als ein Vorgang sui generis, verschieden von Ernährung und Wachsthum zu betrachten, so lange wird man seine morphologische Manifestation auch nicht in der Verbindung gleichwerthiger Elemente, aus der kaum etwas specifisch Neue hervorgehen kann, suchen können.

Übersieht man die ganze Reihe der bekannten Vorgänge, so wird man daher mit mehr Recht gewiss die wesentlichen histologischen Elemente, welche in der Zeugung copuliren, für nothwendig differente Bildungen erklären dürfen.

Unbedingt lässt sich allerdings über den histologischen Vorgang bei der Zeugung ganz allgemein auch gegenwärtig kaum mehr sagen, als dass derselbe, wie ich es schon in meinen Abhandlungen über *Vaucheria* und *Oedogonium* festgestellt habe, in einer materiellen Vereinigung der Sexualelemente besteht. Darf man hierüber hinausgehen, so liesse sich vielleicht nur die Hypothese hinzufügen, es bei dieser Vereinigung sich überall — auch in den copulativen Zeugungsvorgängen — um die Verbindung von histologisch distincten aber ungleichwerthigen und mit differenten Eigenschaften begabten specifischen Bildungsproducten der beiden in Wechselwirkung tretenden Sexualzellen handelt.

Hierbei werden vielleicht die künftigen Beobachtungen allgemein herausstellen, dass diese specifischen Bildungsproducte histologisch Abkömmlinge oder Producte der Zellkerne der Geschlechtszellen sind.

¹⁾ vergl. meinen Aufsatz über Paarung von Schwärmsporen Monatsb. d. Acad.



Erklärung der Tafel XIV.

(dieser Tafel sind nach meinen Präparaten von Hrn. CARL MÜLLER gezeichnet.)

und 13—14. *Achlya polyandra*.

1 eines längeren Oogonium aus der Mitte eines Fadens. Der Befruchtungsschlauch sendet deutlich an jedes Ei eine Zweigspitze ab. Das eine *b*) unmittelbar nach der Befruchtung zeigt zwei sog. Zellkerne nebeneinander, ein anderes (*a*) wie gewöhnlich nur eine Vacuole mit Zellkern. $\frac{800}{1}$.
Antheridium, welches ausser mehreren inneren, auch einen äusseren Befruchtungsschlauch (bei *b*) getrieben hat; bei *a* Spermatöben. $\frac{800}{1}$.

2 dem zerrissenen Oogonium herauspräparierte, befruchtete Eier mit an dem Befruchtungsschlauch nach Behandlung mit Reagentien; bei *a* alle des befruchteten Eies. $\frac{740}{1}$.

3 Oogonium mit einer einzigen, grossen, eben befruchteten Oospore mit Chlorzinkjod und Anilinblau; bei *a* Verwachsungsstelle. $\frac{740}{1}$.

4 herauspräpariertes Ei mit ansitzendem Befruchtungsschlauch. $\frac{740}{1}$.

5 *k* eines Oogoniums mit drei peripherisch gelegenen Eiern; mit Chlorzinkjod und Anilin; zwei Eier mit angewachsenem Befruchtungsschlauch, das zeigt noch die Papille. $\frac{740}{1}$.

6 *k* eines zerrissenen Oogoniums mit Chlorzinkjod. Der Befruchtungsschlauch untrennbar vom Ei. $\frac{360}{1}$.

7 1 eines unbeschädigten Oogoniums mit ansitzenden Antheridien, mit Anilinblau. In den Antheridien und Befruchtungsschläuchen die getödteten Spermatöben. $\frac{360}{1}$.

8 Fig. 4 ohne Chlorzinkjod; bei *a* die Verwachsungsstelle und die hervorstechende Papille des Eies sichtbar. $\frac{740}{1}$.

9 präpariertes, aus dem Oogonium herausgerissenes, befruchtetes Ei, mit Befruchtungsschlauch verwachsen; zeigt noch die Papille. $\frac{800}{1}$.

10 1 eines unbeschädigten Oogoniums mit ansitzendem Antheridium, in dessen Befruchtungsschläuchen bei *a, a, a* eingewanderte Spermatöben. $\frac{360}{1}$.

11 Antheridien mit Spermatöben und Oogonium mit normalen Oosporen. $\frac{360}{1}$.

12—31. *Achlya colorata mihi* (Collectiv-Species die *Achlya* und *lignicola* Hild. und noch einige kleinere und meist einsporige umfassend; s. Jahrb. für wiss. Bot. IX. S. 205. Anm. unter 12). Fig. 12, 16, 17, 31 zeigen die natürliche Farbe der Oogonien.

13 *k* eines Fadens mit drei Oogonien. *a, b, c*; in *b* und *c* die Befruchtung ausgereift, die Oosporen normal gereift; in *a* die Befruchtung wegen Nichtbestehens des Befruchtungsschlaches unterblieben, die Oosporen nicht gereift und der Zerstörung anheim. $\frac{500}{1}$.

14 Oogonium mit ansitzendem Antheridium, welches einen inneren und einen ausseren grossen, äusseren Befruchtungsschlauch getrieben hat. $\frac{400}{1}$.

15 Oogonium mit mehreren männlichen Nebenästen. Das eine sichtbare Antheridium hat einen inneren Befruchtungsschlauch getrieben und beginnt soeben (*a*) einen äusseren zu treiben; im Antheridium Spermatöben. $\frac{400}{1}$.

16 wie 15 in anderer Lage; der äussere Befruchtungsschlauch des Antheridiums ist schon grösser, noch bruchsackartig. $\frac{800}{1}$.

17 Desgl. Antheridien mit äusseren Befruchtungsschläuchen aus der Rücken-
e, in verschiedener Lage gezeichnet, mit Spermatöben. $\frac{800}{1}$.

- 22—28. Desgl. mit Austrittszuständen der Spermatocyten. $\frac{740}{1}$.
29. Männlicher Ast am Oogonium, letzteres im Umriss. Der männliche Ast hat ausser dem End-Antheridium, welches einen inneren und äusseren Befruchtungsschlauch getrieben hat, noch unterhalb desselben, wie dies öfters geschieht, ein zweites Antheridium (*b*) abgegliedert. $\frac{740}{1}$.
30. Antheridium, dessen äusserer Befruchtungsschlauch bereits obliterirt; man sieht an der Rückenfläche nur die vorhandene Öffnung und die unverbrauchten Reste des Inhalts. $\frac{800}{1}$.
31. Normales, ungestörtes Oogonium der einsporigen Form. Beide ansitzenden Antheridien beginnen äussere Befruchtungsschläuche zu treiben. Die im Oogonium sichtbaren welligen Conturen gehören der inneren Membranschicht desselben an, welche die Copulationswarzen bildet. $\frac{360}{1}$.
-

Ausgegeben am 26. October.



1882.

XL.

SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

26. October. Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. DU BOIS-REYMOND.

1. Hr. WEBSKY las: Über eine Methode, den normalen **Bogen**, um welchen eine Krystallfläche von einer ihr sehr **nahe** liegenden Zone absteht, und ihre krystallographische **Lage** zu bestimmen.

2. Hr. WEIERSTRASS las: Bemerkungen zu der Abhandlung **des** Hrn. LINDEMANN: „Über die LUDOLPH'sche Zahl.“ (Sitzungsbericht vom 22. Juni, St. XXX., s. oben S. 679).

Die Mittheilungen 1 und 2 werden in einem der nächsten Berichte **erscheinen**.

3. Hr. W. PETERS machte eine Mittheilung: Über eine neue **Gattung** und Art der Vipernattern *Dinodipsas angulifera*, **aus** Südamerica. (Hierzu Taf. XV.)

4. Hr. DU BOIS-REYMOND legte Untersuchungen über Reflexe **von** Hrn. Dr. MORITZ MENDELSON aus St. Petersburg vor, welche **derselbe** im physiologischen Institut zu Erlangen angestellt hat.

Die Mittheilungen 3 und 4 folgen umstehend.

5. Von Hrn. E. GERLAND in Cassel ist ein Bericht über neuere **von** ihm über die LEIBNIZischen Manuscripte in der Bibliothek zu **Hannover** angestellte Ermittlungen, nebst einem Nachtrage zu **LEIBNIZENS** und HUYGENS' Briefwechsel mit PAPIN, eingegangen.

Die Mittheilung folgt in einem der nächsten Berichte.

892 Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe vom 26. October.

6. Hr. Dr. HUBERT LUDWIG, Prof. der Zoologie in Giessen, berichtet über seine mit Unterstützung der Akademie fortgesetzten Untersuchungen über Echinodermen, unter Hinweis auf seine aus der »Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie« (Bd. XXXVI. u. XXXVII.) besonders abgedruckte Abhandlung: »Morphologische Studien an Echinodermen« (Zweiter Band. 2. Heft).

Über eine neue Gattung und Art der Vipernattern, *Dinodipsas angulifera*, aus Südamerica.

Von W. PETERS

Hierzu Taf. XV.

Unter den Giftschlangen sind die Giftnattern, *Elapina*, deshalb besonders gefährlich, weil sie äusserlich keine Merkmale zeigen, wodurch man sie von den giftlosen Schlangen, denen sie täuschend ähnlich sind, mit Sicherheit sogleich unterscheiden kann. Die meisten derselben sind auch mit langen Oberkiefern, wie die giftlosen Schlangen, versehen und meistens finden sich im Oberkiefer ausser dem vordersten durchbohrten Giftzahn noch andere solide Zähne. Nur ein paar Gattungen kennt man bis jetzt, welche, wie die Vipern und Grubenottern (Vipern mit äusseren Oberkiefergruben), einen ganz kurzen Oberkiefer besitzen, der auch keinen Platz hat für andere Zähne, als den Giftzahn. Von diesen Gattungen, welche man bisher nur von dem africanischen Continent kannte, schliesst sich eine, *Atractaspis*, durch ihre ganze Form den unschädlichen Calamarien, eine andere, *Causus*, dagegen den Glattnattern (oder vielmehr den Trimerorhini) an. Wegen der Übereinstimmung dieser Schlangen in dem Kieferbau mit den Vipern, im Gegensatz zu allen anderen Giftnattern, habe ich sie in einer besonderen Gruppe vereinigt, welche ich die der Vipernattern (s. Reise nach Mossambique. 1882. Zoologie. III. S. 141) genannt habe. Giftschlangen, welche im Äussern den in allen Welttheilen, mit Ausnahme von Europa, verbreiteten *Dipsades* mit breitem Kopfe, schmalem Halse und zusammengedrücktem Körper gleichen, waren bis jetzt unbekannt, so dass man bei dem Fange derselben keine Vorsicht nöthig zu haben glaubte. Das Vorkommen von Giftschlangen, welche sich im Äussern, auch in der Pholidosis des Kopfes, den *Dipsades* und unter diesen den durch ihr schwaches Gebiss besonders ausgezeichneten *Leptognathus* am nächsten anschliessen, war nach so vielen herpetologischen Entdeckungen der letzten Decennien ganz unerwartet. Es dürfte daher die Kenntniss einer solchen

Art, welche ich jetzt vorzulegen mir erlaube, von ganz besonderer Wichtigkeit für Naturforscher und Reisende, welche die Faunen fernere Länder erforschen, sein. Sie stammt aus Südamerika, schliesst sich aber durch die ausserordentliche Kürze des Oberkiefers den afrikanischen Vipernattern an. Der Name *Dinodipsas*, den ich für die Schlange vorzuschlagen mir erlaube, soll an ihre Ähnlichkeit mit bösartig aussehenden, aber harmlosen *Dipsades* erinnern.

DINODIPSAS nov. gen.

Maxilla brevissima, telo laevi armata; os transversum tenue processu externo uncinato, dentes palatino-pterygoidei parvi numerosi. Caput latius distinctum, scutis supra 9. Nasalia utrinque bina, frenale, ante-, post-suborbitaliaque distincta, submentalia brevia. Pupilla rotunda. Corpus compressum, ventralia haud angulata, cauda brevis. Squamae anteriores laeves, posteriores carinatae. Scuta subcaudalia.

Von dem Habitus einer *Dipsas* mit breitem Kopfe, schmalem Halse, mässig zusammengedrücktem Körper, aber mit kurzem Schwanz.

Oberkiefer kurz, wie bei den Vipern, nur mit einem, oder, wenn der Ersatzzahn schon entwickelt ist, mit zwei durchbohrten, ungefüchten Giftzähnen versehen; Os transversum mittellang, dünn, mit einem äusseren hakenförmigen Fortsatze; Gaumen- und Flügelbeinzähne klein, zahlreich.

Oberkopfschilder in gewöhnlicher Zahl, 9; zwei Nasalia, Nasenöffnung weit, zum grössten Theil in dem hinteren Nasale liegend, ein Frenale; Auge gross mit runder Pupille, von Ante-, Post- und Suborbitalia umgeben. Die Submentalia sind kurz, hinten abgestutzt und hinter denselben folgen keine Schuppen, sondern gleich breite Schilder, wie bei *Dasypeltis*. Körperschuppen rhomboidal, am vorderen Körpertheile glatt, am hinteren Körpertheile mit einem höckerförmigen Längskiel, ohne Endgruben. Bauchschilder ohne Seitenkiele. Anal- und Subcaudalschilder einfach.

Dinodipsas angulifera nov. spec. (Taf. XV.)

D. supra olivaceobrunnea, angulis nigris albomarginatis, subtus sordida. Squamis 15-seriatis, abdominalibus 144, anali simplici, scutis 1 caudalibus 15.

Habitatio: America australis.

Kopf kaum halb so breit wie lang und etwas mehr als halb hoch wie breit. Rostrale breiter als hoch, nach oben stumpfwinklig vorspringend. Internasalia pentagonal, so lang wie breit, Prämentalia breiter, aber auffallend viel kürzer als jene. Frontale doppelt so lang wie breit, hexagonal, mit vorderem und hinterem stumpfen Winkel; Supraorbitale gross, ebenso lang, v

hinten abgerundeten Parietalia. Nasalia von gleicher Länge, das hintere durch die weite Mündung des Nasloches ausgezeichnet. Frenale klein, pentagonal, hinten an das untere und die Hälfte des oberen Anteorbitale stossend. Zwei schmale Postorbitalia, von denen das untere das längste ist; 6 Temporalia, von denen das vordere untere längste an das untere Postorbitale, das vordere obere ebenfalls verlängerte an das obere Postorbitale stösst. Es sind sechs Supralabialia vorhanden, von denen das zweite das kleinste und kürzeste ist, das dritte an das längste schmale vordere Suborbitale und an einen kleinen Theil des zweiten Suborbitale, das dritte oben an das zweite Suborbitale, das untere Postorbitale und das vorderste untere Temporale stösst. Das Mentale bildet hinten einen sehr stumpfen Winkel und ist durch das erste Paar der Infralabialia von den Submentalia getrennt. Es sind jederseits neun Infralabialia vorhanden, von denen die vier ersten an das erste Paar der Submentalia stossen. Diese sind unregelmässig hexagonal, hinten quer abgestumpft; diejenigen Submentalia des zweiten Paares sind sehr viel kleiner, kaum halb so lang und nur etwas mehr als halb so breit, wie jene.

Die sehr kurzen, nach oben keulenförmig verlängerten Oberkiefer haben nur Platz für die Insertion des Giftzahns, dessen Mündung länger ist, als die Brücke zwischen dieser und dem Anfange des Giftcanals, welche nicht gefurcht ist. Es sitzen zwei Giftzähne neben einander, von denen der äussere aber als Ersatzzahn zu erkennen ist, da er nur lose sitzt und seine Basis zur Befestigung an den Kieferknochen noch nicht entwickelt hat. Das Os transversum (Pterygoideum externum) ist fast halb so lang, wie das Gaumen- und Flügelbein zusammen, dünn, nach aussen bogenförmig gebogen und mit einem hakenförmigen Fortsatz versehen. Das (3^{mm} lange) Gaumenbein ist nur schwach gebogen, mit 8 kleinen Zähnen versehen, welche genau betrachtet von vorn nach hinten an Länge abnehmen. Das (11^{mm} lange) Flügelbein verbreitert sich nach hinten, ist inwendig convex, aussen concav und fast der ganzen Länge nach mit einer Reihe von 36 kleinen Zähnen versehen, welche, genau betrachtet, kürzer als die Gaumenzähne sind. Die Unterkiefer sind sehr schwach und zeigen eine Reihe sehr kleiner kurzer Zähne, mit Ausnahme der vordersten, welche länger sind.

Der Hals erscheint schmal hinter dem breiten Kopfe und der Körper, namentlich nach der Mitte hin, zusammengedrückt, ohne Seitenkiele oder Winkel an den Seiten der Bauchschilder. Die Schuppen sind rautenförmig, längs der Rückenfirste nicht verbreitert, in dem vorderen Körpertheile glatt, in dem hinteren mit einem höckerförmigen Kiel versehen, der nicht bis zum Ende der Schuppen geht, welches keine Grübchen

zeigt. Die Schuppen bilden funfzehn Längsreihen, und jederseits schiefe Querbinden. Es sind, die hinter den Submentalia liegende mitgerechnet, 144 Ventralschilder, ein einfaches Anale und an dem kurzen conischen Schwanz 15 Subcaudalschilder vorhanden.

Oben olivenbraun, an den Stellen, wo die Schuppen abgefallen sind, schiefergrau, mit schwarzen V-förmigen Zeichnungen, hinter oder denen einige Schuppen vorkommen, welche einen weissen Längsfleck oder innere weisse Seitenränder zeigen. Die erste dieser winkelförmigen Zeichnungen liegt am Nacken, mit der Winkelspitze nach vorn gerichtet und bis an die Parietalia reichend. Die anderen, 8 bis 9 deutliche und auf dem hinteren Körpertheil Spuren von 4 bis 5, sind mit dem Winkel nach hinten gerichtet. Die Unterseite ist in der Mitte schmutzig weiss, indem der hintere Rand der Bauchschilder heller grau ist, die Seitentheile derselben dunkler schiefergrau sind.

Der Magen war ganz zusammengezogen und leer, so dass sich nicht sagen lässt, aus welchen Thieren die Nahrung besteht.

Totallänge 42^{cm}; Kopflänge 2^{cm}; Kopfbreite 11^{mm}, Schwanz 25^{mm}.

Das einzige Exemplar (No. 10272 M. B.) ist, nach der Angabe des Hrn. Naturalienhändlers UMLAUFF, aus Laguna bei Puerto Cabello in Venezuela mit Färbeholz lebend nach Hamburg gekommen.

Erklärung der Abbildungen auf Tafel XV.

Fig. 1. *Dinodipsas angulifera* PETERS; 2. Kopf von der Seite; 3. derselbe von unten; 4. Analgegend und Schwanz von unten; 5. gekielte Körperschuppen.

6. Oberkiefergaumenapparat der linken Seite im Profil, m. Oberkiefer, tr. os transversum, p. palatinum, pt. pterygoideum; 7. dasselbe von unten; 8. Oberkiefer mit Giftzähnen von vorn.

Fig. 1 bis 4 in natürlicher Grösse; 5 bis 8 vergrössert.





Untersuchungen über Reflexe.

physiologischen Institut zu Erlangen angestellt

von Dr. MORITZ MENDELSON

aus St. Petersburg.

Paris, Ende September 1882.

1 Zeitmessungen über Reflexe hatte Hr. Prof. ROSENTHAL, dass die einzelnen Abschnitte des Rückenmarks nicht getrennt seien, die Uebertragung von Reflexen von den sensiblen motorischen Bahnen zu vermitteln, sondern dass die Reflexe hauptsächlich in der Medulla oblongata und dem Hintertheile des Rückenmarks (Halsmark) zu Stande kommen. Verschnittführungen durch einzelne Theile des Rückenmarks, die ROSENTHAL unternommen hatte, um die Leitungsbahnen zu bestimmen, auf denen die Reflexübertragung zu Stande kommt, haben eine Auffassung im Allgemeinen bestätigt. Bei dem Interesse, das diese Frage für die Physiologie und Pathologie hat, musste ein Aufsatz in der Zeitschrift erscheinen, den von Hrn. ROSENTHAL aufgetragen wurde, auch noch auf andere Weise zu prüfen. Ich unternehme auf Vorschlag des Hrn. ROSENTHAL im physiologischen Institut zu Erlangen eine Reihe von Versuchen, deren Ergebnisse ich mittheilen will.

1 Versuchen wurden ausschliesslich frischgefangene Frösche verwendet. Trotzdem war es in den Sommermonaten, in denen ich sehr schwer, gute Resultate zu erzielen, da bei höherer Temperatur die Frösche innerhalb kurzer Zeit unfähig werden, auf schwachen Reizungen mit Reflexen zu reagiren. Wir mussten daher einen Theil der Fragen, deren Beantwortung wir uns vornahmen, auf eine günstigere Jahreszeit verschieben.

1 Von uns angewandten Reize waren einzelne Öffnungsinductionen, welche auf passende Weise durch eine Pfote des Frosches (gewöhnlich die rechte) geleitet wurden. Es wurde die Stromstärke bestimmt, welche eben ausreichte, deutliche Beugungsreflexe in allen Gelenken hervorzurufen. Zur Vermeidung störender willkürlicher Bewegungen wurde vor Beginn der Versuche das Grosshirn

durch den GOLTZ'schen Schnitt ausgeschaltet. Ausserdem wurden die Frösche in der Mehrzahl der Versuche mit äusserst geringen Mengen von Strychnin (0.00005 — 0.0001^{gr} salzsaures Strychnin) vergiftet, nachdem wir uns überzeugt hatten, dass der Erfolg durch solche leichte Vergiftung nicht geändert, aber bedeutend sicherer gemacht wird.

Unser Plan war nun, durch methodische Schnittführungen an verschiedenen Stellen des Rückenmarks festzustellen, ob die Aufhebung der Continuität an einer Stelle einen Einfluss auf das Zustandekommen der Reflexe hat. Bei der hervorragenden Bedeutung, welche nach Hrn. ROSENTHAL'S Versuchen die oberen Theile des Rückenmarks haben sollen, begannen wir mit Schnitten in diesen Theilen. Aus denselben hat sich Folgendes ergeben:

1. Ein Querschnitt durch die Medulla oblongata oberhalb der Spitze des Calamus scriptorius hat keinen nachweisbaren Einfluss auf das Zustandekommen der Reflexe.

2. Wird der Querschnitt genau an der Spitze des Calamus scriptorius oder $\frac{1}{2}$ bis 1^{mm} unterhalb desselben geführt, so hat er keinen Einfluss auf den Reflex in der gereizten unteren Extremität, erschwert jedoch das Zustandekommen der Reflexe in der unteren Extremität der anderen Seite und in beiden oberen Extremitäten, so dass diese bei der ursprünglich ausreichenden Stromstärke ausbleiben und erst bei stärkeren Reizen zu Stande kommen. Dieser schwächende Einfluss des Querschnitts ist unmittelbar nach demselben am stärksten ausgeprägt und vermindert sich allmählich, ohne sich jedoch ganz zu verlieren.

3. Halbschnitte durch das Rückenmark an der angegebenen Stelle dicht unterhalb des Calamus scriptorius haben keinen merklichen Einfluss auf die Reflexe, wenn sie auf der Seite der Reizung angelegt werden. Wird der Schnitt etwas tiefer geführt ($\frac{1}{2}$ — 1^{mm} oberhalb der Wurzeln des Plexus brachialis), so bleiben die Reflexe der unteren Extremitäten unverändert, die der oberen werden etwas geschwächt.

4. Halbschnitte durch das Rückenmark auf der dem Reiz entgegengesetzten Seite in der oben angegebenen Höhe ($\frac{1}{2}$ — 1^{mm} unterhalb des Calamus scriptorius) haben keinen Einfluss auf die Reflexe der gereizten Seite, wirken aber auf die Reflexe der anderen Seite gerade so wie ganze Querschnitte, d. h. sie schwächen die Reflexe dieser dem Reiz entgegengesetzten Seite.

5. Längsschnitte durch die Medulla oblongata bis zur Spitze des Calamus scriptorius haben keinen merkbaren Einfluss auf die Reflexe.

6. Längsschnitte durch die oberen Theile des Rückenmarks von der Spitze des Calamus scriptorius bis oberhalb der Wurzeln des Plexus brachialis haben keinen Einfluss auf die Reflexe derselben

, schwächen aber die Reflexe der anderen Seite, so dass diese bei stärkeren Reizungen zu Stande kommen.

Aus diesen Ergebnissen der Versuche müssen wir in Übereinkunft mit Hrn. ROSENTHAL'S früherer Behauptung folgern, dass das Zustandekommen der Reflexe bei schwachen (d. h. eben auslösenden) Reizen der unversehrte Zusammenhang der sensiblen und motorischen Leitungsbahnen mit den oberen Theilen des Rückenmarks, d. h. dem Abschnitt an und dicht unterhalb der Spitze des Ausscriptorius, unbedingt nothwendig ist. In diesem Rückenmarkabschnitt kommen die Reflexe zu Stande, welche durch auslösende Reize ausgelöst werden. Kann der Reiz nicht mehr zur Stelle gelangen, so bleiben ausreichende Reize unwirksam. Größere (übermaximale) Reize vermögen aber dann noch zu wirken; Reflexapparate in den tieferen Theilen des Rückenmarks sind also leichter erregbar, als die in den oberen. Die Übertragung des Reizes von der gereizten Seite auf die entgegengesetzte erfolgt zwar in den unteren Theilen jener wirksamsten Stelle im Halstheil des Rückenmarks. Auch die Reflexübertragung für die oberen und unteren Extremitäten erfolgt, wie es scheint, nicht genau in derselben Höhe.

Die Medulla oblongata selbst scheint nach diesen Versuchen keinen ausgesprochenen Antheil an dem Zustandekommen der Reflexe in den Extremitäten zu haben. Ob durch feinere Hilfsmittel ein solcher Antheil doch noch würde nachgewiesen werden, müssen wir dahingestellt sein lassen.

Wir konnten auch die Reihenfolge feststellen, in welcher bei starker Steigerung der sensiblen Reizung die Ausbreitung der Reize auf die vier Extremitäten erfolgt. Wird nämlich der Reiz am rechten Fuss angebracht, so treten die Reflexe auf:

am leichtesten (d. h. bei der schwächsten Reizung) an der rechten unteren Extremität,
dann an der rechten oberen Extremität,
dann an der linken oberen „
zuletzt an der linken unteren „

Sobald aber durch einen der oben besprochenen Eingriffe die auslösenden Reize unwirksam geworden sind, und man zu stärkeren (maximalen) Reizen übergehen muss, ändert sich die Reihenfolge:

1. Es erfolgen dann die Reflexe in der Regel so:

am leichtesten in der rechten unteren Extremität,
dann „ „ linken unteren „
„ „ „ rechten oberen „
zuletzt „ „ linken oberen „

900 Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe vom 26. October.

Dieses leichtere Ansprechen der linken unteren Extremität bei übermaximalen Reizen kann der Anschauung zur Stütze dienen, dass bei diesen stärkeren Reizen die unteren Theile des Rückenmarks mehr in Anspruch genommen werden, als bei den ausreichenden Reizen.

Ich gedenke demnächst nach Erlangen zurückzukehren und die Untersuchung fortzuführen, namentlich auch durch Schnitte in den unteren Abschnitten des Rückenmarkes die Richtigkeit der gezogenen Schlussfolgerungen weiter zu prüfen.

Ausgegeben am 2. November.

1882.

XLI.

SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

26. October. Sitzung der philosophisch-historischen Classe.


Vorsitzender Secretar: Hr. MOMMSEN.

Hr. A. KIRCHHOFF las den zweiten Abschnitt seiner Abhandlung:
Über die von Thukydides benutzten Urkunden.
Die Mittheilung wird in den nächsten Sitzungsberichten erscheinen.

Ausgegeben am 2. November.

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei.

1992



1882.
XLII.

SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

2. November. Gesamtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. MOMMSEN.

1. Hr. SCHWENDENER las: Über die Schutzscheiden und ihre Verstärkungen.

Die Mittheilung erscheint in den Abhandlungen.

2. Hr. HELMHOLTZ überreichte eine Notiz von Hrn. Prof. HERMANN W. VOGEL: Über LOCKYER's Dissociationstheorie.

Die Mittheilung folgt umstehend.

3. Hr. AUWERS ist, nach gefälliger Mittheilung der Reichscommission für die Beobachtung des Venusdurchgangs, am 17. October an seinem Bestimmungsorte Punta-Arenas an der Magelhaenstrasse eingetroffen. Desgleichen ist die zweite der südlichen astronomischen Expeditionen an ihrem Bestimmungsorte Bahia Blanca in Argentina und die erste der nördlichen in New-York eingetroffen.



Über LOCKYER'S Dissociationstheorie.

Von HERMANN W. VOGEL.

Im Februar 1880 nahm ich Gelegenheit, auf Grund meiner Beobachtungen des Spectrums von chemisch reinem Wasserstoff die Anschauung LOCKYER'S zu bemängeln, dass das Calcium in sehr hoher Temperatur dissociirt werde.¹ LOCKYER ging u. A. davon aus, dass in den von HUGGINS photographirten Spectren der sogenannten weissen Sterne von den beiden Calciumlinien H' und H'' nur die erste vorhanden ist und stellte demnach die Theorie auf, dass Calcium in hoher Temperatur in zwei Körper zerfalle, X und Y, von denen der erste die Linie H', der andere die Linie H'' gebe und dass in gedachten Sternen sich nur der erste finde. Ich führte dagegen aus, dass der Wasserstoff ausser den vier bekannten leicht sichtbaren Linien noch eine ausgezeichnete, photographisch höchst intensiv wirkende Linie besitzt, die fast mit H' FRAUNHOFER zusammenfällt, und dass man die von HUGGINS beobachtete angebliche Calciumlinie um so mehr für die fünfte Wasserstofflinie zu halten berechtigt sei, als die bekannten Wasserstofflinien in den Spectren jener Sterne in ausgezeichneter Weise entwickelt sind und auch die von HUGGINS beobachteten ultravioletten Sternlinien mit den von mir photographisch fixirten ultravioletten Wasserstofflinien übereinstimmen.²

LOCKYER hat indessen seine Anschauung von der Dissociation nicht aufgegeben, sondern nach neuen Beweisen für dieselbe auf spectroscopischem Wege gesucht.

Er macht darauf aufmerksam, dass u. A. im Spectrum der Sonnenfleck gewisse Eisenlinien verbreitert erscheinen, andere nicht, dass ferner manche derselben, wie $\lambda 4918$ und $\lambda 4919.7$ im Spectrum der Protuberanzen, welche anderweitige Eisenlinien zeigen, nicht vorkommen, wohl aber im Spectrum der Flecke, dass dagegen in diesen wieder unter Umständen Eisenlinien fehlen, die jene enthalten, und er sagt darauf hin: »Somit giebt es kein Eisen in der Sonne, sondern nur seine Bestandtheile.«³

¹ Proc. Royal Soc. XXVIII 157.

² S. Monatsberichte der Berliner Akademie der Wissenschaften. 1880 S. 192.

³ Comptes rendus etc. T. XCII 904.

Gegen diese Argumentation sind bereits LIVEING und DEWAR ¹ getreten¹, indem sie nachwiesen, dass gewisse Spectrallinien ein Stoffes z. B. λ 5210 Magnesium und verschiedene Calciumlinien sichtbar werden, wenn gewisse fremde Stoffe, im vorliegenden Fall Wasserstoff einerseits, Eisen andererseits gegenwärtig sind, dass somit das Fehlen gewisser Eisenlinien in den Spectren der Flecke oder Proberanzen nicht auf eine Dissociation, sondern auf die Abwesenheit fremder Stoffe zurückzuführen sein dürfte, die eben das kräftige Auftreten jener Linien bedingen.

Nun fusst aber LOCKYER noch auf eine andere Thatsache, durch LIVEING und DEWAR's Versuche nicht erklärt wird und allerdings seiner Dissociationstheorie eine festere Stütze zu geben scheint, als die oben angeführten Facta. Er sagt:²

»Die letzte Reihe von Beobachtungen betrifft den Grad der Bewegung der Dämpfe in den Sonnenflecken, welche bekanntlich angezeigt wird durch Änderungen in der Brechbarkeit der Linien. Wenn also Linien des Eisens in einem Fleck durch Eisendampf hervorgebracht wären, der sich mit einer Geschwindigkeit von 40^{km} in der Secunde bewegt, so wäre diese Geschwindigkeit angezeigt durch eine Änderung der Brechbarkeit aller Linien. Wir finden aber, dass das nicht der Fall ist. Wir constatiren nicht bloss verschiedene Bewegungen, von verschiedenen Linien angezeigt sind, sondern beobachteten in dem Grade der Bewegung dieselben Umkehrungen, wie in der Breite der Linien. Diese Thatsache erklärt sich leicht, wenn wir Dissociation annehmen und ich kenne keine einfachere Art, sie zu deuten.

Als Beispiel führt LOCKYER an, dass in den Flecken am 24. December 1880, 1. und 6. Januar 1881 eine bestimmte Anzahl Eisenlinien gewunden erschien, während andere gerade blieben.

Ich glaube nun diese Facta auf Grund zahlreicher Beobachtungen in der Absorptions-Spectralanalyse deuten zu können, ohne zu Hypothese der Dissociation meine Zuflucht nehmen zu müssen.

Es ist bekannt, dass die Lage der Absorptionsstreifen eines Körpers sehr wesentlich von der Dispersion des Mediums abhängt, in dem er gelöst oder incorporirt ist. Oft bemerkt man, dass in stärker dispergirenden Medien die Absorptionsstreifen eines Körpers mehr nach Roth hin rücken.³ Hierbei tritt nun nicht selten der merkwürdige Fall ein, dass gewisse Absorptionsstreifen mit der Zunahme

¹ Proc. Royal Soc. 30. 93. WIEDEMANN, Beiblätter IV 366.

² Ich folge hier der Wiedergabe des LOCKYER'schen Aufsatzes im »Naturforscher« vom 4. Juni 1881, um jeden Schein einer individuellen Färbung der Übersetzung auszuschliessen.

³ KUNDT, Jubelband POGGEND. Ann. S. 620.

Dispersion des Lösungsmittels verschoben werden, andere wieder nicht. Schon HAGENBACH beobachtete, dass z. B. die Chlorophyllstreifen I, II und IV in alkoholischer Lösung mehr nach Roth hin liegen, als in aetherischer, während der Streif II in beiden Lösungen genau die gleiche Lage zeigt (a. a. O.). Ähnliche Fälle beobachtete ich bei Uranoxydsalzen¹ und bei Cobaltverbindungen.²

Nun hat KUNDT bereits darauf aufmerksam gemacht, dass für Absorptionsspectren von Gasen dieselben Regeln gelten, wie für die Absorptionsspectren flüssiger Körper (a. a. O.). Er fügt zwar hinzu: „Es bleibt nur fraglich, ob, wenn man z. B. untersalpetersaures Gas mit verschiedenen anderen durchsichtigen Gasen mischt, die Verschiebungen der Absorptionsstreifen so beträchtlich sind, dass sie bemerkt werden können.“ Dieser Zweifel betrifft aber nicht gedachte Regel, sondern nur die Möglichkeit ihrer experimentellen Prüfung.³ Es ist daher die Annahme zulässig, dass, in gleicher Weise wie bei Flüssigkeiten, beigemengte Medien auf die Stellung der Absorptionsstreifen auch bei Gasen wirken, und dass hier wie dort Verschiebungen einzelner Streifen eintreten können, während die Lage anderer ungeändert bleibt.

Wenn demnach in Sonnenflecken einzelne Eisenlinien eine Verschiebung erleiden, andere an derselben Stelle nicht, so ist nicht Bewegung der Grund, sondern die Beimischung eines fremden stark dispergirenden Gases, welches auf die verschobenen Linien wirkt, auf der anderen nicht. Es folgt daraus ferner, dass Krümmung von Absorptionslinien der Sonnenflecke keineswegs immer als Bewegung der absorbirenden Gase in der Richtung der Beobachtungslinie gedeutet werden dürfen, sondern nur dann, wenn alle Linien eines Stoffes an der Krümmung theilnehmen.

Dass auch helle Linien leuchtender Gase unter ähnlichen Umständen durch Beimischung eines anderen nicht leuchtenden, oder ein continuirliches Spectrum gebenden Dampfes eine Verrückung erleiden können, hat KUNDT bereits angedeutet (a. a. O. S. 620).

Berlin, im October 1882.

¹ VOGEL, pract. Spectralanalyse. Nördlingen bei Beck, S. 248.

² Monatsberichte der Akademie der Wissenschaften vom 20. Mai 1878.

³ KUNDT bezweifelte früher auch die Möglichkeit des Nachweises einer anomalen Dispersion bei Gasen und glühenden Dämpfen. Neuerdings ist ihm dieser Nachweis bei Natriumdämpfen geglückt. WIEDEMANN'S Ann. 10. S. 321.

Über die von Thukydides benutzten Urkunden.

Von A. KIRCHHOFF.

(Vorgetragen am 26. October [s. oben S. 901].)

II.

(Vergl. Monatsberichte 1880 S. 834 ff.)

Im weiteren Fortgange der begonnenen Untersuchung gelangen wir zunächst zur Urkunde des sogenannten Nikiasfriedens, welche wir 5, 18. 19 lesen. Analyse und Erklärung dieser Urkunde im Einzelnen sind leider weder durch die Bemühungen der Herausgeber und Erklärer des Thukydides noch selbständige auf den Gegenstand gerichtete Specialuntersuchungen schon soweit gefördert worden, dass ich die Aufgabe als in befriedigender Weise erledigt und mich der Nothwendigkeit überhoben erachten könnte, auf diese Dinge noch einmal im Zusammenhange einzugehen. Um indessen unnütze Weitschweifigkeit zu vermeiden, werde ich mich in der nachfolgenden Auseinandersetzung auf eine positive Darlegung meiner Auffassung beschränken und auf eine Kritik abweichender Ansichten meiner Vorgänger mich überhaupt nicht oder nur dann einlassen, wenn ich nicht hoffen kann, sie durch einfachen Hinweis auf das Richtige in einer für Unbefangene überzeugenden Weise abzuthun und zu erledigen.

Unsere Urkunde zerfällt in zwei sich deutlich von einander absondernde Theile, den Text des Friedensvertrages selbst (18) und ein Zusatzprotokoll (19), durch welches einerseits das Datum des Tages, mit welchem nach gegenwärtigem Übereinkommen der Vertrag in Kraft zu treten hat, fixirt, andererseits die Vollziehung der im Vertrage selbst stipulirten Beschwörung desselben durch die Vertreter der contrahirenden Parteien beurkundet wird. Denn dass der Inhalt des 19. Kapitels in der That einen integrirenden Bestandtheil der eingelegten Urkunde bildet und nicht, wie allerdings von den Herausgebern bisher in höchst auffälliger Übereinstimmung, aber darum nicht minder irrig, geschehen, in die Darstellung des Geschichtsschreibers selbst einzubeziehen ist, wird Niemandem zweifelhaft erscheinen, der für zutreffend anerkennt, was von mir oben über die Bedeutung des dem unsrigen ganz ähnlichen und ebenso wie dieses bis-

hier verkannten Anhangsprotokolles der zuerst besprochenen Urkunde bemerkt worden ist. Ich erinnere daher nur noch daran, was für den Kundigen freilich einer besonderen Hervorhebung kaum noch bedürfen wird, dass die inschriftlich erhaltenen Vertragsurkunden des 5. und 4. Jahrhunderts mehrfach dergleichen Anhangsprotokolle enthalten und somit den überzeugenden Beweis liefern, nicht nur dafür, dass die Bedeutung des fraglichen Abschnittes im Obigen richtig bestimmt worden ist, sondern auch, dass bei Gelegenheit von Publicationen solcher Vertragsurkunden auf Stein wenn nicht regelmässig, doch sehr häufig auch diese protokollarischen Vermerke zur Veröffentlichung gelangt sind, dass also eine Abschrift, wie die hier bei Thukydides vorliegende, ebensowohl auf das im Archiv deponirte Original, wie auf eine der üblichen Ausfertigungen auf Stein zurückgeführt werden kann, sobald sich nachweisen lässt, dass eine solche wirklich Statt gefunden hat.

Um sodann zur Analyse zunächst des Haupttheiles der Urkunde des Textes des Friedensvertrages, im Einzelnen überzugehen, so ist ihm wie allen uns bekannten Vertragsurkunden ähnlicher Art eine einleitende Formel vorangestellt:

Σπονδὰς ἐποίησαντο Ἀθηναῖοι καὶ Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι καὶ τὰδε, καὶ ὥμοσαν κατὰ πόλεις.

Dieselbe unterscheidet sich von allen ähnlichen in sehr auffälliger Weise durch den auf die Beschwörung des Vertrages und deren Modalität bezüglichen Zusatz, welcher sonst nirgends begegnet und auch abgesehen davon hier gar nicht an seinem Platze zu sein scheint. Denn er kann weder als Beurkundung der vollzogenen Beschwörung des Vertrages durch die Contrahenten, noch als vertragsmässige Stipulirung dieser Beschwörung und ihrer Modalitäten aufgefasst werden: jene ist vielmehr durch das Anhangsprotokoll, diese durch einen weiter unten folgenden besonderen Abschnitt der Vertragsurkunde selbst in einer dem sonstigen Herkommen völlig entsprechenden Weise vertreten. Im Grunde genommen ist der Zusatz als überflüssig und dieser Umstand könnte die Vermuthung gerechtfertigt erscheinen lassen, dass die beregten Worte nichts weiter als eine Interpolation seien, deren Urheber sich dabei an die weiter unten begegnende Formel ὅρκους δὲ ποιήσασθαι Ἀθηναίους πρὸς Λακεδαιμονίους καὶ τοὺς ξύμμάχους κατὰ πόλεις angelehnt hätte. Indessen, wenn der Zusatz auch entbehrlich ist, kann er doch immerhin echt sein, nur wenn wer ihn für ursprünglich hält, dann auch zugeben, dass, weil er alsdann als gleich bei der Paraphirung des Vertrages in die Überschrift aufgenommen zu betrachten ist, er nicht eine wirklich vollzogene Thatsache, sondern lediglich die Absicht und die Meinung

der Contrahenten von dem bezeugt, was zu geschehen hatte und, weil man keinen Zweifel an dem zukünftigen Geschehen hegte oder legen sich den Anschein gab, darum im Voraus als wirklich geschehen bezeichnet wurde. Die Thatsache der vollzogenen Beschwörung des Vertrages durch einige oder gar alle dabei Betheiligten darf unter keinen Umständen aus dem Passus gefolgert werden, um so weniger, da wir wissen, dass Elis, Korinth, Megara und der attische Bund dem Frieden überhaupt nicht beigetreten sind und das Anhangsprotokoll nur die Beschwörung des Vertrages durch Sparta und Athen bezeugt.

An die Spitze der Bestimmungen des Vertrages sind diejenigen gestellt, welche die Regelung der durch den Krieg unterbrochenen politischen Beziehungen der Contrahenten zum Gegenstande haben:

περὶ μὲν τῶν ἱερῶν τῶν κοινῶν, θύειν ἐξεῖναι¹ καὶ μαντεύεσθαι καὶ θεωρεῖν κατὰ τὰ πατρία τὸν βουλούμενον καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλασσαν (l. θάλατταν) ἀδεῶς.

Dass unter den gemeinschaftlichen Heiligthümern, von denen die Rede ist, diejenigen von Olympia, Delphi und dem Isthmus verstanden sind, ergibt sich, abgesehen von sonstigen Erwägungen, welche zu demselben Resultate führen, unmittelbar aus dem Umstande, dass in den die Publication des Vertrages betreffenden Schlussbestimmungen der Urkunde die Aufstellung von Exemplaren auf Stein zu Athen und Sparta ausdrücklich auch zu Olympia, Pythion und auf dem Isthmos angeordnet wird, eine Anordnung, welche nur dann ihre ausreichende Erklärung und Begründung findet, dass in dem Vertrage auf das Recht der betreffenden Heiligthümer bezügliche Bestimmungen enthalten waren. Was diese Bestimmungen selbst betrifft, so sind sie zwar absichtlich ganz allgemein gehalten, doch ist trotzdem klar, dass durch ihre Aufnahme lediglich einem attischen Interesse und einem darauf gegründeten Ansprüche Genüge geschah. Denn da diese Heiligthümer sämmtlich auf feindlichem Gebiete lagen, so war die Verbindung mit denselben während des Krieges für Athen unterbrochen gewesen und schien einer formellen Rehabilitirung bedürftig, während für die Spartaner und ihre Bundesgenossen eine factische Störung des Rechtszustandes in dieser Beziehung keiner Zeit eingetreten war und es daher einer vertragsmässigen Regelung dieser Verhältnisse für sie eigentlich gar nicht bedurfte.

Ist in dieser Bestimmung also eine wenn auch rein formale und natürlich selbstverständliche Concession zu erkennen, welche Athen

¹ So ist meines Erachtens für das, wie allgemein anerkannt, verdorbene καὶ ἄλλοι Handschriften zu schreiben.

gemacht wurde, so ist die folgende, allein auf das Delphische Heiligtum und die Stadtgemeinde von Delphi sich beziehende, eben so gewiss ein gleichartiges und in gleicher Weise begründetes Zugeständniss, zu welchem Athen sich auf Verlangen der Spartaner verstanden hatte:

τὸ δ' ἱερόν καὶ τὸν νεῶν τὸν ἐν Δελφοῖς τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ Δελφῶν αὐτονομίους εἶναι καὶ αὐτοτελεῖς καὶ αὐτοδίκους καὶ αὐτῶν καὶ γῆς τῆς ἐαυτῶν κατὰ τὰ πάτρια.

Der Unterschied ist nun der, dass, während die erste Bestimmung lediglich einen Zustand wiederherstellt, wie er rechtlich und factisch bis zum Ausbruche des Krieges bestanden hatte, die zweite die Anerkennung eines Zustandes ausspricht, der nur einige Zeit vor und während des Krieges factische Geltung gehabt hatte, dessen rechtliche Gültigkeit aber von Athen vor dem Kriege nicht zu allen Zeiten und vielleicht überhaupt nie ausdrücklich anerkannt worden war. Im heiligen Kriege von 448 waren die Spartaner für die Ansprüche der Stadt Delphi auf die Prostatie des Heiligtumes eingetreten, während die Athener mit Nachdruck und schliesslichem Erfolge sich der entgegenstehenden Ansprüche der mit ihnen verbündeten Landschaft von Phokis angenommen hatten. Nach der Katastrophe von Koronea und den Ereignissen, welche zum Abschluss des dreissigjährigen Friedens von 446/45 führten, war naturgemäss ein Umschlag im Sinne der Spartanischen Auffassung eingetreten, dessen Ergebniss sich die Athener wohl oder übel gefallen lassen mussten. Den dadurch geschaffenen Rechtszustand nunmehr ausdrücklich und in bindender Form anzuerkennen, war eine Forderung, deren Erfüllung, obwohl sie für die Athener das Zurückweichen aus einer bisher behaupteten Stellung bedingte, ihrem Selbstgeföhle darum weniger schwer fallen mochte, weil die früheren Verbündeten, die phokische Landschaft, welche die Sache ja zunächst angien, unter dem Drucke der Verhältnisse ihre Ansprüche aufgegeben hatten, in ein Bündniss mit den Spartanern getreten waren und diesen im Kriege mit Athen Heeresfolge geleistet hatten (Thukydides 2, 9. 4, 118; vergl. auch 5, 64. 8, 1). Dass es trotzdem noch immer eine starke athenerfreundliche Partei in Phokis gab (Thukydides 3, 95. 4, 76), deren Sympathien dadurch verscherzt werden konnten, kam gegenüber der gesammten Sachlage wie sie sich nun einmal gestaltet hatte, nicht in Betracht oder nicht zur Geltung.

Es folgen nunmehr die Bestimmungen des eigentlichen Friedensvertrages, welche in einen allgemeinen und in einen speciellen Theil zerfallen. Der erstere enthält ausser der Bestimmung über die Dauer des Friedens nur Setzungen ganz allgemeiner Natur, wie sie allen

lensverträgen zu eignen pflegen, in der herkömmlichen, auch : begnenden Formulirung, und bietet dem Verständnisse weiter : Schwierigkeiten:

ἔτη δὲ εἶναι τὰς σπονδὰς πεντήκοντα Ἀθηναίοις καὶ τοῖς ξυμμάχοις τοῖς Ἀθηναίων καὶ Λακεδαιμονίοις καὶ τοῖς ξυμμάχοις τοῖς Λακεδαιμονίων ἀδόλους καὶ ἀβλαβεῖς καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλασσαν (l. θάλατταν). ὅπλα δὲ μὴ ἐξέστω ἐπιφέρειν ἐπὶ πημονῇ μήτε Λακεδαιμονίους καὶ τοὺς ξυμμάχους ἐπὶ Ἀθηναίους καὶ τοὺς ξυμμάχους μήτε Ἀθηναίους καὶ τοὺς ξυμμάχους ἐπὶ Λακεδαιμονίους καὶ τοὺς ξυμμάχους, μήτε τέχνη μήτε μηχανῇ μηδεμιᾷ. ἦν (l. εἰάν) δέ τι διάφορον ἢ πρὸς ἀλλήλους, δικαίῳ χρήσων καὶ ὅροις, καθ' ὃ τι ἂν ξυνθῶνται.

Schwieriger ist dagegen das Verständniss der Specialbestimmungen, die sich unmittelbar daran anschliessen, sowohl was manche Theile, als was ihre Anordnung und Abfolge betrifft. Man wird die Anordnung nur verstehen können, wenn man daran festhält, dass sie ausschliesslich durch den Gang bedingt worden ist, welchen die Paraphirung der Vertragsurkunde vorausgegangenen schwierigen intricaten Verhandlungen genommen hatten.

Auf Grund anderweiter, unabhängig von dem Inhalt der vorliegenden Urkunde ihm gewordener Informationen berichtet Thukydides 7, dass bei diesen Verhandlungen von dem allseitig acceptirten Principe ausgegangen worden sei, dass alle während des Krieges von kriegführenden Parteien gemachten Eroberungen an ihre ursprünglichen Besitzer zurückzugeben seien: ἐκ τῶν συνόδων ἅμα πολλὰς δικαιοπραγεύκοντων ἀλλήλοις ξυνεχωρεῖτο ὥστε ἅ ἐκάτεροι πολέμῳ ἔσχον ὅντας τὴν εἰρήνην ποιεῖσθαι. Es kam nun darauf an, im Einzelnen festzustellen, was hiernach von den Contrahenten zu beanspruchen und dagegen zu leisten sei. Die Ansprüche der Athener gelangten zur Verhandlung und das Ergebniss der letzteren findet sich auch in der Vertragsurkunde den übrigen vorangestellt.

Athen hatte in seiner Thrakischen Provinz während der letzten Jahre des Krieges seine Colonie Amphipolis an die Spartaner verloren und einen Theil seines dortigen Bundesgebietes in Folge des Verlustes und Übertrittes einer Anzahl von Bundesstädten eingebüsst. Die seiner eigenen Landesgrenze war ferner schon im Beginn des Krieges sein starkes Vorwerk gegen Böotien, das verbündete Plataea, durch die Kriegsmacht der Peloponnesier überwältigt worden und in die Händen der Thebaner geblieben, nicht lange vor dem Beginne der Friedensverhandlungen endlich das Grenzfort Panakton von den Spartanern durch Verrath genommen und behauptet worden. Auf Grund dieser umgenommenen Principes beanspruchte Athen die Restituirung aller vermissten Objecte.

Am wenigsten Schwierigkeit machte der Fall von Amphipolis, da das Besitzrecht Athens in der Zeit vor dem Verluste der Stadt einem Zweifel nicht unterlag und andererseits die Spartaner durchaus in der Lage waren, die Restitution zu bewirken, wenn sie sich dazu verstehen mochten, die seinerzeit von Brasidas gegebenen Versprechungen zu desavouiren; denn Amphipolis wurde von ihnen militärisch besetzt gehalten und war dem Regimente eines von Brasidas eingesetzten Harmosten unterstellt (4, 132). Da also Athen auf seiner rechtlich unanfechtbaren Forderung bestand, so fügten sich die Spartaner, und in den Vertrag wurde an erster Stelle die Bestimmung aufgenommen, auf welche Athen aus bekannten Gründen einen ganz besonderen Werth legte:

ἀποδόντων δὲ Ἀθηναίοις Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι Ἀμφίπολιν.

Welche Verpflichtung die Spartaner damit übernahmen, ist an sich klar und wird zum Überflusse ausser Zweifel gestellt durch den Inhalt der Verhandlungen, welche nach Abschluss des Vertrages zwischen Athen und Sparta über die Ausführung dieser Bestimmung geführt worden sind, welcher bekanntlich von den Verpflichteten nicht entsprochen worden ist. Zwar wurde der Harmost Klearidas sofort angewiesen (5, 21) *τὴν Ἀμφίπολιν παραδιδόναι τοῖς Ἀθηναίοις*, entsprach aber diesem Befehle nicht (ebenda *οὐδὲ ὁ Κλεαρίδας παρέδωκε τὴν πόλιν, χαρίζομενος τοῖς Χαλκιδεῦσιν, λέγων ὡς οὐ δυνατόν εἴη ἑκείνων παραδιδόναι*), sondern begab sich nach Sparta, um dort persönlich zu remonstriren, und zwar nicht ohne Erfolg, denn er wurde zwar angewiesen, auf seinen Posten zurückzukehren, erhielt aber eine Instruction, welche ihm in erwünschter Weise freie Hand liess, nämlich (ebenda) *μάλιστα μὲν καὶ τὸ χωρίον παραδοῦναι, εἰ δὲ μή, ἐπισοι Πελοποννησίων ἐνεῖσιν ἐξαγαγεῖν*. Auf Grund dieser Vollmacht beschränkte er sich darauf, die unter seinem Befehle stehende Besatzung von Amphipolis aus der Stadt zu ziehen und mit ihr den Rückmarsch nach der Peloponnes anzutreten (5, 34). Darauf erhoben die Athener Beschwerde (5, 35): *τὴν γὰρ Ἀμφίπολιν πρότεροι λαχόντες οἱ Λακεδαιμόνιοι ἀποδιδόναι καὶ τᾶλλα (d. h. Panakton) οὐκ ἀπεδεδώκεσαν*, die Spartaner aber erklärten (ebenda) *τὰ μὲν δυνατὰ — πεποιηκέναι τοὺς γὰρ — ἐπὶ Θρέκης στρατιώτας ἀπαγαγεῖν — Ἀμφιπόλεως δὲ οὐκ ἔφασαν παραδοῦναι*. Man sieht, auch nach dem Zugeständnisse der Spartaner wurde die stipulirte Restitution, *ἀπόδοσις*, erst eigentlich perfect durch eine *παράδοσις*, d. h. eine Übergabe der Stadt durch die abziehende Peloponnesische Garnison an eine einrückende Attische Besatzung, keineswegs durch eine blosse Räumung von Seiten der ersten.

Ganz anders lagen die Verhältnisse in Bezug auf den zweiten Punkt, den von den Athenern im Laufe des Krieges verlorenen Theil

ihres Bundesgebietes in Thrakien. Zwar beanspruchten sie auch hier **Wiederherstellung** des Status quo vor dem Kriege, allein die **Spartaner** befanden sich weder rechtlich noch factisch in der Lage, dieser **Anforderung** ihrem ganzen Umfange nach zu entsprechen; es war für sie nicht möglich, die abgefallenen Bundesstädte ihrem Schicksal zu überlassen, selbst wenn Athen sich damit hätte begnügen wollen, oder gar in irgend einer Weise dazu behülflich zu sein, sie mit Gewalt unter die Athenische Herrschaft zurückzuzwingen. Einmal waren die meisten dieser Bundesstädte, nämlich die der Landschaften Bottiaea und Chalkidike, schon vor dem Ausbruche des Krieges zwischen Athen und dem Peloponnesischen Bunde, nicht erst im Laufe desselben, abgefallen, und die principielle Bestimmung, um deren Ausführung es sich handelte, fand daher auf sie streng genommen keine Anwendung. Allein schon aus diesem Grunde mussten die Spartaner sich den Athenischen Ansprüchen gegenüber ablehnend verhalten. Es kam hinzu, dass diese Städte, nachdem sie sich, vorübergehend im Bunde mit Perdikkas von Makedonien, gegen die Angriffe von Athenischer Seite bis zum Auftreten des Brasidas in diesen Gegenden mit Erfolg behauptet hatten, dann in das Verhältniss einer Symmachie zu Sparta getreten waren; letzteres hatte dadurch vertragsmässig die Unabhängigkeit dieser Städte anerkannt und sich ohne Zweifel in irgend einer nicht näher bekannten Weise zur Vertheidigung derselben verpflichtet. Sodann waren zwar die übrigen Städte erst in Folge des Zuges des Brasidas nach Thrakien, also während des Krieges, von Athen abgefallen, aber auch sie waren von den Spartanern in die Symmachie aufgenommen und ihnen gegenüber ähnliche Verpflichtungen eingegangen worden, wie im Falle der anderen. Ohne bundbrüchig zu werden, konnte also Sparta weder die einen noch die anderen einfach preisgeben, und selbst wenn es sich dazu unter dem Drucke der Verhältnisse hätte verstehen wollen, ja wenn es die Anwendung von Gewalt nicht hätte scheuen wollen, um diese Städte geknebelt den Athenern zu überantworten, so würde es dazu nicht im Stande gewesen sein, denn die Streitmacht, über welche es in Thrakien verfügte, war an sich nicht bedeutend; sie stand überdem in Amphipolis concentrirt und keine einzige der Städte, um die es sich handelte, befand sich, so viel wir wissen, ausserdem in ihrem militärischen Besitze, aus dem sie ohne Weiteres in den der Athener hätte übergehen können. Den zu gewärtigenden allgemeinen Widerstand aber durch Gewalt von aussen, also durch eine Reihe von Belagerungen zu brechen, konnte Sparta nicht wohl zugemuthet werden und reichten auch die zur Stelle befindlichen Kräfte in keiner Weise aus.

Indem nun dieser rechtlichen und factischen Sachlage von beiden in Rechnung getragen wurde, gelangten die Verhandelnden zu

einem Compromisse, für dessen Annahme auch durch die übrigen dabei Betheiligten die Spartaner, vielleicht zunächst bona fide, Bürgschaft übernahmen, und durch welches einerseits den abgefallenen Bundesgenossen der Athener eine autonome Stellung ausserhalb Bundes zugestanden, andererseits den finanziellen Interessen Athens durch Concessionen von jener Seite wenigstens theilweise Befriedigung verschafft wurde. Das Ergebniss dieses Compromisses fand, wie wir zunächst unseren Handschriften folgen, in folgender Fassung Aufnahme in die Vertragsurkunde:

1. ὅσας δὲ πόλεις παρέδωσαν Λακεδαιμόνιοι Ἀθηναίοις, ἐξέστω ἀπὸ οἳ ἂν βούλωνται αὐτοὺς καὶ τὰ ἑαυτῶν ἔχοντας. 2. τὰς δὲ πφερούσας τὸν φόρον τὸν ἐπ' Ἀριστείδου αὐτονόμους εἶναι. 3. ὅπλμὴ ἐξέστω ἐπιφέρειν Ἀθηναίους μηδὲ τοὺς συμμάχους ἐπὶ κακῶ, ἀπὸ δόντων τὸν φόρον, ἐπειδὴ αἱ σπονδαὶ ἐγένοντο. 4. εἰσὶ δὲ Ἀργεὶ Στάγειρος (l. Στάγιρος), Ἀκανθοί, Σκυῶλος (l. Σκῶλος), Ὀλυνθοί, Στυλίοι. 5. συμμάχους δ' εἶναι μηδετέρων, μήτε Λακεδαιμονίων, Ἀθηναίων ἢν (l. ἐάν) δὲ Ἀθηναῖοι πείθωσι τὰς πόλεις βούλους ταύτας, ἐξέστω συμμάχους ποιῆσθαι αὐτοὺς Ἀθηναίους.¹ 6. Μιβερναίους δὲ καὶ Σαναίους καὶ Σιγγαίους (l. Σιγγίους) οἰκεῖν τὰς πόλεις τὰς ἑαυτῶν, καθάπερ Ὀλύνθιοι καὶ Ἀκάνθιοι.

Der Wortlaut des ersten Abschnittes kann unmöglich richtig überliefert sein. Weder waren bis dahin irgend welche Städte von Spartanern an die Athener in der Form einer παράδοσις in dem oben entwickelten Sinne überantwortet worden, noch war dies irgend einem anderen gegenüber, Amphipolis allein ausgenommen, für die Zukunft beabsichtigt; dies ergibt sich nicht nur aus den oben vorgetragenen Erwägungen, sondern auch aus dem, was Thukydides in seinem Bericht über die versuchte Ausführung des Vertrages als von den Spartanern in Ansehung der Thrakischen Städte angestrebt und von den Athenern ebenmässig gefordert bezeichnet. Die nach Abschluss des Vertrages nach Thrakien abgegangene spartanische Commission hatte den Auftrag, die Übergabe von Amphipolis an die Athener durch Klearchos zu veranlassen und an die Übrigen (τοὺς ἄλλους) die Aufforderung zu richten, τὰς σπονδὰς ὡς εἶρητο ἐκάστοις, δέχεσθαι. οἳ δ' (wird hinzugefügt) ἤθελον, νομίζοντες οὐκ ἐπιτηδεΐας εἶναι (5, 21); und später führen die Athener Beschwerde, dass die Spartaner τὴν Ἀμφίπολιν καὶ τὰλλα (d. h. Panakton) οὐκ ἀπεδεδώκεσαν, οὐδὲ τοὺς ἐπὶ Θράκης παρῆχον συμμάχους σπονδὰς δεχομένους (5, 35). Nirgends ist mit Bezug auf die Thrakischen

¹ Nur bei Annahme der oben befolgten Interpunction scheint mir der überlieferte Wortlaut der Stelle, deren Sinn ja nicht zweifelhaft sein kann, allenfalls hien und da wenigstens ein wenig unklar zu sein, wenigstens ich für seine Correctheit nicht eintreten möchte, vielmehr in Bezug auf die Interpunction ein Glossem zu sehen geneigt bin.

Städte von einer erfolgten oder unterlassenen παράδοσις die Rede, sondern nur darum handelt es sich, sie zu bewegen, dem Frieden beizutreten und sich den Bedingungen zu unterwerfen, welche mit Bezug auf sie zwischen Athen und Sparta einseitig vereinbart worden waren. Sicher also ist das παρέδοσαν unserer Stelle auf ein Verderbniss des Textes zurückzuführen; der Sinn verlangt vielmehr ein Verbum, durch welches die in dem umschreibenden Relativsatz charakterisirten Städte als solche bezeichnet würden, die von Athen abgefallen waren und sich in den Schutz der Spartaner begeben hatten. Ich schlage also vor, παρέλαβον statt παρέδοσαν zu schreiben und den Dativ Ἀθηναίους nicht dem Relativsatze, sondern dem Hauptsatze zuzuweisen, was trotz der folgenden Accusative sehr wohl möglich ist; wem diese Fügung zu hart erscheint, mag meinetwegen Ἀθηναίοις auch noch in Ἀθηναίους umsetzen. Alsdann erhält unser erster Paragraph folgende Fassung: ὅσας δὲ πόλεις παρέλαβον Λακεδαιμόνιοι, Ἀθηναίοις (oder Ἀθηναίους) ἐξέστω ἐπίνειαι ὅποι ἂν βούλωνται, αὐτοὺς καὶ τὰ ἑαυτῶν ἔχοντας, und stipulirt in dieser Fassung, wie man sieht, die Freigebung Attischer Bürger, welche wenn nicht in allen, doch in einzelnen der abgefallenen Bundesstädte zur Zeit des Ausbruches des Aufstandes sich anwesend befunden oder als Metöken aufgehalten hatten und zurückgehalten worden waren, sowie ihres beweglichen oder auch unbeweglichen Eigenthums, welches bei dieser Gelegenheit mit Beschlagnahme belegt worden war, wobei als selbstverständlich vorausgesetzt wird, dass die Betreffenden ihre Privatverhältnisse in jenen ehemaligen Bundesstädten nunmehr aufzulösen und ihr Eigenthum aus denselben herauszuziehen sich beeilen würden. Die Niederlassung Attischer Kleruchen an der Strymonmündung nach der Einnahme von Eion und weiter landeinwärts nach der Gründung der Colonien Brea und Amphipolis, sowie die Handels- und Geschäftsbeziehungen mannigfacher Art, in denen diese Kleruchen zu den Bevölkerungen der benachbarten Bundesstädte gestanden haben müssen, machen die Thatfachen, welche einer solchen Bestimmung als zu Grunde liegend angenommen werden müssen, durchaus erklärlich; ganz in der Ordnung ist es ferner, dass der Staat von Athen sich der geschädigten Privatinteressen eines Theiles seiner Bürger beim Friedensschlusse annahm, ja, wie wir aus der Voranstellung dieser Stipulation zu schliessen berechtigt sind, die Erfüllung der darin ausgesprochenen Forderung als die conditio sine qua non eines weiteren Eingehens auf Verhandlungen in dieser Richtung aufgestellt hatte.

Demnächst erklärten sich die Athener bereit, wie dies die Lakedämonier im Interesse ihrer Schutzbefohlenen zu fordern sich für verpflichtet erachteten, die völlige Autonomie aller dieser Städte anzuerkennen, unter der Bedingung, für deren Annahme durch die Betheiligten

sich hinwiederum die Lakedämonier verbürgen mussten, dass die wie bisher zur Zahlung eines jährlichen Tributes an Athen verpflichtet blieben. Die Höhe desselben anlangend verstanden sich die A dazu, auf eine willkürliche Normirung derselben ihrerseits zu verzichten und als unveränderliche Norm der Zahlungspflicht diejenigen geringen Beträge anzuerkennen, welche in den ursprünglichen Acceptverträgen mit den einzelnen Städten zu den Zeiten des Attikervereinbündnisses vereinbart worden waren, willigten also zugleich in eine entsprechende Herabsetzung des Betrages der nunmehr für unveränderlich erklärten Tribute ein. Das Ergebniss dieses Theiles der Verhandlungen ist im zweiten Absatz seine Formulirung gefunden.

Im Anschluss hieran wurde sodann, offenbar von Athen aus, zur Sprache gebracht, dass für den nicht unmöglichen Fall einer Zahlungsverweigerung oder Einstellung durch einzelne oder die Gesamtheit dieser Städte Athen Garantie dafür verlangen dürfe, dass es zu dem Seinigen komme. Da die Lakedämonier solche Fälle eine finanzielle Garantie zu übernehmen nicht wollten, sahen sie sich genöthigt, den Athenern das äusserst bedenkliche Recht der bewaffneten Execution gegen die säumigen Zahler einzuräumen. Wie schwer ihnen diese Concession geworden ist, sieht man deutlich an der vorsichtigen und zurückhaltenden Fassung, derselben in Absatz 3 gegeben worden ist: die Berechtigung zur Anwendung von Gewaltmitteln für den Fall ausbleibender Zahlung von der Verpflichteten wird nicht ausdrücklich, sondern nur indirekt anerkannt, indem bewaffneter Angriff für so lange unzulässig erklärt wird, als die Verpflichteten regelmässig die Zahlung leisten. Wenn hinzugefügt wird, »vom Datum des Vertragsabschlusses an«, so soll die offenbar vorsichtiger Weise der Anwendung der zugestandenen Executionsbefugnisse zur Erzwingung solcher Zahlungen entgegen gehalten werden, welche von den abgefallenen Bundesgliedern in der Zeit nach dem Datum ihres Abfalles bis zu dem des Friedensschlusses, also während der Periode des Symmachieverhältnisses zu Sparta, nicht geübt worden waren. Auch diese Nebenbestimmung charakterisirt sich als Ausfluss argwöhnischer und wohlbedachter Vorsicht.

Bisher waren die Städte, über deren staatsrechtliche Situation man pactirte, nur im Allgemeinen als *ὅσας παρέλαβον Λακεδαιμόνιοι* bezeichnet worden. Die Allgemeinheit dieser Bezeichnung verleiht unter Umständen eine Deutung, durch welche auch solche Städte in diese Kategorie einbezogen wurden, welche zu den Lakedämoniern übergetreten, aber von den Athenern wieder bewältigt worden waren wie Mende und Torone, oder deren Bewältigung unmittelbar stand, ohne dass die Lakedämonier sie zu verhindern oder au

aufzuhalten sich in der Lage befanden, wie das seit geraumer Zeit von den Athenern blockirte Skione. Es lag nicht sowohl im Lakedämonischen, als vielmehr im Athenischen Interesse, dass die Möglichkeit einer solchen Deutung von vorn herein abgeschnitten wurde, was am einfachsten durch eine Declaration geschah, welche die Städte, auf welche die Bestimmungen der vorhergehenden Abschnitte Anwendung finden sollten, namentlich aufführte. Eine solche Declaration enthält Abschnitt 4, welcher also als auf Verlangen der Athener hinzugefügt zu betrachten ist. Voran stehen in diesem Verzeichnisse die Colonien von Andros, Argilos, Stagiros und Akanthos, welche durch Brasidas zum Abfall vom Athenischen Bunde veranlasst worden waren und denen gegenüber Sparta folgerichtig die stärkste Verpflichtung fühlen mochte; es folgen die Städte der Bottiäa und Chalkidike, Stolos, Olynthos und Spartolós, welche schon vor dem Beginn des Krieges auf eigene Hand abgefallen waren und sich erst später den Lakedämoniern angeschlossen hatten. Wenn andere Städte dieser Gegend fehlen, welche sich genau in derselben Lage befanden und darum auch gleichzeitig mit den drei genannten von den Athenischen Tributregistern verschwinden, so hat das seinen Grund in jenen Massnahmen der aufständischen Bündner, von welchen Thukydides bei Gelegenheit der Darstellung des Abfalles der Bottiäer und Chalkidier berichtet, 1, 58: (Ποτειδαιᾶται) ἀφίστανται μετὰ Χαλκιδέων καὶ Βοττιαίων κοινῇ ξυνομόσαντες. καὶ Περδίκκας πείθει Χαλκιδέας τὰς ἐν Σαλαῳ πόλεις ἐκλιπόντας καὶ καταβαλόντας ἀνοικίσασθαι ἐς Ὀλυμπον καὶ τὴν πόλιν ταύτην ἰσχυρὰν ποιήσασθαι· τοῖς τ' ἐκλιποῦσι τούτοις τῆς αὐτοῦ γῆς τῆς Μυγδονίας περὶ τὴν Βόλβην λίμνην ἔδωκε νέμεσθαι, ἕως ἂν ὁ πρὸς Ἀθηναίους πόλεμος ᾖ. καὶ οἱ μὲν ἀνψικίζοντό τε καὶ αἰροῦντες τὰς πόλεις καὶ ἐς πόλεμον παρεσκευάζοντο — Auffällig aber und auf den ersten Blick unerklärlich ist, dass die Ortschaften der Athoshalbinsel, Thyssos, Leonä, Akrothoon und Olophyxos, nicht genannt werden, von denen nach Thukydides 4, 109 ausdrücklich berichtet, dass sie sich nach der Einnahme von Amphipolis durch Brasidas dem letzteren angeschlossen (προσεχώρησαν), während Sane und Dion trotz des auf sie Anwendung gebrachten militärischen Druckes widerstanden, und deren Wiedergewinnung durch die Athener in der Zeit vor dem Friedensschlusse er mit keinem Worte Erwähnung thut. Es muss angenommen werden, dass was Thukydides, gleichviel aus welchem Bunde, nicht berichtet hat, dennoch wirklich geschehen ist, und nur nicht nur deshalb, weil diese Städte im Friedensvertrage als zur Lakedämonischen Clientel gehörig nicht erwähnt werden, sondern weil wenigstens eine von ihnen, Thyssos, nach dem ausschliesslichen Zeugnisse des Thukydides selbst (5, 35) erst im Sommer

desselben Jahres, zu dessen Anfang der Friede geschlossen wurde den Athenern durch die Chalkidier entrissen wurde und bei dieser Gelegenheit als zu jener Zeit zum Attischen Bunde gehörig bezeichnet wird.¹ Es hält auch durchaus nicht schwer, mit annähernder Sicherheit die Zeit und die Umstände nachzuweisen, unter denen die Wiedereroberung der auf der Akte verlorenen Stellungen den Athenern noch vor dem Frieden gelungen ist. Was Thukydides von den Operationen Kleon's bis zur Schlacht bei Amphipolis 5, 2. 3 und berichtet, lässt deutlich erkennen, dass diese Unternehmungen die Wiedergewinnung sämtlicher in der Thrakischen Provinz an den Lakedämonier verloren gegangenen Positionen berechnet waren. Kleon wendete sich zunächst gegen Skione auf der Pallene; da diese Stadt aber bereits von einem Athenischen Blockadecorps fest eingeschlossen war und ihre Übergabe nur noch eine Frage der Zeit schien, so hielt er sich hier nicht weiter auf, sondern warf sich, nachdem er seine eigenen Truppen durch entbehrlich erscheinende Theile des Belagerungscorps vor Skione verstärkt hatte, sofort auf Torone in der Sithonia und nahm dasselbe, obwohl es durch eine Peloponnesische Besatzung unter Führung eines Lakedämonischen Offiziers vertheidigt wurde, mit Sturm. Hierauf wendete er sich die Athoshalbinsel umfahrend nach Eion. Von Eion aus rückte er sodann nachdem er Stagiros ohne Erfolg angegriffen, dagegen die Thasische Colonie Galepsos, welche an Brasidas übergegangen war, mit Sturm genommen hatte, schliesslich gegen Amphipolis vor. Es ist unter diesen Umständen nicht glaublich, dass er auf der Fahrt von Torone nach Eion es unterlassen haben sollte, die an seinem Wege gelegenen abtrünnigen Städte der Athoshalbinsel anzugreifen, wenn es dessen bedurft hätte, und wenn Thukydides von einem solchen Angriffe nichts berichtet, so scheint mir daraus nur gefolgert werden zu dürfen, dass ein solcher allerdings nicht Statt fand, aber nur deswegen nicht Statt fand, weil er sich als unnöthig erwies, indem diese unbedeutenden und auf ihre eigenen Kräfte angewiesenen Ortschaften unter dem Eindrucke der Nachricht von der Einnahme von Torone bei dem Erscheinen der Attischen Flotte an der Küste der Akte jeden Gedanken

¹ Τοῦ δ' αὐτοῦ Θέρους καὶ Θύστων τὴν ἐν τῇ Ἀθῶν διακτιδῆς (διακτιδῆς, διακτιδῆς) εἶλον, Ἀθηναίων οὐτὶν ξύμμαχον. Wie auch immer der Wortlaut der letzteren verscribenen Stelle gewesen sein möge, das eine scheint mir sicher, dass die oberer von Thyssos nur die Χαλκιδῆς, nicht die Διῆς gewesen sein können, wie Porphyrius richtig gesehen hat, welchem man hätte folgen sollen. Dion, welches, wie aus 4, 1 hervorgeht, während des Krieges fest zu Athen gehalten hatte, ist erst später während des Friedens (Sommer 417) vom Bunde abgefallen und zu den Chalkidiern übergegangen (Thukydides 5, 82. τοῦ ἐπικηρυγμένου Θέρους Διῆς οἱ ἐν Ἀθῶν ἀπέστησαν Ἀθηναίων π. Χαλκιδῆας).

erstand aufgaben und sich beeilten, dem Attischen Strategen Verwerfung anzubieten, vielleicht selbst ohne dessen Aufforderung zu warten. In diesem Falle mochte Thukydides der Thatsache, wenn sie ihm bekannt war, sei es, weil sie ihm unerheblich sei, sei es, weil sie geeignet war, Kleon's Thätigkeit in einem helleren Lichte erscheinen zu lassen, als ein Gegner desselben zu mochte, sei es, dass beide Erwägungen einwirkten und die andere beeinflusste, absichtlich oder unabsichtlich keine Erwägung thun. Auf jeden Fall ist die Beschaffenheit der in Frage stehenden Vertragsbestimmungen nur unter der Voraussetzung einer Reticenz des Geschichtsschreibers erklärlich und steht darum selbst wie das Verhalten des Erzählers ihm gegenüber in Frage: nur über die Motive zu diesem Verhalten kann eine Verschiedenheit bestehen.

Man nunmehr in einer jedes Missverständniss ausschliessenden bezeichneten Städten war durch die vorangehenden Bestimmungen die Stellung ausserhalb des engeren Kreises der Attischen Städte eingeräumt worden. Wenn Athen sich dazu verstanden diese Concession zu machen, so durfte und musste es dagegen annehmen, dass nunmehr auch dasjenige factisch bestehende Symmetrieverhältniss gelöst werde, in welches die betreffenden Städte zum Abfall zu den Lakedämoniern getreten waren. Ausserdem war zwar die den Städten zugestandene Autonomie selbstverständlich das Recht für sie, in Symmachie zu treten, mit wem sie wollten, also auch mit Athen, wenn sie das in ihrem Interesse finden wollten, allein es war von Bedeutung für die Athener, dass dies ihnen ausdrücklich anerkannt und nicht der Anschein hervorgerufen werde, als habe Athen nicht nur für jetzt, sondern für alle Zukunft darauf Verzicht geleistet, mit diesen Städten jemals wieder neue Verträge zu schliessen, selbst wenn es mit gutem Willen und oder gar auf ihren Antrag geschehen sollte. Und die Möglichkeit lag durchaus nicht fern, da Makedonien gegenwärtig und die Hellenischen Ansiedelungen dieser Gegend durch die Umstände der Dinge selbst auf einander angewiesen waren. So kann Absatz 5 hinzugefügt; dass er das Ergebniss einer Verhandlung ist, welche durch eine von Seiten Athens gestellte Forderung herbeigeführt worden war, ist mit Sicherheit an der einseitigen Natur der Verhandlung zu erkennen, durch welche das Recht, zu den Städten in Symmachie zu treten, scheinbar allein den Athenern reservirt wird, dass es doch zweifellos den Lakedämoniern in ganz gleicher Weise zustehen musste. Athen legte aber ein Gewicht auf die ausdrückliche Anerkennung eines Rechtes, das ihm selbst werthvoll und

unentbehrlich, den Lakedämoniern dagegen so selbstverständlich und unerheblich erscheinen konnte.

Grosse Schwierigkeiten bereitet das Verständniss des 6. und letzten Abschnitts der Bestimmungen über die Thrakischen Städte. Er nennt die Namen dreier Thrakischer Städte, deren im Vorhergehenden keine Erwähnung geschehen war, und trifft in Bezug auf sie Anordnungen, welche sich von den bisherigen wesentlich unterscheiden. Denn dass οἰκεῖν τὰς πόλεις τὰς ἐαυτῶν καθάπερ Ὀλύνθιοι Ἀκάνθιοι nicht besagen soll und nicht besagen kann, die in Ansehung der vorhergenannten Städte vereinbarte Festsetzung solle auch auf diese drei Gültigkeit haben, indem Olynthier und Akanthier gleichsam beispielsweise als Vertreter der beiden Reihen von Städten in den voranstehenden Verzeichnisse genannt und als solche zu betrachten wären, ist abgesehen von anderen Gründen schon einfach darum evident, weil, wenn von diesen Städten nichts Anderes zu gelten hatte und zu sagen war, als von den übrigen, gar nicht abzusehen wäre, warum nicht ihre Namen in derselben Weise wie die der übrigen hätte behandelt und folglich einfach dem voranstehenden Verzeichnisse einverleibt werden sollen. Es ist vielmehr deutlich, dass es mit ihnen eine besondere Bewandniss gehabt hat und darum für sie auch besondere Bestimmungen nothwendig geworden sind, und es muss der Versuch gemacht werden, das Verständniss dieser Besonderheiten einem Wortlaute abzugewinnen, welcher uns nur deshalb nothwendig dunkel ist, weil er, auf die Betheiligten und ihre Zeitgenossen allein berechnet, eine Kenntniss der Verhältnisse voraussetzt, welche jenen zu Gebote stand, uns aber zufällig abgeht.

Von den drei Städten wird die erste, Mekyberna, von der Strabonischen Epitome 7 Seite 330 No. 29 als ἐπίγειον von Olynth bezeichnet, ist also wahrscheinlich als eine Olynthische Anlage zu betrachten. Die zweite, Sane, war eine Colonie von Andros (Thukydides 4, 104) wie Akanthos, und von Singos darf der ihm hier in der Aufzählung angewiesenen Stellung nach dasselbe vermuthet werden, obwohl über die Herkunft der Gründer dieser Stadt bestimmte Angaben sonst nicht vorliegen. Denn es scheint doch deutlich, dass die Gleichung zwischen den drei Städten einerseits und Olynthos und Akanthos andererseits in dem Sinne von »Mekyberna wie Olynthos, Sane und Singos wie Akanthos« aufzufassen ist, so zwar, dass die Veranlassung zu der Festsetzung, deren Grundlage diese Gleichung bildet, irgend welche Beziehungen abgegeben haben, in denen die drei Städte zu Olynthos und Akanthos in Folge ihres gleichartigen Ursprunges gestanden haben. Was ferner das Verhältniss der drei Städte zu Athen betrifft, so hat sie nach Ausweis der Attischen Tributlisten vor dem Ausbruche d.

rieges sämtlich zu den selbständig zahlenden Mitgliedern der attischen Symmachie gehört. Auch während des Krieges findet sich wenigstens Sane auf allen aus der Zeit desselben erhaltenen Tributlisten, d. h. denen von Ol. 88, 1 (auf dieser allerdings nur nach wahrscheinlicher Ergänzung), 88, 2 und 3 (C. I. A. I. 256, 257, 259), und noch im Winter von Ol. 89, 1 (424/3) widersteht es Brasidas' Angriffen mit Erfolg (Thukydides 4, 109). Es kann also gar keinem Zweifel unterliegen, dass diese Stadt auch noch zur Zeit des Friedensschlusses sich im gesicherten Besitze der Athener befand.¹ Es gleichen hatte Mekyberna noch nach dem Friedensschlusse im Winter 421/20 eine Attische Garnison und wurde erst um diese Zeit von den Olynthiern durch Überfall genommen (Thukydides 5, 39 καὶ τῇ αὐτῇ χειμῶνι τούτῳ Μηκύβερναν Ὀλύνθιοι, Ἀθηναίων φρουρούντων, ἀδραμόντες εἶλον). Allerdings fehlt der Name der Stadt, sowie auch der von Singos, von dem überdem sonst keine Nachrichten vorliegen, auf den oben erwähnten Tributlisten der Kriegsjahre und hat veruthlich auf keiner von ihnen gestanden; allein es würde voreilig sein, wollte man daraus die Thatsache folgern, dass beide Städte in den betreffenden Jahren und vielleicht auch noch später von Athen abgefallen gewesen seien; denn das Factum lässt sich auch unter anderen, an sich nicht unwahrscheinlichen Voraussetzungen erklären, wie z. B. dass in den betreffenden Jahren diesen Städten vom Vororte die Zahlung gestundet oder aus irgend welchen Gründen, deren sich manche denken lassen, gänzlich erlassen worden war. Wie dem aber auch sein möge, schon allein die einfache Erwägung, dass, wenn die drei Städte zur Zeit des Beginnes der Friedensverhandlungen von Athen abgefallen gewesen wären und zur Clientel der Lakedämonier gehört hätten, die letzteren ohne Zweifel für sie dieselben Vergünstigungen, wie für die anderen, im Vorhergehenden genannten, verlangt haben würden, und die Athener nicht umhin gekonnt hätten, einem solchen Verlangen zu entsprechen, nöthigt auch abgesehen von den anderen oben hervorgehobenen Momenten zu der Annahme, dass Mekyberna, Sane und Singos zur Zeit des Friedensschlusses sich im Besitze der Athener befanden und ihnen folglich einfach belassen werden mussten. Nicht die Lakedämonier also können es gewesen sein, welche in Bezug auf

¹ Die Attischen Tributregister und die Redaction unserer Urkunde kennen offenbar nur ein Sane, und dass unter diesem das in der Kriegsgeschichte dieser Zeit erwähnte Sane auf der Akte zu verstehen ist, scheint mir zweifellos. Wenn Herodot (7, 123, vgl. 22) und aus ihm wahrscheinlich die Strabonische Epitome 7, 330 neben diesem auch noch ein anderes auf Pallene gelegenes Sane erwähnen, so kommt die letztere für unsere Frage auf keinen Fall in Betracht; es scheint vielmehr gar nicht autonome Gemeinde gewesen zu sein, wenn es zu dieser Zeit überhaupt noch bestand.

sie besondere Stipulationen verlangten, sondern allein die Athener und die Veranlassung dazu müssen Beziehungen gewesen sein, in denen die im Bunde verbleibenden Städte zu den beiden durch vorangehende Vereinbarung aus demselben entlassenen standen gestanden hatten, und welche in der Formulirung der Vertragsbestimmung jedenfalls angedeutet sind. Meines Erachtens lassen sich die der Bestimmung zu Grunde liegenden und sie bedingenden Verhältnisse kaum anders als folgendermassen auffassen: Vor dem Bestehen der Städte der Thrakischen Provinz zur Attischen Symmachie waren Mokyberna einerseits, Sane und Singos andererseits Unterthanen von Olynthos resp. Akanthos gewesen; in der Zeit nach dem Bestehen fand es der Vorort des Bundes in seinem Interesse, die Unterthanen seiner nunmehrigen Bundesgenossen zu patronisiren und deren Unabhängigkeitsbestrebungen zu begünstigen und zu unterstützen. So konnten die mit Hülfe des Vorortes die Unterthanenstädte selbständige Mitglieder des Bundes und ihre Interessen dadurch unauflöslich mit denen Athens verbunden. Als daher zunächst Olynthos und später auch Akanthos sich vom Bunde lossagten und den Lakedämoniern in die Arme fielen, folgten ihnen ihre ehemaligen Unterthanen nicht, sondern hielten treu zu Athen, dessen Niederlage für sie die Rückkehr in die frühere Unterthänigkeit zur unausbleiblichen Folge gehabt haben würde, während sein Sieg ihnen ihre Unabhängigkeit gewährleistete. Wenn Athen beim Friedensschlusse sich dazu verstand, Olynthos und Akanthos endgültig aus dem Bunde zu entlassen und deren Autonomie anzuerkennen, so war zu befürchten, dass dieselben früher oder später die Hoheitsrechte über ihre ehemaligen beim Bunde verbliebenen Unterthanenstädte reclamiren würden, was zu bedenklichen Conflicten Veranlassung geben konnte. Sie mussten wünschen, solchen Eventualitäten vorgebeugt zu sehen, und stellten deshalb die Forderung, dass Olynthos und Akanthos auf diese ihre Ansprüche ein für allemal in aller Form Verzicht leisteten. Die Lakedämonier, denen gleichfalls daran liegen musste, die Veranlassung zu unliebsamen Störungen der mühsam durch den Vertrag geschaffenen Neuordnung der Dinge in diesen Gegenden aus dem Wege geräumt zu sehen, erkannten die Billigkeit dieser Forderung an und verbürgten sich dafür, dass die Schützlinge sich zu dem verlangten Verzicht verstehen würden. In demgemäss fand eine Bestimmung Aufnahme in den Vertrag, in welcher ausgesprochen wird, die im Verbande der Attischen Symmachie verbleibenden Städte Mokyberna, Sane und Singos sollten *οἰκεῖν πόλεις τὰς ἑαυτῶν κατὰ περὶ Ὀλύνθιοι καὶ Ἀκάνθιοι*, d. h. Olynthos und Akanthos gegenüber ebenso autonom sein, wie diese selbst gegenüber Athen.

Nach Regelung der Thrakischen Verhältnisse blieben noch die Ansprüche Athens auf Restitution der an der Grenze gegen Böotien verloren gegangenen Punkte zu erledigen. Bei Gelegenheit der Verhandlungen, welche der Paraphirung des Vertrages vorangegangen waren, war nach der Quelle, welche Thukydides' Angaben im 17. Capitel zu Grunde liegt, als die Herausgabe von Nisäa durch die Athener an den Peloponnesischen Bund zur Sprache kam, von diesen die Restitution von Platäae als Gegenleistung gefordert worden; dagegen hatten aber die Thebaner Einspruch erhoben unter Hinweis auf die Thatsache, dass Platäae seiner Zeit nicht durch Sturm, sondern Capitulation in den Besitz der Belagerer gelangt war, während die Athener ihrerseits betonten, dass es sich mit der Einnahme von Nisäa ganz ebenso verhalte. So war denn ein Compromiss zu Stande gekommen, kraft dessen die Athener ihren Anspruch auf Platäae fallen liessen, dafür aber auch Nisäa behalten durften (— *Νίσαιαν δ' ἔχειν Ἀθηναῖους· ἀπαιτούντων γὰρ Πλάταιαν οἱ Θηβαῖοι ἔφασαν οὐ βίᾳ ἀλλ' ὁμολογία αὐτῶν προσχωρησάντων καὶ οὐ προδόντων ἔχειν τὸ χωρίον, καὶ οἱ Ἀθηναῖοι τῷ αὐτῷ τρόπῳ τὴν Νίσαιαν*). Offenbar hatten die Lakedämonier sich auf Seite der Thebaner gestellt und deren Einrede unterstützt, wahrscheinlich weil sie diesen gegenüber sich in bindender Weise engagirt hatten; wenigstens berichtet Thukydides, wo er die Übergabe von Platäae erzählt (3, 52), dass die Lakedämonier schon damals die jetzt eingetretene Eventualität in das Auge gefasst und den Commandanten des Belagerungscorps mit den entsprechenden Instructionen versehen hätten (*γινούς δὲ ὁ Λακεδαιμόνιος ἄρχων τὴν ἀσθένειαν αὐτῶν βία μὲν οὐκ ἐβούλετο ἐλεῖν· εἰρημένον γὰρ ἦν αὐτῷ ἐκ Λακεδαιμόνος, ὅπως, εἰ σπονδαὶ γένοιτό ποτε πρὸς Ἀθηναίους καὶ συγχωροῖεν ὅσα πολέμῳ χωρία ἔχουσιν ἑκάτεροι ἀποδίδοσθαι, μὴ ἀνάδοτος εἴη ἡ Πλάταια ὡς αὐτῶν ἐκόντων προσχωρησάντων· προσπέμπει δὲ αὐτοῖς κήρυκα u. s. w.*), was darauf hinzuweisen scheint, dass schon damals von ihnen den Thebanern der Besitz von Platäae unter allen Umständen garantirt worden war. Wenn sie jetzt die Kosten des nothwendig gewordenen Compromisses zu tragen einem Gliede des Peloponnesischen Bundes zumutheten, welches ohne Zweifel lebhaften Protest erhob, wie es sich denn später lediglich aus diesem Grunde dem Frieden beizutreten weigerte, so mochten sie die formale Berechtigung zu einem solchen Verfahren aus dem Umstande ableiten, dass zur Zeit der Einnahme von Nisäa durch die Athener dieser Hafenplatz gar nicht von den Megarern selbst, sondern ausschliesslich von Peloponnesischen Bundestruppen unter Befehl eines Lakedämonischen Offiziers besetzt gehalten und vertheidigt worden, und die letzteren es gewesen waren, welche die Capitulation abgeschlossen hatten (Thukydides 4, 66, 69; vergl. 100). Was dagegen

- . Panakton betraf, dessen Rückgabe die Thebaner sicherlich ebenso von Anfang an verweigerten, wie sie denn später vornehmlich auf diesem Grunde die Annahme des Friedens beharrlich abgelehnt haben, so hatten die Lakedämonier hier freie Hand und nahmen um so wenig Anstand, Athen gegenüber die Bürgschaft für die von ihm verlangte Rückgabe dieses Platzes zu übernehmen, als sie sich der Hoffnung hingeben mochten, dass Theben, wenn erst die Majorität der Bundesgenossen sich für den Frieden erklärt haben werde und es den Erben der Lakedämonier erfahre, seinen Widerstand aufgeben und sich doch noch zum Ziele legen werde. So fand denn mit gegenseitiger Übereinstimmung Athens und Spartas die folgende Bestimmung Aufnahme in das Vertragsinstrument, welche, unter stillschweigender Übergehung von Platäa und ohne dass dessen rechtlicher Besitz den Thebanern ausdrücklich zugesprochen wird, die Rückgabe von Panakton an Athen anordnet:

ἀποδόντων δὲ Ἀθηναίοις Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ ξίμαχοι Πάνακτον.

Damit war der erste Theil der Aufgabe erledigt, welcher sich auf die Befriedigung der Athenischen Ansprüche bezog. Nicht geringere Schwierigkeiten bereitete die genaue Präcisirung derjenigen Plätze, welche von den Athenern dagegen an ihre bisherigen Gegner herauszugeben waren. Es ist soeben bemerkt worden, dass in den Vorverhandlungen das Schicksal des von den Athenern besetzten Nisäa Gegenstand von Erörterungen wurde, welche damit endigten, dass die Lakedämonier darin willigten, den Platz im Besitze der Athener zu belassen; es fehlt aus diesem Grunde im Folgenden in der Aufzählung der von den Athenern zu restituirenden Plätze und veranlasst dieser Umstand die Weigerung der Megarer, den Friedensschluss auch für sie bindend anzuerkennen. Aber auch die Angelegenheit der während des Krieges den Korinthern verloren gegangenen Colonien bildet einen Stein des Anstosses, welcher schwer zu beseitigen war. Nach Thukydides' Angabe (5,30) war der wahre Grund der hartnäckigen Opposition, welche Korinth später dem Frieden machte, der Umstand, dass die Lakedämonier es unterlassen hätten, die Rückgabe von Solon und Anaktorion an die Korinther zu erwirken, während zu Vorwände die Verpflichtungen dienten, welche Korinth den Bundesgenossen in Thrakien gegenüber eingegangen sein wollte. (Κορίνθοι δὲ ἀντέλεγον τοῖς Λακεδαιμονίοις, ἃ μὲν ἡδικοῦντο, οὐ δηλοῦντες ἀντικρὺς, ὅτι οὔτε Σόλλειον σφίσιν ἀπέλαβον παρ' Ἀθηναίων οὔτε Ἀνακτόριον, εἴ τί τι αὐτοὶ ἐνόμιζον ἐλαττοῦσθαι, πρόσχημα δὲ ποιοῦμενοι τοὺς ἐπὶ Θράκης μὴ προδῶσαι ὁμόσαι γὰρ αὐτοῖς ὅρκους ἰδίᾳ τε, ὅτε μετὰ Ποτιδαιατῶν τὸ πρῶτον ἀφίστανται καὶ ἄλλους ἴστερον). Jene beiden an der Akarnanischen Küste belegenen Colonien der Korinther hatten die Athener im Laufe des Krieges

Die der Akarnanen eingenommen und alsdann den letzteren überlassen, so dass sie als in Athenischem Besitz befindlich nicht beachtet und ihre Rückgabe von den Athenern auf Grund des einmal eingenommenen Principis nicht verlangt werden konnte (vgl. Thukydides 30 οἱ δὲ ἐν ταῖς ἑκατὸν ναυσὶν Ἀθηναῖοι ἔτι ὄντες περὶ Πελοπόννησον Σόλλειόν Κορινθίων πόλιν αἰροῦσι καὶ παραδιδόασιν Παλαιρεῦσιν Ἀκαρνάνων μόνοις τὴν γῆν καὶ πόλιν νέμεσθαι und 4,49 καὶ οἱ ἐν τῇ Ναυπάκτῳ Ἀθηναῖοι καὶ Ἀκαρνᾶνες ἅμα τελευτῶντος τοῦ Θέρους στρατευσάμενοι Ἀνακτόριον Κορινθίων ἔλθιν, ἣ κεῖται ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ Ἀμπρακικοῦ κόλπου, ἔλαβον προδοσίᾳ καὶ πέμψαντες Κορινθίους αὐτοὶ Ἀκαρνᾶνες οἰκήτορες ἀπὸ πάντων ἔσχον τὸ χωρίον). Hierher gehören aber hatten die Korinther bereits in den Vorverhandlungen ähnliche Forderungen gestellt und, wie ich nicht zweifle, dabei auch das Schicksal von Potidäa zur Sprache gebracht; sie begegneten aber mit entschiedener Weigerung von Seiten der Athener, deren Auffassung, wie der Erfolg lehrt, sich endlich auch die Lakedämonier anschlossen; denn in der Reihe der von Athen zu restituierenden Plätze zählen die Namen der Korinthischen Kolonien, so gut wie der von Elis. Sonach erhielt der die Verpflichtungen Athens zusammenfassende Abschnitt der Vertragsurkunde die folgende Gestalt:

ἀποδόντων δὲ καὶ Ἀθηναῖοι Λακεδαιμονίοις Κορυφάσιον καὶ Κύθηρα καὶ Μεθώνην (l. Μέθανα; vergl. Strabon 8 S. 374) καὶ Πτελεὸν καὶ Ἀταλάντην.

Für Pylos ist, wie in der Waffenstillstandsurkunde 4, 118, die den Lakedämoniern geläufige Bezeichnung Koryphasion gewählt (Thukydides 4, 3 καλοῦσι δὲ αὐτὴν (Πύλον) οἱ Λακεδαιμόνιοι Κορυφάσιον); die Lage von Pteleon ist nicht bekannt und die Thatsache seiner Einnahme und Besetzung durch die Athener wird von Thukydides selbst nirgends erwähnt. Da übrigens wenigstens Methana und Atalante nicht an die Lakedämonier, sondern an Verbündete von ihnen herausgegeben waren, so lässt sich der Verdacht nicht abweisen, dass die vorliegende Fassung durch Abschreibernachlässigkeit verdorben ist, und die Vermuthung erscheint mir gerechtfertigt, hinter Λακεδαιμονίοις noch καὶ τοῖς ξυμμάχοις ausgefallen sein.

Den Schluss der Abmachungen über die von beiden Seiten zu verwerkstellenden Restituirungen machen die Bestimmungen über die Lieferung der Kriegsgefangenen. Obwohl man erwarten sollte, dass dieselben als selbständiger Abschnitt auch äusserlich gekennzeichnet würden, ist dem entgegen der erste Absatz ohne eigenes Verbum gelassen und dem Vorhergehenden unmittelbar angeschlossen worden. Denkbar ist, dass bei dem Gewichte, welches die Lakedämonier auf ihren Antheil an der Sache wegen der Gefangenen von Lakonia legten, die Rückgabe der Lakedämonischen Kriegsgefangenen

in erster Linie stipulirt und diese Stipulation als eine der vorhergehenden gleichartige betrachtet und behandelt wurde; doch muss auch die Möglichkeit offen gehalten werden, dass zu Anfang dieses Abschnittes einige Worte, wie ἀποδόντων δὲ Ἀθηναῖοι oder ἀποδοῦναι δὲ Ἀθηναίους durch Nachlässigkeit der Abschreiber ausgefallen sind. Nach der Überlieferung lautet er jetzt, dem Vorhergehenden angeschlossen:

— καὶ τοὺς ἄνδρας ὅσοι εἰσὶ Λακεδαιμονίων ἐν τῇ δημοσίῳ τῷ Ἀθηναίων ἢ ἄλλοδί που ὅσης Ἀθηναῖοι ἄρχουσιν ἐν δημοσίῳ καὶ τοὺς ἐν Σκιῶν πολιορκουμένους Πελοποννησίων ἀφεῖναι, καὶ τοὺς ἄλλους ὅσοι Λακεδαιμονίων ξυμμαχοὶ ἐν Σκιῶν εἰσὶ καὶ ὅσους Βρασίδας ἐπέπεμψεν, καὶ εἰ τις τῶν ξυμμάχων τῶν Λακεδαιμονίων ἐν Ἀθήναις ἐστὶν ἐν τῇ δημοσίῳ ἢ ἄλλοδί που ἥς (l. ὅσης) Ἀθηναῖοι ἄρχουσιν ἐν δημοσίῳ. ἀποδόντων δὲ καὶ Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ ξυμμαχοὶ οὕστινας ἔχουσιν Ἀθηναίων καὶ τῶν ξυμμάχων κατὰ ταῦτά.

Wie man sieht, wird die Freilassung der gefangenen Lakedämonier und ihrer gefangenen Bundesgenossen nicht zusammen, sondern für jede von beiden Categorien besonders stipulirt, während in der Formulirung der Gegenleistung die Athener und ihre Bundesgenossen zusammengefasst erscheinen. Der Grund war die eigenthümliche Lage, in welcher sich die lediglich aus bundesgenössischen Elementen bestehende Besatzung befand, welche von Lakedämonischer Seite seiner Zeit in das jetzt von den Athenern blokirt und von den Lakedämoniern preisgegebene Skione geworfen worden war; obwohl nicht kriegsgefangen, befand sie sich thatsächlich in der Gewalt der Athener; sie musste herausgezogen und zu diesem Zwecke ausdrücklich freier Abzug für sie ausgewirkt werden. Über ihre Zusammensetzung und ihre ungefähre Stärke erhalten wir in Thukydides' Bericht über die Unternehmungen des Brasidas hinreichende Auskunft. Das Truppen-corps, mit welchem Brasidas den Zug nach Makedonien unternahm, hatte eine Stärke von 1700 Mann (4, 78). Darunter befanden sich 700 Heloten, die übrigen waren in der Peloponnes für das Unternehmen besonders geworbene Söldner (4, 80). Nach dem Abfall von Skione und Mende sendete Brasidas diesen Städten 500 Hopliten aus der Zahl seiner Peloponnesischen Söldner und 300 Peltasten, welche die verbündeten Chalkidier stellten, zur Hülfe (4, 123). Zur Zeit, als die Athener ihre Operationen gegen beide Städte eröffneten und sich zunächst gegen Mende wendeten, befand sich ein Theil der Peloponnesier in Skione, der andere in Mende als Besatzung der Burg. Nach dem Übergang von Mende gelang es dem Reste der Besatzung durchzubrechen und sich mit dem in dem mittlerweile von den Athenern eingeschlossenen Skione verbliebenen Theile wieder

reinigen (4, 129—131). Der Chalkidischen Peltasten geschieht eiter keine Erwähnung; es scheint indessen, dass sie von Anfang 1 für die Vertheidigung von Skione disponirt worden sind und diese adt nicht verlassen haben; wenigstens werden bei Gelegenheit des reffens von Mende als den Athenern gegenüber zur Stelle ausser n Mendäern selbst nur die Peloponnesier und 300 Skionäer erwähnt, während die Gesamtzahl der Vertheidiger auf nur 700 angegeben wird. Die Urkunde nun trennt in ungewöhnlich specialisirter ufzählung die Peloponnesischen Söldner von den übrigen Bundesmossen und scheint dann von den letzteren, wenn der Überlieferung trauen ist, zwei Categorien zu unterscheiden, solche, welche auf jene Hand sich nach Skione begeben hatten, und solche, welche rich Brasidas dorthin beordert worden waren, d. h. eben jene 300 alkidischen Peltasten.

Den Schluss des auf die Kriegsgefangenen bezüglichen Abschnittes det eine Bestimmung, die, da sie nicht immer richtig verstanden worden ist, eine besondere Besprechung nöthig macht. Es ist die folgende:

Σκιωναίων δὲ καὶ Τορωναίων καὶ Σερμυλίων (l. Σερμυλιῶν) καὶ εἴ τινα ἄλλην πόλιν ἔχουσιν Ἀθηναῖοι Ἀθηναίους βουλευέσθαι περὶ (αὐτῶν καὶ τῶν ἄλλων πόλεων)¹ ὅ τι ἂν δοκῇ αὐτοῖς.

Die Stelle, welche diesen Worten angewiesen ist, lässt nicht 1 mindesten Zweifel, dass der Inhalt derselben sich nicht auf die gelung der rechtlichen Verhältnisse der genannten Gemeinden zu hen, sondern auf das Schicksal derjenigen Bürger derselben bezieht, lche sich augenblicklich als Gefangene in der Gewalt der Athener anden. Nicht minder klar ist, dass, wenn die Bestimmung über

ausdrücklich dem freien Ermessen der Athener überlassen wird, mit eine Ausnahme von der im Vorhergehenden aufgestellten Regel, s die beiderseitigen Gefangenen freizugeben seien, statuirt wird, lche eine Concession der Lakedämonier gegenüber einem entschiedenen rlangen oder einer bestimmten Weigerung der Athener darstellt.

nun die Städte, welche bei Namen genannt werden, ursprünglich tglieder der Attischen Symmachie sind, so folgt, dass es sich hier 1 Fälle handelt, in denen Städte dieser Categorie im Laufe des ieges von Athen abgefallen, von den Lakedämoniern in ihre Sym- uchie aufgenommen, später aber von den Athenern mit Waffengewalt eder unterworfen worden waren und sich zur Zeit der Friedens-

¹ Auch ich bin der Ansicht, dass die eingeklammerten Worte ein Glossem sind, dessen Beseitigung die vorhergehende Präposition mit Anastrophe zu schreiben Eine Wortfügung, wie die überlieferte, widerstreitet vollständig dem Gebrauch Attischen Urkundensprache.

verhandlungen in deren factischem Besitze befanden. Ganz klar die Sache in Bezug auf Skione und Torone. Erstere Stadt war kanntlich zwei Tage vor dem Abschlusse des Waffenstillstandes im Frühjahr 423 von Athen abgefallen, von Brasidas kraft seiner Vollmachten in die Lakedämonische Symmachie aufgenommen und trotz der Reclamationen von Athenischer Seite nicht herausgegeben worden; die Athener hatten daher noch während des Waffenstillstandes im Sommer desselben Jahres die Übergabe durch Gewalt zu erzwingen gesucht, die Stadt eingeschlossen und bis zur Zeit des Friedensschlusses blockirt gehalten. Bald darauf, im Sommer 421, mussten sie sich ergeben und ihre Bewohner wurden nach der Strenge des Kriegsrechts und auf Grund eines schon vor Eröffnung der Belagerung für diese Eventualität gefassten Volksbeschlusses behandelt (Thukydides 5, 32; vgl. 4, 122. *Ψήφισμά τ' εὐθὺς ἐποίησαντο, Κλέωνος ἡνώματι πεισθέντες Σκιωναίους ἐξελεῖν τε καὶ ἀποκτεῖναι*). Ähnlich verhält es sich mit Torone, welches Brasidas kurze Zeit vor dem Waffenstillstande zu Anfang von 423 genommen, als autonomes Mitglied der Lakedämonischen Symmachie anerkannt und durch eine Peloponnesische Besatzung gegen Wiedereroberungsversuche der Athener zu schützen übernommen hatte. Trotzdem erlag die Stadt im Herbst 422 den Angriffen Kleons; die Gefangenen wurden nach Athen geschafft und nach Abschluss des Friedens den Bestimmungen desselben gemäß behandelt, d. h. die Peloponnesier sofort entlassen, die Toronäer und Chalkidier (deren Städte den Frieden anzunehmen sich weigerter dagegen zurückbehalten und erst später an Olynth, mit dem der Kriegszustand fort dauerte, gegen Athenische Gefangene ausgewechselt (Thukydides 5, 3. *καὶ τῶν Τορωναίων γυναῖκας μὲν καὶ παῖδας ἡνδραποδίσαν αὐτοὺς δὲ καὶ Πελοποννησίους καὶ εἴ τις ἄλλος Χαλκιδίων ἦν, ζύμπαντας ἐπταχοσίους, ἀπέπεμψαν ἐς τὰς Ἀθήνας· καὶ αὐτοῖς τὸ μὲν Πελοποννησίον ὕσπερον ἐν ταῖς γενομέναις σπονδαῖς ἀπῆλθεν, τὸ δὲ ἄλλο ἐκομίσθη ὑπὸ Ὀλυνθίων ἀνὴρ ἀντ' ἀνδρὸς λυθεῖς*). Von Sermylia wird zwar Ähnliches nicht berichtet; aus Thukydides' Erzählung 1, 65 entnehmen wir nur, dass die Stadt zur Zeit des Beginns der Belagerung von Potidäa und kurz vor Ausbruch des Krieges noch zu Athen hielt, und auch aus dem Tributregister C. I. A. I. 255, welches dem Jahre Ol. 87, anzugehören scheint, hat der Name des Sermyliaer wahrscheinlich gestanden; aber von dem Schicksale der Stadt nach diesem Zeitpunkt finden wir in Thukydides' Darstellung der Kriegsgeschichte nicht das Mindeste verzeichnet. Trotzdem müssen wir, da unser Paragraph Sermylia mit Skione und Torone zusammenstellt und auf demselben Fusse behandelt, folgerichtig schliessen, dass es mit ihm genau ebenso stand, dass die Stadt also nach Ol. 87, 3, wahrscheinlich zur Zeit

Erfolge des Brasidas¹, wie jene von Athen abgefallen und zu den Lakedämoniern übergegangen war, aber etwas später und jedenfalls vor dem Beginn der Friedensverhandlungen von den Athenern wieder erobert worden war. Auch die anderen Städte, welche nach den genannten summarisch mit καὶ εἴ τινα ἄλλην πόλιν ἔχουσιν Ἀθηναῖοι bezeichnet werden, können unmöglich einer anderen Kategorie angehören, es können nicht Bundesstädte der Athener sein, welche den Athenern treu geblieben waren, sondern nur solche, welche durch Kriegsgewalt wieder in ihren Besitz gelangt waren, weil sonst sich nicht Kriegsgefangene aus ihnen in den Händen der Athener befinden konnten, und es müssen diese Städte bis zum Augenblicke ihrer Wiederunterwerfung Bundesgenossen der Lakedämonier gewesen sein, sonst das Schicksal der Gefangenen unmöglich Gegenstand einer gleichviel wie beschaffenen Stipulation zwischen Spartanern und Athenern hätte sein können; kurz, es sind eben alle anderen Städte, welche sich in ähnlicher Lage, wie die mit Namen aufgeführten, befinden, Städte also wie Potidaea, Mende und das von Brasidas eroberte, aber von Kleon wiedereroberte Thrakische Galepsos (Thukydides 5, 6). Man begreift vollständig, dass die Lakedämonier es ihrer politischen Ehre willen wünschen mussten, auf die Bevölkerung von Städten, gegen welche sie Verpflichtungen übernommen hatten, die sie aber jetzt mit ihrem Gebiete ihrem Schicksal zu überlassen sich genöthigt sahen, wenigstens die Wohlthat der allgemeinen Bestimmungen des vorhergehenden Paragraphen ausgedehnt zu sehen, ebenso, dass und warum die Athener einem solchen Ansinnen entsprechen ablehnen mussten. Wahrscheinlich ist, dass ein Verbot, welches bei den Verhandlungen von Seiten der Lakedämonier gemacht worden war, eine Berücksichtigung ihrer Wünsche in dieser Richtung zu erlangen, für die Athener Veranlassung war, nachdem sie an ihrem Widerstande gescheitert war, eine ausdrückliche Anerkennung ihres völlig freien Verfügungsrechtes zu verlangen, und in Folge davon die verlangte und zugestandene Declaration als Ergänzung den Bestimmungen, welche sich auf die Kriegsgefangenen bezogen, hinzugefügt wurde.

Nach Erledigung der materiellen Punkte blieb eine Anzahl herkömmlicher Formalien abzumachen. So folgen denn zunächst in einem ersten Abschnitte Bestimmungen über die Modalitäten der durch das Herkommen vorgeschriebenen Beschwörung des Vertrages durch die daran Betheiligten.

¹ Dass Sermylia in den Tributverzeichnissen von Ol. 88, 1 — 3 fehlt, hat meines Wissens ebenso wenig beweisende Kraft, wie in den übrigen oben hervorgehobenen. Schon vor dem Beginn des Krieges fehlt es einmal in dem Register von Ol. 85, 1 (C. I. A. I. 244).

ὅρκους δὲ ποιήσασθαι Ἀθηναίους πρὸς Λακεδαιμονίους καὶ τοὺς
 χους κατὰ πόλεις. ὁμνύντων δὲ τὸν ἐπιχώριον ὅρκον (ἐκάτε
 μέγιστον (ἐξ ἐκάστης πόλεως). ὁ δ' ὅρκος ἔστω ὅδε· ἐμμεν
 ξυνδήκαις καὶ ταῖς σπονδαῖς ταῖςδε δικαίως καὶ ἅ
 ἔστω δὲ Λακεδαιμονίοις καὶ τοῖς ξυμμάχοις κατὰ ταῦτά ὅρκ
 Ἀθηναίους. τὸν δὲ ὅρκον ἀνανεοῦσθαι κατ' ἐνιαυτὸν ἀμφοτέρους

Die Anordnung dieser Bestimmungen ist offenbar die, zunächst den Athenern die Verpflichtung, den Vertrag zu besch aufgelegt und die Modalitäten der Eidesleistung für diese fest werden, alsdann die Lakedämonier und ihre Bundesgenossen z selben Leistung, und zwar in der für den Eid der Athene geschriebenen Form (κατὰ ταῦτά) verpflichtet erklärt werden. hieraus folgt mit Nothwendigkeit, dass die eingeklammerten ¹ welche den Inhalt der betreffenden Bestimmung in unzulässiger vgreifend generalisiren, aus dem Text zu entfernende junge Gk sind. Überdem enthält der zweite Zusatz, welcher in der lieferten Gestalt völlig sinnlos ist, selbst wenn ihm seine ursprün Fassung, sei es ἐξ ἐκάστης πόλεως (ULLRICH), sei es ἐξ ἐκάστης (STAHL), wiedergegeben wird, immer nur die Angabe einer *That* nicht eine Bestimmung, welche Gegenstand vertragsmässiger stellung hat gewesen sein können. Allerdings ist unser *Fr* vertrag nach Ausweis des Anhangsprotocolles (cp. 19) von 1⁷ dämoniern und 17 Athenern beschworen worden; allein die hat sich zufällig und unbeabsichtigt nebenher in der *Weise* , welche weiter unten aufzuzeigen versucht werden soll, un ihre Beschaffenheit lehrt, dass sie gar nicht im Voraus *normir* sein kann. Vielmehr entnahm der Interpolator die *Zahl* Angaben des Protocolles, und der ursprüngliche *Wortlaut* stimmung war einfach in allgemein gehaltener Fassung ὁ τὸν ἐπιχώριον ὅρκον τὸν μέγιστον, wozu nur zu bemerken, dass der ἐπιχώριος ὅρκος ὁ μέγιστος, welcher bei der *Beschwörung* tragen zur Anwendung zu kommen pflegte, der bei *Zeu* und Apollon war; vgl. die von Fränkel im *Hermes* 13, 460 gestellten Belege.

Es folgt eine Bestimmung über die Publication d urkunde in der herkömmlichen Form:

στήλας δὲ στήσαι Ὀλυμπίασι καὶ Πυθοῖ καὶ Ἰσθμῷ (Ἀθήναις (l. Ἀθήνησι) ἐν πόλει καὶ ἐν Λακεδαιμόνι ἐν

Dass die Aufstellung von Exemplaren der *Urkur* Athen und Lakedämon auch in Delphi, Olympia und au angeordnet wird, hat, wie bereits oben bemerkt word Grund lediglich darin, dass der Vertrag in seinem *er*

iligthümer der genannten drei Orte betreffende Festsetzungen thält.

Den Schluss der eigentlichen Urkunde bildet sodann eine Variation r bekannten Formel, durch welche den den Vertrag abschliessenden rtheilen das Recht vorbehalten wird, unbeschadet des geleisteten Eides iter nach gemeinschaftlichem Übereinkommen nöthig erscheinende nderungen vorzunehmen und Zusätze zu machen:

εἰ δέ τι ἀμνημονοῦσιν ὁποτεροιοῦν καὶ ὅτου (l. ὅτουσιν) πέρι, λόγοις δικαίοις χρωμένοις εὖορκον εἶναι ἀμφοτέροις ταύτη μεταθεῖναι, ὅπῃ ἂν δοκῇ ἀμφοτέροις, Ἀθηναίοις καὶ Λακεδαιμονίοις.

Dass bei dieser Gelegenheit neben den Lakedämoniern nicht auch er Bundesgenossen als solcher, deren Zustimmung erforderlich sein lte, ausdrücklich Erwähnung geschah, wurde von den Peloponnesern übel vermerkt und rief arge Verstimmung hervor; vgl. 5, 29 — καὶ Λακεδαιμονίους ἅμα δι' ἐργῆς ἔχοντες, ἐν ἄλλοις τε καὶ ὅτι ἐν ταῖς σπονδαῖς ταῖς Ἀττικαῖς ἐγγράπτο εὖορκον εἶναι προσθεῖναι καὶ ἀφελεῖν ὅ τι ἂν φαῖν τοῖν πολέοιν δοκῇ, Λακεδαιμονίοις καὶ Ἀθηναίοις. τοῦτο γὰρ τὸ γράμμα λιστα τὴν Πελοπόννησον διεδορύθει u. s. w.

Es folgt im 19. Capitel ein dem Texte der Vertragsurkunde anhängtes Protocoll, dessen erster Theil das Datum fixirt, von welchem der auf fünfzig Jahre abgeschlossene Friede laufend angenommen werden soll, und zwar nach Lakedämonischem und Attischem Calender, aus wie dies in dem entsprechenden Theile der Waffenstillstands-urkunde 4, 119 ebenfalls geschieht:

ἄρχει δὲ τῶν σπονδῶν¹ ἔφορος Πλειστόλας Ἀρτεμισίου μηνὸς τετάρτη φθίνοντος, ἐν δὲ Ἀθήναις ἄρχων Ἀλκαῖος Ἐλαφειβολιῶνος μηνὸς ἕκτη φθίνοντος.

Der zweite Theil beurkundet in herkömmlicher Form die That-ache der vollzogenen Beschwörung des Vertrages durch die Lakedämonier und Athener und zählt die Namen derjenigen Personen auf, welche dabei als Eidschwörer von beiden Seiten fungirt haben:

ὠμνουν δὲ οἷδε καὶ ἐσπένδοντο, Λακεδαιμονίων μὲν Πλειστο[άναξ, Ἄγις, Πλειστό]λας, Δαμάγηνος, Χίωνις, Μεταγένης, Ἀκανθοῦ, Δαίδος, Ἰσχαγόρας, Φιλοχαρίδας, Ζευξίδας, Ἀντιππος, Τέλλις, Ἀλκινάδας, Ἐμπεδίας, Μηνᾶς, Λάφιλος, Ἀθηναίων δὲ οἷδε: Λάμπων, Ἰσθμίωνικος, Νικίας, Λάχης, Εὐθύδημος, Προκλῆς, Πυθόδωρος, Ἄγων, Μυρτίλος, Θρασυκλῆς, Θεαγένης, Ἀριστοκράτης, Ἰώλκιος, Τιμοκράτης, Λέων, Λάμαχος, Δημοσθένης.

¹ Beiläufig stelle ich zur Erwägung, ob nicht an dieser Stelle die Worte ἐν Λακεδαιμονίᾳ als durch Schreibernachlässigkeit ausgefallen anzunehmen sind; mir scheint sie nicht wohl entbehrt werden zu können.

Abgesehen von einzelnen bedeutungslosen Schwank Schreibung einiger Namenformen und den in eckige Klammer Buchstaben, welche an unserer Stelle in den Handschrift ist dieses Verzeichniss identisch mit dem der Eidschwörer a des etwas späteren Bundesvertrages 5, 24. Jene Buchs daher mit Recht von Arnold als durch Versehen ausgefalle vollständigeren zweiten Verzeichnisse ergänzt worden, da d vertrag selbst 5, 23 ausdrücklich anordnet: ὁμοῦνται δὲ καὶ τὰς ἄλλας σπονδὰς ὥμνουν ἑκατέρων. Die äussere Veranlassu Versehen ist überdem augenfällig.

Hiernach ist also der Vertrag von den Lakedämoniern un thatsächlich beschworen worden, wie dies auch von Thukyd am Schlusse von Capitel 17 ausdrücklich angegeben wird δαίμονιοι — ποιοῦνται τὴν ξύμβασιν καὶ ἐσπείσαντο πρὸς τοὺς Ἄ ὥμοσαν, ἐκεῖνοί τε πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους. Ob, wie es die Al weitere Eidesleistungen zwischen den Athenern und denjenig genossen der Lakedämonier stattgefunden haben, welche d zugestimmt hatten, wissen wir nicht; dass der Schluss der I formel der Vertragsurkunde καὶ ὥμοσαν κατὰ πόλεις das in ke bezeugen könne, ist bereits oben ausgeführt worden. M dass die Bestimmungen des Vertrages auch nach dieser Ri nicht oder nicht vollständig zur Ausführung gelangt sind; hat das von Thukydides benutzte Exemplar der Urkunde k gung sonstiger Eidesleistungen enthalten und sind wir il licher Auslassungen zu zeihen absolut durch gar nichts be

Alle Spuren führen darauf hin, dass nicht nur die verhandlungen in ihren letzten Stadien in Sparta gefüh sind und hier der Abschluss des Friedens erfolgt ist, so auch die Beschwörung desselben, wie durch die Lakedä durch die in Sparta anwesenden athenischen Unterhändler der ihnen dazu ertheilten Vollmacht in Sparta stattgefu Die wunderliche Zahl von siebzehn Eidschwörern auf bei welche in Attischen Institutionen oder Gepflogenheiten jede begründet ist, lässt sich entweder so erklären, dass angenor es sei im Laufe der Verhandlungen die Zahl der nach Sparta Attischen Unterhändler zufällig auf die von vornherein beabsichtigte Zahl von siebzehn allmähig gestiegen, die G derselben sei alsdann nach Abschluss der Verhandlunge schwörung des Vertrages beauftragt worden und ihr dann

¹ Vgl. die Bemerkungen von KOEHLER zu C. I. A. I. 45 in den des deutschen archäologischen Instituts zu Athen 1, 171 f.

l von Eidschwörern von Spartanischer Seite gegenüber gestellt den, oder, dass die Zahl von siebzehn Eidschwörern in Spartanischem Herkommen ihren Grund hatte und desshalb von Athenischer dieselbe Zahl beliebt wurde. Letztere Annahme scheint mir einen höheren Grad von Wahrscheinlichkeit für sich zu haben. Von

Namen des Verzeichnisses der Lakedämonier sind nämlich die ersten, Pleistoanax und Agis, die der damals regierenden Könige, der dritte, Pleistolas, der des Obmannes der Ephoren (vgl. vorhergehenden Paragraphen unseres Protocolles und Thukydides 5, sowie Xenophon Hell. 2, 3: 10), so dass es nahe liegt, in den folgenden vier die der übrigen Mitglieder des Ephorencollegiums auszusetzen. Es bleiben alsdann die Namen von zehn Personen, von denen Tellis als der Vater des Brasidas bekannt ist (Thukydides 5, 29), Ischagoras, Philocharidas und Menas gleich darauf 5, 21 als mit einer Mission nach Thrakien beauftragt erwähnt werden;¹ wir mögen unbedenklich als eine Vertretung auffassen, über deren Veranlassung und Beschaffenheit eine Vermuthung aufzustellen ich mir allerdings nicht erlaube, deren Zahl aber immerhin eine gewöhnliche und keiner Weise auffällige ist. Auf jeden Fall setzt sich die Gesamtzahl von siebzehn für Sparta aus den Factoren 2 + 5 + 10 zusammen. Diese lässt sich aus der Beschaffenheit der politischen Institutionen des Staates genetisch erklären, wenn auch gerade nicht als nothwendig erweisen, während eine solche Möglichkeit für Athen nicht besteht.

Wie aus den Bestimmungen der Urkunde selbst hervorgeht, lag in der Absicht der den Vertrag abschliessenden Parteien, Abschriften derselben, ausser in Sparta und Athen, auch in Olympia, Delphi und auf dem Isthmus auf steinernen Stelen aufstellen zu lassen. Allein von Olympia und dem Isthmus betrifft, so kann die beabsichtigte Aufstellung an diesen Orten nie zur Ausführung gekommen sein, da diese betreffenden Heiligthümer, auf den Gebieten von Elis und Korinth gelegen, unter der Prostatie von Staaten standen, welche den Beitritt zu einem Frieden hartnäckig verweigerten und darum eine öffentliche Anerkennung desselben an ihrem Einflusse unterstehenden Orten des eigenen Gebietes niemals zugegeben haben werden. Dagegen ist

¹ Ischagoras erscheint schon früher 4,132 als mit der Zuführung von Verstärkungen für Brasidas beauftragt, Philocharidas 4,119 im Anhangsprotocoll der Urkunde einer der drei Lakedämonischen Gesandten, und später noch einmal 5,44 in derselben Eigenschaft, und zwar als eine den Athenern genehme Persönlichkeit.

denkbar, dass die Aufstellung einer Stele zu Delphi keinen Schwierigkeiten begegnete und nicht zu bezweifeln, dass sie in Lakedämonien Athen zur Ausführung gelangte. Für Athen ist die Existenz solcher Stele im Winter von 419/18 sogar durch Thukydides bezeugt, 5, 56: Ἀθηναῖοι δὲ Ἀλκιβιάδου πείσαντος τῇ μὲν Λακωνικῇ στήλῃ ὑπέγραψαν ὅτι οὐκ ἐνέμειναν οἱ Λακεδαιμόνιοι τοῖς ὅρκοις, Πύλον u. s. w., denn nur die Stele des Friedensvertrages, nicht des etwas später abgeschlossenen Bündnissvertrages kann gemeint sein, vorausgesetzt, dass nicht beide Urkunden auf derselben Stele nach einander eingetragen waren, was indessen immerhin möglich wäre. Von den drei sonach öffentlich aufgestellt und allgemein zugänglichen Exemplaren der Urkunde waren das Delphische und das Spartanische, so gut wie das Original letzteren im Spartanischen Staatsarchiv, sicher nicht in Attischer Manuskriptart abgefasst, woraus, da die von Thukydides benutzte Abschrift Attische Fassung zeigt, unmittelbar folgt, dass diese Abschrift in Athen stammen muss und entweder von dem Original im Attischen Staatsarchiv, oder dem auf der Burg aufgestellten Steinexemplar genommen worden ist.

Nach Feststellung dieser Thatsache können wir uns der Lösung der Frage zuwenden, wann und auf welchem Wege der Geschichtsschreiber in den Besitz der von ihm benutzten Abschrift unserer Urkunde gelangt ist. Als der Friede geschlossen wurde, hatte Thukydides seine Vaterstadt bereits verlassen und lebte seit geraumer Zeit in der Verbannung. Rührt also die Abschrift von ihm her, so kann sie erst nach seiner Rückkehr in die Heimath, nach dem Ende des Krieges, genommen sein; lässt sich das nachweisen, dass sie schon vor dieser Zeit ihm zur Verfügung gestanden hat und von ihm benutzt worden ist, so muss angenommen werden, dass sie von anderer Hand gefertigt und ihm durch Vermittelung seiner Freunde von Athen aus zugegangen ist. Ich glaube nun, dass Indicien genug vorhanden sind, welche uns berechtigen, uns für die erste der beiden Möglichkeiten zu entscheiden.

Die Darstellung der Ereignisse unmittelbar nach dem Friedensschlusse, welche wir vom 21. Capitel des fünften Buches an vorfinden, verräth an mehreren Stellen deutlich eine Kenntniss des Inhalts auch des Wortlautes der Urkunde. Am unzweifelhaftesten tritt uns entgegen in der bereits oben ausgehobenen Stelle 5, 29, wo sich auf den Schlussparagraphen der Urkunde in einer Weise bezieht, welche die Annahme unvermeidlich macht, dass bei Niederschrift derselben der Wortlaut jenes Paragraphen vorgeschwebt habe.

auch, wenn 5, 27 (ἐπεὶ γὰρ αἱ πεντήκοντούτεες σπονδαὶ ἐγένοντο

ὕστερον ἢ ζυμμάχια) und 5, 32 (τάς τε δεχήμερους ἐπισπονδάς, αἱ ἦσαν Ἀθηναίους καὶ Βοιωτοῖς πρὸς ἀλλήλους οὐ πολλῷ ὕστερον γεγόμεναι [τούτων] τῶν πενηκοντούτιδων σπονδῶν) der Nikiasfriede schlechtweg als der funfzigjährige bezeichnet wird, ist klar, nicht nur dass dem Geschichtsschreiber die die Dauer des Friedens betreffende Bestimmung des Vertrages bekannt war, sondern auch, dass er bei seinen Lesern die gleiche Kenntniss voraussetzt, woraus folgt, dass, da eine Angabe darüber in seinem eigenen Berichte vom Friedensschlusse sich nirgends findet, die Thatsache also nur aus der eingelegten Urkunde selbst zu entnehmen war, das Actenstück an der Stelle, an welcher wir es jetzt lesen, bereits wirklich eingefügt oder doch eingefügt zu werden bestimmt war, als die Stellen des fünften Buches niedergeschrieben wurden. Endlich verräth gleich 5, 21 die Angabe Λακεδαιμόνιοι δὲ — τοὺς τε ἄνδρας εὐδὺς τοὺς παρὰ σφίσιν αἰχμαλώτους ἀφίεσαν καὶ πέμψαντες ἐς τὰ ἐπὶ Θράκης πρέσβεις — ἐκέλευον τὸν Κλεαρίδαν τὴν Ἀμφίπολιν παραδόναι τοῖς Ἀθηναίοις, καὶ τοὺς ἄλλους τὰς σπονδάς, ὡς εἴρητο ἐκάστοις, *δεχεσθαι* genaue Bekanntschaft mit den Specialbestimmungen des Friedensvertrages, wie denn überhaupt die nun folgende Darstellung der Versuche, diese Bestimmungen zur Ausführung zu bringen, eine Kenntniss von denselben beim Darsteller selbst wie auch seinen Lesern zur nothwendigen Voraussetzung hat. Nun ist es aber eine Thatsache, welche meinem Urtheile nach einem begründeten Zweifel überhaupt nicht unterliegen kann und darum auch bisher noch von jedem besonnenen Forscher auf diesem Gebiete anerkannt worden ist, dass das fünfte Buch vom 25. Capitel an von Thukydides nach dem Ende des Krieges niedergeschrieben worden ist, und ich glaube für meine Person, dass das Gleiche von den Kapiteln 21—24 ohne Schwierigkeit erwiesen werden kann. Wenn also die Darstellung in diesen Partien Bekanntschaft mit der Urkunde verräth, so folgt daraus doch noch keinesweges, dass diese Kenntniss aus einer älteren Zeit, als der Rückkehr des Geschichtsschreibers nach Athen datirt und dass sie als eine durch Gefälligkeit eines Dritten vermittelte gedacht werden müsste.

Streitig dagegen ist bekanntlich die Abfassungszeit derjenigen Theile des Werkes, welche die Geschichte des zehnjährigen Krieges enthalten, und damit der 20 ersten Capitel des fünften Buches, vor deren letztem die Urkunde selbst eingelegt ist. Indessen welche Stellung man auch immer zu dieser Frage einzunehmen geneigt sein mag, auf welche näher einzugehen hier nicht der Ort ist, davon wird, denke ich, bei unbefangener Betrachtung sich Jedermann unschwer zeugen können, dass die Urkunde keinen organischen und nothwendigen Bestandtheil der Darstellung bildet, in welche sie jetzt eingefügt

erscheint, ja dass sie den ursprünglichen Zusammenhang derselben in auffälliger und wahrnehmbarer Weise unterbricht. Denn die Capitel 17 und 20 stellen nach Form und Inhalt einen ununterbrochenen Zusammenhang dar und geben einen zwar summarischen, aber im Ueberflusse vollständigen Bericht über den Gang der Friedensverhandlungen, auf Grund derselben vereinbarten Friedensbedingungen, die Form des Friedensschlusses und die Zeit des letzteren, an welche abschliessende Angabe eine Berechnung der Dauer des durch diesen Frieden beendigten zehnjährigen Krieges angeknüpft wird. Der erste Theil dieses Berichtes bis zum Ende des 17. Capitels ist ferner augenscheinlich nicht der Grund einer Kenntniss der Urkunde entworfen, sondern beruht, schon oben hervorgehoben wurde, auf von dieser unabhängigen, vollständigen Informationen, welche dem Geschichtsschreiber aus andrer Quelle zugegangen waren; aber auch die Datirung zu Anfang des 20. Capitels: αὗται αἱ σπονδαὶ ἐγένοντο τελευτῶντος τοῦ χειμῶνος ἀμὰ τῇ Διονυσίῳ εὐθὺς τῶν ἀστικῶν kann nicht der Urkunde entnommen werden. Denn diese Datirung setzt, wie man sieht, die Zeit des Abschlusses des Friedensvertrages genau in die Mitte des Attischen Monats phrebolion, während die Urkunde als den Tag, von welchem an auf funfzig Jahre geschlossene Friede als zu Recht bestehend berechnet werden sollte, vielmehr die ἑκτῇ φθίνοντος desselben Monats bezeichnet, mithin ein Datum gibt, welches dem Ende des Monats näher liegt, als dessen Mitte. Wer aber auch geneigt sein sollte, die starke Abweichung beider Angaben von einander durch die Annahme zu erklären, dass jede von ihnen sich auf einen verschiedenen Zeitpunkt beziehe, indem zwar die σπονδαὶ und die Ableistung der Ratificationseides durch Lakedämonier und Athener um die Mitte des Monats Statt gefunden hätten, der Anfang aber des in Aussicht genommenen funfzigjährigen Friedenszustandes aus irgend welchen Gründen auf einen etwas späteren Termin verlegt worden sei, der wird doch gerade durch diese Annahme erst recht sich genöthigt sehen, zuzugestehen, dass die eine Datirung nicht aus der anderen als von derselben Quelle abgeleitet werden kann. Kein anderes Resultat ergibt sich, als die andere, an sich mögliche Annahme, welche ich für meine Person die allein richtige halte¹, dass nämlich, wie gewöhnlich, so auch in dem vorliegenden Falle, der Tag der Vollziehung der σπονδαὶ gleich der des Beginnes des Friedenszustandes war, von welchem die Zeitdauer des letzteren laufend angenommen wurde, und folglich

¹ Ich glaube nämlich nicht, dass es Thukydides sich würde haben einfallen lassen, die Dauer des ersten Abschnittes des Krieges bis zur Vollziehung der σπονδαὶ statt bis zum stipulirten Beginne des Friedenszustandes zu berechnen, auch wenn beide Zeitpunkte nicht zusammengefallen wären.

Angaben trotz ihrer auffälligen Differenz dasselbe Datum meinen müssen. Denn in diesem Falle ist die Angabe im 20. Capitel gegenüber der unbedingt zuverlässigen der Urkunde die weniger genaue und die Abweichung zugleich eine so starke, dass die Möglichkeit der Annahme ausgeschlossen scheint, die weniger genaue Datirung sei aus der urkundlichen abgeleitet und Thukydides habe die Urkunde bereits gekannt und benutzen können, als er den Anfang des 20. Capitels niederschrieb. Überdies kommt die zweite Datirung nach der ersten sehr unerwartet und erscheint im jetzigen Zusammenhang gar nicht motivirt, da sie sich in der Form nicht als eine Wiederaufnahme der ersten, sondern als neues und selbständiges Moment der Darstellung einführt. Alles dies legt die Vermuthung nahe, dass der Geschichtsschreiber noch keine Kenntniss von der Urkunde besass, als er die Darstellung der Ereignisse, welche in den Capiteln 1—17 und 20 des fünften Buches enthalten ist, zuerst niederschrieb, und das ihm erst später bekannt gewordene Document nachträglich als eine Ergänzung und zwar zunächst in ziemlich äusserlicher Weise eingelegt hat, in Folge dessen es unterlassen worden ist, die nunmehr sich ergebenden formalen und sachlichen Unebenheiten in der erforderlichen Weise auszugleichen. Es kommt hinzu, dass auch die Anfügung der Urkunde an das ihr jetzt vorangehende 17. Capitel eine durchaus lose und oberflächliche ist, bewerkstelligt durch die einfache Hinzufügung eines gar nicht erwarteten *τάδε*, durch welche der Schlusssatz des Capitels eine Fassung erhalten hat, welche durchaus nicht den Eindruck macht, als sei sie in dieser Form gleich ursprünglich beabsichtigt gewesen: *(οἱ Λακεδαιμόνιοι) ποιοῦνται τὴν ξύμβασιν, καὶ ἐσπείσαντο πρὸς τοὺς Ἀθηναίους καὶ ὤμωσαν, ἐκεῖνοί τε πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους, τὰδε*. Jeder Zweifel aber, der in dieser Beziehung noch obwalten könnte, wird meines Erachtens gründlich beseitigt durch den Umstand, dass die Urkunde eine Reihe von Thatfachen der Kriegsgeschichte erwähnt oder voraussetzt, welche von Thukydides in seiner Darstellung übergangen worden sind. Als solche Thatfachen hat die vorstehende Analyse der Urkunde die folgenden festgestellt: 1. Die Besetzung und Behauptung des seiner Lage nach nicht näher bekannten Pteleon durch die Athener; 2. den Abfall von Sermylia und seine Wiedereroberung durch die Athener; 3. den Wiederanschluss der durch Brasidas gewonnenen Städte der Akte, Thyssos, Olophyxos u. s. w., an Athen zur Zeit der Expedition Kleon's gegen Amphipolis. Hätte die Urkunde bereits einen Bestandtheil desjenigen Quellenmaterials gebildet, unter dessen Benutzung die Geschichte der letzten Kriegsjahre in der uns vorliegenden Form niedergeschrieben wurde, so würde es völlig unerklärlich sein, dass der betreffenden Ereignisse in derselben keine Erwähnung

gethan ist, man müsste denn annehmen wollen, wozu ich für meine Person mich nicht entschliessen mag, dass Thukydides seine Quellen in leichtfertiger und oberflächlicher Weise benutzt, und darum nicht eigentlich ausgenutzt habe. Dagegen lässt sich unschwer begreifen, wie es geschehen mochte, dass eine in Folge der Mangelhaftigkeit der benutzten Quellen unvollständige oder lückenhafte, aber form abgeschlossene Darstellung auch dann nicht vervollständigt wurde, wenn eine dem Verfasser erst später bekannt gewordene und selbst ihrem Wortlaute nach nachträglich eingelegte Urkunde dazu die Möglichkeit und die Veranlassung bot: entweder diese Möglichkeit wurde, was unter solchen Umständen durchaus erklärlich ist, überhaupt nicht bemerkt, oder, wenn dies dennoch der Fall war, die nunmehr notwendig gewordene Überarbeitung der ursprünglichen Darstellung wurde, wenn auch ins Auge gefasst, doch aus irgend welchen äusseren Gründen nicht in Angriff genommen oder nicht zu Ende geführt.

Ist aber die Urkunde Thukydides wirklich erst bekannt geworden, nachdem er die Erzählung der Ereignisse, welche sich in den letzten Jahren vor dem Frieden des Nikias zugetragen hatten, bereits schriftlich fixirt hatte, und erst nachträglich als Ergänzung einer viel früher abgeschlossenen Darstellung eingefügt worden, so liegt auch kein Grund vor, der uns nöthigte anzunehmen, dass dies vor seiner Rückkehr nach Athen und dem Ende des Krieges geschehen sei: die natürlichste Annahme bleibt im Gegentheil die, dass er sie nach diesem Zeitpunkte kennen lernte, wo sie ihm in der Heimath direct und ohne jede Vermittelung eines Dritten in der einen oder anderen Weise zugänglich sein musste und darum schwerlich entgehen konnte.

Zum Schlusse will ich, um ganz ehrlich zu sein, nicht unterlassen ausdrücklich anzuerkennen, dass die Auffassung des Sachverhaltes, welche im Vorstehenden zu begründen versucht worden ist, allerdings vortrefflich zu derjenigen Vorstellung von der Entstehungsweise der überlieferten Fassung des ersten Theiles des Thukydideischen Geschichtswerke stimmt, welche ich für die richtige halte und nach welcher dieser Theil (bis 5, 20 einschliesslich) geraume Zeit vor dem Ende des Krieges entworfen worden ist, nach dem Ende desselben aber eine Überarbeitung erfahren hat, welche dem Verfasser in der beabsichtigten Weise zu vollenden und abzuschliessen nicht beschieden sein sollte.

Ausgegeben am 9. November.

1882.
XLIII.

SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

9. November. Sitzung der philosophisch-historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. MOMMSEN.

1. Hr. CURTIUS las: Die Griechen in der Diaspora.
Die Mittheilung folgt umstehend.
2. Hr. MOMMSEN legte eine Abhandlung von Hrn. K. E. ZACHARIAE
VON LINGENTHAL in Grosskmehlen vor: Zur Geschichte des Authent-
ticum und der Epitome Novellarum des Antecessor Julianus.
Die Mittheilung wird in diesen Berichten erscheinen.

Die Griechen in der Diaspora.

Von E. CURTIUS.

Man hat die Geschichte der Hellenen innerhalb und ausserhalb Hellas von allen Seiten durchforscht, aber ein Capitel derselben ist noch nicht zusammenhängend behandelt, d. i. die sporadische Ausbreitung griechischen Volks ausserhalb seines Heimathsbezirks, die der Colonisation vorangegangen ist und neben ihr fortbestanden hat. Sie gehört grösstentheils einer prähistorischen Periode an, aber sie ist reichlich und mannigfach bezeugt, durch neuere Funde neu beleuchtet; ihr Verständniss ist für die Culturgeschichte des Mittelmeers unerlässlich und es handelt sich um eine Reihe von Thatsachen, die nur in Zusammenhänge beurtheilt werden können, um manche unrichtige Vorstellungen zu berichtigen. Denn man denkt noch immer: Wo eine griechische Stadt, auch kein Griechenvolk: man sieht Philhellenismus, Blutsverwandtschaft vorhanden ist; man begegnet noch immer der Stadt, als wenn die Colonisation der Anfang griechischen Einflusses ausserhalb der Heimat sei und der letzte Platz einer Colonienreihe die Grenze, griechische Ansiedelung und griechischer Einfluss plötzlich aufhöre. Die Stadtgründung ist vielmehr der Schluss einer langen Arbeitszeit, welcher der Völkerverkehr begründet und der Same ausgestreut worden ist, ein Abschluss, wie er nur in günstigsten Fällen gelingt. *Λις οὐ τῶν τυχόντων*; sagt Aristoteles, d. h. nicht die Ersten, Besten setzen ein Gemeinwesen zu Stande; nicht aus jedem Abenteurer erwächst eine Bürgerschaft. Die Geschichte verzeichnet die häufigsten Erfolge. Aber wir kennen doch den Schreckenstag von Sicily; wir kennen die Verwilderung der fremden Ansiedler in Sardinien und Illyrien und selbst den Namen dessen, der den ersten fehlten Versuch machte, Sinope zu gründen.¹

Die Colonien sind zu Stande gekommen, nachdem durch Anwesenheit vieler Generationen der Gegensatz von hien und drüben aufgehoben war und das trennende Meer wie ein eigenes, *θάλασσα οἰκεία*, angesehen werden konnte. Auch pflegte man damit

¹ Skymnos Ch. 948.

nicht über diejenigen Breiten hinauszugehen, wo die Hellenen, ~~wo~~ ihrer Vegetation umgeben, nach hellenischer Weise leben konnten während der Handel gerade solche Gegenden aufsuchte, die von ~~den~~ Heimathländern grundverschieden sind und ihre Mängel ergänzen konnten, wie die Deltaländer nordischer Ströme.

Die Vorzeit der Colonisation ist also die inhaltreichste Entwicklungsperiode, wo es sich um die Geschichte von Seevölkern und Binnenmeeren handelt. Was wüssten wir von den Normannen, wenn wir nur ihre einzelnen Reichsgründungen kannten und nichts von ~~den~~ Vikingerzügen wüssten, durch die sie des Meeres Herren wurden, und wie mangelhaft wäre gar unsere Kenntniss von der Geschichte des baltischen Meers, wenn wir die Städte der Hanseaten auf ~~den~~ Inseln und Küsten ins Auge fassten, aber nicht die kleineren Stationen, Stapelplätze und Verkehrsmärkte!

Ich denke nicht daran, die grosse Lücke, welche in der alten Geschichte der Mittelmeerküsten vorhanden ist, ausfüllen zu wollen. Ich bescheide mich, für diese Aufgabe einige Gesichtspunkte aufzustellen. Sie kann nur allmählich gelöst werden. Es kommt aber durch monumentale, linguistische, botanische Untersuchungen immer neues Material zusammen, und seit 50 Jahren mehrten sich ununterbrochen die Zeugnisse griechischer Cultur in Gegenden, die keine Colonialgebiete waren, die *vestigia graeci moris*, wie sie Justinus am ganzen Rande Italiens anführt.

Die Anfänge der Diaspora gehören einer Zeit an, da die Völkernschaften noch keine geschlossene und ausgeprägte Nationalität bildeten, und das der sporadischen Ausbreitung Charakteristische liegt darin, dass es Stämme sind, die ohne einen festen Ausgangspunkt und bestimmte Ziele in gewissen Richtungen sich bewegen und die Grenzen des Heimathsbezirks überschreiten.

Der älteste uns bekannte Schauplatz griechischen Seevolks ist aber der Archipelagus, den die Griechen als Ionier sich zu eigen gemacht haben. Die ionische Panegyris auf Delos ist die erste Thatsache, die aus der Vorzeit in die Geschichte hereinreicht. Wer nur einmal das Inselmeer durchfahren hat, kennt die Unmöglichkeit durch dasselbe eine Grenzlinie zu ziehen, welche als Völkerscheid dienen könnte, und schon Böckh hat in seinen Forschungen über die Alterthümer von Delos es für undenkbar erachtet, dass diese Amphiktyonie einer nachhomerischen Zeit angehören und als Resultat der Wanderung anzusehen sei, der die Zwölfstädte Ioniens ihren Ursprung verdanken.

In den griechischen Seebezirk haben die Karer und Theile derselben zeitweise überschwemmt.

los war man überrascht, so viele Gräber zu finden, die sich ihre Einrichtung von den andern herkömmlichen unterschieden. Der stammfremden Völkerschaft angehören mussten.

Die Ausdehnung des Seebezirks erfolgte nach Süden, den vorwärtigen Winden und Strömungen gemäss. Stephanos kennt das Meer zwischen Gaza und Aegypten und der Geograph, den er excerptirt, bezeichnet es von Aegypten an als Westgrenze des asiatischen Continents. Vom tyrischen Strande lässt Euripides die ionischen Frauen nach Böotien gelangen, und Cypern, das der griechischen Stamm- und Sprachgebiete wieder zugehört, spiegelt sich nach Claudian mit seinen Bergen in ionischem

nähe die Küsten des Peloponneses, des Ἰόνιον Ἄργος, folgen wir den Seefahrenden Ionier bis Illyrien hinauf, von dem ein Theil der Einwohner Ἰόνται und Ἰωνικοί. Wenn Himerios, der die alten Ionier preisend (Or. XI), von ihnen sagt: »sie haben das ägäische Meer Bahn gemacht und das ionische Meer als der Siciliens durchfahren«, so findet er in dem Namen eine Analogie an die Entdeckungsfahrten der Chalkidier; die Alten also, die den Namen des ionischen Meers für die beiderseitigen Seegegenden gebrauchten, zweifelten nicht an dem Zusammenhange des Namens mit dem Namen der Westsee, welcher sich schon zu klassischer Zeit bis an die Pomündung erstreckte. Das von grammatischem Standpunkt aus gegen den Zusammenhang erhobene Bedenken, wie ich glaube, durch den Nachweis erledigt, dass von zweifellos zwei Parallelbildungen ausgehen und neben der eine kürzere Form bestand, welche durch Ἰόν und Ἰόντι gebildet wird.

Als ich 1856 die Vorzeit des griechischen Seevolks, dem die Seefahrt angehört, aufzuklären suchte, wies ich darauf hin, wie festere Grundlagen für die Anfänge griechischer Seefahrt nur aus den Annalen der Mittelmeervölker zu gewinnen seien, und, nachdem damals ersten Anknüpfungen versucht worden waren, sind nun, einstweilen noch in spärlichem Masse, die Urkunden Aegyptens aufgeschlossen, in die ersten Zeiten des neuen Reichs zurückgehen. Seestämme, deren Namen sind darin an das Licht getreten, deren Nennung zum Male die Möglichkeit giebt, die Anfänge hellenischer Völkerkunde durch auswärtige Reichsannalen aufzuhellen.

Die von Rougé 1867 begonnenen Untersuchungen sind noch in Gange, und es steht mir nicht zu, den Grad von Sicherheit

zu bestimmen, mit dem die mannigfachen Völkernamen in den glyphischen Texten gelesen und mit klassischen Namen zu gestellt sind. Es kann nicht fehlen, dass neue Texte neu verbreiten werden. Einstweilen ist aber zu constatiren, dass den Ergebnissen, welche auf Grund der Forschungen von ROCHABAS MASPERO in seiner Geschichte der morgenländischen zusammengestellt hat, und dem auch deutsche Forscher unbedingte Zustimmung¹, ausser den Shardana die Dardaner und Turasier sichersten unter den Stämmen nachgewiesen sind, die zur Zeit der Ramessiden vom Seestrande in ägyptisches Reichsgebiet einströmten sind. Sie treten nicht als selbstständige Macht auf, sondern als von Abenteurern, die sich gelegentlich zu kriegerischen Unternehmungen anwerben lassen, und es stimmt durchaus zur griechischen Überlieferung, dass es die Libyer sind, welche sie gegen die Pharaonen gebieten denn mit der libyschen Küste finden wir die Seestämme des ägäischen Meeres in uraltem Zusammenhange. Der von Allen am wenigsten angefochtene Name der Dardaner, die unter Ramses II. bestätigt aber, was wir bei einem Anstrich an der Strömung des Hebräer ansässigen, früh entwickelten Volke voraussetzen mussten, nämlich unter den Küstenvölkern des ägäischen Meeres zu den ersten gehören, welche am frühesten Seefahrer geworden sind, wie von griechischer Seite durch die vielbesungenen Raubzüge troischer Helden bezeugt wird.

Konnten sie aber im vierzehnten Jahrhundert an fernerer Thätigkeit in die Geschichte eingreifen, so mussten sie von älteren Völkern das Seehandwerk erlernt haben, und ehe sie zu eigenen Zügen das Meer kreuzten, haben sie sich passiv am Weltverkehr betheiligt, d. h. sie haben den Phöniziern als Material für ihre seeischen Niederlassungen gedient, wo sie unter fremder Leitung in besonderen Gemeinden lebten.

Im Zusammenhange mit der Landesgeschichte ist uns die Sache nur für Sicilien durch Thukydides bezeugt. Dass sie wohlgelegenen Küstenpunkten mehrfach stattgefunden hat, ist an den verschiedenen Gestaden die wiederkehrenden Namen bezeugt. An der attischen Küste lag der phönikischen Station Salamis gegenüber und an dem wichtigsten aller Häfen Liguriens finden neben den Spuren einer phönikischen Station die Elymerna, Egesta, Eryx, Entella in einer so geschlossenen Gruppe, dass ein zufälliges Zusammentreffen keine Rede sein kann.

Den heimathlichen Namen folgen die Sagen der Heimath. Es erscheint mir als ein nicht unwesentlicher Gewinn, dass v

¹ Vergl. L. STERN in der Allg. Zeitung 1882, Sonntag den 5. Juni.

an einem Punkte, wo dardanische Männer angesiedelt waren, in Aineia am thermäischen Golf durch eine Münze, die nicht jünger ist als die Mitte des sechsten Jahrhunderts die Aeneadensage als eine dort einheimische und echt volksthümliche Überlieferung urkundlich bezeugt sehen.¹

Es ist gestattet, die Zeiten phönikischer Seeherrschaft, soweit sie für sporadische Ausbreitung griechischer Seefahrerstämme massgebend sind, in zwei grosse Gruppen zu sondern. Die eine Gruppe der See-Stationen schliesst sich an die Göttin von Sidon, welche am Eryx und den damit zusammenhängenden Plätzen auftritt, die andere an den tyrischen Stadtgott. Die jüngere Periode ist im Gedächtniss der Mittelmeervölker lebendiger geblieben. Die in Ortsnamen weithin zerstreuten Spuren hat OLSHAUSEN scharfsichtig erkannt; geschichtliche Erinnerungen haben sich vorzugsweise in Sardinien erhalten, wo in der phönikischen Besiedelung als besonderer Bestandtheil neben den Barbaren die zur Urbarmachung des Bodens herbeigerufenen Iolaeer genannt werden, als βαρβαρῶν σύννομοι, die aus Thessalien, Böotien, Attica hergeleitet und als ritterliche, sowie als kunstfertige Ankömmlinge charakterisirt werden. Iolaïden kennen wir als edle Geschlechter in Thespieae und, wie man auch über den Namen des Heros urtheilen mag, dürfen wir doch wohl annehmen, dass die Zeit einer engen Verbindung mit den Phöniziern, die griechische Tapferkeit und griechisches Talent zuerst anzuerkennen und zu verwerthen wussten, in der Kameradschaft der Iolaos und Herakles ihren mythischen Ausdruck erhalten hat.

Ein anderes Seevolk der griechischen Meere wird mit demselben Herakles eng verbunden, das sind die Tyrrhener oder Tyrsener. Auf sie ist neuerdings die Aufmerksamkeit von Neuem gelenkt, da in den ägyptischen Texten neben den Dardanern die 'Turscha vom Meer', wie sie in den Kriegen von 1320 v. Chr. genannt werden, auftreten, welche von MASPERO und seinen Vorgängern und Mitforschern als Tyrrhener gedeutet werden. Auch hier wird weitere Bestätigung abzuwarten sein. Dagegen aber glaube ich schon jetzt Einspruch thun zu müssen, dass man dabei einstimmig an die Etrusker gedacht hat. Wir kennen die Tyrrhener als Freibeuter des ägäischen Meeres, auf allen Inseln und Küsten, hüben und drüben; als Sklavenhändler kennt sie der homerische Dionysoshymnus, die nach Kypros und Aegypten ihren Raub auf den Markt bringen; so konnten sie sich auch schon unter dem zweiten Ramses an libyschen Einfällen betheiligen, um dann in die königlichen Leibgarden eingestellt zu werden.

¹ FRIEDLÄNDER im Monatsbericht 1878 S. 749.

Als ihren Heimathsbezirk betrachtete man allgemein die lydische Küste, wo ein altes Tyrrha bezeugt ist, im Kaystrosthale, wo der asiatische Continent den Seevölkern zuerst zugänglich und bekannt wurde, wo die ältesten Verkehrsstrassen sich begegneten. Darum hat OTFRIED MÜLLER, wie ich glaube, jenes Tyrrha mit vollem Rechte als ein Kennzeichen für die Heimath der Tyrrhener angenommen. Was aber ihre Beziehung zu Etrurien betrifft, so ist es nach meiner Überzeugung ein altes, zum Theil von Dionysios veranlasstes und bis in die neuesten Zeiten fortgepflanztes Missverständniss, wenn man der bei Herodot I. 94 vorliegenden Überlieferung den Sinn unterlegt, dass das etruskische Volk eine Colonie der Lyder sein sollte. Denn es handelt sich in der That weder um Lyder, die auswandern, noch um einwandernde Tusker, sondern um die auf dem Küstensaume des lydischen Reichs seit unvordenklichen Zeiten ansässigen Stämme griechischer Nationalität, welche von den Phöniziern das Seehandwerk gelernt haben und durch sie, wie die Dardaner, als schwärmendes Schiffsvolk in die Westsee gelangt sind, wo sie sich sporadisch an beiden Langseiten Italiens ausbreiteten. In ihrer Heimath sind sie von den jüngeren Stämmen nach und nach absorbirt worden; in der Westsee hat sich ihr Name erhalten und zwar in doppeltem Sinn. Einmal ist derselbe nach griechischem Sprachgebrauch auf das binnenländische Volk übergegangen, in dessen Reichsgebiet die von ihnen bewohnte Küste überging, und zweitens ist er die Bezeichnung der Küstenbevölkerung geblieben, die, von der griechischen Heimath getrennt, mit Barbaren vermischt, in alter Gewohnheit der Piraterie mehr und mehr verwilderten, wie die Hylleer in Illyrien, die Iolaeer in Sardo. Dem schwerfälligen Volk der Etrusker hat man gewiss mit Unrecht eine Neigung zum Corsarenthum aufgebürdet: Tyrrhener haben noch zu Alexanders Zeit, wie des Dinarchos tyrrhenische Rede beweist, das adriatische Meer unsicher gemacht.

Wo sie aber sesshaft geworden, waren sie Träger griechischer Bildung. Wo Küstenorte an ihren Namen geknüpft werden, finden wir Spuren überseeischer Einflüsse, griechischer Anlagen und Gebräuche und was den Zusammenhang mit Lydien betrifft, so ist es nach Entdeckung der Fürstengräber am gygäischen See eine unanfechtbare Thatsache, dass die lydischen Grabformen, auf das Genaueste nachgebildet, in Etrurien vorkommen, so dass eine Übertragung derselben nicht bezweifelt werden kann.¹

Bei ethnographischen Untersuchungen dieser Art kann nur in grossen Zügen der Gang der Entwicklung und die allmähliche Aus-

¹ Artemis Gygaia und die lydischen Fürstengräber. Archäol. Zeitung Jahrgang XI. S. 148.

mittlung des internationalen Verkehrs darzustellen der Versuch gemacht werden. Es treten aber für diese Periode, in welcher der griechischen Nationalität angehörige Stämme durch ältere Völker aus dem Dunkel hervorgezogen werden, zwei Thatsachen, wie mir scheint, immer deutlich hervor, erstens die Priorität der Cultur auf der asiatischen Seite des griechischen Inselmeers und zweitens die beiden Stadien phönikischer Seehegemonie, welcher die Küstenstämme arischer Herkunft dienstbar sind.

Wollten wir mit den französischen Aegyptologen neben den Dardanern und den Tyrrenern auch die Lykier (Leka) als solche ansehen, welche an der Völkerbewegung Theil nehmen, die seit Ramses II das armenienreich bevölkerten, so würde die Priorität Kleinasiens noch beständiger hervortreten. Doch halte ich mit H. GELZER diese Annahme sehr unsicher, und auch in Bezug auf die Schardana 'vom Meer', besonders häufig auftreten,¹ gestatte ich mir nur die Bemerkung, dass ich auch in ihnen nur Seevölker des östlichen Mittelmeers kennen kann.

Das neue Stadium, da die Stämme am ägäischen Meer selbständige Seefahrten machen, bezeichnet Thukydides mit dem treffenden Ausdruck: *ἐπειδὴ οἱ Ἕλληνες πολλοὶ κατὰ θάλασσαν ἐπισέπλεον, ἐκλιπόντες* s. w: (VI, 2). Bei dem massenhaften Nachdrängen der jüngeren Völker, welche auch in den ägyptischen Texten mit Sand am Meer verglichen werden, erfolgte ohne schwere Kämpfe ein allgemeiner Rückzug der an Volkszahl schwachen Phönizier, die sich auf einzelne Punkte concentriren mussten. Für die Periode dieser siegreichen Konkurrenz von Seiten der griechischen Stämme haben wir keine deren Urkunden als die Grabfunde in den nach einander von Phöniziern und von Griechen bewohnten Orten, Grabfunde, deren Schichten darüber Auskunft geben, wie mächtig die der phönikischen Vorzeit und wie weit sie heraufreiche.

Untersuchungen dieser Art sind noch im Anfange, und doch hat man aus einzelnen Ergebnissen derselben die Berechtigung zu gewinnen glaubt, Thukydides eines Irrthums zu überführen, wenn er den phönikischen Herrschaftskreis über die Küsten von ganz Sicilien ausdehnt; denn bei Messina sei nichts von ihrer Ansiedelung aufzufinden gewesen.²

Wenn auch zu abschliessendem Urtheile die Lokaluntersuchungen nicht ausreichen, ist die Hinweisung auf diesen Punkt sehr lehrreich. Und am sicilischen Sunde können wir in der That die ältesten Spuren

¹ STERN a. a. O. S. 2266.

² v. DUHN. Verhandlungen der Trier. Philologenversammlung S. 142.

selbstthätiger Ansiedelung von Hellenen nachweisen und zugleich von der ältesten Form derselben unterrichten. war eine Ansiedelung kymäischer Piraten. Wie im baltischen gingen auch im Mittelmeere Handel und Seeraub Hand in Hand. Zankle war ein Lauerplatz, eine ἐπιβολὴ τῶν πλωιζομένων, ein ληστήριον, wie später noch die kilikische Steilküste. Raubschlösser des Mittelalters waren diese Plätze an den Häfen angelegt, und dass in der Anlage eine gewisse Methode zeigt der Zusammenhang mit Kyme. Weil aber an dem Ort keine Stadt angelegt wurde, sondern nur eine Schiffsstation, behielt er auch den Namen der eingeborenen Si-Myra. Der Meerfelsen von Kyme war ursprünglich auch nur eine Seeinsel. Die ganze Nachricht über Alt-Kyme und Alt-Zankle ist uns wichtig, weil es vielleicht die einzige, litterarisch überlieferte ist aus einer verschollenen Periode, und eine solche, die den Unterschied sporadischer Niederlassung und städtischer Ansiedelung recht deutlich macht.

Mustern wir die verschiedenen Formen, in denen das griechische Volk, seit es seetüchtig und selbständig geworden, den engern Heimathsbezirks überschreitet, so beginnt dies bei den einander gegenüberliegenden Gestaden, wo Seeraub zuerst den friedlichen Tauschverkehr übergeht. Ein Gestade giebt dem Ueberschuss der Bevölkerung ab; ein Wechselverkehr, welcher der sichersten bezeugt ist, wo diesseits und jenseits dieselben Völker auftreten, wie es bei den Chaonern oder Chonern¹ der Fall ist, wie wir in Epeiros wie in Oenotrien begegnen. Ähnlich verhält es sich mit den Iapygern, Venetern u. A. Hier vollzogen sich Umnicherungen der durchgreifendsten Art, aber im Gegensatze zu continentalen Wanderungen friedlich und allmählich, so dass sie nur an den Ergebnissen zu erkennen sind. Am deutlichsten vielleicht in der Iapygischen Halbinsel, deren hellenischer Charakter sich weder aus uralter Stammverwandtschaft mit den nordgriechischen Völkern, noch dem Einfluss der Stadt Tarent hinlänglich erklären lässt. Sie vielmehr ein mittleres Stadium annehmen, eine Zeit, in der eine gemeinsame Erbtheil bei neuer Begegnung modificirt wurde. Das griechische Volksthum noch bildsam genug war, um griechische Formen anzunehmen, wie die der neuerdings beobachteten Patronymica und Götternamen in die Landessprache aufzunehmen.² Hier tritt die Übersiedelung von Küste zu Küste wesentliche Umwand-

¹ HELBIG Hermes XI S. 268.

² DEECKE Rhein. Museum XXXVI S. 528.

Bevölkerung ein, ähnlich denen, die im ägäischen Meer durch Herüberkommen der Ionier erfolgten; milde Umwandlungen verwandter Nationalitäten, deren Gesamtergebnis so bedeutend war, dass Ion von Aristoteles der Oekist von Athen genannt werden konnte. Die nicht städtisch geschlossenen Niederlassungen sind deshalb um so eingreifender, weil sie unmittelbar zu Cultusgemeinschaften führen, deren sie nicht entbehren können, um im fremden Lande festen Fuss zu fassen. So schlossen die eingeborenen Iberer in Tartessos sich dem tyrischen Heraklesdienste an,¹ so die Italiker dem Apollo- und Aphroditendienste.

Ähnliche Einwirkungen durch Zuwandern erfolgen auch dort, wo von griechischen Küstenstädten die näheren Plätze des Hinterlandes nach und nach assimiliert werden. So schlichtet sich am leichtesten der alte Streit, ob Nola eine griechische Stadt sei oder nicht.²

Eine andere Art Zuwanderung ist die von kleineren Gruppen, welche eine besondere Hanthierung haben. Wie im nordischen Binnenmeere, das so viel Analogien mit dem Mittelmeere aufweist, Bürger der Hansestädte sich als Fabrikanten, namentlich von Schuhwerk, in den überseeischen Orten niederliessen; so errichteten griechische Ansiedler ihre Werkstätten in den fremden Häfen. Der wichtigste Kunstbetrieb war die Töpferei. Töpfer sind die hervorragendsten Leute im Gefolge des Demaratos³, und sie bezeugen die Übersiedelung griechischer Handwerkergilden in solche Plätze, welche keine Pflanzstädte waren. Neben dem Import entwickelte sich also ein Betrieb an Ort und Stelle, und mit vollem Recht hat man aus den in Atria gefundenen Thongefässen mit Besitzernamen und Weihinschriften auf Anwesenheit von Griechen geschlossen, wie dies der Ruhm des dortigen Thongeschirrs bestätigt. Was man dagegen eingewendet hat, scheint mir nur davon zu zeugen, dass man viel zu sehr gewohnt ist, sich die Griechen nicht anders als in Form städtischer Gemeinschaft draussen zu denken.⁴

Wir haben hier also Waarenniederlagen und Werkstätten auf erworbenem Grund und Boden am Küstenrande zu denken, durch Cultusplätze den heimathlichen Gottheiten geweiht. Wir wissen ja auch aus der Geschichte unseres Nordens, wie Ansgar, von Kaufleuten und Handwerkern begleitet, auszog. Wir kennen die Seemannskirchen, wo nach glücklicher Überfahrt die Gelübde gelöst wurden.

¹ ARRIAN II 16.

² KRAMER, Stil und Herkunft der griechischen Thongefässe S. 101.

³ Vgl. Arch. Z. XVIII. S. 110, wo ich den Dritten neben Eucheir und Eugrammos, *Νοππος*, als Wegebauer aufgefasst habe.

⁴ HELBIG Italien S. 120 gegen SCHÖNE Museo Bocchi XIII.

So entstanden Höfe mit Altären in ihrer Mitte, nach Vorbild der phönikischen Gehege (στρατόπεδα) mit der ξείνη Ἀφροδίτη; daher der Name Ἄλσιον für griechische Küstenstationen, und der Name Πύργοι. Gewiss kam es häufig vor, dass diese auswärtigen Stationen eher eine Ringmauer hatten als die ionische Metropolis. Denn die Höfe mussten wie Lagerplätze eingerichtet sein, um Unberufenen den Zutritt zum Altare zu sperren und um Conflictte mit den Barbaren vermeiden oder, wenn es sein musste, bestehen zu können. So lagen zwei Niederlassungen mit festen Grenzen nebeneinander, wie in Wisby das deutsche Quartier neben dem gothischen lag, jedes durch einen besondern Vogt verwaltet.¹ Am deutlichsten sehen wir dies bei den Emporiten in Spanien, welche ihr Seethor nach den Schiffen hatten, während das Landthor für die zum Verkehre bestimmten Tage und Tagesstunden sich öffnete. Vor demselben war der Bazar oder Marktplatz, um den die Iberer sich sammelten und niederliessen. Hier erwuchs ausnahmsweise eine so nahe Verbindung, dass die hellenisirten Anwohner auf ihren Wunsch mit in den schützenden Mantel des griechischen Mauer rings aufgenommen wurden, ohne dass die innere Quermauer beseitigt wurde.

Eine ganz besondere Art sporadischer Niederlassung finden wir in den Ländern alter Cultur, namentlich in Aegypten, wo die Seestämme des Archipelagus nicht als Kaufleute Aufnahme fanden, sondern als streitbare Männer, mit denen Soldverträge geschlossen wurden und es ist ein entschiedener Fortschritt unserer Geschichtskunde, dass wir jetzt wissen, wie Psammetichos nur dem Beispiel der grossen Pharaonen der achtzehnten und zwanzigsten Dynastie folgte, wenn ein Ionier wie Karer in seine Dienste nahm und durch Dotation zu einer Art Militaircolonie machte.²

Die Einrichtungen des internationalen Verkehrs beschränkten sich natürlich nicht auf die fernen Zielpunkte des Handels, sondern es kam darauf an, auch die Verkehrsstrasse unterwegs zu sichern und zweckmässig auszustatten.

Hier sind auch die Landwege zu berücksichtigen, auf denen Griechen die Grenzen ihres Heimathkreises weit überschritten.

Ich erinnere an die Agenturen an den Karavanenstrassen, das ägäische Meer mit dem Innern Afrikas verbanden. So wohnten Milesier in dem altägyptischen Abydos;³ es waren Repräsentanten milesischer Handelshäuser, mit bestimmten Gerechtsamen ausgestattet

¹ D. SCHÄFER, die Hansestädte und König Waldemar S. 42.

² MASPERO, Geschichte der morgenländischen Völker S. 475.

³ STEPH. BYZ. MASPERO S. 521.

manier waren bis an die grosse Oase vorgedrungen,¹ und zwar gehörten sie alle einer Phyle an, ein Zeichen, dass sie nicht von Staatswegen ausgesendet waren. Die Ansiedelungen von einzelnen Häusern, einzelnen Bürgerkreisen und einzelnen unternehmenden Gemeinden ausgingen, lebten unter fremdem Reichsschutze als privilegierte Unterthanen fremder Race. Später erweiterten sie ihre engeren Kreise, wie die Lübecker in ihrem Hofe zu Nowgorod auch Nicht-Lübeckern Anschluss gestatteten. Das nationale Princip brach durch und so entstand das Hellenion, wie im Baltischen Meere allgemein hansische Quartiere, die allen deutschen Kaufleuten offen waren.

Von anderen Landungen, welche die Griechen weit aus ihrem Heimathsbezirke heraus geführt haben, nenne ich die vom Pontus und der Maiotis ausgehenden, welche, den grossen Strömen aufwärts fliegend, quer durch die Steppen Russlands den Verkehr mit dem Norden herstellten. Nach Auffindung der binnenländischen Fundstätten des Bernsteins die Handelsstrasse nachzuweisen, welche den Niépr und Bug hinaufging, ist man jetzt eifrig und erfolgreich beschäftigt.² Im Dongebiete kennen wir Nauaris und Exopolis als vorgeschobene Posten griechischer Cultur. Ohne solche Binnenplätze war ein sicherer Caravanenhandel unmöglich, und wir müssen annehmen, dass von den griechischen Kaufmannsstädten, deren Namen aus den im Handel vorkommenden Münzen nach und nach genauer bestimmt werden können, Marktplätze, auf denen die Erzeugnisse der Nord- und Südländer ausgetauscht wurden, regelmässig unterhalten worden sind. Auch im nordgriechischen Alpenlande wird eine κοινὴ ἀγορά namhaft gemacht, wo die vom Pontus und vom Adrias kommenden Händler schon mit ihren Töpferwaaren begegneten, so dass die ganze Länge des Wegs von Meer zu Meer unbekannt bleiben und unrichtig geschätzt werden konnte. So erkläre ich es mir, dass noch zu Theopomp's Zeit die Griechen, welche überall Halbinseln suchten, von einem Isthmus zwischen Hadrias und Pontus fabeln konnten.³ Endlich gab es auch an der Seeküste Landstrassen, welche, wenn die Schiffahrt durch Krieg oder schlechte Jahreszeit gehemmt war, den Verkehr übernahmen. So war Korinth mit seinen fernen Tochterstädten auch durch Heerstrassen verbunden,⁴ und wenn wir den Handel der Epimanier mit den Bergvölkern, sowie die Ansässigkeit von Bakchiaden in den Lynkestes in's Auge fassen, so erkennen wir, wie die Bevöl-

¹ Her. III. 26.

² Ich verweise auf GENTHE's inhaltreichen Vortrag in der Philologenversammlung Karlsruhe.

³ Ps. Arist. Mir. auro. 104. STRABO 317.

⁴ Hermes X 230.

kerung der Seestadt auch in binnenländischen Gegenden weithin sporadisch vertreten war.

Viel umfassender waren aber natürlich die Einrichtungen an den Seestrassen, und viel grösser die Menge der Griechen, die hier mit ihren Sklaven zerstreut wohnten. Die Seewege waren wie die Landstrassen nach Tagereisen berechnet; sie hatten ihre Etappen, ihre Signalstationen, ihre Wasserplätze und Magazine, ihre Nothhäfen und Schiffswerften. Wir finden in der Insel- und Küstenbeschreibung des STRABO vielfach die Punkte hervorgehoben, welche über das Meer hin einander sichtbar waren (STRABO 261): Wo keine Städte entstanden, entstanden *πολίχνια*, und das Hemerostadion der Massaliten zeigt am besten, wie die Begriffe von Stapelplatz, Castell, Seewarte und Heiligtum in einander übergehen (STRABO 159). Was aber für Einrichtungen getroffen wurden, um ein Meer in griechischem Sinne für den Verkehr einzurichten, lernen wir am besten aus dem attischen Volksbeschlusse, in welchem die Anlage von *ἀφετήρια*, *ναυσταθμοί*, *ἐμπόρια*, *σιτοπόμπια*, *προβολαί* (befestigte Vorsprünge zum Schutz gegen Seeraub) für die adriatischen Gewässer angeordnet werden.¹

So lassen sich in der Geschichte des Adrias, die LETRONNE zuerst darzustellen unternommen hat, die verschiedenen Verkehrsepochen mit einiger Sicherheit erkennen. Die Spuren der auch hier bahnbrechenden Phönizier, die Zinn auf den Küsteninseln fanden, zeigen sich bei den mit Kadmos zusammenhängenden Encheleern, bei den mit Tyrus verknüpften Hylleern, in den Inselnamen Melite und Issa. Während von nordgriechischen Stämmen Bryger, Thraker, Eneter sich vorschoben, waren es von der Seeseite erst Ionier, namentlich euböische Stämme, welche hier Stationen errichteten, wie z. B. an der wichtigen Bucht von Orikos. Dann begann die Zeit der Städte, Korinth und seiner Pflanzorte. Das Meer wurde bis in den innersten Winkel eine Seestrasse (*πόρος Ἰόνιος*). Daher nennt schon Hellenikos Hadria al eine am ionischen Meer gelegene Handelsstadt, und die Zusammenstellung korkyräischer und adrianischer Thongefässe zeugt von dem lebhaften Verkehr, der in Korkyra seinen Ausgangspunkt hatte. SCHWARZ - Korkyra und eine dichte Reihe griechischer Ortsnamen »Mentores, Elektrides, Diomedesinseln« u. a., sowie die Gesittung der Illyrier, von denen ein Theil seiner Geistesbildung und seiner Gastlichkeit wegen von Skymna (V. 423) gerühmt wird, zeugen von den Fortschritten, welche die Griechen hier machten — aber sie wurden nie fertig. Im vierten Jahrhundert machten sich die Parier, Knidier

¹ БѢСКН, Seeurkunden S. 457.

² R. SCHÖNE, Museo Bocchi XV.

Athener Concurrenz, um im Westmeere den Hellenismus durchzuführen. Dann nahm der ältere Dionysios die Aufgabe in seine Hand und legte auf den Weideplätzen der Eneter, deren Rosszucht uns durch das neu gefundene Alemanfragment wieder in das Gedächtniss rufen ist, syrakusanische Gestüte an.¹ Endlich unternahmen mit grossem Aufwande die Athener (Ol. 113, 4) den Flottenzug, den man nach guter Vorbedeutung einem Miltiades übergab, um das Meer als griechisches einzurichten. Sporadisch waren Hellenen an allen wichtigen Plätzen angesiedelt, und wenn es auch ein sehr ungenauer Eindruck war, Spina und Hatria Griechenstädte zu nennen, so war doch kein blosser Philhellenismus, der die alten Kaufstädte an den Mündungen mit Hellas verband und Spina neben Agylla die Ehre schaffte, durch einen eigenen Thesaurus in Delphi vertreten zu werden, während die lydischen Weihgeschenke im korinthischen Schatzkammer untergebracht wurden.

Agylla führt uns in das jenseitige Meer und an die Küste, wo die italische Ausbreitung griechischer Stämme unter allen Uferländern des Mittelmeers die grösste Bedeutung erlangt hat. Das Griechenthum, die Tarquinier nach Rom gebracht haben, das, von den Tuskern herzlich angenommen, von den stammverwandten Latinern innerlich gesogen wurde, wurzelt, wie von Tage zu Tage deutlicher hervor, in den Uferplätzen der Westküste, Agylla-Caere, Pyrgoi, Alsion, Cervinii. Für die nördliche Küste war Aithalia der Hauptpunkt vor dem Hafen von Populonia. Hier ist ein kleiner Archipelagus, der den östlichen Seestämmen anmuthen musste, ein Gestade mit drei Inseln; drei von Populonia sichtbar, das selbst nach alter Überlieferung Kyrnos aus gestiftet sein sollte. Südlich das in seinen Denkmälern durch griechische Seegottheiten vertretene Vetulonia mit dem griechischen Hafenorte Telamon, dessen neu gefundene Überreste eine reiche Fundgrube griechischer Kunstwerke geworden sind, namentlich Pisae, portus Σελύνης. Wenn das, was kleinasiatische Tyrannen an der Westküste von Mittel- und Oberitalien begonnen, auch in Korinth und den Phokäern aufgenommen wurde, blieb die griechische Besiedelung doch zu dünn und zerstreut, um den Barbaren Widerstand leisten zu können, welche oberhalb der Küste ihre Stadtburgen aufthürmten. Um so mehr wurde Alles, was die Uferbewohner an Leistungsfähigkeit hatten, von dem Binnenvolk verwerthet (ebenso wie es die Lyder mit den Urtyrrhenern machten), die Technik des Kriegswesens ebenso wie das künstlerische Talent. So sind auch in der Binnenstadt, welcher das ligurische Gestade zufiel, die Spuren des

¹ BLASS im Hermes XIII. 28. Vgl. HOLM, Sicilien II., 134.

Griechenthums nicht erloschen und wir finden über die Urnen ~~der~~ Volaterraner eine Fülle griechischer Seefahrersagen ausgeschüttet.¹

Ein tiefer Zug innerer Verwandtschaft hat lange vor den Zeit~~en~~ städtischer Colonisation die Brudervölker, die sich in nördlichen Ber~~g~~ landschaften getrennt haben, auf dem Seewege wieder auf beide~~n~~ Seiten zusammengeführt, und das fremdartige Tuskervolk, das si~~ch~~ zwischen sie geschoben, hat die Verschmelzung nicht hemmen könne~~n~~ dieselbe vielmehr in merkwürdiger Weise fördern müssen.

Was die sporadische Ausbreitung griechischer Seestämme ausse~~r~~ halb Italien betrifft, so ist Libyen die wichtigste Gegend. Wir finde~~n~~ bei Stephanos Kybos als Ionerstadt in Libyen aus Hekataios angefüh~~r~~t, einen Hafenort bei Ἰππου ἄκρῃ nach MEINEKES zweifelloser Lesun~~g~~, wenn auch die weiter gehende Textänderung unsicher ist. Mascha~~la~~ wird als eine von Hellenen gegründete Küstenstadt zwischen Uti~~ca~~ und Hippon genannt.² Wenn wir erwägen, wie vielseitige Cultu~~r~~-beziehungen an der libyschen Küste zusammentreffen, wenn wir au~~ch~~ die Elymer über Libyen nach Sicilien kommen sehen, wenn w~~ir~~ sehen, wie manche griechische Gottesdienste und Cultsagen³ an den Syrten heimisch sind, wenn nun endlich aus ägyptischen Urkund~~en~~ zu Tage tritt, in welchem Umfange das Pharaonenreich unter den Einflüssen seiner westlichen Nachbarn gestanden hat, so erhellt, wie wichtig und dringend für die Geschichte der Mittelmeervölker eine, wie wir hoffen, durch Auffindung neuer Quellen geförderte Untersuchung über Libyen und seine Beziehung zu Hellas ist.⁴

Werfen wir zum Schluss noch einen Blick auf die fernsten Punkte im Westen und Osten des Mittelmeers, so ist einerseits das Mündungsland des Bätis ein wichtiger Platz, wo die Hellenen ohne Stadtanlage heimisch geworden sind; andererseits ziehen die eigenthümlichen Staatsbildungen an der Küste Syriens immer von Neuem unsere Aufmerksamkeit an. Denn die von Allem, was sonst der Orient aufweist, verschiedenen Stadtverfassungen und Stadtbündnisse⁵ der Philistäer mussten immer die Vorstellung erwecken, dass hier Einflüsse stattgefunden haben, welche von der Seeseite und von Völkerschaften griechischer Nationalität ausgegangen sind. Zu den orientalischen Nachrichten von Verbindungen mit den westlichen Inseln

¹ Über die Spuren griechischer Sitte an diesen Gestaden vgl. den Aufsatz de Persii Flacci patria in der Saturae philologicae H. Sauppis oblata.

² Diod. XX 17.

³ Vergl. Beiträge zur Geschichte und Topographie Kleinasiens. 1872. S. 4.

⁴ Vergl. L. STERN, die Libyer im Alterthum. Beilage zur Allg. Zeitung 1882.

No. 155.

⁵ STARK GAZA S. 2 ff.

nun die Thatsache getreten, dass die Sprache der Kyprier als eine achaische entziffert worden ist, dass Kypros also früh zum griechischen Gebiete gehört hat und die sagenhafte Überlieferung von seinen Verbindungen mit Hellas urkundlich bestätigt worden ist.¹ Dazu kommt aus ägyptischen Quellen die Thatsache, dass unter Ramses II. Merneptah und Leku, mit den Chittitern verbündet, auftreten.² Wir können also annehmen, dass Seefahrer des Nordens an der syrischen Küste ausgestiegen sind. Dass aber an diesen Küsten griechische Völker frühzeitig heimisch gewesen sind, erhellt auch aus dem oben erwähnten Sprachgebrauche, der das 'ionische Meer' bis Gaza ausdehnt. Es wird also, was hier nur als Vermuthung angedeutet werden soll, es wird sich vielleicht auch hier nachweisen lassen, dass griechische Zuwanderer ohne selbst geherrscht und griechische Städte gegründet zu haben, einen eingreifenden Einfluss auf die politische Entwicklung ausgeübt haben, wie dies in Bezug auf die Bildung der ionischen Stadtbünde, in Beziehung auf die Verfassung Roms und wohl auch auf die der Karthager angenommen werden muss; in die letztere würde schwerlich der Ehre gewürdigt worden sein, die Aristoteles unter den besten bürgerlichen Gemeindeverfassungen anerkannt und erforscht zu werden, wenn hier nicht von Libyen aus Elemente griechischer Cultur eingedrungen wären.

Die Geschichte der Hellenen bleibt eine mangelhafte, wenn sie sich auf Mutterland und Colonien beschränkt. Die Hellenen sind an den Küsten des Mittelmeeres das Salz der Erde gewesen, auch da, wo sie in der Minderheit geblieben sind und nur geringe Spuren ihrer Gegenwart zurückgelassen haben.

¹ C. CAUER, *Delectus inscr. Graec.* p. 157.

² STERN a. a. O. S. 2266.



1882.
XLIV.

SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN

9. November. Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. DU BOIS-REYMOND.

Hr. SIEMENS las: Über das Leuchten der Flamme.
Die Mittheilung folgt umstehend.

Über das Leuchten der Flamme.

Von W. SIEMENS.

Licht, welches von verbrennenden Gasen ausgeht, die mit heller Flamme leuchten, ist bekanntlich eine secundäre Erscheinung. Es sind durch die hohe Temperatur der Verbrennung ausgeschiedenen im Glühen gebrachten festen oder auch flüssigen, in der Flamme vertheilten Bestandtheile, von denen die hellen Lichtstrahlen aus-

Gase, welche keine festen oder flüssigen Bestandtheile beim Verbrennen ausscheiden oder durch den Verbrennungsvorgang erzeugen, sondern durchgehends mit einer relativ schwach leuchtenden Flamme verbrennen, ähneln, aber je nach der verbrennenden Gasart verschiedener Art.

Man pflegt die Ursache dieses Leuchtens einfach damit zu erklären, dass das durch die Verbrennung hoch erhitzte Gas selbst leuchtet.

Versuche darüber, ob hoch erhitzte reine Gase wirklich Licht ausstrahlen, sind meines Wissens bisher nicht mitgetheilt. Betrachtungen über die Lichtemission der Sonne, die sich an die Sonnentheorie von Bruders C. WILHELM SIEMENS anknüpfen, und über welche ich der Öffentlichkeit binnen Kurzem eine Mittheilung zu machen gedenke, und ähnliche Beobachtungen liessen es mir unwahrscheinlich erscheinen, dass hoch erhitzte Gase selbst leuchten, und ich beschloss darüber einige Versuche anzustellen.

Sollten die Versuche einen entscheidenden Charakter annehmen, so mussten sie bei Temperaturen angestellt werden, welche höher waren, als diejenige, welche durch die leuchtende Verbrennung erreicht wird. Ich überzeugte mich bald, dass aus diesem, sowie aus anderen Gründen im Laboratorio anzustellende Versuche kaum ein bestimmtes Ergebniss erwarten liessen. Dagegen schienen mir die Versuche mit Schwelgas geheizten Regenerativ-Öfen der Glasfabrik von Bruders FRIEDRICH SIEMENS in Dresden vorzüglich zur Anstellung von Versuchen geeignet.

Mein Bruder ging bereitwillig auf meinen Wunsch ein, mit einem solchen Ofen einen Versuch anzustellen, ein und zwei Tage lang die Erwartung in vollem Masse bestätigt. Es wurde ein zur Glasfabrikation nach der Methode meines Bruders dienender Regenerativ-Ofen verwendet, der in einem abgesonderten Raume stand, welcher durch eine Nacht vollkommen dunkel zu machen war. Der Ofen hatte

eine rechteckige Heerdsohle von ca. $2\frac{1}{2}^m$ Länge und $1\frac{1}{2}^m$ Breite und eine grösste Höhe des Ofenraumes von ca. 160^m . In der Mitte jeder langen Seiten des Ofens befanden sich gegenüberstehende Öffnungen, welche einen freien Durchblick durch den Ofenraum gestatteten. Der Ofen konnte mit Leichtigkeit so hoch erhitzt werden, als die aus besonders feuerfesten Steinen gebildeten Ofenwände gestatteten. Es ist dies die Stahlschmelzhitze, welche zwischen 1500 und $2000^\circ C$. beträgt. Nachdem diese Temperatur erreicht und wurde darauf der weitere Zutritt von Gas und Luft zum Ofen abgestellt, so erhielten die heissen Wände des Ofens die Temperatur des Inneren längere Zeit auf einer ziemlich gleichen Höhe, wenn jeder Luftwechsel verhindert wurde. Vor den Ofenöffnungen wurde nun eine Reihe von gut berussten Schirmen aufgestellt, mit einer centralen Öffnung, welche einen Durchblick durch den heissen Ofen gestattete, ohne dass von den Ofenwänden ausgehende Strahlen das Auge treffen konnten. Nachdem nun der Ofen überall vollständig abgedichtet und alles Licht aus dem Raum entfernt war, so dass vollständige Finsterniss in demselben herrschte, ergab sich, dass von der hoch erhitzten Luft im Ofen nicht die geringste dem Auge bemerkliche Lichtschein ausging. Wurde eine leuchtende Flamme in den Raum gebracht, so genügten schon durch dieselbe erzeugten Reflexe, das Gesichtsfeld schwach zu erleuchten. Zum Gelingen des Versuches war es nothwendig, im Ofen jede Verbrennung zu beseitigen und so lange zu warten, bis die Ofenwände möglichst staubfrei war. Jede Flamme im Ofen, auch wenn sie scheinbar nicht bis in die Gesichtslinie reichte, und die geringe Staubmenge in demselben erhellte das Gesichtsfeld.

Als Resultat dieser Versuche meines Bruders musste angenommen werden, dass die bisherige Anschauung, dass hoch erhitzte Gase selbst leuchten, nicht richtig ist. In dem Ofen befanden sich die Produkte der früheren Verbrennung, gemischt mit atmosphärischer Luft, Sauerstoff, Stickstoff, Kohlensäure und Wasserdampf. Wenn nur eines dieser Gase selbstleuchtend wäre, so müsste das Gesichtsfeld stets erhellt gewesen sein. Sind die Gase aber nicht selbstleuchtend bei der Verbrennungstemperatur, so kann das schwache Licht, welches die Flamme verbrennender Gase zeigt, die keine festen oder flüssigen Bestandtheile ausscheiden, nicht als Glüherscheinung der erhitzten Verbrennungsproducte erklärt werden. Es erschien mir daher auch wahrscheinlich, dass erhitzte Gase ebenso wenig Wärme wie Lichtstrahlen aussenden würden. Um auch hierüber einen Versuch anzustellen und um mich durch eigene Beobachtung von der Richtigkeit der von meinem Bruder constatirten Thatsache zu überzeugen, beabsichtige ich mich mit Dr. FRÖLICH nach Dresden. Hinsichtlich des Leucht-

der heissen Ofengase erhielten wir im Allgemeinen dieselben Resultate, die mein Bruder und dessen Ingenieur Hr. HERRMANN, welcher sich den Versuchen mit grossem Eifer und Verständniss gewidmet hatte, erhalten hatten. Allerdings blieb das Gesichtsfeld nicht immer ganz dunkel und es gelang oft nur für kurze Zeit, dies zu beobachten. Bei der grossen Empfindlichkeit des durch die herrschende Dunkelheit geschärften Auges und bei der Unmöglichkeit, jede mit Staubbewegung verbundene Luftbewegung im Ofen zu verhindern, so wie jeden weiteren Gaszutritt abzusperren — ist dies auch leicht erklärlich. Wir haben aber wiederholt völlige Dunkelheit des Gesichtsfeldes constatirt. Leider misslangen die Versuche, durch empfindliche Thermosäulen die Frage der Emission von Wärmestrahlen durch hoch erhitzte Gase zur Entscheidung zu bringen.

Ich überzeugte mich aber später durch einen anderweitigen, ganz einfachen Versuch, dass meine Vermuthung eine irrige war. Es wurde eine gewöhnliche Gaslampe mit ringförmigem Brenner und kurzem Glaszylinder durch ein vor derselben aufgestelltes dickes Brett derartig abgeblendet, dass das Brett die ganze Lampe nebst Glaszylinder verdeckte. Eine empfindliche Thermosäule wurde nun derart aufgestellt, dass die Axe des Rohres, in welchem die Thermosäule angebracht war, etwas höher lag wie die obere Kante des Brettes. Das Rohr war mit einer Blende versehen und um eine verticale Axe drehbar. Da die Zimmerwände ziemlich gleiche Temperatur hatten, so war die Ablenkung des eingeschalteten empfindlichen Spiegelgalvanometers nur unbedeutend, wenn die Rohraxe so eingestellt war, dass der von der Flamme emporsteigende heisse Luftstrom nicht in dem durch die Blende beschränkten Gesichtsfelde der Thermosäule lag. Wurde aber die letztere so gedreht, dass die Visirlinie in den heissen Luftstrom fiel, so trat sofort eine Ablenkung ein, die erst wieder zurückging, wenn durch weitere Drehung der Thermosäule oder durch Zurückdrehung derselben der heisse Luftstrom wieder aus dem Gesichtsfelde entfernt wurde. Dasselbe Resultat wurde erzielt, wenn die Lampe selbst hinter dem sie selbst verdeckenden Brette verhooben, und abwechselnd in das Gesichtsfeld gebracht oder aus demselben entfernt wurde. Die geringe Grösse der Öffnungen, sowie die erhebliche Entfernung vom Ofen, in welcher die Thermosäule aufgestellt werden musste, verringerten die Empfindlichkeit der Messung derart, dass zwischen der leuchtenden Flamme und der erhitzten Luft kein Unterschied nachgewiesen werden konnte. Dass die von heissen Gasen ausgehende Wärmestrahlung im Vergleich mit der von gleich heissen festen Körpern ausgehenden nur sehr klein ist, zeigt die grosse Ablenkung der Scala des Galvanometers, welche eintritt, wenn ein

Stück feinen Drahtes oder ein anderer fester Körper in den heissen Luftstrom gehalten wird. Andererseits ist sie aber doch viel zu undeutend, um annehmen zu können, dass nur im Luftstrome suspendirte Staubtheile die Wärmestrahlung veranlassten.

Es liegt nahe, zu fragen, ob nicht die Lichtausstrahlung heisser Gase in ähnlicher Weise wie die Wärmestrahlung ausserordentlich schwach und dadurch leicht zu übersehen wäre, wenn die Temperatur nicht sehr hoch ist. Diese Möglichkeit muss allerdings zugegeben werden und es ist sehr wünschenswerth, dass die Versuche bei noch weit höheren Temperaturen und mit schärferen Hilfsmitteln wiederholt werden, um die Temperaturgrenze festzustellen, bei welcher erhitzte Gase unzweifelhaft selbstglühen werden. Die Thatsache, dass Gase bei einer Temperatur von mehr als 1500°C. noch nicht leuchten, beweist jedoch, dass das Glühen der Flamme nicht als Selbstglühen der Verbrennungsproducte zu erklären ist. Dafür spricht auch schon die Betrachtung der Flamme selbst. Wenn man für schnellere Mischung der zur Verbrennung gelangenden Gase sorgt, so wird die Flamme kürzer, weil der Verbrennungsprocess schneller verläuft, und gleichzeitig heisser, weil weniger kalte Luft mit den verbrennenden Gasen gemischt wird. In gleicher Weise wird die Flamme verkürzt und heisser, wenn die Gase vor der Verbrennung stark vorgewärmt werden. Da die ansteigenden Verbrennungsproducte noch einige Zeit die Temperatur der Flamme nahe beibehalten, so müsste ein umgekehrtes Verhalten stattfinden, wenn die Gase selbstleuchtend wären. Das Leuchten der Flamme hört aber in einer scharfen Begrenzungslinie über derselben auf und fällt offenbar mit der Vollendung der chemischen Action zusammen. Es muss mithin diese selbst und nicht die durch sie erzeugte Erhitzung der Verbrennungsproducte die Ursache des Leuchtens sein. Nimmt man an, dass die Gasmoleculë mit einer Ätherhülle umgeben sind, so muss bei der chemischen Verbindung zweier oder mehrerer solcher Moleculë auch eine veränderte Lagerung der Ätherhüllen derselben eintreten. Die hierdurch bedingte Bewegung der Äthertheile muss sich durch Schwingungen ausgleichen, welche die Ausgangspunkte der Licht- und Wärmewellenzüge bilden können. In ganz ähnlicher Weise kann man sich die Lichterscheinung vorstellen, welche stattfindet, wenn ein elektrischer Strom durch Gase fortgeleitet wird. Wie ich schon vor längerer Zeit bei der Beschreibung des Ozonapparates auseinandergesetzt habe¹, werden alle Gase Leiter

¹ Über die elektrostatische Induction und die Verzögerung des Stromes in Glasfläschendrähnen. Pogg. Ann. Bd. 102 S. 66. 1857.

tricität, wenn das ihnen zustehende, von mir so bezeichnete Polarisationsmaximum überschritten wird. Es besagt dies, dass das Dielectricum nur eine von seiner Natur, d. i. bei Gasen von ihrer Dichtigkeit, abhängige Menge Elektricität zu übertragen vermag und dass bei grösserer Erhöhung der Potentialdifferenz der Vorgang der Fortleitung der Elektricität durch das Dielectricum eintritt. Verhindert man beim Luftensator die Funkenbildung wie beim Ozon-Apparat durch eine zwischen die Collectorplatten eingeschobene Glas- oder Glimmerplatte, tritt in der Luftschicht bei Überschreitung einer bestimmten, vom Abstand der Platten und der Dichtigkeit des Gases abhängigen Potentialdifferenz eine Glüherscheinung in der ganzen Gasmenge ein, welche bei der Entladung des Condensators wiederholt. Es ist dann diese Potentialdifferenz das Gas ein Leiter der Elektricität geworden, das Dielectricum des Condensators besteht jetzt nur noch aus Glas- oder Glimmerplatte, welche ein weit höheres Polarisationsmaximum hat, also erst viel später leitend wird, wie das Gas. Da durch das Gas geleitete Strom stets mit chemischer Action verbunden zu sein scheint, so könnte man sich die Glüherscheinung in gleicher Weise wie bei der Flamme durch oscillirende Umlagerung der Ätherhüllen der Gasmoleküle, durch welche der Übergang der Elektricität vermittelt wird, erklären. Es wäre dann das Flammenlicht mit demselben Rechte elektrisches Licht zu nennen, wie das Licht der Ozon-Röhre oder der GEISSLER'schen Röhre, welche sich von ersterer principiell nur dadurch unterscheidet, dass sie ein Dielectricum von äusserst geringem Polarisationsmaximum enthält. Für die Übereinstimmung der Ursache des Leuchtens der Flamme und von elektrischen Strömen durchflossenen Gase spricht auch die Hartigkeit der Flammenerscheinung in Stärke und Lichtfarbe.

Über eine Methode, den Normalenbogen, welchen eine Krystallfläche von einer ihr sehr nahe liegenden Zone absteht und ihre krystallo- graphische Lage zu bestimmen.

Von Hrn. WEBSKY.

(Vorgelegt am 26. October [s. oben S. 891].)

Man findet nicht selten Complexe von Krystallflächen, welche eine wenig von einander abweichende Lage besitzen, naheliegende Reflexe geben, unter Umständen, welche die Annahme einer gestörten Krystallbildung ausschliessen und die Erscheinung als eine Consequenz der morphologischen Constitution der Krystallgattung erkennen lassen. Der Nachtheil auch, die Lage eines solchen Complexes durch ein einziges Symbol von zahllosen Indices auszudrücken, ist zwar meist durch die Grenzen der Beobachtungs-Präcision inducirt, damit aber nicht der Umfang der morphologischen Darstellungs-Möglichkeit erschöpft, indem die Lage der einzelnen Glieder des Complexes zu einander und in ihnen vertretenen Zonen wenigstens mit annähernder Wahrscheinlichkeit ermittelt werden können und oft von Interesse sind. In der Aneinanderreihung der Glieder innerhalb sonst bekannter Zonen stattfindet, bietet das Eingehen auf die Discussion ihrer Symbole keine Schwierigkeit dar; nicht selten stösst man aber auf Reflexe, welche um kleine Bogenwerthe seitlich einer bekannten und auf dem Goniometer eingestellten Zone im Gesichtsfelde des Beobachtungsohres erscheinen und anderen Zonen angehören, die vorerst nicht erkannt sind.

Die Bestimmung der Lage der diese Reflexe erzeugenden Flächen ist je zwei Bogenmessungen unter Veränderung der Justirung unter, abgesehen von der Umständlichkeit des Verfahrens, erheblichen Vortheilen entgegenzusetzen, weil einmal das aus der Vergleichung grösserer Bogenmessungen eruirte, auf wenige Minuten hinauslaufende Resultat relativ genauer wird und andererseits bei Veränderung der Krystallage leicht die Orientirung in der oft complicirten Reflexgruppe verloren geht,

so dass Messungs-Resultate kombinirt werden, welche nicht zusammengehören.


Aus diesen Gründen habe ich¹ vorgeschlagen, die Lage von Flächen, welche wenig von einer eingestellten Zone abweichen, dadurch, ohne Veränderung der Justirung, zu bestimmen, dass man den scheinbaren Abstand ihres Reflexes von der justirten Zonenebene und die Limbus-Position verwerthet, bei welcher der Reflex senkrecht über (— oder unter) der Einstellungsmarke steht.

Messungen des Abstandes nicht tautozonaler Reflexe von einer eingestellten Zonenebene sind zuerst von GROTH² angewendet worden, um einen bei stauroskopischen Beobachtungen möglichen Einstellungsfehler zu eliminiren. Er benutzt dabei an Stelle des Fadenkreuzes eine Glasplatte, auf welcher ein Linienkreuz eingeschnitten und der der Limbusaxe parallele Vertical-Strich durch kurze Querstriche in kleine Abschnitte getheilt ist, deren Bogenäquivalente empirisch festgestellt werden; nach dem so gewonnenen Maassstabe wird der Abstand vom Mittelpunkte geschätzt, in welchem der Reflex einer fernen Lichtflamme den Vertical-Strich passirt. Eine feinere Bestimmung würde ein beweglicher, von einer Mikrometer-Schraube geführter Horizontalfaden gestatten, dadurch aber das Instrument wesentlich vertheuert, auch weniger stabil gemacht worden, so dass diese Einrichtung mit Bezug auf ihre exceptionelle Verwendung nicht empfohlen werden kann.

Dieserhalb habe ich (loco citato), jedoch ohne nähere Begründung, den Vorschlag gemacht, als Signal eine möglichst kleine runde Öffnung anzuwenden, durch welche intensives Licht einfällt, fern dem Vertical- und Horizontalfaden im Beobachtungsfernrohr noch zwei unter 45° geneigte Fäden hinzuzufügen, (— oder durch Um-

stecken der Fassung zu erzeugen) und —
Fig. 1 die Limbusdrehung, welche notwendig ist, um das reflectirte Signalbild von dem einen schrägen Faden zu dem anderen zu führen, also den Weg von nach r_2 zu beschreiben, gleich zu setzen dem Abstände mr , in welchem das Reflexbild den Verticalfaden vom Mittelpunkte ab schneidet.

Ist nun auch das aus einer kleinen runden Öffnung bestehende Signal zweifellos die beste Einrichtung, um die allgemeine Anordnung des Complexes



¹ GROTH's Zeitschrift IV. (1880). S. 562.

² POGGEND. Ann. 144, 34.

kennen, so befriedigten die mit ihm ausgeführten Versuche der Messung doch nicht sonderlich bezüglich der Gleichmässigkeit der gemessenen Zahlenwerthe, so dass ich einer anderen auf demselben Princip beruhenden Einrichtung jetzt den Vorzug gebe.


Es ist von SCHRAUF¹ als allgemein verwendbares Signal ein aus zwei auf einander senkrechten, gegen die Reflexions-Ebene um 45° geneigten beleuchteten Spalten bestehendes Kreuz vorgeschlagen worden. Der von mir angewandten von R. FUESS in Berlin ausgeführten Einrichtung ist dasselbe dadurch hergestellt worden, dass auf einer runden silberten Glasplatte von 18 mm Durchmesser die Silberdecke in 0,25 mm Tiefe in zwei auf einander senkrechten Richtungen auf der Theilmaschine ausgehoben ist, so dass durch die so entstandenen linearen Abblösungen das Licht einer Flamme hindurch fallen kann; die Befestigung der Platte wird durch vier Stellschrauben in einem Kopf gehalten, welcher in das Signalrohr des Goniometers gesteckt werden kann. Stellt man das Beobachtungs-Fernrohr diametral gegen das Signalrohr, so kann man durch die Stellschrauben die Mitte des Signals genau in die Ebene des Horizontalfadens im Beobachtungs-Fernrohr centriren und andererseits die 45° -Stellung dadurch justiren, dass man die beiden Bögen begleicht, um welche das Beobachtungs-Fernrohr von der Mitte rechts und links hin gewendet werden muss, mit dieselbe anderweitige Stelle des Verticalfadens, z. B. bei einem stark vergrössernden Ocular die Gesichtsfeldgrenze, die nach links und rechts geneigte Lichtlinie schneidet.

Von tautozonalen Flächen der eingestellten Zone wird dieses Signal in der Weise reflectirt, dass beim Drehen des Limbus der Kreuzpunkt der Lichtlinien auf dem Horizontalfaden des Beobachtungs-Fernrohres entlang läuft; wenn der Kreuzpunkt der Lichtlinien den Mittelpunkt des Fadenkreuzes deckt, halbirt die Normale der betreffenden Krystallfläche den Winkel zwischen diesem und der Normalenmitte. Wenn man die nach der Seite der Reflexionsnormale verlaufenden beiden Schenkel der Lichtlinien des Signals die inneren und die anderen beiden die äusseren nennt und einen Goniometer mit horizontalem Limbus im Auge hat, so erscheint im Spiegel einer tautozonalen Krystallfläche ohne Fernrohr beobachtet, die innere-obere Lichtlinie als äussere-obere, die äussere-obere Lichtlinie des Signals als innere-obere. Betrachtet man aber den Reflex durch das Beobachtungs-Fernrohr, welches als sogenanntes astronomisches das Bild umkehrt, so erblickt man den oberen-äusseren

¹ Sitzungsberichte der Akademie in Wien (1871), 64. I. — GROTH Zeitschr. III (1879) S. 356.

Schenkel des Signals als äusseren-unteren und den oberen-
inneren Schenkel des Signals als inneren-unteren.

Wenn die spiegelnde Fläche nach Oben geneigt ist und ihre Nor-
male nach Aussen hin ansteigt, erscheint das von ihr gespiegelte
Signalbild, ohne Fernrohr betrachtet, unter der Horizontalebene, da-
gegen im Gesichtsfelde des Fernrohres (Fig. 2) über der durch den



Horizontalfaden tracirten Horizont-
ebene. Bei einer gewissen Stellung
des Limbus geht der Mittelpunkt de
Signals in r durch den Verticalfaden.
Sei im Gesichtsfelde des Fernrohres r_1
die äussere-untere Lichtlinie, so
bedeuten die scheinbaren Hergänge
auf derselben solche, welche den
äusseren-oberen Schenkel des Signa-
lkreuzes betreffen; dann ist r_2 die
innere-untere Lichtlinie im Gesicht-
felde des Fernrohres und beziehen sich
die auf ihr zu beobachtenden Er-

scheinungen auf Hergänge am inneren-oberen Schenkel des Signa-
lkreuzes.


Dreht man nun den Limbus in der Richtung nach dem Signal, in der
Figur in der Richtung m nach β , so folgt das Bild der Signalmitte dieser
Drehung und kann in eine Stellung r_1 gebracht werden, bei welcher
die Lichtlinie $r_1 a$ in der Lage $r_1 a$, die Mitte m des Fadenkreuzes
schneidet; ebenso kann man den Limbus so weit in entgegengesetzter
Richtung drehen, dass die Lichtlinie $r_2 \beta$ in der Lage $r_2 \beta$ den Mittel-
punkt m schneidet.

Es geht nun die Absicht dahin, aus dem Bogen der Limbus-
drehung = V , welche nothwendig ist, um das Bild der Signalmitte
von r_1 nach r_2 zu führen, den Bogen abzuleiten, um welche die
Normale der spiegelnden Fläche gegen die Ebene der eingestellten
Zone geneigt ist, so wie aus den Limbus-Positionen, bei denen die
Lichtlinien die Mitte m schneiden, die Stelle in der Zone zu bestimmen,
über welcher die Normale senkrecht liegt.

Die Entwicklung der hier in Betracht kommenden Beziehungen
stösst, allgemein durchgeführt, auf sehr complicirte Verhältnisse, welche
sich einigermaßen nur in dem besonderen Falle vereinfachen, wenn
man das Beobachtungs-Fernrohr senkrecht gegen das Signalrohr stellt,

Verhältniss, das sich bei den neueren, nach dem System BABINET gebauten Goniometern ohne Schwierigkeit herbeiführen lässt.

Fig. 3.



Sei in Fig. 3 *im* die Intersection der Ebene der eingestellten Zone mit einer um den Krystall *o* beschriebenen Kugeloberfläche, *io* die Richtung von dem Signalcentrum nach dem Krystall, also die des einfallenden Lichtes, *om* die Richtung vom Krystall nach der Fadenkreuzmitte, also die Richtung, in welcher tautozonale Flächen das Signalcentrum nach der Fadenkreuzmitte spiegeln, wenn ihre Normalen in der

re *of* den Bogen *im* = 2ρ halbiren, so dass $if = fm = \rho$ ist.

Eine Ebene, gelegt durch die äussere-obere Lichtlinie des Signals *l* den Krystall trifft die Kugeloberfläche in einem grössten Kreise *ia*, welche vom oberen Pol der Kugeloberfläche über *o* um 45° abstellt *l* mit der Zonenebene *iom* den Winkel $\alpha im = 90^\circ + 45^\circ$ macht; eine zweite Ebene, gelegt durch die innere-obere Lichtlinie des Signals *l* den Krystall, schneidet die Kugel im Kreise *iβ*, welcher die Zonenebene unter dem Winkel $\beta im = 45^\circ$ trifft.

Der Winkel zwischen den Kreisebenen *ioa* und *ioβ* wird durch die Ebene halbirt, die durch *i* und den Pol über *o* geht, die Kugeloberfläche in einem grössten Kreise trifft, welcher als Linie *io* in der Figur erscheint, auch nach dem Signal verlängert in diesem Winkel zwischen den beiden oberen Lichtlinien halbirt; diese Halbierungslinie im Signal würde, von einer tautozonalen Fläche, deren Normale in *of* liegt, gespiegelt, im Beobachtungs-Fernrohr mit dem Verticalfaden zusammenfallend erblickt werden. Die weiter folgenden Punkte *k*, *k1*, *k2* und *q*, *q1*, *q2* sind auf der Kugeloberfläche zu denken.

Wenn eine nicht tautozonale Fläche *K* einen Punkt *q* des grössten Kreises *io* im Abstände $iq = \delta$ nach dem Mittelpunkte *m* reflectiren will, so muss die Normale dieser Fläche *ok* den Bogen *mq* halbiren; eine Ebene durch *ok*, senkrecht auf der Zonenebene *iom*, schneidet *im* den Bogen *mh* ab, welcher innerhalb des Bogens *fm* belegen ist. Analog dem von mir früher durchgeführten Calcül wird im Dreieck *iqm*:

$$\cos mq = \cos mi \cos iq = \cos 2\rho \cos \delta$$

$$\cos mk = \cos \frac{1}{2}mq = \sqrt{\frac{1 + \cos 2\rho \cos \delta}{2}}$$

$$\sin mk = \sqrt{\frac{1 - \cos 2\rho \cos \delta}{2}}$$

$$\operatorname{tg} mk = \sqrt{\frac{1 - \cos 2\rho \cos \delta}{1 + \cos 2\rho \cos \delta}}$$

In demselben Dreieck iqm ist $\operatorname{tg} imq = \frac{\operatorname{tg} iq}{\sin mi} = \frac{\operatorname{tg} \delta}{\sin 2\rho}$, auch

$$\begin{aligned} \sin hmk &= \sin imq = \sqrt{\frac{\operatorname{tg}^2 \delta}{\operatorname{tg}^2 + \sin^2 2\rho}} = \sqrt{\frac{\sin^2 \delta}{\sin^2 \delta + \sin^2 2\rho \cos^2 \delta}} \\ &= \sqrt{\frac{\sin^2 \delta}{1 - \cos^2 \delta + \sin^2 2\rho \cos^2 \delta}} = \sqrt{\frac{\sin^2 \delta}{1 - \cos^2 2\rho \cos^2 \delta}} \end{aligned}$$

und
$$\cos hmk = \sqrt{\frac{\sin^2 2\rho \cos^2 \delta}{1 - \cos^2 2\rho \cos^2 \delta}}$$

Es ist nun $kh = \eta$ der Bogen, um welchen die Normale der Fläche K gegen die Zonenebene geneigt ist, und h der Punkt, über welchem sie senkrecht liegt.

Im Dreieck hkm ist $\sin kh = \sin mk \sin hmk$, also

$$\sin \eta = \sqrt{\frac{1 - \cos 2\rho \cos \delta}{2}} \sqrt{\frac{\sin^2 \delta}{1 - \cos^2 2\rho \cos^2 \delta}} = \sqrt{\frac{\sin^2 \delta}{2 + \cos 2\rho \cos^2 \delta}}$$

Wird $2\rho = 90^\circ$ genommen, so wird $\sin \eta = \sin \delta \sqrt{\frac{1}{2}}$.

Im Dreieck hkm ist ferner

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} hm &= \operatorname{tg} mk \cos hmk = \sqrt{\frac{1 - \cos 2\rho \cos \delta}{1 + \cos 2\rho \cos \delta}} \sqrt{\frac{\sin^2 2\rho \cos^2 \delta}{1 - \cos^2 2\rho \cos^2 \delta}} \\ &= \frac{\sin 2\rho \cos \delta}{1 + \cos 2\rho \cos \delta} \end{aligned}$$

Der Abstand des Punktes f von h , also der Bogen $hf = \theta$ wird gefunden: $\operatorname{tg} \theta = \operatorname{tg} (\rho - hm)$

$$\begin{aligned} &\frac{\sin \rho}{\cos \rho} - \frac{\sin 2\rho \cos \delta}{\cos \rho \cdot 1 + \cos 2\rho \cos \delta} = \frac{\sin \rho}{\cos \rho} \cdot \frac{1 - \cos \delta}{1 + \cos \delta} = \operatorname{tg} \rho \operatorname{tg}^2 \frac{\delta}{2} \\ &1 + \frac{\sin \rho}{\cos \rho} \cdot \frac{\sin 2\rho \cos \delta}{1 + \cos 2\rho \cos \delta} \end{aligned}$$

Wenn $2\rho = 90^\circ$, $\rho = 45^\circ$ genommen wird, ist

$$\operatorname{tg} \theta = \operatorname{tg}^2 \frac{\delta}{2}.$$

Wenn der Limbus aus der Position h , bei welcher der Punkt q nach m reflectirt wird, um den Bogen τ , auf das Signal zu, so weit gedreht wird, dass die vorher mit h zusammenfallende Stelle den Platz h , annimmt, so beschreibt der Punkt k der Flächennormale von K einen Kleinkreis auf der Kugeloberfläche und tritt in die Stelle k_1 ;

man kann τ_1 so gross machen, dass nunmehr ein Punkt q_1 des Kreises *ia* nach m reflectirt wird. Die Bedingung für die Grösse von τ_1 ergibt sich dadurch, dass man alsdann für den Cosinus des Bogens mq_1 zwei Gleichungen aufstellen kann. Ebenso kann man den Limbus auch um den Bogen τ_2 in der Richtung vom Signal nach h_2 drehen, so dass ein Punkt q_2 des Kreises *iβ* nach m reflectirt wird, dann nimmt die Normale auf Fläche k die Stellung ok_2 ein und liegt k_2 in der entgegengesetzten Fortsetzung des besagten Kleinkreises; aus den beiden Gleichungen für mq_2 wird man die Bedingung für die Grösse des Bogens τ_2 ermitteln.

Was zunächst den Bogen τ_1 anbelangt, so ist im Dreieck h_1mk_1 :

$$\operatorname{tg} h_1mk_1 = \frac{\operatorname{tg} k_1h_1}{\sin mh_1}.$$

$$\text{Da } \sin k_1h_1 = \sin kh = \sqrt{\frac{\sin^2 \delta}{2 + 2 \cos 2\rho \cos \delta}} \text{ oben gefunden,}$$

so ergibt sich

$$\operatorname{tg} k_1h_1 = \sqrt{\frac{\sin^2 \delta}{2 + 2 \cos 2\rho \cos \delta - \sin^2 \delta}} = \sqrt{\frac{\sin^2 \delta}{1 + 2 \cos 2\rho \cos \delta + \cos^2 \delta}}.$$

Es ist andererseits

$$\begin{aligned} \sin mh_1 &= \sin (mf - fh + hh_1) = \sin (\rho - \theta + \tau_1) \\ &= \sin [\tau_1 + (\rho - \theta)] = \sin \tau_1 \cos (\rho - \theta) + \cos \tau_1 \sin (\rho - \theta). \end{aligned}$$

$$\text{Aus } \operatorname{tg} \theta = \frac{\sin \rho}{\cos \rho} \cdot \frac{1 - \cos \delta}{1 + \cos \delta} \text{ folgt:}$$

$$\sin \theta = \frac{\sin \rho (1 - \cos \delta)}{\sqrt{1 + 2 \cos 2\rho \cos \delta + \cos^2 \delta}},$$

$$\cos \theta = \frac{\cos \rho (1 - \cos \delta)}{\sqrt{1 + 2 \cos 2\rho \cos \delta + \cos^2 \delta}} \text{ und ferner}$$

$$\cos (\rho - \theta) = \frac{1 + \cos 2\rho \cos \delta}{\sqrt{1 + \cos 2\rho \cos \delta + \cos^2 \delta}},$$

$$\sin (\rho - \theta) = \frac{\sin 2\rho \cos \delta}{\sqrt{1 + \cos 2\rho \cos \delta + \cos^2 \delta}}, \text{ so dass}$$

$$\sin mh_1 = \frac{\sin \tau_1 (1 + \cos 2\rho \cos \delta) + \cos \tau_1 \cdot \sin 2\rho \cos \delta}{\sqrt{1 + 2 \cos 2\rho \cos \delta + \cos^2 \delta}}$$

und wenn wir für $\sin \tau_1 (1 + \cos 2\rho \cos \delta) + \cos \tau_1 \cdot \sin 2\rho \cos \delta$ die Bezeichnung w_1 einführen

$$= \frac{w_1}{\sqrt{1 + 2 \cos 2\rho \cos \delta + \cos^2 \delta}}$$

und dies eingesetzt, giebt

$$\operatorname{tg} h_1mk_1 = \frac{\operatorname{tg} k_1h_1}{\sin mh_1} = \frac{\sin \delta}{w_1}, \text{ auch}$$

$$\sin h_1 m k_1 = \frac{\sin \delta}{\sqrt{\sin^2 \delta + w_1^2}}, \quad \cos h_1 m k_1 = \frac{w_1}{\sqrt{\sin^2 \delta + w_1^2}}.$$

Im Dreieck $i q_1 m$ ist

$$\begin{aligned} \cos m q_1 i &= -\cos(90^\circ + 45^\circ) \cos h_1 m k_1 + \sin(90^\circ + 45^\circ) \sin h_1 m k_1 \cos 2\rho \\ &= \frac{\sin \delta \cos 2\rho + w_1}{\sqrt{2 \sin^2 \delta + 2w_1^2}} \quad \text{und daraus} \end{aligned}$$

$$\sin m q_1 i = \sqrt{\frac{\sin^2 \delta + w_1^2 + \sin^2 \delta \sin^2 2\rho - 2 \sin \delta \cos 2\rho w_1}{2 \sin^2 \delta + 2w_1^2}}$$

In demselben Dreieck ist weiter

$$\begin{aligned} \sin m q_1 : \sin m i q_1 &= \sin m i : \sin m q_1 i \quad \text{und} \\ \sin m q_1 &= \frac{\sqrt{\frac{1}{2}} \sin 2\rho}{\sin m q_1 i} = \sqrt{\frac{\sin^2 2\rho \sin^2 \delta + w_1^2 \sin^2 2\rho}{\sin^2 \delta + w_1^2 + \sin^2 \delta \sin^2 2\rho - 2 \sin \delta \cos 2\rho w_1}}, \end{aligned}$$

und

$$\cos m q_1 = \frac{\sin \delta - w_1 \cos 2\rho}{\sqrt{(w_1 - \sin \delta \cos 2\rho)^2 + 2 \sin^2 \delta \sin^2 2\rho}}.$$

Andererseits ist im Dreieck $h_1 m k_1$

$$\begin{aligned} \cos m k_1 &= \cos m h_1 \cos k_1 h_1 \\ &= \sqrt{1 - \sin^2 m h} \sqrt{1 - \frac{\sin^2 \delta}{2 + 2 \cos 2\rho \cos \delta}} \\ &= \sqrt{\frac{1 + 2 \cos 2\rho \cos \delta + \cos^2 \delta - w_1^2}{2 + 2 \cos 2\rho \cos \delta}} \end{aligned}$$

und

$$\cos m q_1 = \cos 2 m k_1 = 2 \cos^2 m k_1 - 1 = \frac{\cos 2\rho \cos \delta + \cos^2 \delta - w_1^2}{1 + \cos 2\rho \cos \delta}.$$

Damit also ein Punkt des Bogens ia nach m reflectirt wird, muss τ_1 eine Grösse haben, welche

$$\frac{\sin \delta - w_1 \cos 2\rho}{\sqrt{(w_1 - \sin \delta \cos 2\rho)^2 + 2 \sin^2 \delta \sin^2 2\rho}} = \frac{\cos 2\rho \cos \delta + \cos^2 \delta - w_1^2}{1 + \cos 2\rho \cos \delta}$$

ergibt, unter der Voraussetzung, dass

$$w_1 = \sin \tau_1 (1 + \cos 2\rho \cos \delta) + \cos \tau_1 \sin 2\rho \cos \delta$$

bedeutet.

Dieser Ausdruck vereinfacht sich nur in dem besonderen Falle, dass $\rho = 45^\circ$, $2\rho = 90^\circ$ und dann $\cos 2\rho = 0$, $\sin 2\rho = 1$ wird; dann lautet die Bedingungsgleichung

$$\frac{\sin \delta}{\sqrt{w_1^2 + 2 \sin^2 \delta}} \quad \text{oder} \quad \frac{\sin \delta}{\sqrt{1 + \sin^2 \delta - (\cos^2 \delta - w_1^2)}} = \cos^2 \delta - w_1^2$$

worin $w = \cos \tau_1 \cos \delta + \sin \tau_1$ bedeutet und

$$\begin{aligned} \cos^2 \delta - w_1^2 &= \cos^2 \delta - \cos^2 \tau_1 \cos^2 \delta - 2 \cos \tau_1 \cos \delta \sin \tau_1 - \sin^2 \tau_1 \\ &= -\sin^2 \tau_1 \sin^2 \delta - \sin 2\tau_1 \cos \delta \quad \text{ausfällt.} \end{aligned}$$

Da nun sowohl τ_1 als auch δ in den hier in Betracht kommenden Fällen kleine Winkel sind, namentlich δ nicht über das Gesichtsfeld

des Fernrohres hinausreichen soll, kann man den Werth von $\sin^2 \tau \sin^2 \delta$ vernachlässigen und die Bedingungsgleichung auch

$$\sin \delta = (-\sin 2\tau_1 \cos \delta) \pm \sqrt{1 + \sin^2 \delta + \sin 2\tau_1 \cos \delta}$$

oder, da es nur auf die Grösse des Winkels δ ankommt,

$$\sin \delta = \sin 2\tau_1 \cos \delta \sqrt{1 + \sin^2 \delta + \sin 2\tau_1 \cos \delta}$$

und

$$\operatorname{tg} \delta = \sin 2\tau_1 \sqrt{1 + \sin 2\tau_1 \cos \delta + \sin^2 \delta} \text{ schreiben.}$$

Dieser Ausdruck besagt, dass für einen kleinen Winkel δ nahezu $\operatorname{tg} \delta = \sin 2\tau_1$ sein wird, so dass man ohne sonderlichen Fehler

$\cos \delta$ durch $\cos 2\tau_1$, $\sin^2 \delta$ durch $\sin^2 2\tau_1$ ersetzen und annähernd

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} \delta &= \sin 2\tau_1 \sqrt{1 + \sin 2\tau_1 \cos 2\tau_1 + \sin^2 2\tau_1} \\ &= \sin 2\tau_1 \left(1 + \frac{\sin 2\tau_1 \cos 2\tau_1}{2} + \frac{3}{8} \sin^2 2\tau_1 \dots \right) \\ &= \sin 2\tau_1 + \frac{\sin^2 2\tau_1 \cos 2\tau_1}{2} + \frac{3}{8} \sin^3 2\tau_1 \dots \end{aligned}$$

annehmen kann.

Führt man die analoge Rechnung für den Bogen $\tau_2 = h h_2$ aus, so wird

$$\begin{aligned} \sin m h_2 &= \sin (m f - f h - \tau_2) = \sin [-\tau_2 + (\rho - \theta)] \\ &= -\sin \tau_2 (1 + \cos 2\rho \cos \delta) + \cos \tau_2 \sin 2\rho \cos \delta \\ &= \frac{\sin \delta + \cos 2\rho \cos \delta + \cos^2 \delta}{\sqrt{1 + 2 \cos 2\rho \cos \delta + \cos^2 \delta}} \end{aligned}$$

und wenn wir für $-\sin \tau_2 (1 + \cos 2\rho \cos \delta) + \cos \tau_2 \sin 2\rho \cos \delta$ die Bezeichnung $= w_2$ einführen, und erwägen, dass im Dreieck $i q_2 m$ der Winkel $i q_2 m > 90^\circ$ ausfällt, schliesslich

$$\cos m q_1 = \frac{\sin \delta + w_2 \cos 2\rho}{\sqrt{(w_1 + \sin \delta \cos 2\rho)^2 + 2 \sin^2 \delta \sin^2 2\rho}} = \frac{\cos 2\rho \cos \delta + \cos^2 \delta - w_2^2}{1 + \cos 2\rho \cos \delta}.$$

Dieser Ausdruck vereinfacht sich für den Fall, dass $2\rho = 90^\circ$ gemacht wird gleichfalls auf

$$\frac{\sin \delta}{\sqrt{1 + \sin^2 \delta - (\cos^2 \delta - w_2^2)}} = \cos^2 \delta - w_2^2.$$

worin

$$w_2 = \cos \tau_2 \cos \delta - \sin \tau_2 \quad \text{und} \quad \cos^2 \delta - w_2^2 = -\sin^2 \tau_2 \sin^2 \delta + \sin 2\tau_2 \cos \delta \text{ bedeutet.}$$

Vernachlässigt man nun aus den oben angeführten Gründen $\sin^2 \tau_2 \sin^2 \delta$ und vertauscht $\cos \delta$ mit $\cos 2\tau_2$, $\sin^2 \delta$ mit $\sin^2 2\tau_2$, so hat man annähernd

$$\operatorname{tg} \delta = \sin 2\tau_2 - \frac{\sin^2 2\tau_2 \cos 2\tau_2}{2} + \frac{3}{8} \sin^3 2\tau_2.$$

Es beziehen sich nun τ_1 und τ_2 auf dasselbe δ , und ist daher

$$\begin{aligned} 2 \operatorname{tg} \delta &= \sin 2\tau_1 + \frac{\sin^2 2\tau_1 \cos 2\tau_1}{2} + \frac{3}{8} \sin^3 2\tau_1 + \\ &+ \sin 2\tau_2 - \frac{\sin^2 2\tau_2 \cos 2\tau_2}{2} + \frac{3}{8} \sin^3 2\tau_2 \dots \end{aligned}$$

Da nun τ_1 und τ_2 an sich klein und beinahe gleich anzunehmen sind, so kann man

$$\frac{\sin^2 2\tau_1 \cos 2\tau_1}{2} = \frac{\sin^2 2\tau_2 \cos 2\tau_2}{2}$$

ansehen und

$$2 \operatorname{tg} \delta = 2 \sin (\tau_1 + \tau_2) + \frac{6}{8} \sin^3 (\tau_1 + \tau_2) \text{ oder}$$

$$\operatorname{tg} \delta = \sin (\tau_1 + \tau_2) + \frac{3}{8} \sin^3 (\tau_1 + \tau_2) \text{ setzen; da}$$

ferner $\operatorname{tg} (\tau_1 + \tau_2) = \sin (\tau_1 + \tau_2) + \frac{1}{2} \sin^3 (\tau_1 + \tau_2) + \dots$ ist, so fällt in der That nahezu

$$\delta = \tau_1 + \tau_2 \text{ aus.}$$

Es ist aber $\tau_1 + \tau_2$ die Differenz V der Limbus-Positionen in Stellungen h_1 und h_2 , welche gemessen wird, also $V = \delta$ und insofern $2\rho = 90^\circ$ vorausgesetzt wird, der Abstand η auszudrücken durch

$$\sin \eta = \sqrt{\frac{1}{2}} \cdot \sin V = 0,707 \sin V,$$

was für kleine Winkel nahezu auf

$$\eta = 0,707 \cdot V \text{ hinausläuft.}$$

Um die Stelle in der justirten Zone zu bestimmen, über welcher die Fläche k senkrecht liegt, ist zu erwägen, dass, wenn eine Fläche H in der justirten Zone vorhanden wäre, welche senkrecht unter k stände, ihre Normale in oh liegen würde, sobald der Punkt q nach m reflectirt und das Signalcentrum i den Verticalfaden des Beobachtungs-Fernrohrs schneidet; dann reflectirt die Fläche H nicht das Signalcentrum i nach m , sondern einen Punkt s innerhalb des Bogens mi und muss der Limbus noch um den Bogen $hf = \theta$ auf die Position h zu gedreht werden, damit die hypothetische Fläche H das Signalcentrum nach m reflectire.

Um bei Abwesenheit der Fläche H ihre Lage zu bestimmen, hat man daher nur nothwendig, die Limbus-Position zu notiren, bei welcher das Signalcentrum den Verticalfaden passirt und dieser Position noch den Bogen θ in der Richtung nach r , hinzuzulegen; wenn das Signalcentrum den Punkt r in Figur 2 passirt, würde von der hypothetischen Fläche H das Signalcentrum nach der Stelle r im Horizontalfaden geworfen werden.

Wenn bei weiterer Drehung des Limbus vom Signal weg der Reflex einer tautozonalen Fläche U das Signalcentrum nach m spiegelt, so muss Fig. 3 diese Drehung uf sein. Die Limbusdrehung $= \epsilon$, also die Differenz zwischen den Limbus-Positionen, zwischen der Stellung, wo der Reflex r von k den Verticalfaden schneidet und der, wo der

lex durch U die Mitte m deckt, ist um θ grösser als uf , also $= \varepsilon - \theta$.

Erscheint dagegen der Reflex einer tautozonalen Fläche U' bei weiterer Drehung nach dem Signal zu, dann ist $u_1 f = \varepsilon_1 + \theta$.

Sei ok_0 die Lage der Normale von K , wenn H die Signalmitte in m reflectiren würde; alsdann folgt aus $fk_0 = kh = \eta$ und $fu = \varepsilon - \theta$ Dreieck fuk_0 :

$$\operatorname{tg} fuk_0 = \frac{\operatorname{tg} \eta}{\sin (\varepsilon - \theta)}$$

Es ist zwar ist fuk_0 der Winkel, unter welchem der Zonenbogen durch Flächen U und K den Zonenbogen der eingestellten, durch U' endenden Zone trifft, welcher bei bekannten krystallographischen Werten und bekanntem Symbol von U in bekannter Zone die Lage UK giebt.

Es ist ferner $\cos uk_0 = \cos \eta \cos (\varepsilon - \theta)$ und somit in uk_0 der Zonenbogen UK in bekannter Zone gefunden und damit das Symbol K abzuleiten.

$$\text{Es ist aber } \operatorname{tg} \theta = \operatorname{tg}^2 \frac{\delta}{2} = \operatorname{tg}^2 \frac{V}{2}.$$

Man kann sich die Einstellung des Reflexcentrums auf den Veralfaden ersparen, weil τ_1 und τ_2 ein von der Summe V abhängiges Verhältniss haben.

$$\begin{aligned} \text{Da } \operatorname{tg} \delta &= \sin 2\tau_1 + \frac{1}{2} \sin^2 2\tau_1 \cos 2\tau_1 + \frac{3}{8} \sin^3 2\tau_1 + \dots \\ &= \sin 2\tau_2 - \frac{1}{2} \sin^2 2\tau_2 \cos 2\tau_2 + \frac{3}{8} \sin^3 2\tau_2 \end{aligned}$$

, fällt τ_2 etwas grösser als τ_1 aus, d. h. der Limbus-Ausschub nach aussen, dem Reflexwege rr_2 entsprechend, ist etwas grösser als der Ausschub nach Innen, dem Reflexwege rr_1 entsprechend.

Die Differenz $\tau_2 - \tau_1 = \Delta$ ergibt sich mit Rücksicht auf die Einheit und fast gleiche Grösse von τ_1 und τ_2 aus

$$\sin 2\tau_2 - \sin 2\tau_1 = \frac{1}{2} (\sin^2 2\tau_1 \cos 2\tau_1 + \sin^2 2\tau_2 \cos 2\tau_2),$$

dem man

$$\sin 2\tau_2 - \sin 2\tau_1 = \frac{\sin 2(\tau_2 - \tau_1)}{\cos (\tau_1 + \tau_2)} = \frac{\sin 2\Delta}{\cos V}$$

und

$$\begin{aligned} (\sin^2 2\tau_1 \cos 2\tau_1 + \sin^2 2\tau_2 \cos 2\tau_2) &= \sin^2 (\tau_1 + \tau_2) \cos (\tau_1 + \tau_2) \\ &= \sin^2 V \cos V \text{ setzt, annähernd} \end{aligned}$$

$$\sin 2\Delta = \sin^2 V \cos^2 V = \frac{1}{4} \sin^2 V.$$

Darnach wird für kleine Winkel beinahe $\Delta = 2\theta$; es ist z. B.

für $V = 3^\circ 0' 0''$ der Bogen $\theta = 0^\circ 2' 21.44''$

der Bogen $\Delta = 0^\circ 4' 41.72 = 2 \cdot 0^\circ 2' 20.86''$.

Da nun goniometrische Präcision bei derartigen Versuchen kaum einen Fehler von $\pm 3''$ vermeidet, und $V = 3^\circ$ schon die Grenze ist, welche hier in Betracht kommt, so kann man auch

$$\text{für } \tau_2 + \theta = \frac{V}{2} + \frac{\Delta}{2} + \theta \text{ kürzer } \frac{V}{2} + 2\theta$$

$$\tau_1 - \theta = \frac{V}{2} - \frac{\Delta}{2} - \theta \quad \frac{V}{2} - 2\theta$$

einsetzen.

Bei $V = 0^\circ 20'$ wird $2\theta = 0^\circ 0' 3.5''$, so dass man bei Werth für V , welche kleiner als $0^\circ 20'$ sind θ vernachlässigen kann.

Die hier entwickelten Verhältnisse gelten auch für das in Fig. 1 dargestellte Verfahren, bei welchem als Signal eine kleine runde Öffnung dient und im Beobachtungs-Fernrohr zwei mit 45° geneigte Fäden angebracht sind. Es liegt aber jetzt der grössere Ausschub rr_2 auf der inneren Seite, der kleinere rr_1 auf der äusseren.

Wenn das Signalbild den Verticalfaden passirt, würde das von der hypothetischen Fläche H gespiegelte Signalbild in Fig. 1 bei ϵ , d. h. von m nach Aussen liegen. Es wird dies ersichtlich, wenn man in Fig. 3 unter oi die Richtung vom Krystall nach der Fadenkreuzmitte des Beobachtungs-Fernrohres, unter om die Richtung vom Signalcentrum nach dem Krystall erkennt.

Nachtrag zu LEIBNIZENS und HUYGENS' Briefwechsel mit PAPIN.

VON E. GERLAND
in Kassel.

Vorgelegt von Hrn. du Bois-REYMOND am 26. October [s. oben S. 891].)

Ich bringe hier eigentlich eine Durchsicht der von LEIBNIZ hinterlassenen Schriften über den physikalischen und technischen Inhalt, deren Resultat ich mir zur Veröffentlichung in der Akademie der Wissenschaften zu unterbreiten erlauben werde, vor. Ich habe mir eine Anzahl Briefe und sonstige Schriftstücke zur Kenntniss, deren Inhalt in mehrfacher Hinsicht von grossem Interesse ist. Sie sind nämlich geeignet, weitere Aufklärungen zu geben über das Verhältniss PAPIN's und LEIBNIZENS, über die Theilnahme, welche der letztere an den Arbeiten, die zur Erfindung, sowie denjenigen, welche zur weiteren Ausbildung der Dampfmaschine führten, entgegenbrachte, auch über des ersteren Familienverhältnisse und letzten Geschiede. Ich erlaube mir ihren Inhalt im Folgenden vorzuführen, wobei es sich empfehlen wird, dies möglichst in chronologischer Reihenfolge zu thun.¹ Das älteste und zugleich interessanteste dieser Schriftstücke ist ein Concept des Empfehlungsbriefes, den LEIBNIZ seinem Freunde an den Secretär der Royal Society, Dr. SLOANE, mitgab. Der Wortlaut desselben ist der folgende:

Viro nobilissimo et celeberrimo dno HANS SLOANE Societatis Regiae Britannicae Secretario GODEFRIDUS GUILIELMUS LEIBNITUS s. p. d.
Quem aegre ex Germania dimittimus celeberrimo viro DIONYSIO PETRO ad vos redeunti has ad te literas dare volui, quibus et a te apud Te officia renovarem et testarer, quantum faciam virum ingenium, qui tamdiu has oras inventis et meditatis suis donavit. Nec cum non sine ratione judicet, nonnulla ex illis apud vos in maiorem habere posse, ad vos navem novam fert, vel eo citius fertur. Argonauta et in eo sum, ut videam novo remigiorum rotatiliū per annum hunc descendente. Itaque vobis

¹ Dass sich dabei einige Berichtigungen des in dem Briefwechsel LEIBNIZENS und PAPIN'S mit PAPIN Mitgetheilten als nöthig ergeben werden, wird den nicht übersehen, der die Schwierigkeit solcher Quellenstudien kennt.

virum gratulor, et reipublicae, cui non exiguum ab eo fructu spero. Inclytae Societatis Regiae britannicae decora mihi semper cordi sunt grato, in quibus est nosse subinde quae praeclara etiam extra sanctum se gerant. Caeterum te rogo ut magnum virum ejus praesidem aliosque amicos a me salutes et me Tibi comme datum habeas. Vale.

Dabam Cassellis 23. Septembr. 1707.

Diesem Briefe zufolge hat also LEIBNIZ den lange gehegten und immer wieder verschobenen Vorsatz, PAPIN zu besuchen, ausgeführt und sich rasch zur Reise nach Kassel entschlossen, nachdem ihm jen. am 15. September geschrieben, dass er nunmehr seine Reise in den nächsten Tagen antreten würde. LEIBNIZ sah mit Befriedigung die Wirkung der Ruderräder, von einem Dampfschiffe ist auch hier nicht die Rede. Dann schrieb er seinen Empfehlungsbrief an SLOANE und am folgenden Tag reiste PAPIN ab, leider um bald genug in seiner Reise gehemmt zu werden. Wir können nur vermuthen, dass er wohl wieder nach Kassel zurückging. That er dies aber, dann wird LEIBNIZ dort noch getroffen haben. Denn der Anfang des Briefes den der Drost von ZEUNER am 27. September an LEIBNIZ schrieb und der nunmehr erst seine Erklärung findet, beweist, dass der hannoversche Hofrath noch einige Tage in Kassel verweilte.

Mit dieser letzten persönlichen Begegnung hörte der Verkehr LEIBNIZENS mit PAPIN auf. Dass die Schuld davon an letzterem la beweisen LEIBNIZENS öftere Versuche von dem in London mit immer wachsender Noth ringenden Freunde Nachricht zu erhalten. Es ist nicht recht einzusehen, warum PAPIN sich von London aus mit keinem Wort mehr an LEIBNIZ wandte. Hinderte ihn vielleicht die Schatzkammer, dass er seines Gönners Warnungen², die sich nur als allzu begründet bewiesen, nicht befolgt hatte oder fehlte es ihm an Gelegenheit Briefe zu befördern? Er hatte allerdings auch, als er im Jahre 1700 einige Monate nach Holland gereist war³, nicht an LEIBNIZ geschrieben scheint überhaupt kein Freund vom Briefschreiben gewesen zu sein. Ebenso wie sich LEIBNIZ damals an FLEMMER und den Baron von STAFF

¹ Vergl. Briefwechsel u. s. w. S. 385 No. 151.

² Ib. S. 215. No. 54.

³ Ib. S. 256. No. 90.

⁴ Dies ist der richtige Namen, wie ihn seine Unterschrift ergiebt, ich ihn fälschlich »STASS« gelesen. Sechs Briefe von STAFF, zwei Concepte von LEIBNIZ bilden die Correspondenz Beider. Das eine dieser letzteren ist dasjenige Briefes, der in Leibnitii epistolis ad diversos von KORTHOFT III 373 veröffentlicht und am 14. Januar 1702 geschrieben wurde. Soweit die Correspondenz Interesse hat, werde ich sie demnächst in den Schriften des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde mittheilen. Hier genüge die Bemerkung, dass STAFF am 13. Februar

~~und~~ Nachrichten über seinen Schützling gewandt hatte, richtete er ~~nun~~ dieselbe Bitte an HASPERG und an ZUMBACH VON KOESFELD.

HASPERG, wie er sich selbst, oder HASBERG, wie ihn LEIBNIZ schreibt, war Secretär des Herzogs von Wolfenbüttel und befand sich in den Jahren 1713 und 1714 in Geschäften seines Herrn in London. ZUMBACH dagegen, in Trier geboren, hatte von 1688—1708 in Leiden gelebt, war dann an das in Cassel neu errichtete Collegium Carolinum berufen und blieb hier bis an sein Lebensende. Dem Secretär des ihm befreundeten Fürsten muss LEIBNIZ aufgetragen haben, sich nach PAPIN zu erkundigen, denn am 5. November 1713 schrieb HASPERG an LEIBNIZ: »Et de Mons. PAPIN je n'entendis rien en Hollande, d'ailleurs je me serois donné l'honneur d'aller chez lui, il m'a montré autrefois à Cassel sa manière d'amollir les os.« Weiter enthalten seine Briefe nichts über den Erfinder der Dampfmaschine, wohl aber einiges Bemerkenswerthe über diese selbst. In einem vom 11. December 1713 datirten Brief findet sich nämlich die Stelle: »les deux Messieurs [WOODWARD und SLOANE] ne savent rien du Manuscript ni de l'Explication que le Marquis de WORCESTER promet à la fin de son petit livre de problèmes«. Es ist damit die bekannte Century of inventions gemeint, an deren Schluss der Verfasser ein grösseres, denselben Stoff behandelndes Werk in Aussicht stellte, welches aber nie erschien. Für uns hat die Briefstelle Interesse, da sie einen neuen Beweis liefert für den Eifer, mit welchem LEIBNIZ Alles verfolgte, was die Dampfmaschine betraf. Das hatte er PAPIN, das hatte er SAVERY gegenüber gezeigt. Schon 1704 hatte er den letzteren über die Wirkungsfähigkeit seiner Maschine befragt; die Antwort auf diese Anfrage ist noch vorhanden. Auch eine Zeichnung der Maschine erhielt LEIBNIZ und schickte sie am 6. Januar 1705 an PAPIN¹. Der Umstand, dass in Hannover noch eine Copie jenes Schreibens von SAVERY existirt, lässt vermuthen, dass er auch den Inhalt desselben PAPIN mitzutheilen die Absicht hatte. Warum dies nicht geschehen, ist nicht recht ersichtlich, übrigens ist in der den Briefwechsel² einleitenden Biographie bereits hervorgehoben, dass es die Prioritätsansprüche PAPIN's nicht im Mindesten beeinträchtigt haben würde, wenn er Kenntniss von jenem Briefe erhalten hätte.

¹⁷⁰² schreibt, PAPIN sei, obwohl er beim Landgrafen in hoher Achtung stehe und einen beträchtlichen Gehalt beziehe, ein wenig ungeduldig, doch rede er nicht davon sich zu verändern. Freilich billige das Publicum seine Bestrebungen nicht in Folge des Misserfolges, welchen sein Taucherschiff gehabt habe (vgl. über den Vorfall Briefwechsel etc. S. 59).

¹ Briefwechsel S. 339.

² Ib. S. 97.

Die von ZUMBACH an LEIBNIZ geschriebenen Briefe haben ein ungleich grösseres Interesse, als die HASPERG'schen, sowohl was PAPIN selbst, als was seine Erfindung betrifft. Am 13. Juni 1715 schrieb er: »Mitto hic descriptionem effectuum Machinae illius hydraulice pyreumaticae, quam inventionem nuper ex Anglia secum contulit Capitaneus et ingeniarius Weber. estque multis modis perfectior illa D. C. Savery, noster serenissimus Landgravius examinavit ipse illam machinam fuitque oculatus testis effectuum illius: Rogavit me antedictus Capitaneus ut illam descriptionem Excellentiae vestrae mitterem simul rogarem, ut metalli fodinarum Hannoverensium Directoribus ejus notitiam praebere dignetur. idem Capitaneus ut et alii retulerunt michi Dominum Papinium nunc Hagae comitum in angusto satis morari statu praeceptorem agens puerorum.

Dem hier erwähnten Capitän Weber begegnen wir später als Major wieder, in welcher Stellung er bei den Canalbauten des Landgrafen Karl mitwirkte, die obwohl anfangs das gewaltige Project einer Verbindung zwischen Weser und Rhein verfolgend, hauptsächlich in Folge des Todes des Landgrafen mit dem Bau eines Canals zwischen Hümme und Karlshafen ihr Ende fanden¹. Den angekündigten Bericht über die neue Dampfmaschine sandte Weber im Juni 1715 an LEIBNIZ ein. Er sagt darin unter Anderem, dass man diese Maschine an Orten aufstellen solle, wo keine Wasserkräfte vorhanden seien, dass sie um $\frac{1}{4}$ weniger Kosten verursache, wie Pferde- oder Menschenkräfte, dass man mit ihr das Wasser bis zu jeder beliebigen Höhe heben könne, dass sie auch vortrefflich zur Ventilation der Bergwerke geeignet sei, endlich dass eine solche Maschine, welche in 24 Stunden $\frac{1}{2}$ Klafter Holz verbrauche, in derselben Zeit 6480 Ohm Wasser 150 Fuss hoch hebe.

Die genaue Beschreibung der an der Wallmauer in Kassel errichteten Dampfmaschine, wohl der ersten in Deutschland, die noch 1783 vorhanden war², bewahrt auch den Landgrafen Karl vor dem Vorwurf, den man nach WEIDLER's³ Bericht zu erheben berechtigt war, er habe nach PAPIN's Weggang eine Savery'sche Maschine aufstellen lassen, deren Unvollkommenheit im Vergleich zu PAPIN's Entwürfen er doch hätte kennen müssen. Die Maschine dürfte demnach wohl eine Newcomen'sche gewesen sein.

¹ Vergl. Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde. Neue Folge. IX. Bd. S. 348.

² Vgl. Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure. XXIII. S. 235.

³ WEIDLERI Tractatus de Machinis Hydraulicis toto terrarum orbe maxime Marlyense et Londinensi et aliis rarioribus similibus. Ed. II. 1733. S. 86.

Die von PAPIN handelnde Stelle des ZUMBACH'schen Briefes ist ich unverständlich, sie wird es noch mehr, wenn man den Brief, der Kasseler Professor am 24. October 1715 an LEIBNIZ richtete, an hält. Doch ist dieser so ausführlich und klar, dass man keinen kein Gewicht mehr wird legen dürfen, sondern annehmen, ich habe entweder falsch Verstandenes weiter gegeben oder was zu liegen scheint, sich vielleicht in Folge ungenügender Kenntniss der lateinischen Sprache unrichtig ausgedrückt. Am 25. October schreibt er nämlich: »Non recordor, an in ultimis meis ad Excellentiam datis propiorem magis informationem dederim super statu papinii ejusque familiae: Jam enim per Amicum Anglum Hagae cum morantem informatus sum: Bonum istum virum in Angliam rem valde mortuum fuisse, et privigna ejus Hanoverae aut in Hollandia inservit illustrissimo Comiti de Kielmanseck: Uxor ejus plusquam sexagaria Hamburgi etiam pro Mademoiselle inservit, soror Papinii Lodovici alit et instruit des pensionnaires filias.« An der Glaubwürdigkeit dieser Nachrichten zu zweifeln, haben wir nicht den geringsten Grund. Wenn sie einerseits beweisen, dass man an den Erfinders Schicksalen, auch nachdem er Kassel verlassen, nicht aufhörte, Antheil zu nehmen, so bewahrheiten sie auch das Bedauernswertheste die von mir bereits ausgesprochene Vermuthung über sein Ende in England, indem sie dasselbe noch trauriger machen, als ich annehmen zu müssen glaubte. Um Ideen durchzusetzen, die hundert Jahre später das Glück von Millionen zu begründen konnten waren, hat er nicht nur seine eigene Existenz, sondern auch die seiner Familie geopfert. Möge ihm denn endlich die Nachberechtigung werden! In doppelter Weise setzt uns hierzu der Nachlass Papins in den Stand, einmal durch die von ihm stammende Manuscripte der Bibliothek zu Hannover, dann durch die von ihm gesammelte Akademie der Wissenschaften in Berlin, deren Munificenz Studien ermöglichte, deren Resultate im Anschluss an die in dem Briefwechsel u. s. w. enthaltenen hier dargelegt worden sind.

Es sei zum Schlusse gestattet, einige Berichtigungen, PAPIN's betreffend, anzuführen, welche sich aus dem Obigen, sowie aus der nochmaligen Durchforschung der Kirchenbücher in Kassel und Hamburg, die durch eine kleine Schrift von BELTON und BOURNON, *Notice de Denis Papin d'après des documents inédits*, Blois 1880, bekannt gemacht wurde, ergeben haben.

Unzuletzt hatte ich auf de la Saussayes Autorität hin angenommen, dass PAPIN's Schwiegermutter Madelaine Pajon war.¹ Das ist nicht

Vergl. Briefwechsel S. 33.

richtig. Vielmehr war sie, wie ihre eigene Unterschrift, die im Staatsarchiv in Marburg vorhanden ist, bezeugt, Marie de Royer. Sie war weder die Frau von Jacques Papin, wie de la Saussaye angiebt, noch von Isaac Papin, welche Ansicht BELTON und BOURNON vertreten, denn das Livre mortuaire de l'Eglise Françoise de Cassell, Paroisse de la Vieille Ville de Cassell enthält die Notiz: »Le Samedi, 28. Avril 1700 a esté entermée Demoiselle Marie de Royer, Veuve de feu le Sieur Nicolas Papin, Docteur en Médecine, âgée de 77 ans.« Nach dem von BELTON und BOURNON veröffentlichten Stammbaum der Papin war Nicolas Papin ein Bruder des Vaters von Denis Papin (dieser hat 12, sein Vater 9 von denselben Eltern stammende Geschwister) und war im Jahre 1625 als jüngstes Kind seiner Eltern geboren. Durch diese Notiz berichtet sich auch das Todesjahr von PAPIN's Schwiegermutter.¹ Leibliche Kinder dagegen scheint PAPIN nicht gehabt zu haben. Weder ZUMBACH erwähnt solche, noch finden sich Notizen über sie in den Tauf- oder Sterberegistern der Casseler oder Marburger Kirchenbücher. Da aber das erstere den Tod der Schwiegermutter enthält, das letztere anführt, dass er am 29. Mai 1690 den Sohn eines Herrn Joyau über die Taufe gehoben, dass er am 1. Januar 1691 »par dispense de Monseigneur le Landgrave de Hesse« seine Cousine Marie Papin heirathete und endlich, dass er am 21. Juni 1691, einem Sonntag Morgen, in der reformirten französischen Kirche als Kirchenältester aufgenommen wurde, so schliesst dies die Annahme aus, dass PAPIN die Einzeichnung in die Kirchenbücher vermieden habe. Gesetzt auch dies wäre während des Streites mit dem Pastor Gautier² geschehen, und es wäre ihm in dieser Zeit ein Kind geboren, so würde dies, wenn es nicht sehr bald, sondern nach einigen Jahren wieder gestorben wäre, doch bemerkt worden sein. Der Bemerkung des Mündener Protocolls, auf welche ich die entgegengesetzte Ansicht gründete, möchte ich doch weniger Beweiskraft zuschreiben, wie den angeführten amtlichen Nachrichten.

Endlich ergibt das Kasseler Kirchenbuch, dass PAPIN, weil er »Paroisse de la Vielle Ville« gehörig, nicht wie die begüterteren seiner Stammesverwandten in der Oberneustadt, sondern in der Altstadt wohnte. Freilich fehlt einstweilen noch jeder Anhaltspunkt zur näheren Bestimmung seiner Wohnung.


¹ Ib. S. 116.

² Ib. S. 35—37.

1882.
XLV.

SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

16. November. Gesammtsitzung.



Vorsitzender Secretar: Hr. MOMMSEN.

1. Hr. MÜLLENHOFF las: Über die Hávamál.
2. Hr. PETERS legte eine Abhandlung vor: Über Sphaeronycteris cophyllum, eine neue Gattung und Art der frugivoren schnabigen Flederthiere, aus dem tropischen America. (erzu Taf. XVI.)
3. Hr. LEPSIUS legte vor: Nachträgliches zu der Mittheilung über die babylonische Halbelle des Hrn. OPPERT vom October d. J.
Die Mittheilungen 2 und 3 folgen umstehend.
4. Die Wahl Seiner Majestät des Kaisers von Brasilien Don PEDRO als Ehrenmitglieder der Akademie hat die Allerhöchste Bestätigung erhalten.
5. Zwei Ministerial-Schreiben vom 10. November zeigen die Genehmigung der folgenden Unterstützungen an: 1. auf Antrag der sammt-Akademie für den Regierungs-Baumeister Hrn. BASSEL, zur Aufn. in Alatri, zum Zweck der Aufnahme der Wasserbau-Anlagen in der Umgegend von 2000 Mark; 2. auf Antrag der physikalisch-mathematischen Classe für den Hrn. Prof. Dr. FRITSCH hierselbst, zu den Kosten einer Reise zum Besuche der Museen in London und Leyden, behufs Fortsetzung seiner Untersuchungen über die elektrischen Organe der Torpedineen, von 610 Mark.

Über *Sphaeronycteris toxophyllum*, eine neue Gattung und Art der frugivoren blattnasigen Flederthiere, aus dem tropischen America.

Von W. PETERS.

Hierzu Taf. XVI.

Die mit blattförmigen Hautfalten der Nase versehenen Flederthiere theilen sich in drei Familien, welche schon leicht nach wenigen äusseren Merkmalen von einander zu unterscheiden sind. Die Hufeisennasen bilden die einzigen aller Gruppen mit unvollständigem Zeigefinger, welche dadurch auszeichnen, dass sie, wie die Flederhunde, keine Ohrspeiche (Tragus) besitzen. Sie gehören Europa, Africa, Asien und Australien an, fehlen aber gänzlich in America. Die Megadermen, denen ich *Rhinophyllum*, *Megaderma*, *Nycteris*, *Nyctophilus* und *Myotis* zähle, gehören, ausser dem letzteren, welcher in America häufig ist, ebenfalls sämmtlich der östlichen Hemisphäre an. Dagegen kommen die Phyllostomen, welche sich durch den aus drei knöchernen Elementen bestehenden Mittelfinger auszeichnen, lediglich in den warmen Gegenden Americas vor. Ich habe sie in fünf Gruppen getheilt, von denen die *Mormopes*, *Vampyri* und *Glossophagae*, wie die meisten übrigen Fledermäuse, mit w-förmigen Falten auf der Kaufläche der Backzähne versehen sind und von Insecten leben, die *Desmodus*, mit kleinen zusammengedrückten schneidenden Backzähnen ausschliesslich blutsaugend sind, während eine fünfte Gruppe, die der *Stenodermata*, welche GERVAIS zuerst von den übrigen Phyllostomen getrennt hat, sich ausschliesslich oder wenigstens vorzugsweise von pflanzlichen Nahrungsmitteln nähren und von denen einzelne Arten manchmal in so grosser Menge auftreten, dass sie die Erndten, z. B. der Kaffeepflanzen, vollständig vernichten. Sie unterscheiden sich von allen übrigen Flederthieren durch die eigenthümliche Bildung ihrer Backenzähne, welche schneidende Ränder und auf der Mitte der Kaufläche höckerförmige Höcker zeigen.

Die hierher gehörigen Gattungen und Arten habe ich früher (Monatsber. Berl. Ak. 1865 S. 356 und 524) zusammengestellt. Zu den zehn Gattungen *Artibeus*, *Phyllops*, *Vampyrops*, *Stenoderma*, *Pygo-*

derma, *Ametrida*, *Chiroderma*, *Sturnira*, *Brachyphylla*, *Centurio* konnte ich später (l. c. 1876 S. 429) eine elfte, *Peltorhinus*, hinzufügen. Seitdem sind nur ein paar, nicht sehr ausgezeichnete Arten hinzugekommen. Es war mir daher sehr auffallend, eine ganz neue, äusserlich und innerlich ausgezeichnete Form zu erhalten, welche eine besondere Gattung bilden, deren genauer Fundort aber leider nicht festzustellen ist, da sie nicht zusammen mit anderen bekannten Flederthieren aus verschiedenen Welttheilen zum Kauf zugesandt wurde.

SPHAERONYCTERIS nov. gen.

Dentes $\frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{3 \cdot 2 \cdot 1} \frac{4}{4} \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{1 \cdot 2 \cdot 3}$. *Caput globosum*, *auriculae modicae*, *apice rotundatae*, *trago externe fimbriato*, *ferrum equinum obsoletum*, *lanceola adformis*, *plicis incrassatis superata*, *labia fimbriata*, *gula plicata*, *palatagium metatarso affixa*, *calcaria brevia*, *palagium femorale modicum*, *emarginatum*. *Cranium valde elevatum*, *facie depressa*, *regione interorbitali latissima*, *palato postice usque ad regionem inter molares quartos exciso*, *basi interauriculari lata*.

Diese Gattung schliesst sich am nächsten der *Ametrida* Gray an. Sie stimmt mit derselben überein durch die Zahl und zum grössten Theil auch durch die Form der Zähne, den kugelförmigen Kopf, die Form der Ohren und der Ohrklappe, die bis zum Ende des Metatarsus sich ansetzenden Körperflughäute, den kurzen Sporn und die bogenförmig ausgeschnittene Schenkelflughaut.

Sie unterscheidet sich aber äusserlich durch die mangelhafte Entwicklung des Hufeisens, die eigenthümliche bogenförmige Form der Lanzette des Nasenblattes und die wulstförmigen Hautbildungen oberhalb dieser letzteren.

Das Gebiss unterscheidet sich nur durch die geringere Grösse und nicht zweilappige Form der äusseren oberen Schneidezähne und die merklich grössere Breite des ersten, dritten und vierten oberen Backzahns. In dem Schädel dagegen finden sich wesentliche Unterschiede. Durch die starke Entwicklung von Supraorbitalkämmen wird die Interorbitalgegend ausserordentlich verbreitert, die Foramina incisiva sind sehr klein, der hintere Gaumenrand ist bis zu der Gegenfläche zwischen den vorletzten Backzähnen ausgeschnitten, und die Basis cranii zwischen den Gehörschnecken eben so breit, wie eine Gehörschnecke mit dem Os tympanicum. Bei *Ametrida* liegt der kaum ausgeschnittene Gaumenrand ganz hinter den Backzähnen und die Basis cranii zwischen den Gehörschnecken ist viel schmaler, nur halb so breit. Der Unterkiefer zeichnet sich, im Vergleich zu dem von *Ametrida*, vorzüglich durch die grössere Höhe des Processus coronoideus aus.

Sphaeronycteris toxophyllum nov. spec. (Taf. XVI.)

Sph. cinnamomea, *subtus pallidior*, *macula antehumerali flavida*.
Longitudo tota 53^{mm}, *antibrachii* 40^{mm}.

Habitatio: *America tropicalis*.

An dem kugelförmigen Kopf erscheint das Gesicht convex und **ht** vorspringend. Die Ohren sind kürzer als der Kopf, abgerundet, hinteren Rande bogenförmig eingebuchtet, mit sehr stumpfem **nkel** über dem Antitragus, in der oberen Hälfte nackt, inwendig vorderen Rande und auf dem Längskiel, aussen an der Basis fein **llig** behaart, hinten mit neun bis zehn Querfalten versehen. Der **agus** übertrifft an Länge ein Drittel des Ohrs, ist am inneren Rande **ickt**, am äusseren verdünnt, mit sechs fingerförmigen Fortsätzen **sehen**, von denen die beiden vorletzten sehr kurz sind.

Das Hufeisen des Nasenblatts ist nur seitlich entwickelt und **det** einen die Nasenlöcher umgebenden höckerig wulstigen Rand, **lcher** oben in den äusseren Rand der bogenförmigen Lanzette über-**at**. Zwischen dem oberen Ende des Hufeisens und dem oberen **genlide** sieht man zwei rundliche kleine Warzen, unter welchen **h** eine dreieckige Grube befindet. Die Lanzette hat einen ver-**nnten** bogenförmigen Rand und längs der Mitte einen verdickten **el**. Oberhalb der Lanzette bildet die Haut zwei wellenförmige **erwülste**, eine kurze untere und eine längere bis an das Augenlid **hende** obere, welche in der Mitte zusammenhängen. Auch an der **ange**, nach aussen und unten von dem Auge sieht man zwei kleine **ärzchen**, aus denen eine Borste hervorragt. Die Oberlippe des **eiten** Maules ist stärker, die Seiten der Unterlippe sind feiner **frantz**, indem sie eine äussere Reihe dickerer, eine innere dünner **d** spitzer Fortsätze zeigen. Die Mitte der Unterlippe zeigt drei **ssere** flachere Warzen, welche von einer Reihe in sehr offenem Winkel **henden**, kaum sichtbaren Wärzchen umgeben wird. Am Unterkinn **d** der Kehle befinden sich drei wulstige Querfalten, von denen die **rderste** die stärkste ist. Am Gaumen finden sich nur zwei gezackte, **der** Mitte eingeknickte Querfalten, welche zwischen dem zweiten **ar** der Backzähne liegen.

Der Körper ist gedrungen, oben mit feinen mässig langen, unten **t** kürzeren Haaren bekleidet. Die Körperbehaarung setzt sich auf **r** Rückseite allmählich dünner werdend bis zu dem Ende des Ober-**ms** fort, und bekleidet die Flughaut zwischen diesem und dem **terschenkel**. Der Vorderarm und die Flughaut neben demselben **ziemlich** dicht kurzbehaart. An der Bauchseite ist die Schulter-**ghaut** und die Lendenflughaut ziemlich weit über den Ellbogen **aus** sparsam länger behaart. Die ganze Schenkelflughaut ist oben

und unten sparsam, Unterschenkel und Füsse sind auf der Dorsalseite kurz behaart. Die Schenkelflughaut ist wohl entwickelt, bis zu der Mitte ausgerandet, der Sporn kurz, nicht halb so lang wie der Fuss.

Die Flughäute sind breit, schliessen nur das erste Glied des Daumens ein und gehen am Fusse bis an das Ende des Metatars herab, ohne die Zehenbasis zu erreichen. Der Daumen ist ziemlich lang und mit einer kräftigen Krallen versehen. Das Mittelhandglied des zweiten Fingers ist sichelförmig gebogen und trägt eine Phalanx von 5^{mm} Länge. Die Mittelhand des dritten und fünften Fingers sind gleich lang, aber so inseriert, dass der dritte ein klein wenig vorragt, während der des vierten Fingers ein wenig kürzer ist. Die erste Phalanx des dritten Fingers ist um ein Drittel kürzer als die zweite, während die kürzeste dritte, die erste und zweite Phalanx des vierten und die zweite Phalanx des fünften Fingers ungefähr gleich lang sind.

Oben zimmetbraun, die einzelnen Haare in der Mitte weisslich, Kehle und Vorderhals weisslich, Bauch bräunlichweiss, die einzelnen Haare an der Basis braun, an der Spitze hell. Vor der Schulter ein Büschel gelblicher Haare. Flughäute dunkelbraun, zwischen dem zweiten und dritten Finger und an der Spitze farblos durchscheinend.

Maasse eines ausgewachsenen trächtigen Weibchens, in Millimetern:

Totallänge	53	L. 1. Fing. Mh. 3	1 Gl. 5. 2 Gl. 2, 5	10
Kopflänge	19	L. 2. Fing. = 28,5	= 4,5	33
Ohrhöhe	15	L. 3. Fing. = 40	= 14,5 = 22. 3 Gl. 11 Kpl. 4	89
Vorderer Ohrtrand	12	L. 4. Fing. = 39	= 11 = 17 Kpl. 1	68
Ohrbreite	11	L. 5. Fing. = 40	= 11,5 = 11 = 1	63
Tragus	5,5	Oberschenkel		19
Humerus	25	Tibia		19
Antibrachium	40	Fuss		11
Schenkelflughaut in der Mitte	15	Sporn		

Von dieser merkwürdigen Art hat unsere Sammlung nur ein einziges Exemplar (No. 5984 M. B.) im Handel erhalten, ein Weibchen welches einen fast reifen behaarten männlichen Embryo enthält.


Der specielle Fundort ist nicht bekannt, sie gehört aber zweifellos dem tropischen America an.

Erklärung der Abbildungen.

Fig. 1. *Sphaeronycteris toxophyllum* PETERS, Fem. ad.; 2. Kopf derselben von der Seite; 3. Gesicht von vorne.

4. Schädel von der Seite; 5. derselbe von oben; 6. derselbe von unten; 7. Gebiss von der Seite; 8. dasselbe von vorn; 9. oberes Gebiss; 10. unteres Gebiss der linken Seite.

Fig. 1, 2, 4, 5, 6 in natürlicher Grösse, die übrigen Figuren vergrössert.



Sphaeronycteris toxophyllum Firs



Nachträgliches zu der Mittheilung über die babylonische Halbelle des Hrn. OPPERT" vom 19. October d. J.

Von R. LEPSIUS.

der obigen Mittheilung S. 848 Z. 25 ist irrthümlich das Zeichen anstatt des anderen **𒌦** gedruckt worden. Hr. SCHRADER schreibt darüber: »Das von mir in Aussicht genommene Zeichen ist das **𒌦**, wie es sich in der betreffenden Stelle Asurbanipal's auf Cylinder A col. I Z. 47 (III Rawl. 17) findet, dasjenige Zeichen, welches III R. 70,3 durch akk. *šanabi*, ass. *štnibu* erklärt wird (vgl. mein Assyrisches Syllabar, Berlin 1880 S. 7 Nr. 295) und welches auch die ihm gleichgesetzte Zahl 40 (Sechzigstel), sowie durch das angegebene Minengewicht auf den Sinnwerth von $\frac{2}{3}$ bestimmt wird. Demgegenüber ist das Zeichen **𒌦**, welches die Syllabare III R. 70,5) durch akkad. *kigusili*, assyr. *parab* erklären (vgl. mein Assyrisches Syllabar Nr. 298), was allgemein seinem Sinnwerthe nach auf $\frac{1}{2}$ bestimmt wird. Diese Lesung findet sich an der betreffenden Stelle Cyl. Rassam V. R. 1,47. Man hat sich demnach zu entscheiden, welcher der beiden Lesungen man den Vorzug geben will. Der Umstand, daß der Cyl. Rassam weit vollständiger erhalten ist, als Cyl. A, und für die Fälle, wo letzterer erhalten ist, einen Ausschlag nicht abgibt; und daß der Cyl. Rassam vor dem Cyl. A durchweg den Vorzug verdiene, wird Niemand behaupten wollen. Nun wissen wir, daß in einem Falle gerade auch bei dieser Stelle, nämlich bei der Zahl der Ellen (U) die Cylinder A und ein dritter schwanken, indem Cyl. A da die Zahl 5 bietet, wo der andere Cylinder die Zahl 4 hat. Daher ist es ein auch sonst zu constatirendes Verfahren der Abschreiber, die Wiederabschriften die zu Gunsten der Assyrier sprechenden Zahlen möglichst zu vergrößern. Man kann also zuversichtlich annehmen, daß von den beiden Lesungen: 5 und 4 Ellen, die letztere die ursprüngliche ist. Genau so wird es sich bei der Angabe über die

Höhe der Ähren verhalten. Von den beiden Lesarten $\frac{2}{3}$ Ellen (Cyl. A) und $\frac{5}{6}$ (Cyl. Rassam) wird die die kleinere Zahl aussagende, also diejenige des Cyl. A ($= \frac{2}{3}$) die ursprünglichere sein, der demgemäfs bei der Beurtheilung der bezüglichen Angabe des Königs der Vorzug zu geben sein wird.«

Hieraus geht zugleich klar hervor, dafs sich an der Sache, um die es sich handelt, nichts ändert.

Zur Geschichte des Authenticum und der Epitome Novellarum des Antecessor Julianus.

Von K. E. ZACHARIAE VON LINGENTHAL.

(Vorgelegt von Hrn. MOMMSEN am 9. November [s. oben S. 941].)

Vorbemerkung.

Ich citire die Novellen nach meiner Ausgabe: Imp. Justiniani etc. A. Novellae quae vocantur ordine chronologico digestae. Pars I. II. Lips. 1881. In Parenthese füge ich die Zahlen der gewöhnlichen Ausgaben bei.

In der const. CLXIV (der sog. Sanctio pragmatica pro petitione Vigilii) vom August des Jahres 554 sagt Justinian in §. 11: Jura insuper vel leges Codicibus nostris insertas, quas jam sub edictali programme in Italiam dudum misimus, obtinere sancimus. Sed et eas quas postea promulgavimus constitutiones jubemus sub edictali propositione vulgari, [et] ex eo tempore, quo sub edictali programme vulgatae fuerint, etiam per partes Italiae obtinere, ut una deo volente facta republica legum etiam nostrarum ubique prolatetur auctoritas.

Das Verständniss dieser Verordnung bietet in der Hauptsache keine Schwierigkeiten. Nach derselben waren die jura vel leges Codicibus insertae, d. i. die Digesten und der Constitutionencodex schon längst — also wohl bald nach der im Jahre 538 erfolgten Einsetzung des Praefectus Praetorio Italiae (Procop. de bello Goth. II, 22) — in Italien promulgirt worden und es wird bestimmt, dass sie hinfort gelten sollten: die später ergangenen Constitutionen aber sollten nunmehr auch Geltung erlangen. Unter den später ergangenen Constitutionen sind offenbar sämmtliche nach 534 erlassene Novellen zu verstehen. Zwar müsste, streng logisch genommen, zu dem postea aus dem Vorhergehenden ergänzt werden: quam jura et leges in Italiam misimus. Aber es würden alsdann, was sicher nicht angenommen werden kann, die zahlreichen und wichtigen Novellen der Jahre 535 bis 537 von der Gültigkeit in Italien ausgeschlossen worden sein. Es ist daher zu dem postea vielmehr zu suppliren: quam jura et leges Codicibus insertae sunt. Was aber Justinian in dem Satze Sed eas u. s. w. in Betreff der Publication und Gültigkeit der Novellen

anordnet, ist nicht immer in demselben Sinne aufgefasst worden, worüber das Nähere bei BIENER, *Gesch. d. Nov.* S. 225 und in Julian. ed. HAENEL p. 187 not. k zu finden ist. Am einfachsten und den Worten am angemessensten ist es den Satz so zu verstehen, dass für Italien eine Gesamtpublication der Novellen und deren Gültigkeit vom Tage der Publication ab befohlen wird. Diese Auslegung haben schliesslich auch BIENER S. 613 und HAENEL S. 271* als die richtige angenommen. Auf andere gezwungene Auslegungen war man deshalb verfallen, weil Spuren einer früheren Bekanntmachung oder Bekanntwerdung einzelner Novellen in Italien vorhanden sind. Eine lateinische Übersetzung der c. LVI (Nov. 42) findet sich z. B. in den Acten des fünften Konstantinopolitanischen Concils vom Jahre 552, und einige Novellen der Jahre 538 und 539 — die c. LXXXIX (Nov. 69), die c. XCIII (Nov. 73), die c. XCVIII (Nov. 79), die c. CI (Nov. 81) — sind nach Ausweis des griechischen Textes an den Praefectus Praetorio Italiae gesendet worden. Indessen wenn auch diese und vielleicht noch einige andere Novellen an den Präfecten von Italien gesendet worden sind, so folgt daraus noch nicht, dass sie von demselben an allen Orten ordnungsmässig wirklich publicirt worden sind: ja es muss dies mit Rücksicht auf die damaligen noch keineswegs fest geordneten Zustände geradezu als unwahrscheinlich bezeichnet werden. Ebenso wenig kann aus dem Umstande, dass einzelne Novellen schon vor 554 in kirchlichen Kreisen in Italien bekannt gewesen sind, darauf geschlossen werden, dass eine Publication derselben durch den Präfecten stattgefunden habe: die Päbste, welche in directer Verbindung mit Konstantinopel standen, können auf diesem Wege Kenntniss einzelner Novellen erhalten und dieselben im kirchlichen Interesse befolgt haben. Nichts hindert also anzunehmen, dass eine officiële Publication der Novellen in Italien bis zum Jahre 554 nicht stattgefunden hatte, und dass deshalb Justinian nach definitiver Niederwerfung der Gothen in der oben angeführten Stelle eine Gesamtpublication derselben sub edictali propositione angeordnet habe.

Erwägen wir nun, wie diese Anordnung zur Ausführung gelangt sein wird, so musste selbstverständlich zuvörderst eine Sammlung der bis dahin erlassenen Novellen dem Praefectus Praetorio Italiae aus den kaiserlichen Bureaux in Konstantinopel zugefertigt werden. Darüber mag eine geraume Zeit verstrichen sein. Eine officiële Sammlung der Novellen gab es bekanntlich nicht: die einzelnen Novellen mussten daher erst zum Zweck der Übersendung, vielleicht aus verschiedenen Bureaux, zusammengetragen werden. Auch war der Geschäftsgang in den kaiserlichen Bureaux, wie sich z. B. aus c. LXXXVI (Nov. 66) c. 1 §. 2. 3 entnehmen lässt, überhaupt ziemlich schleppend.

Endlich mochte der geschäftliche Verkehr zwischen Konstantinopel und Italien damals noch nicht wieder in regeren Gang gebracht sein. Unter diesen Umständen ist es wahrscheinlich, dass die Übersendung erst nach Jahr und Tag — etwa in der zweiten Hälfte des Jahres 556 erfolgt ist.

In Italien eingetroffen, konnten nun aber die gesammelten Novellen nicht ohne Weiteres publicirt werden. Bekanntlich ist eine grosse Zahl von Novellen nur griechisch erlassen worden. Der Praefectus Praetorio Orientis Ioannes hatte das Lateinische als Geschäftssprache abgeschafft (Lyd. III, 68), und es sind daher zumal die an ihn adressirten oder von ihm entworfenen Novellen regelmässig nur in griechischer Sprache abgefasst. In diesem ihrem Originaltexte waren die griechischen Novellen nach Italien gesendet worden: eine weiter unten zu erläuternde Notiz spricht daher von einem Codex graecus. Da aber, wie der citirte Lydus sagt, die Abendländer, selbst die griechischen Stammes, italienisch d. i. lateinisch sprachen, so wäre eine Publication der griechischen Novellen für Italien durchaus unangemessen gewesen; vielmehr mussten die griechischen Novellen zuvor ins Lateinische übersetzt werden. Dass dies nicht schon in den kaiserlichen Bureaux in Konstantinopel, sondern erst in Italien im Bureau des Praefecten geschehen ist, ergiebt sich auch aus Authent. c. 124 c. 1, wo das Griechische in const. CLXII (Nov. 146) c. 1 *φωνῆς . . . τῆς ἰταλῆς ταύτης φασὲν* übersetzt ist: *lingua hac dicimus*.

Nach Allem diesen wird anzunehmen sein, dass die Veröffentlichung der gesammelten Novellen, und zwar die der griechischen in lateinischer Übersetzung *κατὰ πόδα* (— nur solche Übersetzungen waren nach c. Tanta circa nos §. 21 zulässig —), etwa gegen das Ende des Jahres 556 der kaiserlichen Anordnung gemäss sub edictali programme in Italien erfolgt ist.

Um dieselbe Zeit hat Julianus, Antecessor zu Konstantinopel, von 122 Novellen, die ihm in einer von ihm angelegten oder doch ergänzten und vermehrten Sammlung vorlagen, eine Epitome in lateinischer Sprache herausgegeben. Die jüngste von ihm epitomirte Novelle — const. CLXV (Nov. 159) — ist vom 1. Juni 555. Die Epitome ist also erst abgefasst, nachdem Justinian die Geltung der Novellen für Italien angeordnet hatte: wahrscheinlich ist sie durch diese Anordnung geradezu veranlasst worden. Sie steht aber ausser allem Zusammenhang mit einer in Italien erfolgten Gesamt-Publication der Novellen. Obgleich sie nicht alle bis 555 erschienenen Novellen umfasste, so scheint man sie doch im Abendlande während des Mittelalters vorzugsweise benutzt zu haben.

Indessen man würde sich billig verwundern müssen, wenn darüber die von Justinian anbefohlene und in Italien sicher auch ausgeführte

Gesammpublication der Originalnovellen spurlos untergegangen sein sollte. Forscht man nun aber nach Spuren derselben, so wird man — da andere nicht aufzufinden sind — mit Nothwendigkeit auf das Authenticum geführt. Dieses enthält die Novellen bis zum Mai des Jahres 556, die lateinischen in der Ursprache, die doppelsprachigen in der lateinischen Ausfertigung, die griechischen in lateinischer Übersetzung *κατὰ πῶδα*, — also ganz das, was der Inhalt der um 556 in Italien sub edictali propositione promulgirten Novellensammlung gewesen sein muss. Es enthält namentlich auch eine Reihe von Novellen, die für Italien keinerlei Bedeutung hatten, — wie z. B. const. VIII (Nov. 36), XXII (12), XXIII—XXVI (24—27), XXXI. XXXII (28. 29), XXXIV (37), XLIV. XLV (30. 31), XLVII (21), LI (40), LIII. LIV (102. 103), LX (43), LXVII (50), LXXXIII (64), LXXXV (65), CLXI (145) — deren Aufnahme in das Authenticum — sie finden sich hier als c. 38. 12. 24—29. 39. 30. 31. 21. 42. 32. 33. 44. 49. 65. 67. 123 — allein dadurch begreiflich wird, dass Justinian ganz allgemein die Veröffentlichung seiner Novellen in Italien anbefohlen hatte und somit auch die auf Italien keinen Bezug habenden von der Publication nicht ausgeschlossen werden durften. Wie nun dies Alles auf den officiellen Charakter des Authenticum hinweist, so ist diese Sammlung denn auch zu Anfang des 12. Jahrhunderts dem Irnerius als eine officielle — denn dies will der von Irnerius bezeugte Name *Authentica* besagen — entgegengehalten worden, und nicht viel später hat sie Burgundio geradezu als vom Kaiser Justinian veranlasst bezeichnet (Die Beweisstellen bei BIENER Gesch. d. Nov. S. 607. v. SAVIGNY Gesch. des RRs. IV S. 347 Anm.)

Irnerius hat Anfangs Bedenken gegen die Ächtheit des Authenticum erhoben. Er vermisste das edictale programma, mittelst dessen die Sammlung publicirt sei: aber mit demselben Rechte würde man die Authenticität jeder Novelle bestreiten können, welcher nicht ebenso wie z. B. der c. CLXV (Nov. 159) das Publicationspatent beigelegt ist. Irnerius rügt ferner, dass der lateinische Styl des Authenticum von demjenigen der lateinischen Constitutionen Justinian's abweiche: allein dies gilt nicht von denjenigen Novellen, deren Ursprache die lateinische ist, noch von den doppelsprachigen, von denen die lateinische Ausfertigung im Authenticum enthalten ist, sondern nur von den lateinischen Übersetzungen der griechischen Novellen, und hier darf man nicht übersehen, dass die Übersetzung nicht in den kaiserlichen Bureaux in Konstantinopel, sondern in Italien und zwar *κατὰ πῶδα* gemacht ist. Hier muss zugegeben werden, dass nicht bei allen Übersetzungen ein gleich gutes Verständniss des griechischen Urtextes — der theilweise sogar in fehlerhafter Abschrift vorgelegen haben muss — zu bemerken

dass das Latein mitunter — zumal in Folge des Bestrebens
r Wort wiederzugeben — als ein so barbarisches erscheint,
ner des mittelalterlichen Lateins die Abfassung der Übersetzung
ele Jahrhunderte nach Justinian haben setzen wollen. Allein
während der gothischen Kriege eingerissenen Verwilderung
um die Mitte des sechsten Jahrhunderts in Italien gesprochene
chriebene Latein sicherlich nicht besser. Und was die Ver-
heit des Lateins in den Übersetzungen verschiedener Novellen
so erklärt sich dieselbe leicht, wenn man — wie gewiss
einlich — annimmt, dass in dem Bureau des Präfecten von
im die Publication zu beschleunigen, theils vorgefundene Über-
1 einzelner Novellen abgeschrieben, theils für andere Novellen
eit des Übersetzens unter verschiedene mehr oder minder
nterbeamtete vertheilt worden ist. Möglicher Weise war auch
1 Übersetzungen noch nicht die letzte Feile angelegt, als die-
on dem Bureauchef eingefordert und zum Zweck der Publi-
isammengestellt wurden.

en den officiellen Charakter des Authenticum lässt sich aber
len schon von Jrnerius geltend gemachten Bedenken noch
ende anführen.

hdem Justinian ganz allgemein die Veröffentlichung der Novellen
1 befohlen hatte, hätten eigentlich sämtliche seit 535 er-
Verordnungen nach dort übersendet werden müssen. Von
ovellen fehlt aber eine ganze Anzahl im Authenticum, so
n es auf den ersten Blick nicht für möglich halten möchte,
Authenticum mit der 556 nach Italien gesandten Sammlung
sei. Von den in meiner Ausgabe der Constitutiones quae
dicem supersunt enthaltenen Novellen der Jahre 535—556
n Authenticum 21 Constitutionen. Indessen dieselben betreffen
il speciell orientalische Provinzen oder Illyricum oder Africa
XXIII. XXXVII. LII. LV. LVII. LVIII. LXXXII. XCVI. CXXIII.
XXXII. CXXXV. CXXXIX. CXL. CXLVI. CLX) und einige der-
blen ebenso in Julian's Epitome oder in der orientalischen Samm-
1 168 Nummern, zum Theil beziehen sie sich auf konstanti-
ische Verhältnisse oder Einrichtungen (const. LIX. CXXXVII.
um Theil endlich enthalten sie nur kaiserliche Entscheidungen
Streitsachen (const. XX. CXLIX).¹ Und es ist daher weniger
l, dass diese Novellen bei der für Italien bestimmten Samm-
ersehen oder übergegangen worden sind, so dass das daraus

¹ e const. CXLII, die ich in meiner Ausgabe dem Jahre 542 zugeschrieben
; zwar auch: allein ich möchte ebendeswegen jetzt vorziehen sie der Zeit
zu vindiciren.

hergeleitete Bedenken gegen den officiellen Charakter des Authenticum nicht von Gewicht ist.

Schwerer wiegt folgendes Argument.

Dass Justinian's Befehl der Übermittlung der Novellen nach Italien erst gegen die Mitte des Jahres 556 zur Ausführung gekommen ist, lässt sich unter den damals obwaltenden Umständen wohl begreifen: dagegen dürfte es ganz unzulässig sein, anzunehmen, dass die Ausführung viel später — etwa nach einem Decennium — erfolgt sei. Soll daher das Authenticum auf der officiell nach Italien gesendeten Sammlung beruhen, so dürfen offenbar jüngere Novellen als etwa solche aus der ersten Hälfte des Jahres 556 nicht einen Bestandtheil desselben bilden. Schlösse das Authenticum nicht mit diesem Jahre ab, so würde es gewiss auch noch die const. CLXVIII vom Jahre 557 enthalten, da sich dieselbe unmittelbar auf Italien bezieht. Nun scheint aber das Authenticum ausser den Novellen der Jahre 535—556 auch noch eine jüngere Novelle — die const. CLXXIII (Nov. 143. 150, im Authent. c. 132), welche sogar (auch in meiner Ausgabe) dem Jahre 563 zugeschrieben wird, — zu umfassen, so dass die ganze bisher vertheidigte Ansicht als eine unhaltbare Hypothese erscheint.

Indessen es hat mit der const. CLXXIII eine ganz eigene Bewandniss.

Diese Novelle trifft allgemeine Bestimmungen über das Verbrechen der Entführung und ist daher unzweifelhaft zur weiteren Bekanntmachung an höchste Behörden gerichtet gewesen, und zwar muss sie, da sie blos lateinisch erlassen worden ist, an einen der drei Praefecti Praetorio — Africae, Illyrici oder Italiae — adressirt gewesen sein. Nun ist sie im Authenticum inscribirt Areobindae oder Areobindo und am Schlusse steht die Kanzleiformel Areobinde pater carissime atque amantissime; ein Datum aber findet sich hier nicht. Dagegen steht in einigen Handschriften der Epitome des Julianus dieselbe Verordnung im Anhang, hier aber adressirt an Leo; am Schlusse mit der Kanzleiformel Vale Leo parens carissime atque amantissime und dem Datum Dat. XII Kal. Jun. (im Cod. Utinensis: Jul.) CP. imp. DN. Justiniani. pp. A. ann. XXXVI p. c. Basilii v. c. ann. XXII (In anderen Handschriften des Julian soll die Novelle an Areobindus adressirt sein, aber das gleiche Datum tragen, wie die Ausfertigung an Leo. Näheres bei BIENER Gesch. S. 526. 533 und HEINBAUGH Authent. p. 1060. 1065 not.) Athanasius XI, 5 kennt die Inscription an Areobindus und hat das Datum Καλανδ. ιανουαρίων Cp. βασιλεως ιουστινιανου το 15' μετα την υπατειαν βασιλειου το κβ'. — In der Sammlung von 168 Novellen hat die Novelle zwei mal gestanden, als Nov. 143 und als Nov. 150; wir kennen aber nur die in dem Breviar

des Theodorus enthaltenen Summen derselben. Von diesen hat v. 143 die Subscription: ἐξεφωνήθη μηνὶ ἰουνίῳ βασιλείας ἔτει λς ἣν ὑπατείαν βασιλείου τὸ ιβ', die Nov. 150: ἐξεφωνήθη μηνὶ ἰουνίῳ μετὰ ὑπατείαν βασιλείου τὸ κβ'.

Was nun diese handschriftlichen Überlieferungen betrifft, so ist erst in der Inscription der Novelle bei Athanasius, welche die Handschrift so giebt: ἀραβίνδῳ λεγεῶνι, das λεγεῶνι für Leoni zu nehmen und nicht als ein Beiname des Areobindus aufzufassen. Es vielmehr ein Glossem zu sein, welches ein Schreiber hinzugefügt hat, der Kenntniss von der Ausfertigung an Leo hatte. Es liegt in den Handschriften des Julian, welche die Inscription enthalten haben (— HÄNEL nennt sie tertiae classis —) offenbar eine Abweichung von dem Authenticum vor. Aus den übrigen handschriftlichen Überlieferungen erhellt, dass die Novelle in zwei Ausgaben erhalten ist, der einen an Areobindus, der anderen an Leo adressirt. Dies erklärt auch, wie sie in die Sammlung der Novellen zweimal Aufnahme finden konnte¹: Nov. 143 scheint die Ausfertigung an Areobindus, Nov. 150 diejenige an Leo gewesen zu sein. Nun lässt sich Theodorus, welcher in Nov. 150 §. 1 die Nov. 143 als πρὸ αὐτῆς διάταξις bezeichnet, so verstehen, dass er damit Nov. 143 als die frühere Ausfertigung habe bezeichnen wollen. Es mögen denn auch die Subscriptionen der beiden Ausfertigungen verschiedene gewesen sein, und in den handschriftlich überlieferten Subscriptionen, die sämmtlich — mit alleiniger Ausnahme der von Theodorus bei Nov. 150 überlieferten — mit chronologischen Fehlern besetzt sind, ist bei deren kritischer Würdigung auf solche mögliche Unrichtigkeiten Rücksicht zu nehmen. Nun scheint mit früheren Ausgaben übereinstimmend für die an Leo gerichtete Ausfertigung unter Änderung LXXVI in XXXVII² — in Übereinstimmung mit Theodorus in Nov. 150 — das Datum des Jahres 563 (XII Kal. Jun. a. imperii II p. c. Basilii a. XXII) angenommen werden zu müssen. Für die Ausfertigung an Areobindus bleibt dann die Subscription bei Athanasius und bei Theodorus Nov. 143: καλανδ. ἰανουαρ. (Theod. μηνὶ ἰαννουαρίῳ βασιλείας ἰουστινιανοῦ τὸ ις' (Theod. λς') μετὰ τὴν ὑπατείαν βασιλείου (wofür jedoch Athanasius κβ', Theodorus ιβ' hat), d. i. 543. Aus diesen lieses in der That die richtige Subscription ist, ergibt sich

Das doppelte Vorkommen der const. LXXIX in der Sammlung von 168 Novellen habe ich in dem Vorwort zu jener Verordnung ebenso zu erklären gesucht. Sollte jedoch das p. c. Basilii a. XII nach der sogenannten Victorianischen Zeitrechnung zu verstehen sein und mithin das Jahr 562 bezeichnen, so würde dazu der Index XXXVI ganz gut passen. Wenn übrigens HEIMBACH Auth. S. 1304 aus Theodorus's Papieren anführt, der Cod. Ranconeti (Paris. 4568) habe anno 37, so dürfte ein Irrthum vorliegen.

auch daraus, dass die an Areobindus gerichtete Novelle im Authenticum zwischen einer Novelle vom Jahre 539 und einer solchen von 545 steht, eine Stellung, deren Bedeutung für die Chronologie aus den Ausführungen von HEIMBACH in den Prolegomenen seiner Ausgabe pag. CCCXXIX—CCCXLII erhellt. Und im Jahre 543 finden wir nun auch, was ebenfalls für die Richtigkeit der so reconstruirten Subscription spricht, einen Areobindus Praefectus Praetorio Africae, der damals nach Afrika gesendet war und im folgenden Jahre ermordet wurde (Procop. bell. Vandal. c. 24. Theophanes ed. Paris. p. 178 sqq.). Für Leo bleibt dann die Praefectura Illyriens oder Italiens: BIENER (Gesch. S. 26 Anm. 59) hat Letzteres vermuthet, meinerseits möchte ich vorziehen, an Illyricum zu denken. Ergiebt sich nun aus der kritischen Untersuchung, dass die const. CLXXIII, wie sie im Authenticum enthalten ist, dem Jahre 543 und nicht dem Jahre 563 angehört, so verschwindet auch das letzte Argument gegen die Annahme, dass das Authenticum die im Jahre 556 für und in Italien officiell bekannt gemachte Novellensammlung sei. (Es muss hiernach meine Ausgabe bei const. CLXXIII berichtigt werden: Zweifel hatte ich schon in den Anmerkungen ausgedrückt: nach Abschluss des Druckes habe ich aber das Richtige erkannt und daher in den vorgesetzten Prolegomenen p. IV das Authenticum bestimmt dem Jahre 556 zugeschrieben.)

Es erübrigt nun noch, von einer alten handschriftlichen Notiz die oben verheissene Erklärung zu geben. Sie findet sich in einer jüngeren Wiener und einer älteren Kloster Neuburger Handschrift und steht hier an der Spitze des Authenticum. (Vergl. BIENER, Gesch. S. 575 und Auth. ed. HEIMBACH p. LXIII. CCCXVI.) Sie lautet: Centum viginti et duae constitutiones sunt. sed error factus est superius inter centesimam sextam et centesimam octavam, ubi centesima septima esse debuit. sed quia in codice² antecessoris idem error est et ille secundum suum codicem nobis transmissionem³ fecit, melius esse duxi⁴ non emendare numerum. hae sunt quae interpretatae sunt, quas tamen⁵ in codice graeco habemus. sunt autem et quaedam latinae immixtae graecis, quaedam inter graecas tantummodo sunt. non extant⁶ in praesenti Codice centesima vigesima⁷ secunda, [centesima vigesima quarta].⁸

¹ Das Centum fehlt in der Wiener Handschrift.

² Desgleichen das in codice. Vielleicht richtiger.

³ Die Wiener Handschrift hat transmissiones. (Übersetzungen?)

⁴ Die Handschriften haben dixi.

⁵ Die Wiener Handschrift liest tantum.

⁶ Die Handschriften lesen etiam. HEIMBACH schlägt vor, vielmehr so zu interpretiren: tantummodo. sunt non etiam etc.

⁷ Das vigesima fehlt in der Wiener Handschrift.

⁸ Die in Parenthese eingeschlossenen Worte hat nur die Wiener Handschrift.

tesima vigesima quinta, centesima vigesima octava, centesima tricesima, centesima tricesima secunda. BIENER nimmt an, dass diese Notiz aus einer Handschrift abgeschrieben worden sei, in welcher sie am Ende des Authenticum gestanden haben müsse, und fährt fort: »Die Bemerkung fällt in drei Sätze, welche verschiedenen Zeiten zuzuschreiben sind.

Die erste liefert uns die Nachricht . . . dass« im Authenticum »122 Novellen enthalten sind. Hier ist wohl eine Corruptel der Zahl . .

Die zweite ist offenbar neuer . . . Hier wird bemerkt, dass oben schon const. 106. 108 eine Constitution fehle, wie die fehlende 1107 ergebe, dass man aber doch die durch diesen Mangel unrichtige Zählung des Originals beibehalten habe. Vielleicht ist diese ebenfalls fehlende die Nov. 133 . . . Der dritte Satz ist der interessanteste und rührt von dem Verfasser der altlateinischen Sammlung« des Authenticum — »selbst her. Er sagt, dass das Ganze eine Übersetzung aus einer griechischen Handschrift sei, welche unter den griechischen auch einige lateinische Novellen enthalte. Die Zahlen, welche zuletzt stehen, scheinen die lateinischen Novellen aufzuzählen, sind aber offenbar corrupt, und es sind weniger aufgezählt, als ursprünglich sich wirklich vorfinden.« — HEIMBACH stimmt mit BIENER darin unbedenklich überein, dass die beregte Notiz ursprünglich am Ende des Authenticum gestanden haben müsse und eine Schlussbemerkung zu demselben sei. Den error inter centesimam et centesimam octavam versteht er aber nicht von dem Auslassen einer Constitution, sondern nur von dem Überspringen der 1107 bei der Numerirung, und deducirt, dass daher auch die mittelbar vorher genannte irrige Zahl 122 fehlerhaft gewesen sei und in Wirklichkeit 121 hätte heissen müssen. Damit solle gesagt sein, dass das Authenticum 121 originalgriechische Novellen übersetzt enthalte, während die übrigen (HEIMBACH sagt quatuordecim!) originallateinische seien. Der Schlusssatz wolle nur bemerken, dass die nach den bezeichneten Novellen in uno aliquo eoque vetustissimo Novellarum libro fehlten!

Das Unbefriedigende in den Erklärungen von BIENER und HEIMBACH darf keines näheren Nachweises. Die Voraussetzung derselben, dass nämlich ein Schreiber die Notiz, die er in seinem Prototypen am Anfange des Authenticum gefunden, seiner Abschrift vorgesetzt habe, ist zu bedenken, dass er damit ein referens sine relato schaffe, ist in sich doch mehr als unwahrscheinlich, und mit dieser Voraussetzung lassen sich die darauf gebauten Erklärungen in sich zusammenfassen.

Man wird der Wahrheit näher kommen, wenn man die Notiz des Julianus Epitome Novellarum bezieht. Sie ist dann wie folgt zu verstehen:

»Es sind 122 Novellen. (Zwei doppelt, daher scheinbar 124. Vorstehend allerdings 125.) Allein es hat sich oben zwischen Nov. 106 und 108 ein Irrthum in der Zählung eingeschlichen, indem dort die Zahl 107 hätte stehen müssen.¹ Da sich jedoch in der Handschrift (?) des Antecessor (Julianus?) derselbe Irrthum findet und da er uns nach seiner Handschrift die Übersendung gemacht hat, so habe ich für besser gehalten, die Zahl unverändert zu lassen. Jene (122) Novellen sind es, welche interpretirt (d. i. in lateinischen Auszügen wieder gegeben) sind: wir haben sie aber auch in dem griechischen Codex (d. i. der officiellen nach Italien gesendeten Sammlung). Es sind aber auch einige lateinische Novellen mit den griechischen vermisch, einige nur unter den griechischen vorhanden. Nicht vorhanden sind in der vorstehenden Handschrift (der Epitome Juliani) die Novellen (des griechischen Codex) 122 (Auth. c. 121 — nach BIENER c. 122), 124 (Auth. c. 123 — nach BIENER 124), 125 (Auth. c. 124 — nach BIENER 125), 128 (Auth. c. 127 — nach BIENER 128), 130 (Auth. c. 134 — nach BIENER 133), 132 (Auth. c. 132 — nach BIENER ebenfalls 132).

Man sieht, wie die ganze Notiz auf Julianus passt, und wie die letzten Zahlen in der That eine Reihe von Novellen bezeichnen, die bei Julianus wirklich fehlen, im Authenticum aber an den angeführten Stellen (— wenn man die Unsicherheit in der Anordnung der letzten Stücke des Authenticum berücksichtigt —) vorhanden sind. Daran, dass das Authenticum hier als codex graecus bezeichnet ist, kann geschlossen werden, dass die nach Italien gesendete Sammlung zu der Zeit, als der Verfasser obige Notiz schrieb, noch nicht officiell lateinisch publicirt war. Die Niederschrift der Notiz müsste also zwischen dem 1. Juni 555 und dem Ende des Jahres 556 erfolgt sein.

Wie mag es aber, so wird man nun fragen müssen, kommen, dass eine auf Julian bezügliche Notiz in den betreffenden Handschriften an der Spitze des Authenticum erscheint? Man wird sich die Sache so vorstellen müssen, dass ursprünglich in einer und derselben Handschrift Julian (mit der gedachten Schlussnotiz) und Authenticum standen, und zwar so, dass die Schlussnotiz noch auf dem den Anfang des Authenticum enthaltenden Blatte zu stehen kam, und dass dann die Handschrift in zwei Theile getheilt als Vorlage für andere Handschriften gedient hat, und zwar so, dass die Theilung zwischen Schluss des Julian und Anfang des Authenticum gemacht wurde, wodurch die zu Julian gehörige Schlussnotiz an die Spitze des Authenticum kam. Der Schlussnotiz aber, wie sie uns erhalten ist, fehlt


¹ Davon eine Spur in den von HAENEL herausgegebenen Paratitla zum Julian, wo S. 207 auf c. CVI. (HAENEL zieht mit Unrecht die Lesart der Wiener Handschrift CVII vor) die c. CVIII folgt.

der ursprüngliche Anfang: denn abgesehen davon, dass es zweifelhaft ist, ob nicht das Anfangswort *centum* lediglich auf Conjectur des Schreibers der Kloster Neuburger Handschrift, so ist selbst mit dieser Ergänzung ein rechter Anfang nicht, da es an einem Hinweise auf das Schriftwerk fehlt, welches Constitutionen enthalten soll. Der eigentliche Anfang muss noch auf der Seite gestanden haben, auf welcher die Epitome ss.

ersucht man nun nach, ob sich nicht in Handschriften des Julian die der Epitome Spuren des ursprünglichen Anfangs der Schlussorfinden, so stösst man auf die *Constitutio Quam jam videor*, in unseren Handschriften der Epitome auf *const. 124* folgt den Erklärern so grosse Schwierigkeiten gemacht hat (vgl. Julian. ENEL S. XL). Liest man mit einer leichten und in einer Hand- (— der Codex Matritensis liest *Quasuum* —) angedeuteten Änderung *Quas* statt *Quam*, so ergiebt sich nunmehr ein ganz anderer Sinn: *Quas jam videor* (— der Cod. Haenel II hat *vō* —) *conscripsisse in regia civitate, centum viginti et duae con-*nes sunt etc. Noch entsprechender freilich würde es sein, eine genauere Prüfung der Handschriften zu lesen gestattete: *Julianus videtur conscripsisse in regia civitate etc.* Wenn aber der Schreiber von sich selbst sagt, dass er in Konstantinopel 2 Novellen **abgeschrieben habe, so möchte doch kaum** zu be- sein, dass die sog. *Constitutio Quam jam videor* von der Spitze des Authenticum stehenden Notiz den Anfang bildet.

Ausgegeben am 23. November.





1882.
XLVI.

SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

23. November. Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. DU BOIS-REYMOND.

1. Hr. EICHLER las den ersten Theil einer Abhandlung: Zur Morphologie und Systematik der Marantaceen. Die Abhandlung ist bestimmt; nach Vollendung eines zweiten Theiles derselben in den »Abhandlungen« zu erscheinen.

2. Hr. DU BOIS-REYMOND legte einen Bericht des Prof. GUST. FRITSCH, Vorsteher der mikroskopischen Abtheilung des physiologischen Instituts der Universität, über eine Reise zur Untersuchung der in den Museen von England und Holland aufbewahrten Torpedineen vor. Der Bericht folgt umstehend.



Bericht über eine Reise zur Untersuchung der in den Museen Englands und Hollands vorhandenen Torpedineen.

Von Prof. GUSTAV FRITSCH.¹

Der Königlichen Akademie der Wissenschaften erlaube ich mir folgenden Bericht über die während des Monates August d. J. in England und Holland ausgeführten Arbeiten vorzulegen.

Da es keinem Zweifel unterliegen konnte, dass die Sammlungen des British Museum in London die grösste Aussicht auf Förderung meiner Aufgaben darbieten würden, so reiste ich am Sonnabend 1. August direct nach London, und hatte bereits am folgenden Montag das gewünschte Material unter den Händen, da Hr. Dr. GÜNTHER mir dieselbe in freundlicher Berücksichtigung der schriftlich geäusserten Wünsche bereits hatte zurecht stellen lassen.

Es fand sich unter den Torpedineen das typische Exemplar von *Torpedo hebetans* LOWE, dessen anderweitige Merkmale mir die Verwandtschaft mit *T. occidentalis* STORER, sowie mit *T. californica* wahrscheinlich machten, und damit die Überzeugung erweckten, dass nach dem Gesetz der Correlation auch die Säulenzahl der elektrischen Organe besonders grosse sein werde.

Es verdient die dankbarste Anerkennung, dass mir auf dringendes Verlangen Hr. Dr. GÜNTHER gestattete, die betreffende anatomische Unter-

¹ Prof. FRITSCH's Reise hatte zum Zweck, an noch mehr Torpedineen-Species, Hr. Prof. PETERS ihm im hiesigen zoologischen Museum zur Verfügung stellen zu lassen, die Richtigkeit des Schlusses zu prüfen, den ich aus dem von mir sogenannten CHIAIE-BABUCHIN'schen Satze gefolgert hatte, dass nämlich jeder guten Torpedineen-Species eine gewisse mittlere Säulenzahl als diagnostisches Merkmal zukomme. (Vgl. oben S. 487 ff. meines vorläufigen Berichtes über die von Prof. GUSTAV FRITSCH in Aegypten und am Mittelmeer angestellten neuen Untersuchungen an elektrischen Torpedineen. (Zweite Hälfte). [E. d. B.-R.]

suchung an dem typischen Exemplar vorzunehmen, welche Untersuchung die Richtigkeit der ausgesprochenen Vermuthung rechtfertigte und die drei genannten Arten: *T. occidentalis*, *californica* und *hebertiana* auch durch den Bau der elektrischen Organe als eng verwandte Species hinstellte. Nunmehr wird es nur nothwendig sein, auch bei Exemplaren der immer zweifelhafter gewordenen Species *T. nobiliana* BOS. die Säulenzählung vorzunehmen, um ihr Verhältniss zu den anderen sicher zu stellen.

Die angedeutete Vergleichung bestätigt in erfreulicher Weise auch durch Hrn. Dr. GÜNTHER selber schon auf anderweitige Untersuchungen hin behauptete Übereinstimmung der Meeresfauna der atlantischen und der pacifischen Küsten, sowie die Verbreitung amerikanischer Thierformen des Meeres bis an die europäischen Küsten.

Ausser diesem besonders wichtigen Ergebniss galt es nun an dem Material des Museums bei einer Reihe seltener oder anderswo gar nicht zugänglicher Arten den Bau der elektrischen Organe, das Verhältniss der beiden Seiten des Körpers sowie das Mosaik der Säulen festzustellen.

Diese Untersuchungen wurden ausgeführt an folgenden Species, von denen mir der grössere Theil noch neu war und mit grösserer Wahrscheinlichkeit überhaupt bisher auf die elektrischen Organe nicht untersucht wurde, nämlich: *Hypnos subnigrum* A. DUM., *Narcine tamiensis* (erwachsen und embryonal), *Narcine lingula*, *Narcine timbalaei*, *Torpedo fuscomaculata*, *Astrape dipterygia*, *Astrape capensis*.

Von den freigelegten Organen sowie ihrem Verhältniss zur Körpergestalt wurden zur späteren Vergleichung mit anderweitigem Material Skizzen entworfen; die Säulenzahl wurde bei allen festgestellt und die mit Copiridine auf Glas entworfenen Diagramme der Zählungen auf Papier übertragen.

Ausser der *Torpedo nobiliana*, deren ich trotz allen Bemühungen noch nicht habhaft werden konnte, existirt nunmehr in den europäischen Museen keine Art, welche in den von mir zusammengestellten Tabellen nicht vertreten wäre, und ich verdanke diese erfreuliche Vervollständigung zum erheblichen Theile dem freundlichen Entgegenkommen im British Museum.¹

Unter angestrengter Arbeit konnte ich im Laufe einer Woche die erwähnten Arbeiten beenden, und wendete mich nun nach dem Royal College of Surgeons, um nachzuforschen, ob dort nicht die durch HUNTER beschriebenen, 1773 bei Torbay gefangenen riesigen Exemplaren etwas vorhanden sei; im Hinblick auf meine in

¹ Ob *T. Tschudi* irgendwo in europäischen Sammlungen existirt, weiss ich nicht.

an *T. occidentalis* ausgeführten Zählungen im Vergleich mit den
ischen hatte ich dieselben als zu letzterer Species gehörig
hen müssen.

hgleich im College of Surgeons wie im British Museum die
ungen sich im Stadium der Umstellung und Renovirung befanden,
ich von den Beamten der Anstalt doch in den Nachforschungen
ichst unterstützt, und fand als Rest der erwähnten Fische ein
ohlerhaltenes Praeparat (Descriptive Catalogue No. 2176), welches
ädelkapsel eröffnet, Gehirn und Rückenmark, sowie das System
opfnerven und elektrischen Nerven freigelegt zeigt; von dem
rechten) Organ ist der innere Randtheil, wo die Nerven sich
n, erhalten. Dies äusserst interessante, historische Praeparat,
s in England wohl völlig der Vergessenheit anheimgefallen war,
von mir in natürlicher Grösse skizzirt, so gut dies bei uner-
n Glase thunlich war.

nach Beendigung dieser Arbeiten verliess ich England, da keine
ng blieb, in anderen Städten nennenswerthes Material aus-
n zu finden, die selbst im British Museum nur durch Unica-
en waren, und zwar wendete ich mich nach der altberühmten
itätsstadt Leyden, wo die Hoffnung, weiteres Material zu finden,
m günstigsten schien.

iese Hoffnung hat sich nicht erfüllt, indem die Armuth der
er Sammlung in diesem Gebiet sich als unerwartet gross erwies.
e Stunden genügten, um die Liste der vorhandenen elektrischen
aufzunehmen und zu constatiren, dass, selbst wenn die Erlaubniss
raepariren derselben gegeben worden wäre, was schon wegen
enheit der Beamten nicht erreichbar war, auch nicht eine
liche Lücke der Tabelle ausgefüllt werden konnte.

s bestätigt sich nur wieder die Thatsache, dass die elektrischen
trotz manchen bahnbrechenden Untersuchungen von der Mehr-
er Forscher sehr stiefnütterlich behandelt werden.

s blieb nun noch eine schwache Aussicht, vielleicht zu weiterem
al zu gelangen, nämlich den Versuch zu machen, ob vielleicht
lienhändler der Hauptstadt solches verkäuflich hätten.

h verliess daher Leyden noch am Abend des nämlichen Tages,
angelangt war, wieder und wendete mich nach Amsterdam.
meine Erwartung erwies sich auch diese Hoffnung als eitel, da
ort das Interesse augenblicklich völlig auf lebende Thiere und
n zu concentriren scheint. Ich konnte keinen Naturalienhändler
sterdam ausfindig machen, und somit konnte es nichts nützen,
kostspieligen Aufenthalt unnöthig zu verlängern. Am 17. Vor-
s traf ich wieder in Berlin ein.

1010 Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe vom 23. November.

Aus diesem letzten Theil der Reise ergibt sich als wichtigstes Resultat die Überzeugung, dass es äusserst wünschenswerth ist, Reisende der Akademie, sowie anderweitige, gebildete Personen im Auslande direct für Beschaffung des in den Sammlungen so auffallend seltenen Materials zu interessiren. Der Besuch anderweitiger Städte Europas zum Zweck der Vergleichung conservirten Materials dürfte sich, Hamburg vielleicht ausgenommen, kaum lohnen.

Ausgegeben am 30. November.

1882.
XLVII.

SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

23. November. Sitzung der philosophisch-historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. MOMMSEN.

1. Hr. DROYSSEN las: Zum Finanzwesen des Dionysios von Syrakus.
Die Mittheilung folgt umstehend.
 2. Hr. DILLMANN legte eine Abhandlung von Hrn. Prof. TH. NOELDEKE
in Strassburg vor: Elohim, El (אל, אֱלֹהִים).
Die Mittheilung wird in diesen Berichten erscheinen.
-

zum Finanzwesen des Dionysios von Syrakus.

Von JOH. GUST. DROYSEN.

den Bemerkungen über das Finanzwesen der Ptolemäer, die ich Akademie vor einigen Monaten vorzulegen die Ehre hatte, sind Paar Analogien, welche die Staatsverwaltung des älteren Dionys Syrakus zu bieten schien, nur obenhin berührt worden, Analogien, die auch in dem, was sie von den lagidischen Formen unterscheidet, ohne Interesse sind.

Die Überlieferungen von diesem Tyrannen, wie sie uns vorliegen, freilich zum Theil, vielleicht darf man sagen, so weit sie nicht dem Geschichtswerk des Philistos stammen, sehr bedenklicher

Die öffentliche Meinung, wie sie die Griechenwelt von Alkibiades zum Alexander beherrschte, wenigstens in den attischen Kreisen arischer und politischer Bildung den Ton angab, war nahezu einig, in Dionys den gewaltsamsten und frivolsten Tyrannen, den Schworenen Feind der Autonomie und bürgerlichen Freiheit zu verheuen, von dem nicht minder schwer als von dem Grosskönig Osten die Existenz des Griechenthums bedroht sei; selbst Aristoteles acht gelegentlich als Beispiel eines unrichtigen Schlusses den Satz: Dionys ist ein Räuber, denn er ist ein schlechter Mensch; wohl aber kann man sagen: Dionys ist ein schlechter Mensch, denn er ist ein Räuber.¹

Wenn der grosse Scipio des zweiten punischen Krieges auf die Frage, wer seiner Ansicht nach die grössten und mit Einsicht kühnsten Staatsmänner gewesen seien, die beiden Sikelioten Dionys I. und Agathokles genannt hat (Polyb. XXXV. 6), so wird man sich erlauben dürfen, nicht ohne Weiteres die Phrasen und Anekdoten des doctrinären Tyrannenhasses, wie sie über Dionys I. überliefert sind, für

Geschichte dieses bedeutenden Staats- und Kriegsmannes zu setzen oder seine Geschichte aus dem in ihnen gezeichneten Charakter psychologisch zu entwickeln; vielmehr wird man versuchen dürfen, in ihnen Sachliche von den Gesichtspunkten aus, die Scipios

¹ Arist. Rhet. II. 24 S. 1401^b 13, auch Eth. M. II. 6. 1203^a 25.

Urtheil bestimmten, so weit es noch möglich ist, zu ergründen und aufzufassen, sich klar zu machen, wie nach Lage der Dinge damals und dort, unter den Gefahren, die das Griechenthum in Sicilien und Italien auf das Furchtbarste bedrohten, Dionys seine Aufgabe gefasst hat und fassen musste, um seine Usurpation durch den Erfolg zu rechtfertigen, welche Wege er finden, welchen Nothwendigkeiten er gerecht werden musste, um denselben zu ermöglichen und nach fast vierzigjährigem Regiment seinem Sohn ein mächtiges, blühendes Reich zu hinterlassen, — eine Untersuchung, die vielleicht dahin führen würde, die Richtung und die politischen Formen zu würdigen in denen für das überall durch Demokratie und Oligarchie, durch Kleinstaaterei, Particularismus und Hanseatismus zerrüttete und sich zeretzende Griechenthum noch die Möglichkeit lag, sich eine Zukunft zu retten.

In solchen Kreis von Anschauungen gestellt, werden die folgenden zerstreuten Bemerkungen ihren Zusammenhang finden.

Im ptolemäischen Finanzwesen galt Silberwährung und Kupferwährung neben einander. Silber wurde nur bis zu Drachmenstücken von 3.57 Gramm ausgeprägt, alles Kleingeld unter der Drachme nur in Kupfer; mit den Schwankungen des Kupferwerthes im Handel schwankte auch der Werth des in grosser Masse circulirenden Kupfergeldes, bis man dazu schritt, isonomes Kupfer zu prägen d. h. Kupfergeld zu fixirtem Werth, das, indem es zu diesem seinem Nennwerth auch in der Staatskasse angenommen wurde, in seiner so garantirten Werthhöhe sich erhalten konnte.

In Sicilien und Italien ist, schon ehe Silbergeld in Umlauf kam, Kupfer in Barren, dann auch nach seinem Gewicht gestempelt, wie wenigstens für Italien zahlreiche erhaltene Stücke ergeben, als Geld gebraucht worden, das Pfund (λίτρα, litra) zu 327,45 Gramm.

Die rasch aufblühenden griechischen Städte an den Küsten Siciliens, für die der Verkehr mit der bäuerlichen Bevölkerung des getreide- und viehreichen Binnenlandes und der Absatz der auf den Herrngütern der Gamoren gewonnenen Erträge in erster Reihe stand, werden von den Kauffahrern der hellenischen Heimath, die für ihren Bedarf an Getreide immerfort der Zufuhr aus der Ferne bedurfte, deren Silbergeld gern in Tausch genommen haben; und mit Recht ist darauf hingewiesen worden,¹ dass eben daher die Einführung des attischen Münzfusses in den meisten sikeliotischen Städten sich erklärt, des Münzfusses, wie er durch Solon begründet worden ist, die Drachme zu 4.366 Gramm; sie nahmen sie zu 4.36.

¹ H. DROYSSEN, Athen und der Westen S. 38.

Diese Sikelioten sind, auch nachdem sie selbst Silber zu prägen begonnen, dabei geblieben, nach Kupferpfunden, wie im Binnenlande hergebracht war, zu rechnen. Aber sie haben ihr Kupferpfund durch eine Gewichtsreduction mit dem Münzfuss, nach dem sie ihr Silber fortan prägten, in Verhältniss gesetzt. Sie reducirten die Litra auf $\frac{1}{3}$ ihres Gewichts

von 327.45 auf 218.30 Gramm;

ihre Litra wog nun genau $\frac{1}{2}$ attische Mine, d. i. $\frac{1}{120}$ des attischen Talents. Sie nahmen als Grossgewicht das attische Talent zu 26196 Gramm an;¹ sie theilten es in 120 Litren zu 218 Gramm, die Litra in 12 Unzen zu 18.16 Gramm. Sie rechneten nach Talent, Litren, Unzen in Kupfer, auch wenn sie in Silber oder Gold zahlten.²

Der Werth, den sie im Verkehr dem Kupfer gegen Silber gaben, erhellt aus dem Namen des Dekalitron, mit dem sie den Stater, das silberne Zweidrachmenstück nach attischem Fuss, bezeichneten.³ Wenn das Zweidrachmenstück, also 8.72 Gramm Silber, so viel galt als 10 Litren, also 2180 Gramm Kupfer, so war ihnen das Verhältniss von Silber zu Kupfer = 1 : 250. Die Hälfte des Stater, die Drachme wurde ihnen die »Regel« (*vóμος*, nummus), nach der sie ihre Prägungen in Silber oder Kupfer regelten.

Sikeliotisches Kupfergeld aus der Zeit vor dem peloponnesischen Kriege ist mit Sicherheit nicht nachgewiesen.⁴ Wenn die Dekadrachmen, die Gelon's Gemahlin Demarete nach dem Siege über die Punier prägen liess (Diod. XI. 26), von den Sikelioten Pentekontalitren genannt wurden, so war Ol. 75 bereits dies System in Syrakus in voller Übung. Auch Agrigent und Gela haben von Anfang her, wie man nach den noch erhaltenen Münzen schliessen muss, nach atti-

¹ Nicht das attische Handelstalent zu 36156 Gramm; die Bestimmung des attischen Münzgewichts ist hier berechnet nach dem attischen Volksbeschluss, der das Verhältniss von Handels- und Münzgewicht auf 100 : 138 normirt.

² Den Beweis dafür geben die tauromenischen Inschriften C. I. G. III 5640. 5641, sowie das Epigramm des Simonides für ein Weihgeschenk der Demarate: *ἐξ ὡσόν λιτρῶν καὶ πεντήκοντα ταλάντων . . . τὰς δεκάτας δεκάταν*. Also 50 Talente 100 Litren, an Werth 1220 Drachmen Silber. Mit Recht hat SCHNEIDEWIN die angeführten zwei Zeilen aus dem Epigramm des Simonides No. 141 ed. BERGK ausgeschieden; sie sind die Reste eines besonderen Epigramms.

³ *λίτρα καὶ δεκάλιτρος στατήρ, ἐξαντίον τε καὶ πεντόγχιον*, sagt Epicharm in einem Fragment bei Pollux IX 81 (bei LORENZ Epichl. ἀρπυγῶν fr. 2) dessen Zusammenhang nicht mehr erkennbar ist.

⁴ MOMMSEN, R. M. S. 82, hält für das früheste Kupferstück das jetzt bei Head coins of Syr. tab. V. 13 abgebildete, das nach HEAD's Urtheil dem Style nach der Periode von 405—345 angehört. Nach HEAD sind die ältesten Kupfermünzen bis jetzt die mit dem Polypen und 3 Kugelchen auf der Rückseite, sie wiegen 3.78 bis 1.30 Gramm. Diese Trianten stellt HEAD dem Styl nach in die Zeit der Demokratie von 465—415, während BRANDIS Münzwesen S. 590 sie ein Jahrhundert jünger glaubt.

schem Fuss geprägt; Himera erst aiginäisch, die Drachme zu 6.20 Gr., dann seit jenem Siege am Himera attisch; Zankle, seit es Messana genannt wurde (Ol. 71.), Naxos seit Ol. 70. 3 attisch¹. Und wenn Aristoteles bei Pollux IX. 77 im Gegensatz zu der in seiner Zeit geltenden Werthung des sicilischen Talents zu 12 Nummen sagt: das alte Talent habe 24 Nummen gehabt², so ergibt sich damit das System der älteren Kupferrechnung:

$$1 \text{ Stater} = 2 \text{ Nummen} = 10 \text{ Litren},$$

$$12 \text{ " } = 24 \text{ " } = 12 \times 10 \text{ Litren} = 1 \text{ Talent}.$$

Vielleicht ist noch folgender Umstand beachtenswerth. Wenn die Sikelioten die hergebrachte sicilisch-italische Litra von 327.45 Gramm auf 218.30 herabsetzten, um sie mit dem Gewicht der attischen Silbermünzen in Verhältniss zu setzen, so ergibt sich das einfache Verhältniss 250:1 nur dann, wenn das attische Didrachmon, dem 10 Litren entsprechen sollten, 8.732 wog.

Diesem Gewicht entspricht das attische Silbergeld nur in seinen nachweisbar älteren Prägungen nach der solonischen Reduction, den Tetradrachmen zu 17.464 Gramm. Die späteren Tetradrachmen wiegen 17.344; für diese würde sich, das Didrachmon von 8.672 Gramm Silber = 218.50 Gramm Kupfer, das Verhältniss beider Metalle 251.613:1 ergeben, ein Verhältniss, das zu irrational scheint, als dass es dem neuen sikeliotischen Systeme zu Grunde liegen sollte.

Es wird gegen diese Auffassung nicht eingewendet werden dürfen, dass attische Didrachmen sehr selten und diese seltenen etwas leichter sind als sie sein sollten (statt 8.73 resp. 8.66 Gramm nur 8.41 und geringer), — noch weniger, dass Aristoteles bei Pollux l. c. sagt: »die Sikelioten nennen den korinthischen Stater Dekaliter«; Aristoteles mag den korinthischen Stater genannt haben, weil in seiner Zeit seit

¹ So FRIEDLAENDER in v. Sallet Numism. Zeitschr. VIII. S. 99. Ob wie neuerdings vermuthet worden ist, die Verschiedenheit der Drachmen (euböisch-attisch und aiginäisch) darauf zurückzuführen ist, dass man das (hypothetische) Grossstück von 24.80 Gramm bald in Drittel, Sechstel u. s. w. (8.27—4.13 u. s. w.) bald in Hälften, Viertel u. s. w. (12.40—6.20 u. s. w.) theilte, muss dahin gestellt bleiben.

² Böckh Metrolol. Unters. S. 315 glaubt noch Spuren davon zu erkennen, dass ursprünglich die Litra der Nummos gewesen sei. Auch MOMMSEN l. c. S. 84 hält dafür, dass der Nummos »höchst wahrscheinlich von dem ersten Dionys. von 1 auf 5 Litren gesetzt sei, er nennt das die »erste und ärgste Reduction.« Die erste ist die der Litra von 327.45 auf 218.30 Gr., mit der, so scheint es, das entstand, was Aristoteles τὸ ἀρχαῖον τάλαντον genannt hat; wenigstens deutet er nicht an, dass es ein früheres sikelisches oder sikeliotisches Talent gab. Wohl erst mit dieser Herabsetzung der Litra auf das Gewicht von 1/2 Mine attisch kam in Sicilien das Wort Talent auch für das Geld in Gebrauch, freilich in anderer Bedeutung als sonst bei den Griechen, nämlich für einen Centner von 120 Pfund zu je 12 Unzen, nicht für einen Centner von 60 Minen zu je 100 Drachmen.

noleon die syrakusischen Dekalitren das Gepräge korinthischer Stateren; aber sie wiegen nicht wie die korinthischen nur 8.50 Gramm 1 weniger, sondern 8.72.

Also das Gewicht des alten attischen Münzfusses war und blieb in Athen — und noch bis in die Zeit des Agathokles hinein — normativ. So zu diesem hatte der Nomos ein einfaches Verhältniss, und den Verhältnissänderungen, die in Athen eintraten, folgten die Sikelioten nicht.

Über die Frage, warum die Sikelioten nicht folgten und warum die Syrakusaner das Gewicht ihres Silbergeldes minderten, wird sich vielleicht einer späteren Erörterung über das attische Münzwesen die Antwort ergeben.

In dem ptolemäischen Münzsystem gab es kein Silber unter der Marke von 3.57 Gramm. In dem sikeliotischen System ist unter der Drachme, dem Fünflitrenstück noch eine ganze Reihe kleinerer Münzminale in Silber ausgeprägt, nicht bloss bis zur Litra hinab ($\frac{1}{5}$ Drachme 0.7 Gramm), sondern Theilstücke der Litra bis zu $\frac{3}{12}$ Litra (drei Unzen) hinab; also noch Silberstücke von 0.21 Gramm.¹

In dem heutigen französischen System hat das kleinste Silberstück (20 Cent) 0.9 Gramm, in unserem Marksystem 1.09 Gramm, von 0.09 Legirung. Wie stark die Legirung des sikeliotischen Silbers ist, hat man, so viel mir bekannt, noch nicht untersucht. Wenn die Sikelioten noch Silber zu 0.21 Gramm ausprägten, so befriedigten sie damit das Bedürfniss an Kleingeld in einer Weise, die selbst bei der grossen Wohlfeilheit der nothwendigen Lebensbedürfnisse, die man sie in Sicilien erkennen kann, dem Kupfergelde im Verkehr eine bedeutende Rolle liessen. War noch ihr Dreier von Silber, so trat er nach dem Verhältniss von 250 : 1 den Werth von 54.50 Gramm Kupfer, d. h. $\frac{1}{4}$ Litra oder 3 Unzen. Sie mussten schon 1 Myriaden Kupfer ausprägen, um 400 Drachmen zu repräsentiren. Was sollte das in Dionys I. Zeit sagen, wo ein kluger Kaufmann in Syrakus, der den ganzen Eisenhandel der Insel an sich zu bringen verstand, den 50 Talent Silber, die bei ihm angelegt waren, 100 Talente diente.

Sind, wie HEAD und POOLE meinen, die Kupferdrachmen, deren Rückseite mit dem Polypen und drei Kugeln bezeichnet ist, der Zeit

¹ Das Verzeichniss dieser Kleinstücke giebt HEAD S. 80 und zwar als aus der Zeit von 480—346, von Hieron bis zum Ende Dionys II., es sind:

Zehner	von	0.72	Gramm,
Sechser	•	0.43	•
Fünfer	•	0.36	•
Vierer	•	0.29	•
Dreier	•	0.21	•

zwischen 460 und 412 angehörig und bezeichnen die drei Kugeln sie als Trianten, als Drei-Unzenstücke, so mussten sie nach dem Verhältniss von 250 : 1, wenn ihr Metallwerth dem der silbernen Trianten von 0.215 entsprechen sollte, 54.50 Gramm wiegen; sie wiegen aber nur zwischen 3 und 4 Gramm;¹ das ergäbe das Verhältniss von 18 : 1 bis 14 : 1. Das heisst: diese Kupferstücke haben an Metall nicht den Werth, für den sie als Geld coursiren sollten.

Mochte vor Zeiten, als die »Regel« festgestellt wurde, das Silber gegen Kupfer in Sicilien 250 : 1 gestanden haben, das heisst, mochten die hellenischen Händler in Syrakus, Akragas u. s. w. den Kornbauern auf den Herrengütern und den Viehzüchtern aus dem Hinterland das damals noch seltene Silber so hoch haben anrechnen können, — auf dem allgemeinen hellenischen Markt stand Silber gegen Kupfer gewiss nicht so hoch, und mit der steigenden Silbereinfuhr musste auch in Sicilien das Silber billiger werden. Wer ein Talent Kupfer als Metall verkaufte, begnügte sich dann nicht mehr für diese 120 Litren Gewicht 24 Drachmen Silber zu erhalten. Wenn man trotzdem dabei blieb, die Doppeldrachme Silber als Dekaliter zu bezeichnen, so musste man, damit die Bezeichnung richtig bleibe, entweder das Gewicht der Kupfermünzen nach dem Marktpreis des Silbers reduciren oder den Werth der Kupferstücke nicht mehr nach ihrem Gewicht gelten lassen, wie jener Triant viel mehr galt als er Kupferwerth hatte, d. h. man musste das Kupfer als Scheidemünze behandeln, wenn man auch fortfuhr, nach Nominalen in Kupfer zu rechnen.

Die bisher besprochenen Dinge sind von den neueren Forschern zum Theil sehr anders gedeutet worden. Sie nehmen an, dass zweierlei Rechnungen, die nach Kupferlitren und die nach Silberlitren neben einander gegangen seien, dass man schwere und leichte Litren, jene zu 24, diese zu 12 Nummen, unterschieden habe, dass namentlich die Reduction von 24 auf 12 einen Staatsbankrott bezeichne, indem »eine Schuld von 25 Drachmen mit 5 Drachmen getilgt werden konnte«, also ein Concurs, in dem nur 20 Procent gerettet wurde; sie erklären, dass diese gewaltsame Operation »unzweifelhaft« dem Tyrannen Dionys I. zuzuschreiben sei. In den Überlieferungen findet sich, soviel ich sehe, keine Spur von solchem Concurs, obschon die

¹ POOLE S. 163 führt 5 solcher Stücke auf, die 4.08 — 3.36 — 3.24 — 3.09 — 2.65 Gramm wiegen. Die von BRANDIS S. 590 angeführten 3 Stücke der Berliner Sammlung wiegen 3.78 — 3.30 — 2.98 Gramm. Die Hemilitren aus der Zeit des besten Styls und älter (die in Silber geprägt 0.43 wiegen) müssten in Kupfer 109 Gramm wiegen, wiegen aber in Akragas 22 bis 19 Gramm, in Kamarina 25.60 bis 14.90, in Himera 6.60 Gramm, wohl ein hinlänglicher Beweis, dass schon vor Dionys I. Zeit Kupfer nur Scheidemünze war.

auch den alten Schriftstellern wohl bekannte solonische Schuld-
ein Concurs auf 73 Procent, das Beispiel einer solchen Finanz-
gab. Die numismatischen Thatsachen, aus denen man jenen
ankrott des Tyrannen gefolgert hat, führen auf eine andere
g.

Is Dionys I. das Princip der Scheidemünze, für einen Werth
n, den sie nach ihrem Metallgehalt nicht hat, auch anderweitig
enden versucht hat, wird sogleich zu besprechen sein. Zuvor
och ein Wort von der sogenannten zweiten Reduction der
er von 24 auf 12, gesagt werden.

e man zu dieser Reduction kommen konnte, ist vorher an-
worden. Ist es möglich noch zu erkennen, für welche der
ngeführten Formen man sich entschied, um sie durchzuführen?
Reduction der Kupfermünze auf ihren Metallwerth oder für
ic립 der Scheidemünze? Hypothetisch wenigstens darf man
u antworten versuchen.

ch in der guten attischen Zeit sind ein Paar Versuche mit
nünze gemacht worden; und selbst von Eisenstücken, die als
heine oder Münzzeichen ausgegeben worden sind, giebt es in
hellenischen Staaten Beispiele. Aber im Allgemeinen mögen
chen kein anderes Geld als solches, das den vollen Metall-
at, für den es gelten will; Scheidemünze kommt ihnen wie
t Betrug, wie Falschmünzerei vor; und gewiss hat nichts
zu gethan, Dionys I. als einen grossen Hallunken erscheinen
n, als dass er selbst Zinn als Silbergeld circuliren, ja dem
ld durch eine eingestempelte Marke den doppelten Werth
ess. Bei der grossen demokratischen Reaction, die bald nach
gang Dionys' II. mit Timoleon eintrat, war gewiss eine erste
er Hersteller, diese Münzzeichen zu beseitigen, falls es noch
var.

ann Aristoteles in der mehrfach angeführten Notiz bei Pollux
das sikelische Talent sei unter allen das kleinste, das alte
. Nummen gegolten, das spätere 12 Nummen«, so ist zunächst
ss dies kleinere Talent noch zu seiner Zeit, vor Ol. 114, ein-
worden ist. Weiter scheint es sich von selbst zu verstehen,
ht der Nummos in seinem Gewicht geändert wurde, da das
n der griechischen Welt gleichsam internationales Geld war,
ato's Ausdruck κοινὸν Ἑλληνικὸν νόμισμα, während Kupfer und
nmer nur entweder als Waare, oder als epichorisches Geld
konnte. Auch bei den Sikelioten war seit Einführung der
Silber thatsächlich das Werthmaass, wenn man auch das
; Silber nach den Nominalen des Litrensystems bezeichnete.

Wenn Aristoteles an einer anderen Stelle bei Pollux (IV. 174) sagt: die Sikelioten nennen (nicht: nannten) den Stater Dikalitron, so blieb, als jene zweite Reduction erfolgt war, trotz derselben die Doppel-drachme in Silber ein Dikalitron, und es war nach wie vor der Numos die Hälfte davon, nach wie vor 120 Litren ein Talent; aber das sicilische Talent und dessen Stückelungen nach dem Litrensistem waren in ihrem Gewicht auf die Hälfte reducirt, also

1 Litra früher	218 Gramm,	jetzt	109 Gramm,
10 " "	2180 " "	" "	1090 "
1 Tal. sic. 120 " "	26160 " "	" "	13080 "

War früher 10 Lit. K. (2180 Gr. K.) = 2 Drachmen zu 8.73 Gr. S. so waren jetzt 10 " " (1090 " ") = 2 " 8.73 Gr. S. Stand früher Kupfer zu Silber = 250:1, so jetzt 125:1 (genauer: 124.85:1).

HEAD hat auf Tab. V. eine Reihe syrakusischer Kupfermünzen zusammengestellt, die er, nicht blos ihrem Styl nach, den Jahren von 345—317, denen der von Timoleon hergestellten Demokratie und Autonomie zuschreibt; in erster Reihe zwei Stücke (von 34.2 bis 31.6 Gr. das eine, das andere von 7.72 Gr.), deren Vorderseiten den Kopf der Pallas mit korinthischem Helm haben, dann andere mit dem Kopf des Zeus Eleutherios, andere mit dem korinthischen Pegasos u. s. w., Stücke bis 3.21—1.9—0.38 Gramm hinunter. Dies erste Stück von 34.2 Gr. würde als ein Dreier ($\frac{3}{12}$ Litra) = 0.21 Gr. S., das zweite als eine Unze ($\frac{1}{12}$ Litra) = 0.07 Gr. Silber bezeichnet werden können. Die Stückelung des Weiteren zu verfolgen liegt ausser meiner Aufgabe.

Wenn Aristoteles nach Pollux IV. 174 in der Politik der Akragantiner von einem Strafansatz in dieser Stadt auf 50 Litren gesagt hatte, dass 1 Litra 1 aiginäische Obole gelte ($\frac{6.20}{6}$ Gramm) und an einer zweiten Stelle, IX 87, wo er von dem sikelischen Talent zu früher 24 jetzt 12 Nummen spricht, bemerkt, dass ein Nummos 3 attische Halbböle (= 1.09 Gr. S.) gelte, so können beide Angaben nur den ungefähren Werth bestimmen wollen, aber nicht dazu benutzt werden, durch Multiplication für die höheren Nomina in Silber deren äquivalenten Gewichte in Kupfer zu bestimmen.

Nach dem Dargelegten wird man annehmen dürfen, dass in den Finanzmassregeln des ersten Dionys die Reduction des Kupfers keine lucrative Rolle gespielt hat; selbst wenn er seine kupfernen Trianten 18mal geringer ausbrachte, als sie nominell neben den Trianten in Silber sein sollten, so wäre damit kein grosser Gewinn zu erzielen gewesen; mit je 10000 Trianten hätte er 500 Drachmen, ungefähr 130 Thaler über den Metallbetrag dieser Stücke in Cours gesetzt.

Für ihn handelt es sich bei seinen Festungsbau grossen Marine, die er schuf und erhielt, bei seinen

Kriegen, dann bei seinem Söldnerheer, seinen späteren Feldzügen, seinen Colonisationen u. s. w. um Summen, bei denen Millionen von Trianten nichts verschlugen. Vor Allem seine ersten Jahre mussten voll grosser finanzieller Schwierigkeiten sein. Die kleinen Leute, die Bauern im Zehntlande und der städtische Demos, die auf seiner Seite standen, hatten nicht viel zu zahlen; und diejenigen, welche zahlen konnten, die Gamoren und Ritter, die Oligarchen, die Reichen waren auf das hartnäckigste wider ihn, bis es ihm gelang, sie zu Paaren zu treiben, gewiss nicht ohne die Mittel, die der Principe des grossen Florentiners lehrt, auch die *crueltà ben usate*. Aber es gelang ihm, wie nach Aussen Frieden und Sicherheit, so im Innern Ruhe und Ordnung zu schaffen und zu erhalten. Mit dem Ausgang des zweiten schweren Krieges gegen die Punier 395, demnächst mit der Occupation von Rhegien und Calabrien war die Macht und die grosse politische Stellung des Dionys I. fertig¹: Sparta, die kyprischen Könige, die Satrapen Kleinasiens suchten seine Gunst, und die Athener nannten ihn in einem Ehrendecret von 393 *Διονύσιον τὸν Σικελίας ἄρχοντα* C. I. A. 51. 52, KÖHLER Mittheilungen I. S. 4.

Wir sind von der Steuerverfassung Siciliens zu wenig unterrichtet, um für die Erörterung der Finanzmassregeln, die Dionys traf, von ihnen ausgehen zu können, und selbst von der *lex Hieronica* in den Verrinen, aus der uns noch das beste kommt, ist noch nicht entschieden, ob sie von dem Hieron der Perserkriege oder dem König Hieron in Hannibals Zeit stammt. Auch von den politischen Formen und Reformen der sicilischen Städte ist unsere Kunde weder umfassend noch sicher genug, um von da aus auf die Besteuerung der Gamoren, der Zehntbauern u. s. w. Schlüsse machen zu können. Aus dem, was uns noch vorliegt, sind nur unsichere Ergebnisse zu gewinnen.

Es findet sich, so viel mir bekannt, keine Spur davon, dass Dionys zur Grundlage seiner Macht den gefüllten Schatz gemacht habe, wie es das perikleische Athen gethan hat, nicht ohne die Zuversicht, mit solcher finanziellen Überlegenheit über die geldarmen Peloponnesier der Macht über die Bündner, der »Tyrannis«, wie Perikles sie genannt hat, gewiss zu sein und zu bleiben. Dionys hatte am wenigsten in seinen ersten zehn Jahren daran denken können, Schätze zu sammeln: genug, wenn es ihm gelang, so viel zu schaffen wie nöthig war, nur Syrakus gegen die Karthager zu behaupten. Er wird die Einsicht gehabt haben, auch des Weiteren Alles, was er erübrigen konnte, in der Steigerung und Vervollkommenung der Machtmittel

¹ Inscr. Philipp. 65 *τηλικαύτην δὲ δύναμιν περιεβιάετο καὶ περὶ καὶ ναυτικήν, ὅσην οὐδεὶς ἀνὴρ τῶν πρὸ ἐκείνου γενομένων.*

anlegen zu müssen, auf denen seine militärische und politische Überlegenheit beruhte, auf die »diamatenen Ketten« wie sein Ausdruck war, mit denen er das Reich geeint und gebunden seinem Sohne hinterlasse. Und man sollte meinen, dass er, so wie er nur erst fest im Sattel sass und das tief zerrüttete Sicilien wieder den Muth zu friedlicher Arbeit gewann, darauf bedacht gewesen sein muss, die unendlich reichen Hilfsquellen der Insel wieder zu beleben und den Wohlstand in Stadt und Land zu fördern, der ihm und dem Staat gegebenem Falls statt eines Schatzes sein konnte. — nicht den Reichthümern, die gewohnt waren, »ihres Geldes zu herrschen«, sondern der kleinen Leute in Stadt und Land, die so lange von jenen monopolistisch ausgebeutet, zu Parteizwecken und Strassenkämpfen mißbraucht worden waren.

Freilich die grosse Autorität des Aristoteles tritt solchen Voraussetzungen schroff entgegen. In dem Capitel seiner Politik, in dem er von den Künsten spricht, welche die Tyrannen anwenden, um sich zu sichern, den grossen Bauten der Peisistratiden und des Polykrates den Horen und Zuträgern des Hieron u. s. w., sagt er endlich: »auch die Zahlung der Steuern gehört hierher, wie in Syrakus, wo man unter Dionys' Regiment in fünf Jahren das ganze Vermögen eingezahlt hat.« Diese kühle Exemplification des grossen Denkers ist um so auffallender, da er ein Paar Paragraphen später lehrt: »der Tyrann, der seine Herrschaft erhalten wolle, müsse mehr als Verwalter denn als Gebieter seines Staats erscheinen, er müsse sich in Betreff der Abgaben und Leistungen (εἰσφοραὶ καὶ λειτουργίαι) das Ansehen geben, sie der Staatsverwaltung wegen oder für den Fall eines möglichen Krieges zu fordern, überhaupt sich als Wächter und Handhaber der öffentlichen nicht seiner eigenen und Privatinteressen zeigen; dann brauche er nicht zu fürchten, dass es ihm je an Geldmitteln fehlen werde, solange er Herr des Staates sei; auch wenn er abwesend, sei ihm da besser als aufgehäufte Schätze daheim zu haben, die Andere an sich bringen und gegen ihn verwenden konnten.« Jene auf dem Wege fünfjähriger Besteuerung gemachte Confiscation des ganzen Vermögens (τὴν οὐσίαν ἀπάσαν) kann weder eine allgemeine noch dauernde Massregel gewesen, noch kann sie überhaupt in dieser Form zur Anwendung gekommen sein. In dieser Form nicht; wenn alles Hab und Gut der Einwohner — denn der Ausdruck, den Aristoteles braucht, beschränkt sich weder auf die φανερά οὐσία noch auf das τίμημα, noch auf gewisse Kategorien der Bevölkerung — wenn also in fünf Jahren

¹ Arist. pol. V. 11. 3. καὶ ἡ εἰσφορὰ τῶν τελῶν, οἷον ἐν Συρακούσαις, ἐν πέντε ἔτεσιν ἐπὶ Διονυσίου τὴν οὐσίαν ἀπάσαν εἰσπληροῦναι συνέβαινε.

baares Geld und ihre zinstragenden Capitalien, ihr ländlicher Sitz mit dem lebenden und todten Inventar, ihre Häuser in den Städten, ihre Werkstätten mit allen Werkzeugen und Vorräthen auf dem Wege der Besteuerung confiscirt waren, wer war dann noch im Stande, zu verdienen und zu steuern? Mag als Strafe etwa für eine That, die sich empört, für die Reichen in ihr, die die Empörung veranlasst, mit den Karthagern Verrath gesponnen hatten, die gründlichste Confiscation verhängt worden sein, — dies langsam abtödtende fünfjährige Verfahren insgesamt wäre so sinnlos, dass man es weder mit der Absicht, nicht durch plötzliche Wechsel des Besitzes dessen Erwerb zu mindern, noch mit der, dessen werbende Thätigkeit nicht unterbrechen, zu erklären wird versuchen wollen. Wie gross immer die Autorität des Aristoteles sein mag, diese Angabe ist, so wie er sie giebt, von sehr zweifelhafter Natur, vielleicht nur eine Anekdote, die man sie sich in den Kreisen der Akademie in der Zeit als Aristoteles noch zu ihr hielt, erzählt und geglaubt haben mochte, — vielleicht nicht einmal eine originale. Denn von dem korinthischen Tyrannen Kypselos wurde erzählt: er habe dem Zeus alles Vermögen der Korinthier gelobt, wenn er Tyrann werde, habe dann deren Geld und Gut katastriren lassen, davon jährlich den Zehnten gefordert und auf diese Weise in zehn Jahren so viel erhoben, wie der Kataster im Beginn seiner Tyrannis besagt habe; die Korinthier, wird ausdrücklich hervorgehoben, seien »darüber nicht verärrt«; denn bei dem Tyrannen blieb ihnen, da man auch später noch den Pachtzins auf wenigstens 8 Procent vom Grundwerth, den Zins von Capitalien auf 12 bis 18 und mehr Procent rechnete, immer noch ein Überschuss und ausserdem das werbende Kapital. Dass der natürlich viel schlimmere Tyrann von Syrakus 20 Procent zahlen lässt und zwar nicht vom Einkommen, sondern von allem Besitz — denn sonst wäre nicht nach fünf Jahren *ἡ οὐσία ἅπασα* dahin gewesen, — macht die ganze Geschichte verdächtig eine blosser Steigerung der Geschichte von Kypselos zu sein, — einer Jagdgeschichte, die Herodot noch nicht kennt, die vielleicht in Olympia Angesichts des goldenen Zeusbildes, welches Kypselos geweiht haben sollte, von den Fremdenführern erzählt und von den Autoren, die Pausanias ausschrieb, ihnen nachgeahmt sein mag.¹

Unter den anderen Anekdoten über Finanzmassregeln des Dionys I. sind zwei, die für unsere Zwecke ein grösseres Interesse haben, beide

¹ Nach Arist. Pol. V. 8. 4. gehört Kypselos nicht zu denen, die *ἐκ τῶν τιμῶν* Tyrannen geworden sind; nach der Erzählung des NICOL. DAM. die wohl aus dem Ephoros kommt, ist Kypselos Polemarch gewesen, und so könnte er allerdings eine Katastrirung veranlassen haben, bevor er Tyrann war.

im zweiten Buch der Oeconomica. Nach der einen hat er einmal eine Anleihe bei den Bürgern gemacht und als sie dann Rückzahlung gefordert, ihnen befohlen, was sie an Silbergeld hätten ihm, zu bringen; er habe dann auf jedes Stück eine Marke schlagen lassen und beföhle, dass jedes so gezeichnete Stück für den doppelten Werth gelten solle, eine Drachme für zwei u. s. w. »und so lieferten sie ihm, was er ihnen schuldig war«. Die andere Angabe besagt: er habe Zinn statt Silber prägen lassen und dann in einer Ekklesie mit vielen und eindringlichen Gründen ihnen dies Geld empfohlen, und sie hätten beschlossen, das Zinn für Silber zu halten und zu nehmen. Pollux IX. 79 ergänzt diesen Vorgang mit der Angabe, dass solche Zinndrachmen vier attische Drachmen statt einer gegolten hätten, eine Angabe, die neuerer Zeit mit Unrecht so gedeutet worden ist, als habe Dionys den Werth der Silberdrachme, des Nummos, auf das Vierfache erhöht und damit das ganze Litrensystem reducirt.

Beide Formen, das Zinn Geld so gut wie das gestempelte Silbergeld waren Versuche, ein Princip weiter und ergiebiger durchzuführen, das schon mit den Kupfertrianten von 3—4 Gramm, wenn das früher darüber Gesagte stichhaltig ist, in Sicilien Eingang gefunden hatte. Beide, nach der neueren Bezeichnung Nothmünzen oder vielmehr Münzzeichen (Mynteteken wie in Schweden in Karl's XII. Zeit) basiren auf den Credit, den die öffentliche Macht, die sie ausgiebt, hat oder fordert. Und indem sie denselben nur fordern und aufrecht halten kann, wenn sie diese Werthzeichen selbst an ihren Kassen zu dem vollen Werthe annimmt, für die sie sie ausgegeben hat, so haben sie ihre Garantie in dem Bestande des Staates und seines anerkannten Regimentes; sie sichern so ihrer Seits den Bestand dieses Staates und seines Regiments durch das Interesse Aller, dessen Credit zu erhalten. Nur wenn regelmässige Zinsen oder Prämien in irgend einer Form an sie geknüpft wären, oder ein wechselndes Agio der kaufmännischen Berechnung Raum böte, würden sie die Speculation des Auslandes locken können; ohne solche Lockungen werden sie auf den inneren Verkehr beschränkt sein.

Und mit dieser Beschränkung scheint sich noch ein weiteres Moment zu ergeben, das mit diesen Massregeln des Dionys entweder beabsichtigt war oder deren Wirkung sein musste.

Neuere Zeit ist bei den lebhaften Erörterungen, ob Goldwährung oder Bimetallismus, der Vorschlag gemacht worden, das Silber, dessen Entwerthung die Folge der immer weiter sich verbreitenden Goldwährung ist, zu einer Art epichorischen Geldes zu machen, um weiteren schweren Verlusten an dem massenhaft vorhandenen geprägten und verarbeiteten Silber vorzubeugen und nicht auch für den inneren

Verkehr Gold immer theurer kaufen zu müssen, das Gold wesentlich den internationalen Verkehr zurück zu schieben, indem kein Gold über 20 Mark ausgeprägt, keine Bankscheine unter 100 Mark ausgegeben werden sollen. In dem syrakusischen Fall handelte es sich nicht darum, die Entwerthung des Silbers zu hemmen, sondern dem Fluss desselben vorzubeugen.

Eine andere Seite in der Pathologie des Geldwesens illustriert das System der Mynteteken, das König Karl XII. schon 1711 in Schweden geplant, dann durch sein Decret Stralsund 14/25. März 1715 geordnet und durch Baron v. Görz in Ausführung gebracht hat. Zunächst wurde der Münzfuss der courrenten Kupferplatten von zwei auf drei erhöht, bald zu den Münzzeichen »Krone«, »publica fide« und »Königlich färdig« und wie sie weiter heissen auch Münzzettel auszugeben, bis endlich mit dem Tode des Königs das ganze System zusammenbrach. Man hatte im Laufe von fünf Jahren allein an Münzen für nominell 34.424.600 Thl. S. M. ausgegeben, deren Realwerth (nach dem damaligen Kupferpreise von 150 Thl. Silbermünze) 229.000 Thl. S. M. betrug, also im Verhältniss von 190:1, und die jährliche Jahreseinnahme des Königreichs war zwischen 3—5 Mill. Thl. S. M. Karl XII. war der Hoffnung, mit der Fortsetzung des Krieges die verlorenen Gebiete der Krone, die reichen Provinzen Estland und Liefland, Pommern und Rügen, Bremen und Verden wieder zu gewinnen, wenigstens Norwegen vielleicht Westpreussen hinzu zu bekommen; mit jenen finanziellen Massregeln schaffte er sich eine ausserordentliche Einnahme von 34 Mill. Thaler, jene Eroberungen hätten die Summe dieser fictiven Werthe vollauf gedeckt und seine finanziellen Ansprüche gerechtfertigt. Bei dem Beginn der Eroberung Norwegens verlor er. Den militärischen und politischen Bankrott Schwedens beendete der finanzielle.

Vielleicht gewinnt aus dieser Gegenstellung die Geschichte des Dionysios einiges Licht. Als er sein Regiment, richtiger seine Ursurpation begann, war der Bankrott des Griechenthums in Sicilien, der politische, militärische, finanzielle in vollem Zuge. Dem mächtigen Vordringen der Karthager seit 409 war Selinunt, Himera, Akragas, Agrigento gefallen; Alles, was sie dort fanden, die Menschen, die Heerden, die Äcker und Häuser, wie das bewegliche Vermögen, war ihre Beute geworden, die Weingärten, die Ölpflanzungen, die Tempel zerstört, Akragas namentlich, mit ihren mehr als 20 000 Bürgern und 200 000 Stücken, die grösste Stadt der damaligen Griechenwelt, »von unglaublichem Reichthum«, wie ein alter Schriftsteller sagt, und dem entsetzlichen Uppigkeit und Pracht, wie die überlieferten Beispiele von Hieron, Exainetos, Antisthenes zeigen (Diod. XIII 83), lag nun aus-

geraubt, verödet und in Trümmern. Und der nächste Stoss d^e furchtbaren Feindes war auf Syrakus gerichtet. Unter Führung d^e Dionys mit der höchsten Anstrengung gelang es 404 noch das Äusser~~e~~ abzuwehren; aber man musste eines neuen schwereren Angriffes, d^e Schicksals von Akragas gewärtig sein.

Aus diesen entsetzlichen Vorgängen wird man auf den wirtschaftlichen Zustand des Griechenthums in Sicilien schliessen dürfen. Vor Allem an seinen Zahlungsmitteln, seinem Vorrath an Edelmetall musste es ungeheure Verluste erlitten haben und täglich noch erleiden, da jeder in dem noch nicht verknecteten Theil der Insel sich bee~~h~~ haben wird, was er an Capitalien besass, auswärts anzulegen.


Ohne Geld waren keine Söldner zu werben, keine Schiffe, Kap~~u~~ pulten, Festungswerke zu bauen, keine Waffen herzustellen. Al~~l~~ woher Geld schaffen? welcher Staat, welcher Tempelschatz, welc~~h~~ Privaten in Tarent, Korinth, Sparta oder wo sonst draussen hätte der Stadt, die heut oder morgen ab und todt sein konnte, eine Anlei~~e~~ gewähren sollen? Wollte Dionys versuchen, sie und damit die let~~z~~ Deckung des sicilischen Griechenthums zu retten, so musste in welcher Art immer, alles noch vorhandene und sich verbergen Edelmetall in die Staatscasse ziehen, er musste zugleich den Man~~y~~ an umlaufenden Werthsummen, wenn auch nur in der Form v~~o~~ Nothmünzen und Geldzeichen, von epichorischem Gelde in möglic~~h~~ ausgedehntem Maasse ergänzen. Er konnte es, wenn seine Waf~~e~~ Erfolg hatten; fehlte dieser, so ging doch Alles und nicht bloss di~~e~~ Masse fingirter Werthe zu Grunde.

Wenn Dionys die Mündelgelder aus den Händen der Vormün~~d~~ und in die Verwaltung des Staates nahm, so war das eine verzi~~n~~ liche Anleihe, — eine Zwangsanleihe, wenn er alles Silbergeld e~~rf~~ forderte und es dann, als die Rückzahlung gefordert wurde, mit ei~~n~~ Marke versehen zu dem doppelten Werth zurückgab u. s. w. jener Marke verdoppelte er den nominellen Werth des umlaufend~~e~~ Geldes, mit den fast werthlosen Zinsdrachmen, die als Tetradrachm~~e~~ in Cours gesetzt wurden, schuf er sich nominelle Werthe, die n~~ä~~ chstweiteren Bedarf decken mochten. Beides waren gleichsam inn~~er~~ Anleihen, unverzinsliche, und dass in der Ekklesie die Masse d^e Volkes dies Zinsgeld für Silber nehmen und halten zu wollen beschlo~~s~~ zeigte, dass es entschlossen war, Alles an die Rettung der Stadt s^e tzen, wenn auch die Reichen und Oligarchen, um wenigstens i~~n~~ Geld zu retten, immer neue Versuche machten, den Tyrannen s^türzen und die »Freiheit« herzustellen. Wenn jenes Silber, das dar~~mit~~ mit der Marke versehen wurde, zurückgefordert werden konnte, s^o muss Dionys bei der Einzahlung sich verpflichtet haben, das ihm au~~ss~~

vertraute Geld in bestimmter Frist zurückzuzahlen. Es wird nicht **überliefert**, ob er dann in besseren Zeiten jene Massen Nothgeld und **Münzzeichen** aus dem Verkehr zurückgezogen oder nur verrufen, d. h. **ob** er den Verlust den Privaten aufgebürdet oder ihn mit den Mitteln **des** nun gesicherten und mächtigen Staates gedeckt habe. Wenigstens **hat** sich unter den zahlreichen sicilischen Münzen dieser Zeit bisher **auch** nicht ein mit der Marke versehenes Silberstück, geschweige denn **eine** jener Zinsdrachmen gefunden.

Der Zeit dieser Tyrannis werden von den Kundigen zahlreiche **Silber-** und Goldmünzen zugeschrieben, namentlich silberne **Tetra-****drachmen** mit dem Kopf der Arethusa auf der einen, dem Viergespann **im vollen Lauf** und der schwebenden Nike, die den Siegeskranz bringt. **auf** der anderen Seite, Münzen von wundervollem Gepräge, zum **Theil** von den Künstlern, die die Stempel geschnitten, Konon, Euainetos, **Eumenes** u. a. mit ihrem Namen versehen. Den Namen des Tyrannen **trägt** keine.

Ausgegeben am 30. November.



1882.

XLVIII.

SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

30. November. Gesamtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. MOMMSEN.

1. Hr. LANDOLT las: Über das Verhalten dampfförmiger Substanzen im elektrischen Lichtbogen.

2. Sodann trug Hr. G. HIRSCHFELD, mit Zugrundelegung einer von Hrn. KIEPERT entworfenen Reisekarte, einen Bericht über die Ergebnisse seiner mit Unterstützung der Akademie ausgeführten Bereisung Paphlagoniens vor.

3. Hr. HELMHOLTZ legte eine Arbeit des Hrn. Prof. OBERBECK in Halle vor: Über die Phasenunterschiede elektrischer Schwingungen. (Fortsetzung.)

Die Mittheilung wird in diesen Berichten erscheinen.

4. Durch Ministerial-Schreiben vom 14. November wird die Hrn. Dr. E. GOLDSTEIN hierselbst zur Fortsetzung seiner Experimental-Untersuchungen über elektrische Strahlung bewilligte abermalige Unterstützung genehmigt.

Ausgegeben am 7. December.

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei.

111

111/111

111

1. Die ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...
11. ...
12. ...
13. ...
14. ...
15. ...
16. ...
17. ...
18. ...
19. ...
20. ...
21. ...
22. ...
23. ...
24. ...
25. ...
26. ...
27. ...
28. ...
29. ...
30. ...
31. ...
32. ...
33. ...
34. ...
35. ...
36. ...
37. ...
38. ...
39. ...
40. ...
41. ...
42. ...
43. ...
44. ...
45. ...
46. ...
47. ...
48. ...
49. ...
50. ...
51. ...
52. ...
53. ...
54. ...
55. ...
56. ...
57. ...
58. ...
59. ...
60. ...
61. ...
62. ...
63. ...
64. ...
65. ...
66. ...
67. ...
68. ...
69. ...
70. ...
71. ...
72. ...
73. ...
74. ...
75. ...
76. ...
77. ...
78. ...
79. ...
80. ...
81. ...
82. ...
83. ...
84. ...
85. ...
86. ...
87. ...
88. ...
89. ...
90. ...
91. ...
92. ...
93. ...
94. ...
95. ...
96. ...
97. ...
98. ...
99. ...
100. ...

1882.
XLIX.

SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

7. December. Sitzung der philosophisch-historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. MOMMSEN.

Hr. ZELLER las: Über die Lehre des Aristoteles von der
Ewigkeit des Geistes.

Die Mittheilung folgt umstehend.



Die Lehre des Aristoteles von der Ewigkeit des Geistes.

Von E. ZELLER.

Die Lehre des Aristoteles über den Nus gehört bekanntlich zu den schwierigsten seines Systems, über deren Sinn und Bedeutung die Ansichten der Philosophen an am weitesten auseinandergegangen und über die bis auf den heutigen Tag in wesentlichen Beziehungen noch keine Übereinstimmung erreicht ist. Neben der vielbesprochenen Unterscheidung der Vernunft und der leidenden Vernunft ist es besonders die Frage nach der wirklichen Herkunft derselben, die einen Streitpunkt bildet. Die Erklärungen des Philosophen sind hier wie dort weder so einfach noch so deutlich, als man wünschen möchte; sucht man sie durch Schlussfolgerungen aus seinen anderweitigen Annahmen zu erhellen, so erhebt sich das Bedenken, dass es theils fraglich ist, ob Aristoteles selbst diese Folgerungen schon gezogen und anerkannt hat, theils aus verschiedenen Bestimmungen seines Systems sich widersprechende Lehren vom Nus verschiedene, mit einander nicht immer vereinbar erscheinende Konsequenzen zu ergeben scheinen. Erwägt man zudem noch die Unklarheit, welches sowohl die späteren Peripatetiker als die mittelalterlichen Philosophen daran hatten, sich die schwerwiegende Stimme der Autorität für ihre eigenen Annahmen zu sichern — ein Interesse, das immer bei Einzelnen, wie es scheint, mitspricht — so besteht die Gefahr vollkommen, dass es ungleich leichter ist, den Zwiespalt zwischen den Ansichten über die ächte aristotelische Lehre zu erklären, als ihn aufzuklären. Ich hoffe daher nichts überflüssiges zu thun, wenn ich die Lehren des Aristoteles über die Entstehung des Nus, der nach ihm der oberste Theil der menschlichen Seele bildet, einer nochmaligen sorgfältigen Untersuchung unterziehe.

Bei der nun die allgemeinere Frage nach der Entstehung des Seelenwesens überhaupt drei Antworten zulässt, für deren jede man sich entweder für ein Mittleres zwischen ihnen suchen muss, den Traukismus, den Creatianismus und die Annahme einer Präexistenz, lässt sich auch von der specielleren nach der Entstehung der Vernunft. Man kann dieselbe entweder zugleich mit dem Leibe und

durch die gleichen Faktoren, wie diesen, erzeugt werden lassen; oder man kann annehmen, dass sie durch einen schöpferischen Akt der Gottheit zu dem Leib und den niedrigeren Seelenkräften hinzugefügt werde; oder man kann sie mit Plato, wie es sich auch mit ihrer ersten Entstehung verhalten möge, der des menschlichen Individuums, dem sie inwohnt, in ihrem Dasein vorangehen lassen. Von diesen drei Annahmen ist nun die erste bei Aristoteles, wie allgemein anerkannt ist, durch die Natur der Sache wie durch seine eigenen Erklärungen ausgeschlossen; umsomehr wird darüber gestritten, welche von den beiden andern seiner Ansicht entspreche. Unter den alten Auslegern des Aristoteles fällt für die Peripatetiker ARISTOKLES und ALEXANDER die Frage nach dem Ursprung des Nus ganz weg, weil sie unter dem νοῦς ποιητικός, um den es sich bei dieser Frage zunächst handelt, nicht den menschlichen, sondern den göttlichen Geist verstanden wissen wollen; und ähnlich verhält es sich später mit JAMBlich und wer sonst noch mit ihm den Nus von der menschlichen Seele als ein über ihr stehendes Wesen unterscheidet (vergl. Phil. d. Gr. III a 787. 796 f. b 709. 752,2), wie diess unter den mittelalterlichen Philosophen AVERROËS und seine Schule gethan hat. SIMPLICIUS dagegen (De anima 247,39 f.) schreibt dem aristotelischen Nus, dem er mit Recht einen Theil der menschlichen Seele, nicht ein von ihr verschiedenes Wesen sieht, seiner Unsterblichkeit entsprechen auch Präexistenz zu, und er bezieht es eben hierauf, dass es Aristoteles (De an. III, 5. 430 a 23) nöthig finde, sich ausdrücklich darüber zu erklären, wesshalb wir uns trotz derselben unseres früheren Daseins nicht erinnern. Es ist zu vermuthen, dass diejenigen unter den Neuplatonikern, welche den aristotelischen Nus mit ihm als einen Theil unserer Seele auffassten, auch die Annahme seiner Präexistenz theilten. Die christlichen Theologen wussten sich freilich, abgesehen von Origenes und seiner Schule, mit dieser Annahme nicht zu befreunden; und es war es natürlich, dass sie dieselbe auch Aristoteles absprachen, seit dieser Philosoph eine Auktorität für sie geworden war, um ihm statt ihrer die der kirchlichen Lehre näher stehende Ansicht beizulegen, nach welcher der vernünftige Theil der menschlichen Seele von der Gottheit geschaffen wird, während der Leib und die niederen Seelenkräfte auf physischem Weg entstehen. Diese Auffassung der aristotelischen Lehre findet sich daher bei den christlichen Aristotelikern des Mittelalters ganz allgemein, und wird namentlich von dem grössten und einflussreichsten derselben, THOMAS VON Aquino, vertreten. Unter den heutigen Gelehrten hat sich BRENTANO¹ mit Entschiedenheit zu ihr

¹ Psychologie des Aristoteles (1867) S. 195 ff. ULRICH'S (1872) S. 81—127.

annt, während einige andere ihr nur mit Vorbehalt beistimmen¹; BRANDIS nähert sich ihr, sofern er den aristotelischen Nus »eine mittelbar von der Gottheit ausgehende individuelle Kraftthätigkeit«² nennt; wenn er aber zugleich daran erinnert, dass der Geist nach Aristoteles von seiner Präexistenz keine Erinnerung habe,³ so ist nicht zu zweifeln, wie er sich das Verhältniss dieser Präexistenz zu dem Ausgehen von der Gottheit denkt. Ich selbst hatte in der zweiten Auflage

meiner »Philosophie der Griechen« (II b 457) zwar eine gewisse Verwandtschaft der aristotelischen Ansicht mit dem späteren Creatianismus anerkannt, zugleich aber darauf aufmerksam gemacht, dass

Nus der Einzelnen nach Aristoteles nicht, wie bei jenem, zur Vorbringung dieser Individuen neu geschaffen wird. Noch bestimmter trat mir bei der erneuerten Untersuchung dieses Gegenstandes, der mich die dritte Auflage meines Werks veranlasste, der Unterschied der aristotelischen Theorie von der creatianischen und ihre Verwandtschaft mit der platonischen entgegen, und ich suchte diese Fassung in derselben (II b 593 f. 573) unter Bestreitung BRENTANO's her zu begründen. Diese meine Ausführung hat nun den letzteren veranlasst, mir in einer eigenen Abhandlung⁴ entgegenzutreten. Indem

die Streitfrage mit Beziehung auf diese Abhandlung einer noch näheren Prüfung unterziehe, werde ich mich bemühen, allen in ihr enthaltenen meine Ansicht erhobenen Einwürfen gerecht zu werden. Auf die Erörterungen dagegen, die mit der vorliegenden Frage in keinem Zusammenhang stehen, will ich nicht eingehen; und ebensowenig auf diejenigen Wendungen, welche zwar die Überzeugung des Verfassers

der ausschliesslichen Richtigkeit seiner Auffassung auf's nachdrücklichste aussprechen, aber zu der sachlichen Begründung dieser Überzeugung, auf die es doch allein ankommt, nichts beitragen: dass »von BRENTANO für seine Ansicht gedeutete Stelle »jeden vernünftigen Widerspruch verstummen mache« (S. 109), dass der von ihm gebrachte Beweis für jede entgegengesetzte Auffassung vollständig nichtendend sei« (S. 118), dass sein Gegner »perplex vor der Absurdität

Theorie stehe, die er Aristoteles zumuthen wolle« (S. 114), dass »das System des Philosophen in's Unkennbare verunstalte«, ihn zu einem »verworrenen Kopfe« mache (S. 126), dass eine von ihm geübte Einwendung, »wenn je eine der berückichtigten Distinctionen

¹ Vergl. Phil. d. Gr. II b 594. 3.

² Handb. der Gesch. der griech.-röm. Phil. II b 1178

³ Ebend. 1179. Gesch. der Entwickl. der griech. Phil. I, 518.

⁴ Über den Creatianismus des Aristoteles. Wien 1882. Aus dem Jahrg. 1882 Sitzungsberichte der phil.-histor. Classe der k. Akademie der Wissensch. CI. Bd. I S. 95 bes. abgedr. Ich citire nach den Seiten der Sitzungsberichte.

der späten Scholastik, eine geradezu verzweifelte zu nennen sei (S. 118) u. dergl.

»Aristoteles (behauptet BRENTANO S. 109) lehrt, dass Gott den unsterblichen Theil der menschlichen Seele schöpferisch hervorbringe. Aber von den drei Stellen, in denen er diese Lehre niedergelegt findet, spricht sie nicht bloß keine direkt aus, sondern sie lässt sich auch aus keiner mittelbar erschliessen. Er beruft sich zunächst (S. 109 f.) auf die bekannten Worte aus der Erörterung über die Entstehung der Seele gen. anim. II, 3. 736 b 27: τὸν νοῦν μόνον θύραθεν ἐπεισιέναι καὶ θεῖον εἶναι μόνον, indem er darzuthun sucht, dass θεῖος hier nicht »gottähnlich« bedeute, sondern »von Gott uns geschenkt«. Denn einmal sei im vorhergehenden die Frage aufgeworfen, woher die Seele und namentlich der Nus komme, und die Antwort auf diese Frage müsse neben dem θύραθεν auch das θεῖος enthalten; und sodann beziehe sich auch im folgenden in den Worten: πάσης μὲν οὖν ψυχῆς δύναμις ἑτέρου σώματος ἔοικε κεκοινωνηκέναι καὶ θειοτέρου τῶν καλουμένων στοιχείων das θεῖος auf den Ursprung, und somit werde es auch Z. 27 und S. 737 a 10, wo der Nus ebenfalls zu dem θεῖον in der Seele gerechnet wird, ebenso zu nehmen sein. Aber wenn das *θεῖον*, welches nach Arist. a. a. O. der unmittelbare Sitz der Seele ist, ein *σῶμα θειότερον τῶν στοιχείων* genannt wird, kann das θεῖος doch unmöglich »von Gott entsprungen« bedeuten, denn was sollte man sich unter einem Körper denken, der »mehr von Gott entsprungen« wäre, als die Elemente? sondern es bezeichnet einen seiner Natur nach göttlicheren, d. h. einen edleren, vollkommeneren Körper, wie ja sofort Z. 37 »ein dem Äther ähnlicher Stoff« (*φύσις ἀνάλογον οὕσα τῇ τῶν ἀστρῶν στοιχείῳ*) dafür steht; den Äther aber nennt Aristoteles gleichfalls fast mit denselben Worten eine *οὐσία θειότερα καὶ προτέρα τούτων* (die irdischen Körper) *ἀπάντων* (De coelo I, 2. 269 a 31), offenbar nicht desshalb, weil er von Gott geschaffen ist, denn als ewig ist er überhaupt nicht geschaffen (vergl. Phil. d. Gr. II b 436, 2), sondern er ist als das *σῶμα αἰὲ θεόν* »θεῖος τὴν φύσιν« (Meteorol. I, 3. 339 b 25). Dieses Argument würde sich daher geradezu umkehren, so dass man sagen müsste: da θεῖος 736 b 31 nicht das von Gott geschaffene, sondern nur das gottähnliche bezeichnen könne, so werde es auch Z. 28 und 737 a 10 nichts anderes bedeuten. Um nichts stichhaltiger ist aber auch BRENTANO's erster Beweis, auf den er das Hauptgewicht legt. Wenn der Nus θεῖος genannt wird, soll diess nur auf seinen Ursprung bezogen werden können, weil es sich in der vorliegenden Erörterung eben darum handle, woher die Seele stamme. Aber warum sollte der Satz, dass der Nus göttlicher Natur sei, in einer Erörterung über seinen Ursprung nicht vorkommen können? »Solche Prin-

ien, hat Aristoteles 736 b 22 gesagt, deren Wirksamkeit eine körperliche ist, können nicht ohne Leib sein, also auch nicht von aussen in den Menschen eintreten« (ὥστε καὶ δύραθεν εἰσιέναι ἀδύνατον). Wenn er nun fortfährt: »Es bleibt demnach übrig, dass der Nus allein von aussen her eintrete und allein göttlich sei; denn an seiner Wirksamkeit hat keine körperliche Wirksamkeit theil:«¹ was hindert es, diess so aufzufassen, dass das θεῖον εἶναι μόνον dem ἀνευ σώματος ἵνατον ὑπάρχειν Z. 23 ebenso entspricht, wie das δύραθεν ἐπεισιέναι mit δύραθεν εἰσιέναι Z. 24, und das οὐδὲν γὰρ — ἐνέργεια dem ὅσων γὰρ τιν ἀρχῶν ἢ ἐνέργεια σωματική: »Da der Nus allein in seiner Wirksamkeit mit dem Leibe nichts zu thun hat, kann er allein von aussen kommen und die gottähnliche Natur, welche er haben muss, um von aussen kommen zu können, sich nur bei ihm finden?« Ja, der aristotelische Sprachgebrauch erlaubt nur diese Erklärung. Unter allen den Stellen, welche der BONITZ'sche Index unter θεῖος anführt, findet sich keine einzige, in der diesem Wort als solchem die Bedeutung »von Gott hervorgebracht« oder »von Gott geschenkt« zukäme,² und auch BRENTANO hat keine nachzuweisen vermocht; das θεῖον wird vielmehr mit dem θεόπεμπτον ausdrücklich unterschieden.³ Um so weniger haben wir ein Recht, jene Bedeutung einer Äusserung aufzudrängen, der die gewöhnliche einen ganz guten Sinn gibt.

Einer zweiten Belegstelle, die er für sich anführt, Eth. VIII, 1162a 4 ff., schenkt BRENTANO selbst (S. 112) kein grosses Verweuen, und er hat dazu allen Grund. Denn für's erste wird hier nicht, wie er angibt, von den Eltern und den Göttern, sondern nur von den Eltern gesagt, sie seien uns αἵτιοι τοῦ εἶναι. Es heisst nämlich: τοῦ γὰρ εἶναι καὶ τραφεῖν αἵτιοι καὶ γενομένοις τοῦ παιδευθῆναι; nur die Ernährung und Erziehung der Kinder sorgen aber doch nicht die Götter, sondern die Eltern. Wenn daher im vorhergehenden steht: ἔστι δ' ἡ μὲν πρὸς γονεῖς φιλία τέκνοις, καὶ ἀνδρώποισι πρὸς θεούς, πρὸς ἀγαθὸν καὶ ὑπερέχον, so hat man die Worte; καὶ ἀνδρ. πρ. θεούς, wenn man sie auch nicht mit RAMSAUER auswerfen will, jedenfalls unethisch zu fassen, so dass der Sinn der gleiche ist, wie wenn man hiesse: ὥσπερ ἀνδρ. πρ. θ. Würden aber auch die Götter ebenso, wie die Eltern, Urheber unseres Daseins genannt, so sollen ja, auch

¹ λέγεται δὲ (wofür ich aber δὲ vorschlagen möchte) τὸν νοῦν μόνον δύραθεν εἰσιέναι καὶ θεῖον εἶναι μόνον· οὐθεὶν γὰρ αὐτοῦ τῇ ἐνέργειᾳ κοινῶναι σωματικῇ ἐνέργειᾳ.

² Ausdrücke, wie θεῖα μοῖρα (Eth. N. I, 10 Anf.), θεῖαι αἰτίαι (Eth. X, 10. 79 b 22), bilden natürlich keine Gegeninstanz, denn bei diesen wird der Begriff der Causalität nicht durch das Adjectiv θεῖος, sondern durch das mit ihm verbundene substantiv bezeichnet.

³ Eth. N. I, 10. 1099 a 14 (aus Anlass der Frage, ob die Eudämonie von einer αἰά μοῖρα herrühre): φαίνεται δὲ καὶ εἰ μὴ θεόπεμπτος ἔστιν... τῶν θειοτάτων εἶναι.

nach BRENTANO, die Eltern den Nus nicht hervorbringen, man könnte daher aus dieser Zusammenstellung unmöglich schliessen, dass die Götter ihn hervorbringen. Aber welches Recht hat man überhaupt, das, was Aristoteles von den Göttern sagt, ohne Abzug auf seinen Einen Gott, die Prädikate, welche er einem seiner Ansicht nach in der Wirklichkeit gar nicht existirenden Subjekt beilegt, auf ein anderes, im höchsten Grade reales Subjekt zu übertragen?¹

Um so entscheidender sollen nach BRENTANO (S. 113 f.) die Worte De an. III, s. 430 a 19 f. sein, welche in unserem Text am Anfang des 7. Kapitels noch einmal vorkommen:² τὸ δ' αὐτὸ ἐστὶν ἢ κατ' ἐνέργειαν ἐπιστήμη τῷ πράγματι ἢ δὲ κατὰ δύναμιν χρόνῳ προτέρα ἐν τῷ ἐνὶ, ὅλως δὲ οὐδὲ (al. οὐ) χρόνῳ. Inwiefern aber diese Worte eine Entstehung des menschlichen Nus durch göttliche Schöpfung beweisen könnten, ist mir durch seine jetzige so wenig, als durch seine frühere Auseinandersetzung (Psychol. d. Arist. 182 f.) klar geworden. BRENTANO glaubt das ὅλως δὲ οὐδὲ χρόνῳ nebst dem c. 5 sich daran anreihenden: ἀλλ' οὐχ ὅτε μὲν νοεῖ ὅτε δ' οὐ νοεῖ (sc. ὁ νοῦς oder τὸ νοεῖν) auf die ununterbrochene Denkhätigkeit Gottes beziehen zu müssen. Schon diess ist aber keineswegs sicher. Zunächst bedeuten die Worte, um die es sich handelt, nur dieses, dass in dem Einzelnen zwar die Anlage zum Denken der wirklichen Denkhätigkeit vorangehe, dass diess aber eben nur von dem einzelnen menschlichen Denken gelte, nicht aber von dem Denken im allgemeinen, dem Denken als solchem, abgesehen von seiner individuellen Erscheinung; THEMISTIUS (De an. 183, 26 Sp.) erklärt das ὅλως durch ἀπλῶς. Fragen wir aber, wo dieses unausgesetzte Denken vorkomme, so wird man allerdings in Aristoteles' Sinn an den göttlichen Nus denken dürfen; man ist jedoch nicht gezwungen, sich auf diesen zu beschränken, sondern das gleiche wird von jedem körperfreien Nus gelten müssen, da sich nicht absehen lässt, was einen solchen an dem fortwährenden Denken hindern könnte, da er keine ὕλη und somit nichts bloß potentiell an sich hat. Sollte sich daher aus ander-

¹ Man vergl. hierüber Phil. d. Gr. II b 372, 3. 389, 1. 792 ff. Wesentlich anders verhält es sich in dieser Beziehung Eth. X, 8. 1178 b 8 ff. Wenn hier gezeigt wird, dass man den Göttern keine πράξεις beilegen könne, und Aristoteles daraus folgert, dass ἡ τοῦ Θεοῦ ἐνέργεια θεωρητικὴ ἂν εἴη, so werden nicht Attribute der Volksgötter auf den aristotelischen Gott übertragen, sondern umgekehrt solche, die der Volksglaube ihnen beilegte, auf Grund des aristotelischen Gottesbegriffs ihnen abgesprochen, und dann liess sich freilich dieses von den Θεοὶ erwiesene auch auf den Θεὸς anwenden.

² Ob diese Wiederholung von Aristoteles selbst oder (wie ich mit TORSTRIK annehme) von einem Glossator herrührt, ist für die vorliegende Untersuchung so gleichgültig, dass zu BRENTANO's Behauptung (S. 114, 1), ich wisse meine Auffassung der aristotelischen Stelle nur durch Auswerfung der fraglichen Worte im 7. Kapitel zu schützen, schlechterdings kein Grund vorlag.

zen Erklärungen unseres Philosophen ergeben, dass er die ein-
 1 Menschengeister ihrem höheren Theile nach schon vor dem
 wärtigen Leben existiren lasse, so würde auch bei ihnen wäh-
 dieses körperlosen Lebens dem aktuellen Denken kein blos
 tielles vorangehen; und die »Absurdität der Theorie«, die man
 oteles damit zumuthete (Br. 114), würde uns nicht verhindern
 n, sie ihm zuzutrauen, so lange wir wenigstens nicht von der
 aristischen Voraussetzung ausgehen, dass Aristoteles nichts für wahr
 ten haben könne, was wir nicht dafür halten: denn ein körper-

Dasein des Nus vor diesem Leben ist gerade so denkbar, als
 dliches nach demselben. das letztere behauptet aber auch BRENTANO
 hol. d. Arist. 128 f. u. ö.) entschieden als aristotelisch. — Doch

auch das ὅλως οὐδὲ χρόνῳ sich ausschliesslich auf das göttliche
 en bezöge: wie und wesshalb könnte daraus folgen, dass der
 des Menschen von Gott geschaffen sein müsse? Desshalb, ant-
 t Br. (S. 114 f. Psychol. 182 f.), weil nach Aristoteles »alles
 de von etwas Synonymem hervorgebracht wird«, also auch der
 ur von einem Nus — der menschliche von dem göttlichen —
 rgebracht sein kann. Allein wenn auch Aristoteles Metaph. XII, 3.
 a 4 sagt: ἐκάστη ἐκ συνωνύμου γίνεται ἡ οὐσία, so liegt doch auf
 land, und es ergibt sich auch aus dem folgenden augenfällig,
 dieser Satz eben nur von dem gelten soll, was überhaupt ent-

dass er somit in der hier vorliegenden Fassung nur dasselbe
 en will, wie in den anderen, zum Theil von BRENTANO selbst
 führten, welche ihn ausdrücklich auf alles Entstehende be-
 rken;¹ den Unsinn dagegen, auch die unentstandenen Wesen aus
 en gleichnamigen entstehen zu lassen, wird natürlich niemand
 oteles aufbürden. Nun behauptet aber die Ansicht, die BRENTANO
 legen will, von dem Nus gerade dieses, dass er nach Aristoteles
 n ewigen, unentstandenen Wesen gehöre. Wollte er daher nur
 1, dass der Nus nach Aristoteles, falls er entstanden ist,
 inem anderen Nus hervorgebracht sein müsse, so würde er be-
 n, was niemand bestreitet; will er andererseits eben dieses von
 Nus unbedingt darthun, so setzt er gerade die Hauptsache, das
 indensein des Nus, stillschweigend voraus, und seine ganze
 sführung bewegt sich in einem greifbaren Zirkel.

So wenig es ihm aber gelungen ist, das, was er für Aristoteles'
 ht hält, bei diesem selbst nachzuweisen, so wenig hat er auch

¹ De an. III, 7. 431 a 3: ἔστι γὰρ ἐξ ἐντελεχειᾶ ὅντος πάντα τὰ γηγόμενα.
 u. IX, 8. 1049 b 28: ἀπαν τὸ γηγόμενον γίνεται ἐκ τινός τι καὶ ὑπὸ τινός καὶ τοῦτο
 1 τὸ αὐτό. VII. 7. 1032 b 30: ἀδύνατον γενέσθαι εἰ μὴ εἰς προὔπαρχοι u. a. St.

die Gründe entkräftet, welche die von ihm bestrittene Auffassung empfehlen.

Fassen wir hiefür zunächst die eigenen Äusserungen des Philosophen in's Auge. so kommen in erster Reihe die zwei vielbesprochenen Stellen aus den Schriften über die Entstehung der lebenden Wesen und über die Seele in Betracht. mit denen sich auch BRENTANO S. 101 ff. auf's neue beschäftigt. De gen. anim. II. 3. 736b 5 wirft Aristoteles die Frage auf: wann, in welcher Weise und woher diejenigen Wesen, welchen der Nus inwohnt, denselben bei ihrer Entstehung erhalten? Auf diese Frage, bemerkt er nun, liessen sich verschiedene Antworten geben: man könne entweder annehmen, dass die sämmtlichen drei Arten von Seelen (die ernährende, empfindende und vernünftige) bei der Bildung des Fötus neu entstehen. oder dass alle schon vorher existiren, aber jetzt erst in den Fötus eintreten, oder dass bei den einen jenes. bei den anderen dieses der Fall sei;¹ man könne sie ferner entweder in der ὕλη (d. h. den Katamenien, die nach Aristoteles der Stoff des thierischen Leibes sind) sich bilden, oder in diese bei der Zeugung in dem männlichen Samen herein- kommen lassen: und in diesen könnten entweder sie alle von aussen kommen, oder keine, oder nur ein Theil von ihnen. Dass nun nicht alle Arten von Seelen präexistiren können, sei einleuchtend; denn diejenigen, deren Wirksamkeit sich auf den Leib beziehe, können nicht ohne Leib sein, also auch nicht von aussen her in ihn kommen. Der Nus allein komme somit von aussen und er allein sei ein Göttliches.² Aus dieser Darlegung ergibt sich nun (wie ich schon Phil. d. Gr. II b 573 bemerkt habe) mit voller Bestimmtheit, dass Aristoteles sowohl hinsichtlich des Nus als hinsichtlich der niedrigeren Seelentheile auf die Frage, wie wir zu ihnen kommen,³ überhaupt nur zwei Antworten für denkbar hält: 1. das μὴ οὐσας πρότερον ἐγγίνεσθαι und 2. das προϋπάρχειν. Denn er stellt an die Spitze seiner Ausführung den Satz, dass entweder das eine oder das andere der Fall sein müsse,

¹ A. a. O. Z. 15: ἀναγκαῖον δὲ ἤτοι μὴ οὐσας πρότερον ἐγγίνεσθαι πάσας (sc. τὰς ψυχὰς), ἢ πάσας προϋπαρχούσας, ἢ τὰς μὲν τὰς δὲ μὴ. Das ἐγγίνεσθαι bezeichnet hier, wie schon das μὴ οὐσας πρότερον ἐγγίνεσθαι zeigt, nicht ein Hereinkommen, das εἰσελάθειν ἐγγίνεσθαι ist vielmehr nur eine von den hier aufgeführten Arten des ἐγγίνεσθαι, dieses für sich allein dagegen bedeutet nur: γίνεσθαι ἐν τῇ (im vorliegenden Fall: ἐν τῷ σώματι bezw. τῷ ζῳῳ oder τῷ κυήματι); vergl. De an. I, 4. 408a 20, wo Empedokles die Frage entgegengehalten wird: πότεροι οὖν ὁ λόγος ἐστίν ἡ ψυχὴ ἢ μᾶλλον ἰστέον τι οὐσα ἐγγίνεται τοῖς μέλεσιν;

² Z. 21: ὅτι μὲν τοίνυν οὐχ οἷον τε πάσας προϋπάρχειν, φανερόν ἐστιν ἐκ τῶν τοιούτων. ὅταν γὰρ ἐστὶν ἀρχὴν ἢ ἐνέργειαν σωματικὴν, δῆλον ὅτι ταύτας ἀνευ σώματος ἀδύνατον ὑπάρχειν, οἷον βαδίζειν ἀνευ ποδῶν. ὥστε καὶ εἰσελάθειν εἰσιέναι ἀδύνατον. . . . λείπεται II S. W. 2 S. 0. S. 1037. 1.

³ πότε καὶ πῶς μεταλαμβάνει καὶ πόθεν τὰ μετέχοντα, ταύτης τῆς εἰρηρ. (736 b 5)

e Annahme eines dritten möglichen Falles würde nicht bloss Worten widersprechen, sondern auch die Beweiskraft seiner Argumentation aufheben. Hierüber ist daher auch BRENTANO mit mir einverstanden. Aber er meint, unter das *μη οὐσας ἐγγίνεσθαι* lasse sich auch die Annahme subsumiren, dass der während der Entwicklung des Fötus und bei einer gewissen Uebung selber schöpferisch von Gott hervorgebracht werde.« Allein zusammenhang verbietet diese Deutung unbedingt. Nach meiner Meinung sagt Aristoteles: dass alle Seelentheile präexistiren, sei nicht möglich, denn diejenigen, deren Thätigkeit sich auf den Leib beziehen können nicht ohne einen Leib sein, also auch nicht von aussen kommen; es bleibe mithin nur die Annahme übrig, dass der Nus allein von aussen hereinkomme. Diess ist vollkommen korrekt und verständlich, wenn der Sprechende dabei von der Voraussetzung ausgeht, dass nur solche Seelentheile von aussen her in den Menschen kommen können, die vor der Entstehung seines Leibes schon vorhanden sind. Dann haben wir den Schluss: »da die Thätigkeit der denkenden und empfindenden Seele an einen Leib geknüpft ist, so kann sie nicht präexistiren und also auch nicht von aussen hereinkommen; nur der Nus kann dieses beides, weil seine Thätigkeit mit dem Leibe nichts zu thun hat;« und gegen diesen Schluss lässt sich keine Prämisse zugeben, nichts einwenden. BRENTANO dagegen und andere Philosophen sagen: da die niederen Seelentheile an den Leib gebunden sind, können sie weder präexistiren, noch von aussen hereinkommen, der Nus dagegen komme, ohne zu präexistiren, von aussen her, weil er keine Beziehung zum Leib habe. Bei dieser Erklärung ist die Bemerkung, dass die niederen Seelentheile wegen ihrer Verbindung mit dem Leibe nicht präexistiren können, nicht bloss zwecklos, sondern geradezu irreführend, denn der Nus, der in keiner Verbindung mit dem Leibe steht, soll ja nach BRENTANO gleichfalls nicht präexistiren; statt des *οὐχ οἶόν τε πάσας προϋπάρχειν*, hätte Aristoteles, wenn er seine Meinung nicht ausdrücklich verbergen wollte, sagen müssen, *οὐχ οἶόν τε προϋπάρχειν*; er hätte es ferner irgendwie begründen müssen, dass auch der Nus, der keine Beziehung zum Leibe hat, nicht präexistiren könne; er hätte aber auch seiner ganzen Auseinandersetzung nicht den Gegensatz des *μη οὐσας πρότερον ἐγγίνεσθαι*, und *ὑπαρχούσας ἐγγίνεσθαι*, sondern den der Entstehung durch Zeugung *ὡς δὲ ἐκ τῆς φύσεως εἰσιέναι* zu Grunde legen müssen, denn nur dieser hätte dieselbe eine reale Bedeutung; jedenfalls aber hätte er, wenn er von einer Eintheilung ausgieng, dann innerhalb ihres ersten Gliedes (unter *οὐσας πρότερον ἐγγίνεσθαι*) unter den nichtpräexistirenden Seelentheilen den Unterschied zwischen denen, welche durch Zeugung ent-

stehen, und denen, die von aussen hereinkommen, hervorheben müssen. Wenn er in Wirklichkeit von diesem allem das Gegentheil thut, so ist diess ein entschiedener Beweis dafür, dass die Annahme, der Nus könne von aussen kommen, ohne zu präexistiren, ihm fremd war.¹ Er sagt ja aber auch 737 a 7 f.² vergl. 736 b 33 f. mit klaren Worten, dass der Keim der Seele, und zwar bei den Wesen, welche das Göttliche (den Nus) in sich haben, auch der vom Leib trennbare Theil dieses Keimes, im männlichen Samen (in den er nach S. 736 b 19, 27 *δύραθεν* gekommen ist) in den mütterlichen Leib übergehe. Darüber lässt uns daher schon diese Stelle nicht im Zweifel, dass der Nus nach Aristoteles desshalb von aussen in den Menschen kommt, weil er schon vor der Bildung des menschlichen Leibes und der ihr gleichzeitigen der niedrigeren Seelentheile existirt, durch den Zeugungsakt nicht erst hervorgebracht, sondern nur in das sich bildende menschliche Individuum übertragen wird. Dagegen sagt diese Stelle nichts darüber aus, wie lange vor diesem Zeitpunkt der Nus schon existirt hat. Sie würde daher für sich genommen den, welcher unsern Philosophen um jeden Preis zum Creatianer machen wollte, an der (sonst freilich ganz haltlosen) Vermuthung nicht hindern, dass der vernünftige Theil der menschlichen Seele nach Aristoteles zwar durch einen göttlichen Schöpfungsakt entstehe, dass aber sein Keim nicht erst in den Fötus während seiner Entwicklung im mütterlichen Leibe, sondern vorher schon in den väterlichen Samen gelegt werde. Indessen wird auch dieser Ausweg durch die Stelle *De anima* III, 1, 429a23-24 abgeschnitten.

Nachdem Aristoteles hier den Unterschied des thätigen und des leidenden Nus, leider nur zu kurz, auseinandergesetzt hat, sagt er von dem ersteren: »Und dieser Nus ist körperfrei, keines Leidens (und keiner Veränderung) fähig und mit keinem anderen vermischt,

¹ Auch BRENTANO selbst kann sich nicht verbergen, dass es bei seiner Erklärung nicht möglich ist, in unserer Stelle einen befriedigenden Zusammenhang zwischen dem früheren und dem späteren herzustellen. Aber statt sich dadurch zu Zweifeln an der Richtigkeit dieser Erklärung veranlasst zu finden, schiebt er die Schuld auf Aristoteles, der »mit der ihm eigenen Kürze und Nachlässigkeit keine Sorge getragen habe, die in S. 736 b 15—20 aufgeworfenen Fragen und die Antworten darauf (21—29) genau einander anzupassen.« (S. 107.)

² τὸ δὲ τῆς γοιῆς σῶμα, ἐν ᾧ συναπέρχεται τὸ πνεῦμα τῆς ψυχικῆς ἀρχῆς, τὸ χωριστὸν ὅν τοῦ σώματος ὅσοις ἐμπεριλαμβάνεται τὸ θεῖον (τοιοῦτος δὲ ἐστὶν ὁ καλούμενος νοῦς) τὸ δ' ἀχώριστον u. s. w. Vergl. *Phil. d. Gr.* II b 483, 4. 593. Die Deutung dieser Worte, welche BRENTANO (S. 107 und früher *Zeitschr. f. Phil.* LX., 126) versucht, ist sprachlich und dem Sinne nach so unnötig, dass mir ihre eingehendere Widerlegung entbehrlich zu sein scheint. Was er unter dem πνεῦμα τῆς ψυχικῆς ἀρχῆς χωριστὸν (bezw. ἀχώριστον) τοῦ σώματος verstehe, hat Arist. 736 b 22—29 so deutlich gesagt, dass es schwer ist, es zu verkennen.

er seinem Wesen nach Wirklichkeit ist (also kein *δυνάμει ὄν*, keine Serie zum Substrat hat). Denn das Thätige steht immer höher als das Leidende, und das wirkende Princip höher als der Stoff. . . . Wenn er aber (vom Körper) getrennt ist, so ist er nur das, was er ist, und dieses allein ist unsterblich und ewig. Wir haben jedoch in diesem körperfreien Dasein keine Erinnerung, weil dieser Nus sinnlos, der leidende dagegen vergänglich ist, und er (der thätige) ohne diesen (den leidenden) nichts denkt.¹ Dass der thätige

¹ 430a 17: καὶ οὗτος ὁ νοῦς χωριστὸς καὶ ἀπαθὴς καὶ ἀαρχὴς τῇ οὐσίᾳ ὣν ἐνέργεια, zu lesen ist, zeigt BELGER in der 2. Aufl. des Trendelenburg'schen Commentars z. d. St. nach BONITZ Ind. arist. 491 b 2). αἰεὶ γὰρ τιμωτέρον οἰοῦν τοῦ πάσχοντος καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ὕλης. τὸ δ' αὐτὸ ἐστίν . . . νοεῖ (die S. 1038 angeführten, hier nicht weiter zu besprechenden Worte). χωρισθεὶς δ' ἐστὶ μόνον τοῦθ' ἐστὶ, καὶ τοῦτο μόνον ἀθάνατον καὶ αἰδῖον. οὐ μνημονεύομεν δὲ, ὅτι τοῦτο μὲν ἀπαθὴς παθητικὸς νοῦς φθαρτός, καὶ ἀνευ τούτου οὐδὲν νοεῖ. Ob man das καὶ οὗτος am Anfang dieser Stelle übersetzt: »und dieser Nus,« oder mit BRENTANO: »auch dieser Nus,« hat auf die vorliegende Untersuchung keinen Einfluss; ich habe jedoch schon in d. Gr. II b 571. 577 gezeigt, dass nur die erste von diesen Erklärungen zulässig ist, weil bei der anderen nicht blos dem Satz καὶ οὗτος u. s. f. die grammatische Verbindung mit dem vorhergehenden fehlte, sondern auch dem Aristoteles ausser dem genannten Nus noch ein weiterer, der gleichfalls ἀπαθὴς u. s. f. wäre, zugeschrieben werden müsste, ein solcher aber ihm durchaus fremd sei. Wenn BRENTANO (S. 99) auf den ersten von diesen Einwürfen antwortet, bei Aristoteles könne ein solches Asyndeton nicht Wunder nehmen, so hätte er wohlgethan, diess durch Beispiele zu belegen. Wenn der zweite Punkt betrifft, so behauptet BRENTANO zwar fortwährend, dass Aristoteles neben dem thätigen und leidenden auch noch einen von diesen beiden verschiedenen »aufnehmenden« Nus kenne. Aber das Recht zu dieser Deutung von Metaph. III, 4, das ich ihm bestreite, auf exegetischem Weg nachzuweisen, hat er nicht versucht; wenn ich bemerke, dass nach unserer Stelle der thätige Nus allein πάθος, αἰδῖος u. s. f. sei, so behauptet er, »von diesem »allein« sei bei Aristoteles nichts zu finden, es sei einfach von ZELLER eingeschoben,« was denn doch angesichts der Worte: τοῦτο μόνον ἀθάνατον καὶ αἰδῖον etwas stark ist; schliesslich sucht er gar nicht den Zusatz: αἰεὶ γὰρ τιμωτέρον u. s. f. zu beweisen, dass »wie das wirkende so auch das aufnehmende Princip der Gedanken« χωριστὸν u. s. f. sein müsse, denn Aristoteles könne doch unmöglich den albernen Schluss machen: »der aufnehmende Zustand ist corruptibel, das wirkende Princip ist höher, als das aufnehmende, also das incorruptibel;« es gebe ja auch innerhalb des Corruptibeln einen Rangunterschied. Wer zwingt uns denn, den Philosophen diesen Schluss machen zu lassen? Das »τιμωτέρον« u. s. f. braucht ja gar nicht den Grund anzugeben, aus dem Aristoteles schliesst, dass der Nus χωριστός u. s. f. ist (dieser Grund liegt für ihn, wie aus Metaph. III, 4 und dem S. 1040 f. angeführten hervorgeht, darin, dass sich seine Thätigkeit auf nichts körperliches bezieht); sondern es bezeichnet jene Eigenschaften einfach seine Folge seiner höheren Natur und besagt dem Sinn nach dasselbe, wie wenn man sagte: »wie ja überhaupt das Thätige höher steht, als das Leidende.« Wie unstatthaft BRENTANO's Erklärung dieser Worte ist, zeigt schon der Ausdruck τοῦ πάσχοντος. Wenn man diesen auf den Nus παθητικὸς zu beziehen, auf den er allein bezogen werden kann, deutet er ihn auf den von ihm ersonnenen »aufnehmenden« Nus (πάσχειν heisst nicht: »aufnehmen«, sondern »leiden«, und dieses beides fällt so wenig zusammen, wie das »Leiden« der Nus De an. III, 4. 429a 15 zugleich ἀπαθὴς und δεκτικὸς τοῦ εἶδους genannt, Metaph. XII, 7. 1072b 22 selbst der göttliche Nus, dem doch sicher kein Leiden zukommt, zu dem δεκτικὸν τοῦ νοητοῦ gerechnet wird), und er legt damit dem Philo-

Nus hiemit nicht bloß als unvergänglich, sondern auch als unentstanden beschrieben werden soll, liegt schon in den Worten »unsterblich und ewig«. Denn ewig (αἰδιος) nennt Aristoteles, im Unterschied vom Vergänglichen (dem φθαρτόν) dasjenige, dem das Sein vermöge seiner Natur, also mit Nothwendigkeit, zukommt, dessen Dasein daher ebensowenig einen Anfang als ein Ende hat. »Was nothwendig ist, sagt er, das ist ewig, und was ewig ist, das ist nothwendig.¹ Was daher ewig ist, von dem ist es undenkbar, dass es nicht sei², es hat mithin weder einen Anfang noch ein Ende³, und die Anfangslosigkeit wird an dem Ewigen so gut wie die Endlosigkeit als unterscheidendes Merkmal hervorgehoben. »Es ist ungereimt oder vielmehr unmöglich, von einer Entstehung des Ewigen zu reden.«⁴ Αἰδιος steht daher gleichbedeutend mit ἀγέννητος⁵ und wird dem Gewordenen in contradictorischer Disjunktion gegenübergestellt⁶. Dieselbe Bedeutung des αἰδίου ist auch De an. III, 5. 430a 23 zu vermuten, denn nur dann steht es neben dem ἀθάνατον nicht müßig, wenn es ebenso die Anfangslosigkeit bezeichnet, wie dieses die Endlosigkeit ist und auch das unmittelbar folgende (οὐ μνημονεύομεν δὲ u. s. f.) spricht, wie wir sogleich finden werden, entschieden für diese Erklärung. Indessen würde es in der Sache selbst keinen wesentlichen Unterschied machen, wenn man dem αἰδίῳ hier die Bedeutung des Endlosen, die es allerdings auch hat, geben, und somit nur einen anderen Ausdruck für das ἀθάνατον darin sehen wollte. Denn es ist ein feststehender Grundsatz des Aristoteles, dass Anfangs- und Endlosigkeit sich gegenseitig bedingen, dass daher nichts, was entstanden ist, ein αἰδίον im Sinn der endlosen Fortdauer sein könne. »Dass die Welt entstande-

sophen statt des »albernen« Schlusses, gegen den er ihn in Schutz nehmen will, d. gewiss nicht besseren in den Mund: wenn schon das πᾶν ein ἀπαθὲς ist, muß es das ποιοῦν noch viel mehr sein.

¹ Gen. et corr. II, 11. 337b 25: τὸ γὰρ ἐξ ἀνάγκης καὶ αἰεὶ αἶμα. ὃ γὰρ ἀνάγκη οὐχ οἷόν τε μὴ εἶναι· ὅττι· εἰ ἔστιν ἐξ ἀνάγκης, αἰδίον ἔστι, καὶ εἰ αἰδίον, ἐξ ἀνάγκης.

Vgl. part. an. I, 1. 639b 23: ὑπάρχει δὲ τὸ μὲν ἀπλῶς (sc. ἀναισθησίῳ) τοῖς αἰδίοις u. s. ² Metaph. XIV, 2. 1088b 23: μὴ αἰδίον τὸ ἐνδεχόμενον μὴ εἶναι. Eingehend weist Arist. Metaph. IX, 8. 1050b 7ff. dass jedes bloß δύναμις ὄν, jedes ἐνδεχόμενον μὴ εἶναι, ein φθαρτόν, kein αἰδίον sei. Daher gen. an. II, 1. 731b 24: ἐπεὶ γὰρ ἡ τὰ μὲν αἰδία καὶ θεῖα τῶν ὄντων, τὰ δ' ἐνδεχόμενα καὶ εἶναι καὶ μὴ εἶναι.

³ Eth. VII, 3. 1139b 23: τὰ γὰρ ἐξ ἀνάγκης ὄντα ἀπλῶς πάντα αἰδία (vgl. v. 20 Anm.), τὰ δ' αἰδία ἀγέννητα καὶ ἀφθάρτα.

⁴ Metaph. XIV, 3. 1091a 12: ἀποποιεῖ δὲ καὶ γίνεσθαι ποιεῖν (sc. τῶν ἀριστῶν) αἰδίον ὄντων, μᾶλλον δ' ἐν τι τῶν ἀδυνάτων.

⁵ Z. B. Metaph. III, 4. 999b 5: wenn es kein αἰδίον gibt, kann es auch keine γένεσις geben, denn es muss etwas geben, was, und etwas, woraus das Werden wird, καὶ τούτων τὸ ἔσχατον ἀγέννητον.

⁶ Meteorol. II, 3. 356b 7, wo die zwei Sätze: εἴτερ ὁ κόσμος γέγονεν, und: εἴτερ αἰδίον τὸ πᾶν ein Dilemma bilden; ähnlich gehen I, 14. 353a 15 die Worte: τὸ αἰδίον auf die Anfangslosigkeit der Welt.

zugleich von ewiger Dauer (*αἰδιος*) sei, sagt er De coelo I, 15. 280a 10, ist unmöglich.« »Denn die Erfahrung besse alles, was entstanden ist, auch vergeht.« Und dass es nicht bloss thatsächlich so verhalte, sondern sich auch gar nicht erhalten könne, zeigt er im 12. Kapitel in einer ausführlichen Auseinandersetzung, welche nicht allein über die Welt, über alles Seiende überhaupt das Ergebniss gewinnt: was nicht, sei schlechthin unvergänglich und ungeworden, alles, was entstanden ist, auch vergänglich, und es sei gleichwohl, dass ein gewordenes ewig daure, und dass ein ungewordenes vergehe, da nur das ewig dauern und nur das anfangslos bestehen, das seiner Natur nach das Entstehen und das Vergehen unbedingt ausschliesst.¹ Es ist daher für die vorliegende Frage keiner Erheblichkeit, ob man in der Stelle De anima III, 5 mit »unvergänglich« oder mit »ungeworden« übersetzt, oder welchen Bedeutungen darin vereinigt sieht: bei der zweiten und dritten von diesen Auffassungen wird dem Nus ein Anfang seines Bestehens direkt abgesprochen, bei der ersten indirekt, aber ein gewordenes wäre es auch durch göttliche Schöpfung geworden, würde es, seinen bestimmtesten Erklärungen zufolge, niemals ein Entstehen annehmen haben. — Nur auf das frühere Dasein des Nus kann auch der Zusatz: οὐ μνημονεύομεν δὲ u. s. w.² beziehen.³ Er glaubt zwar, Aristoteles mache diesen Zusatz nur, um die Erinnerung zu beseitigen, der aus der allbekannten Thatsache, dass die Seele unmittelbar mit der sinkenden Kraft des Leibes das Gedächtnis verliert, gegen die so eben behauptete Unsterblichkeit und Unveränderlichkeit des intellectiven Theils sich erheben liess.« Allein diese Erklärung findet in unserer Stelle selbst so wenig Anhalt, dass sie vielmehr nur von der Verlegenheit eingegeben sein kann, in der die Unvereinbarkeit der richtigen Erklärung mit seiner crea-

b 25: ἅπαν ἄρα τὸ αἰεὶ ὄν ἁπλῶς ἀφθαρτὸν ὁμοίως δὲ καὶ ἀγένητον. 282a 10: καὶ ὅτι, εἰ γενητὸν ἢ φθαρτὸν, οὐκ αἰδίου. Ebd. 31: τὸ τε ἀγένητον ἀφθαρτὸν ἀγένητον. 283a 29: ἀδύνατον ἢ γενόμενον ποτε ἀφθαρτὸν τι διαγενήσθαι ὅν καὶ αἰεὶ πρότερον ὄν φθαρήναι. οὐδὲν γὰρ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου οὐτ' ὅτ' ἀγένητον οἷον τ' εἶναι, sondern was irgend einmal vergänglich oder unsterblich ist, muss diess vermöge seiner Natur, also auch immer sein; ἀδύνατον ἄρα ὕστερον αἰδίου εἶναι. 283b 18: ἀδύνατον ἢ αἰδίου ὄν πρότερον φθαρήναι ὕστερον μὴ ὄν ὕστερον αἰδίου εἶναι, denn jedes γενητὸν und φθαρτὸν sei ein veränderliches und jedes veränderliche bestehe aus Entgegengesetztem, durch das es entstehen und zerstört werden.

zur dessen grammatische Erklärung Phil. d. Gr. II b 574, 4.

202. Psych. d. Arist. 206. 209. Ihm folgt BULLINGER, Arist. Nus-Lehre. S. 42: »Wir erinnern uns nicht; an was? Natürlich an das, was uns nicht mehr einfällt.«

tianischen Hypothese versetzte. Οὐ μνημονεύμεν δὲ soll bedeuten: „Es kommt nun aber der Fall vor, dass unser Gedächtniss leidet“. Es bedarf keines Beweises, dass die Worte, so wie sie lauten, dieses nicht besagen und nicht besagen können; und der Satz von der Ewigkeit des Nus konnte auch nicht zu dem Einwurf Veranlassung geben, das Gedächtniss sei doch der Vergänglichkeit unterworfen, da diese auch den Thieren zukommende Seelenthätigkeit nach aristotelischer Lehre mit dem Nus gar nichts zu thun hat; ihr Sitz ist ja (De mem. I Schl.) das *πρῶτον αἰσθητικόν*.¹ Die fraglichen Worte können sich vielmehr, ihrem Buchstaben wie dem Zusammenhang nach, nur auf eine solche Erinnerung beziehen, von der es scheinen könnte, sie müsste sich aus der Unsterblichkeit und Ewigkeit des Geistes ergeben, die uns aber fehlt; entweder darauf, dass wir uns im gegenwärtigen Leben des früheren, oder darauf, dass wir uns in dem künftigen des gegenwärtigen nicht erinnern. Auch von diesen Erklärungen hat aber die zweite, so verbreitet sie früher war und noch ist, entscheidende Gründe gegen sich. Schon das Präsens *μνημονεύομεν* weist darauf hin, dass es sich hier nicht um etwas handelt, von dem der Redende annimmt, dass es in einem künftigen Leben eintreten werde, sondern um etwas, das uns durch gegenwärtige Erfahrung bekannt ist. Nur ein solches können wir aber von Aristoteles überhaupt besprochen zu sehen erwarten: über einen Zustand, von dem uns jede erfahrungsmässige Kenntniss fehlt, eine Betrachtung anzustellen, liegt nicht in seiner Art, und dazu gab ihm der Zusammenhang keine Veranlassung. Da sich endlich der Satz, dass der thätige Nus ohne den leidenden nichts denke (*ἄνευ τούτου οὐδὲν νοεῖ*), nur auf die Zeit, in der beide verbunden sind, also nur auf das gegenwärtige Leben beziehen kann, so würde sich bei der Beziehung des *μνημονεύομεν* auf das künftige der Übelstand ergeben, dass von den beiden so nahe verbundenen Präsensformen *μνημονεύομεν* und *νοεῖ* die eine auf die Zukunft, die andere auf die Gegenwart gehen müsste. Eine ungezwungene und dem Zusammenhang entsprechende Erklärung unserer Worte

¹ Anders verhält es sich mit der von BRENTANO für sich angerufenen Auseinandersetzung De an. I, 4. 408 b 18 ff. Hier wird die Incorruptibilität des Nus aus dem Umstand erwiesen, dass er auch durch das Alter nicht leide; und da diesem Beweismittel die Abnahme der Denkhätigkeit (des *νοεῖν* und *θεωρεῖν*) im Alter entgegenstehen scheint, wird bemerkt: diese rühre nicht von einem Leiden des Nus selbst her, sondern bei den übrigen Geistesthätigkeiten aber, die im Alter abnehmen, sei er überhaupt nicht betheiligt, weder bei dem *διανοεῖσθαι* noch bei dem *φιλεῖν* ἢ *μισεῖν*, diese seien nicht Zustände des Nus, sondern des Subjekts, das ihn besitzt, und deshalb könne auch das *μνημονεύειν* und *φιλεῖν* auf, wenn dieses Subjekt leide. Nicht das Gedächtniss, sondern das *νοεῖν* und *θεωρεῖν* ist es nach dieser Stelle, dessen Abnahme als Instanz gegen die Apathie des Nus gebraucht werden könnte.

alten wir nur dann, wenn wir sie davon verstehen, dass wir uns dem gegenwärtigen Leben des früheren deshalb nicht erinnern, 1 bei allem unserem Denken der leidende Nus mitwirkt, der als πρὸς (und somit, vgl. S. 1044 f., auch γενητός) an dem früheren Dasein theilbetheilt war. Diese Worte beweisen demnach allerdings, dass Aristoteles das Dasein des thätigen Nus nicht erst mit dem gegenwärtigen Leben beginnen lässt. Da aber das gleiche auf aristotelischem Standpunkt schon in den Prädicaten ἀθάνατος und αἰδιος liegt, die ihm unmittelbar zuvor beigelegt waren, bedürfte es dieses Beweises nicht einmal, um jene Lehre mit voller Bestimmtheit als aristotelisch zu erhärten.

Mit der ebenbesprochenen Stelle lässt sich auch die Äusserung anima II, 2. 413 b 24¹ verbinden, sofern der Nus hier gleiches, im Unterschiede von allen andern Seelenkräften, dem φθαρτὸν ein αἰδιον und χωριστὸν entgegengestellt wird, das αἰδιον aber immer gleich ein ἀγένητον ist; und das gleiche gilt von der (schon S. 1046 1 anführten) Stelle De anima I. 4. 408 b 18—30. Diese Stelle bezieht sich allerdings unmittelbar weder auf das frühere noch auf das künftige Dasein des Nus, sondern auf sein Verhältniss zu dem im Alter einwirkenden Nachlass der Geistesthätigkeiten;² und wenn sie auch unverkennbar voraussetzt, dass der Nus, wie er im Tode nicht untergeht, auch vor der Entstehung des Leibes, in den er eintritt, schon vorhanden sei,³ so würde diess doch, für sich genommen, die Annahme, dass er erst unmittelbar vor dem Leibe durch göttliche Schöpfung zustande komme, so wenig ausschliessen, als das δύραθεν εἰσιέναι gen. anim. 3 (worüber S. 1040 f.) sie ausschliesst. Allein wenn von ihm gesagt wird, dass er keinem Leiden und keinem Untergang unterliege, so folgt daraus, nach den oben erörterten Grundsätzen des Philosophen, dass der Zusammenhang zwischen Anfangs- und Endlosigkeit, allerdings, dass ihm mit dem Untergang auch die Entstehung abgesprochen werden muss.

¹ περὶ δὲ τοῦ νοῦ καὶ τῆς θεωρητικῆς δυνάμεως οὐδὲν πῶς φανερόν, ἀλλ' ἔοικε ψυχῆς ἑτέρας εἶναι, καὶ τοῦτο μόνον ἐνδέχεται χωρίζεσθαι καθάπερ τὸ αἰδιον τοῦ φθαρτοῦ.

² Man kann daher aus derselben (wie ich mit Rücksicht auf Phil. d. Gr. II b 4 berichtend bemerke) auf die Vorstellungen des Arist. über das jenseitige Leben nicht direkt, sondern nur mittelbar schliessen. Das letztere, sofern das μνημονεύειν, φιλεῖν, διανοεῖσθαι nicht dem thätigen Nus, sondern den niedrigeren Seelenkräften zukommt, und wenn es schon bei der Affektion der letzteren durch das φθαρτὸν schwindet, bei der gänzlichen Ablösung des Nus von ihnen nothwendig ganz verschwindet.

³ Z. 18: ὁ δὲ νοῦς ἔοικε ἐγγίνεσθαι οὐτίς τις οὕτως (was dem S. 1040f. besprochenen φθαρτὸν ἐγγίνεσθαι, im Gegensatz zu dem μὴ οὕτως πρότερον ἐγγίνεσθαι, τὰς ψυχὰς, entspricht) καὶ οὐ φθείρεσθαι.

Aber stehen dieser Annahme nicht andere Erklärungen im Wege? Metaph. XII, 3 sagt Aristoteles: »die bewegenden Ursachen gehen in ihrem Dasein dem Verursachten voran, die formalen seien den Dingen gleichzeitig; ob aber etwas von ihnen die letzteren überdauere, sei zu untersuchen; denn bei einigen stehe dem nichts im Wege, wie denn vielleicht die Seele dieser Art sei, nicht die ganze, aber der Nus.«¹ Hier, glaubt nun BRENTANO (S. 108), werde die Präexistenz der Form ganz allgemein verworfen, die Postexistenz des Nus zugegeben. Diess wäre nun freilich neben der bestimmten und wiederholten Erklärung (s. o. S. 1044 f.), dass alles, was einen Anfang hat, auch ein Ende habe, und kein gewordenes ewig dauern könne, um so auffallender, da dieser Grundsatz bei dem Philosophen einerseits durch die eingehendste und vielseitigste Beweisführung sichergestellt wird, andererseits durch die auf ihn gestützte Lehre von der Ewigkeit der Welt tief in sein ganzes System eingreift, und sich so in jeder Beziehung als die Sache einer wohl erwogenen wissenschaftlichen Überzeugung darstellt. Indessen liegt die Sache, so siegesgewiss auch der Ton meines Gegners bei dieser Gelegenheit sich ausnimmt, in Wirklichkeit doch keineswegs so, dass durch Metaph. XII, 3 in Beziehung auf den Nus eine Ausnahme von jenem Grundsatz statuirt würde. Es handelt sich nämlich bei den Formen, deren Präexistenz Aristoteles läugnet, nicht um dasjenige *εἶδος*, welches den Gattungsbegriffen entsprechend das gemeinsame Wesen einer Reihe von Einzeldingen bildet; — dieses ist unentstanden und unvergänglich, wie diess Aristoteles, in Uebereinstimmung mit anderen eingehenderen Auseinandersetzungen,² auch am Anfang unseres Kapitels bemerkt hat. Die Form, welche mit dem Ding entsteht, ist vielmehr die Form dieses Einzeldinges als solchen, das *εἶδος ἐν ἄλλῳ* (Metaph. VII, 8. 1033a 34), der *λόγος ἐνυλος* (De an. I, 1. 403a 25), der *λόγος ἐν τῇ ὑλῇ* (part. an. I, 3. 643a 24), die *οὐσία ἐν ὕλῃ* (De coelo I, 9. 278a. 19). Diese kann nicht früher sein, als das Ding, dem sie inwohnt, dann sie bezeichnet nur die Art der Zusammensetzung und Bewegung des Stoffes, aus dem dieses Ding besteht; sie entsteht dadurch, dass sich das immaterielle *εἶδος*, das Wesen einer bestimmten Gattung, mit einem gegebenen Stoffe verbindet (Metaph. VII, 8. 1033b 5 f. 16 f.). Die Form eines lebenden Wesens ist nun seine Seele (De an. II, 4. 415b 7 ff.), die des Menschen eine vernünftige Seele, d. h. eine solche,

¹ 1070 a 21: τὰ μὲν οὖν κινούμενα αἰτία ὡς προγεγενημένα ὄντα (die Ursache als vorher vorhandene Dinge), τὰ δ' ὡς ὁ λόγος (sc. αἰτία) αἶμα. ὁ ἀνθρώπος τότε καὶ ἡ ὑγίεια ἐστίν, καὶ τὸ σχῆμα τῆς χαλκῆς σφαίρας αἶμα. ὅτι γὰρ ὑγιαίνει αἶμα καὶ ἡ χαλκῆς σφαῖρα. εἰ δὲ καὶ ὑστερόν τι ὑπομένει, σκεπτέον. ἐπ' ἐνίων γὰρ οὐδὲν καλύπτει, οἷον εἰ ἡ ὑγίεια τοιοῦτον, μὴ πᾶσα ἀλλ' ὁ νοῦς· πᾶσαν γὰρ ἀδύνατον ἴσως.

² Metaph. III, 4. 999 b 5. VII, 8 u. a. St. vergl. Phil. d. Gr. II b 314.

on welcher der Nus einen Bestandtheil bildet. Aber diese Seele entsteht nach Aristoteles als die Form dieses Menschen, die Entelechie dieses organischen Leibes, erst durch die Zeugung; und daran wird auch dann, wenn man annimmt, der Nus sei vorher schon vorhanden gewesen, nichts geändert, denn so lange er nicht mit der vegetativen und animalischen Seele dieses Leibes und durch sie mit ihm selbst vereinigt war, war er nicht bloß nicht die Form dieses Menschen (was er für sich allein überhaupt nicht ist), sondern auch kein Bestandteil dieser Form. Die Präexistenz des Nus verträgt sich daher vollkommen mit dem Satze, dass die (individuelle) Form eines Dinges nicht vor ihm selbst existire, denn nicht der Nus, sondern die Seele, deren Keim er nach Aristoteles noch vor dem Zeugungsakt eint, ist die Form des menschlichen Individuums. Der Nus ist nur einer von den Bestandtheilen dieser Form, und er ist diess erst seit der Erzeugung dieses bestimmten Menschen. Und so wenig man gegen die Präexistenz des Nus sagen könnte, die Form dieses Menschen habe früher existirt, ebensowenig könnte man wegen der Unsterblichkeit des Nus behaupten, sie habe seinen Untergang überlebt. Aristoteles sagt diess aber auch nicht, sondern er bemerkt nur, indem er sehr vorsichtig ausdrückt: »ob aber später (beim Untergang eines Dinges) etwas (von seiner Form) übrig bleibt, ist zu untersuchen«; und wenn er nun beifügt, bei der ganzen Seele sei diess nicht möglich, sondern nur beim Nus, so erkennt er ebendamt an, dass die Form eines Dinges so wenig nach dem Untergang als vor der Entstehung desselben für sich existiren könne, denn nur die ganze Seele ist die Form eines bestimmten Menschen. Dass sich aber der Philosoph A. O. hierüber nicht eingehender erklärt hat, kann nicht auffallen; denn theils hatte er hier überhaupt nicht die Aufgabe, seine Ansicht über den Nus, der nur als Beispiel für das Verhältniss der Form zu ihrem Träger berührt wird, näher zu entwickeln, theils ist das zwölfte Buch der Metaphysik, wie bekannt, in seiner ersten Hälfte ein so unvollständiger und skizzenhafter Entwurf, dass die Vermuthung vieles für sich hat, es sei nur eine zum eigenen Gebrauch ihres Verfassers niederschriftliche Aufzeichnung, deren Inhalt zu weiterer Ausführung und Erläuterung in seinen Vorträgen bestimmt war (Phil. d. Gr. IIb 82).

Die Lehre, welche sich aus den bisher besprochenen Erklärungen der Philosophen als seine Ansicht ergeben hat, bestätigt sich als solche auch durch ihren Zusammenhang mit den anderweitigen Bestimmungen seines Systems. Als platonischer Schüler hatte Aristoteles ursprünglich die Annahmen seines Lehrers über die Präexistenz der Seele und das Leben nach dem Tode getheilt. In seinem Eudemus, den er in Nachfolge des platonischen Phädo als ein junger Mann von 32 oder

33 Jahren verfasste (vergl. Phil. d. Gr. IIb 58, 1. 59, 1), hatte er in Plato's Sinn von dem Herabkommen der Seele aus einer höheren Welt und der Wahl der Lebenslose gesprochen, und er hatte einen eigenthümlichen Grund dafür angegeben, dass die Seele beim Eintritt in dieses Leben des früheren vergesse, während sie doch die Erinnerung an das gegenwärtige nach dem Tode bewahre: man vergesse ja auch in der Krankheit, was man als Gesunder gelernt habe, aber nicht umgekehrt (Arist. Fragm. 34. 35 R.). In der Folge nahm er an diesem Theil der platonischen Lehre Anstoss. Seine Auffassung der Seele und ihres Verhältnisses zum Leibe verbot ihm die Vorstellung, dass die Seele, welche die Entelechie eines Leibes von dieser bestimmten Beschaffenheit ist, die eines anders beschaffenen werden könnte: die Seelenwanderung musste aufgegeben werden (De an. I, 43. 407b 13f., Phil. d. Gr. IIb 486f.). Seine psychologische Beobachtung liess ihn in dem Gedächtniss, dem Begehren, dem reflektirenden Denken Funktionen erkennen, die an leibliche Bedingungen geknüpft sind, und daher dem körperfreien Geist nicht zukommen können (s. o. S. 1046, 1. 1047); und damit verlor die Annahme, dass wir uns des gegenwärtigen Lebens in dem zukünftigen, oder dessen, was wir in einem früheren Leben geschaut haben, in dem gegenwärtigen erinnern, ihren Boden.¹ Seine Lehre von der Entstehung der Begriffe aus der Erfahrung machte die platonische Wiedererinnerung entbehrlich.² Aber dass der Mensch in seiner Vernunft ein Princip in sich habe, das rein geistiger, immaterieller Natur ist, und dessen Thätigkeit zu dem körperlichen Leben in keiner Beziehung steht, ist auch seine Überzeugung (vergl. 1036 S. f.). Was aber keine Materie an sich hat, das kann nach aristotelischen Grundsätzen weder entstehen noch vergehen. Denn wo keine Materie ist, da ist (weil nur die Materie *δυνάμει* ist) keine Möglichkeit des Seins und Nichtseins, kein blosses Seinkönnen, sondern ein unbedingtes Sein, ein Seinmüssen; und was sein muss, das kann nie nicht sein, es kann also weder anfangen noch aufhören zu sein, es ist ungeworden und unvergänglich.³ Schon dadurch ist nun der Gedanke ausgeschlossen, dass der Nus (d. h. der reine, zur Materie in keiner Beziehung stehende,

¹) Über seinen Widerspruch gegen beide Annahmen Phil. d. Gr. IIb 603.

²) Vergl. Phil. d. Gr. IIb 189. IIa 696.

³) Den Belegen für diesen Satz, die ich Phil. d. Gr. IIb 337. 3. 330. 5 gegeben habe, will ich hier nur einen beifügen, gen. et corr. II, 9. 335a 32: *ὅς μιν οὐκ ἔστι τοῖς γνηστοῖς ἐστὶν αἰτίον τὸ δυνατόν εἶναι καὶ μὴ εἶναι. τὰ μὲν γὰρ ἐξ ἀνάγκης ἔστιν, οἷον τὰ αἰδία, τὰ δ' ἐξ ἀνάγκης οὐκ ἔστιν. τούτων δὲ τὰ μὲν ἀδύνατον μὴ εἶναι, τὰ δὲ ἀδύνατον εἶναι . . . εἶναι δὲ καὶ εἶναι καὶ μὴ εἶναι δυνατόν, ὅπερ ἐστὶ τὸ γνηστὸν καὶ φθαρτὸν περὶ μὲν γὰρ ἐστὶ τοῦτο, ποτὲ δ' οὐκ ἔστιν. ὥστ' ἀνάγκη γένεσθαι εἶναι καὶ φθορὰν περὶ τὸ δυνατόν εἶναι καὶ μὴ εἶναι.*

ἢ νοῦς ποιητικὸς) irgendwann entstanden sein könnte; denn alles, was entstanden ist, hat einen Stoff,¹ er aber hat keinen.

Wie aber so die Natur des Nus einen Anfang und ein Ende seines Daseins gleich unmöglich macht, so ergibt sich die gleiche Unmöglichkeit, seine Entstehung betreffend, auch daraus, dass sich auf dem Standpunkt des aristotelischen Systems schlechterdings keine Ursache denken lässt, durch die er in's Dasein gerufen werden könnte. Als immaterielles Wesen kann er nicht auf dem physischen Wege der Zeugung entstehen, den ja der Philosoph auch durch die bestimmtesten Erklärungen ausschliesst. Es bliebe daher nur übrig, zu der schöpferischen Thätigkeit der göttlichen Allmacht seine Zuflucht zu nehmen. Aber so viele Mühe sich BRENTANO schon in seiner »Psychologie des Aristoteles« (S. 234—250) gegeben hat, diese bei den Scholastikern vollkommen erklärliche Auffassung der aristotelischen Lehre als die objektiv richtige zu erweisen, so wenig konnte ihm diess doch gelingen. Er hat auch nicht Eine Äusserung des Philosophen nachzuweisen vermocht, in welcher der Gottheit eine schöpferische Thätigkeit beigelegt würde. Denn dass es zweierlei ist, in derselben das erste Bewegende zu erkennen, den einheitlichen und zweckmässigen Aufbau des Weltganzen, die zweckmässige Einrichtung aller seiner Theile in der Gottheit (bezw. dem Nus oder der Natur) herzuleiten, und zur Schöpferin der Welt oder einzelner Wesen in der Welt zu werden,² liegt am Tage;³ und ebenso klar ist, dass Gott von Aristoteles auch dann die μία ἀρχὴ πάντων, die πρώτη καὶ κυριωτάτη ἀρχή s. w. genannt werden konnte, wenn ihm zwar keine schöpferische

¹) Metaph. VII, 7. 1032 a 13: πάντα δὲ τὰ γινόμενα ὑπὸ τέ τινος γίνονται καὶ ἐκ τινος. π.ί.... τὸ δ' ἐξ οὗ γίνονται, ἢ λέγομεν ὕλην. Weiteres Phil. d. Gr. II b 315 f. 318, 4.

² Wie diess unter anderem von BULLINGER geschieht, der a. a. O. S. 42 die ganze Streitfrage mit den zwei Worten erledigt: »Gott ist nach Arist. der alles Bewegende, i. e. Hervorbringende, zu welchem »alles« natürlich auch die Geister gehören«.

³ BRENTANO behauptet zwar auch jetzt wieder (S. 116 f.), wie schon in seiner psych. d. Arist., dass Gott nicht das erste Bewegende sein könnte, wenn ihm nicht ein schöpferisches Wirken zukäme. Ich habe jedoch schon Phil. d. Gr. II b 373 f. aus bestimmten Aussagen des Aristoteles nachgewiesen, wie er sich die Sache denkt: Gott bewirkt ihm zufolge die Bewegung der Welt dadurch, dass er als das ἀριστον das Ziel ist, nach dem alles hinstrebt. Wenn nun BRENTANO den exegetischen Beweis anführt, dass ich jene Aussprüche falsch aufgefasst habe, so liesse sich darüber verhandeln; wenn er aber nur immer wiederholt, Gott sei entweder blos Zweckursache ohne zu wirken, oder daneben auch wirkende Ursache (als ob nicht diese beiden, wie a. a. O. 327 f. gezeigt ist, nach Aristoteles' bestimmten und wiederholten Erklärungen an sich und oft auch in der Wirklichkeit zusammenfielen), es sei vielmehr, von Gott eine Wirkung ausgehen zu lassen und ihm keine direkt auf die Welt gerichtete Thätigkeit zuzuschreiben, u. s. f., so ist damit, wie am Tage liegt, nichts, was bewiesen werden sollte, eben nur behauptet.

Thätigkeit beigelegt, aber die Weltordnung und die Bewegung des Weltganzen von ihm hergeleitet wurde; denn es kommt eben alles darauf an, in welchem Sinne der Ausdruck ἀρχὴ in solchen Aussagen gebraucht wird, und darüber lässt sich nur nach den sonstigen Erklärungen des Philosophen urtheilen.¹ Diese gehen aber mit unzweideutiger Bestimmtheit dahin, dass der Gottheit keine auf ein anderes gerichtete Thätigkeit zugeschrieben werden könne, und sogar die Thätigkeit, die ihr allein zukommt, die Denkhätigkeit, sich ausschliesslich auf sie selbst beziehe; und alle Versuche, diese Erklärungen durch Vorbehalte und Einschränkungen, von denen Aristoteles selbst nichts weiss, so weit abzuschwächen, dass sie sich mit der Annahme einer schöpferischen Thätigkeit Gottes vertragen, wird uns ebenso durch ihre bedingungslose Allgemeinheit, wie durch ihre nähere Begründung verboten. Wenn aber dieses, so kann an jenes schöpferische Wirken der Gottheit bei Aristoteles nicht gedacht werden. Denn um die Geschöpfe zu schaffen müsste Gott dieselben, ehe er sie schafft, denken, er denkt aber nach Aristoteles nur sich selbst, weil er nur das absolut beste denken kann, und alles von ihm selbst verschiedene geringer als er ist; um um das von ihm gedachte zu verwirklichen, müsste er sich da Dasein desselben zum Zweck setzen; für die Gottheit kann es aber keinen Zweck geben, um dessen willen sie handelte, da sie selbst der höchste Zweck ist,² und durch jedes auf einen solchen gerichtete

¹ Wie sehr man sich in dieser Beziehung vor übereilten Schlüssen aus einzelnen Ausdrücken hüten muss, kann unter anderem die von BRENTANO, Psych. 234, und besonders Nachdruck hervorgehobene Stelle Metaph. XI, 2. 1060 a 27 zeigen. Arist. verlangt hier allerdings eine οὐσία καὶ ἀρχὴ μία πάντων καὶ ἡ αὐτὴ τῶν αὐτῶν τε καὶ φθαρτῶν und es ist diess nach BRENTANO eine von den Stellen, aus denen allem hervorgehen soll, dass die reinen Geister und die himmlischen Sphären Geschöpfe Gottes seien. Aber begründet hat er jenes Verlangen unmittelbar vorher mit der Frage: πῶς γὰρ ἔσται τάξις μὴ τινος ὄντος αἰδίου καὶ χωριστοῦ καὶ μένοντος; es handelt sich hier also gar nicht um ein schöpferisches, sondern lediglich um ein ordnendes Princip, wie diess in einem System, das einerseits die Ewigkeit der Welt und andererseits die Ausserweltlichkeit Gottes lehrt, nur folgerichtig ist.

² De coelo II, 12. 292 a 22: εἴκει γὰρ τῷ μὲν ἀρίστα ἔχοντι ὑπάρχειν τὸ εὖ ἀπὸ πράξεως. Ebd. b 4: τῷ δ' ὡς ἀρίστα ἔχοντι οὐδὲν δεῖ πράξεως. ἔστι γὰρ αὐτὸ τὸ εἶναι, ἢ δὲ πράξις αἰεὶ ἔστιν ἐν δυτίν, ὅταν καὶ οὐ ἔνεκα ἢ καὶ τὸ τοῦτου ἔνεκα (das Handeln findet nur da statt, wo der Handelnde gewisser Mittel bedarf, um einen Zweck d. h. um ein Gut zu erreichen, es fällt daher für das Wesen weg, welches an sich selbst das ἀρίστον, der letzte Zweck ist, weil es für ein solches keinen erst anzustrebenden Zweck gibt). Auf den gleichen Gedanken bezieht sich Metaph. XII, 1072 b 1: ὅτι δ' ἔστι τὸ οὐ ἔνεκα ἐν τοῖς ἀκινήτοις, ἢ διὰ τὴν ἀκίνητον. ἔστι γὰρ τῷ τὸ εἶναι, ὡν τὸ μὲν ἔστι τὸ οὐκ ἔστι. In dieser Stelle, in welche BRENTANO, Psych. 242, auf Grund einer verfehlten, von SCHWEGLER herrührenden Emendation und Übersetzung hineinliest, was selbst nach dieser Übersetzung nicht darin steht. Z. 2 (mit CHRIST Studia in Arist. libr. metaph. 58 und BRENTANO) auf Grund der besten Handschrift zu lesen: ἔστι γὰρ τῷ τὸ οὐ

Nurken und Wollen aus ihrer eigenen Absolutheit, ihrem in sich abgeschlossenen und vollendeten Wesen heraustreten, aus einem Unbewegten zu einem Bewegten werden würde.¹ Da ich aber alles dieses mit Beziehung auf BRENTANO schon in meiner »Philosophie d. Gr.« II b, 365. 368 ff. 379 ff.) auseinandergesetzt habe, und er in seiner neuen Besprechung dieser Punkte (S. 116 f.) zu der früheren nur Nennliches hinzugefügt hat, werde ich hier nicht ausführlicher darauf einzugehen brauchen.

So entschieden aber die Präexistenz des Nus im Zusammenhang des aristotelischen Systems gefordert war, so wenig liess sich doch erwarten, dass der Philosoph den Versuch machen werde, etwas Näheres über sein früheres Leben auszumitteln, wie er ihn ja auch hinsichtlich des Lebens nach dem Tode nicht gemacht hat. Mit dem *μνημονεύομεν* (s. o. S. 1045) war für ihn jede derartige Untersuchung abgeschnitten. Dagegen glaubte er über die Art, wie der Nus in den Leib eintritt, wie wir (S. 1040) gesehen haben, so wenig er sich auch die Schwierigkeit dieser Frage verbirgt,² wenigstens das erschliessen zu können, dass die Seele eines Menschen als solche nie ohne den Bestandtheil sein könne, der den Menschen vom Thier unterscheidet; und da nun die Seele nach seiner Theorie vom Vater stammt und durch den Samen in den Fötus übergeht, muss er das gleiche auch von dem Nus annehmen. Dass er sich auch in dieser Annahme an Plato anschliesst, zeigt eine Stelle des Phädrus.³

Ob nun diese Lehre des Aristoteles über den Nus sich bei seinen Schülern genau so wiederfindet, wie sie sich uns in seinen Schriften darstellt, dürfte auf die Auffassung der letzteren jedenfalls nur bei solchen Punkten einen Einfluss ausüben, über die er selbst sich nicht klar genug ausgesprochen hätte, um seine Meinung aus seinen eigenen

¹ *ἔστι* (bezw. *οὐκ ἔστι*) mit BONITZ nach dem vorhergehenden = *ἐστὶν ἐν τοῖς ἀκινήτοις* annehmen, so dass der Sinn ist: von den beiden (auch Phys. II, 2 194 a 35. De an. II, 4 415 b 2. 20: berührten, von den griechischen Commentatoren der Physik, BONITZ und SCHWEGLER zu unserer Stelle erläuterten) Bedeutungen des *οὗ ἕνεκα*, wonach theils den Zweck einer Handlung, theils die Person bezeichnet, um derentwillen handelt wird, sei nur die erste auf die *ἀκίνητα* anwendbar; so dass also beispielsweise die Gottheit wohl das Ziel einer Handlung oder Bewegung sein kann, aber nicht das Subjekt, dem sie zu Gute kommt.

² Das erste Bewegende ist nach Arist. unbewegt; *αἱ δὲ πράξεις πᾶσαι μετὰ κινήσεως* (Metaph. III, 3. 996 a 27).

³ Gen. an. II, 3. 736 b 5: *διὸ καὶ περὶ νοῦ, πότε καὶ πῶς μεταλαμβάνει καὶ πόθεν τὰ μετέχοντα ταύτης τῆς ἀρχῆς, ἔχει τ' ἀπορίαν πλείστην, καὶ δεῖ προθυμείσθαι κατὰ δύναμιν λαβεῖν καὶ κατ' ὅσον ἐνδέχεται.*

⁴ 248, D: Es ist ein Gesetz der Adrastea, dass eine Seele, die aus der über sinnlichen Welt auf die Erde herabsinkt, bei ihrer ersten Geburt in kein Thier eintrete, *ἀλλὰ τὴν μὲν πλείστα ἰδοῦσαν εἰς γοῖν' ἀνδρὸς γενησομένου φιλοσόφου* u. s. w. (die γοῖν', aus der ein Mann entsteht, der Philosoph u. s. f. werden wird).

Worten ermitteln zu können; und selbst bei solchen wäre dieser Entscheidungsgrund keineswegs zuverlässig: denn wir haben keine Bürgschaft dafür, dass die Schüler des Aristoteles seine Ansichten durchaus unverändert festhielten, wir sehen vielmehr, um von einem Aristoxenus und Dicäarchus nicht zu reden, dass selbst Theophrast gerade in der Lehre vom Nus Schwierigkeiten fand, die ihn zu Abweichungen von seinem Lehrer wohl hätten veranlassen können. Indessen ist uns nicht bekannt, dass er sich von den Bestimmungen des letzteren über den Nus wirklich entfernte. Auch was er bei THEMISTIUS¹ über den Ursprung der menschlichen Vernunft sagt, stimmt mit der aristotelischen Ansicht, wie sich uns diese im obigen ergeben hat, überein. Theophrast wirft hier die Frage auf: *ὁ δὲ νοῦς πῶς ποτε ἔξωθεν ὦν καὶ ὥσπερ ἐπιδετός ὅμως συμφύης*; und er antwortet darauf: *ἀλλὰ τὸ ἔξωθεν ἄρα οὐχ ὡς ἐπιδετόν, ἀλλ' ὡς ἐν τῇ πρώτῃ γενέσει συμπελαμβάνον [-νόμενον] θετέον*; Das heisst: der Nus komme nicht erst zu dem fertigen Menschen hinzu, sondern trete schon beim ersten Beginn seiner Entstehung unter die Elemente ein, aus denen er sich bildet; und diese Äusserung beweist, dass Theophrast die oben (S. 1042. 1053) als aristotelisch und platonisch nachgewiesene Annahme theilt, nach der er gleich mit dem Samen in den Fötus übergeht, während sie mit der scholastischen, von BRENTANO auch für aristotelisch gehaltenen Theorie, welche ihn erst im Lauf der fötalen Entwicklung mit der animalischen Seele sich verbinden lässt, sich nicht verträgt. Ob aber der Nus erst unmittelbar vor dem Eintritt in den Keim des Leibes entstehe oder unentstanden präexistirt habe, darüber enthalten Theophrast's Worte nicht die geringste Andeutung, und wie BRENTANO (S. 33) behaupten kann, die Präexistenz des Nus werde von ihm »deutlich geläugnet«, ist mir unverständlich.

Ebensowenig ist es ihm aber auch gelungen, die creatianische Ansicht bei Eudemos nachzuweisen. Er beruft sich hiefür auf Eth. Eud. VII, 14. 1248 a 24. Eudemos fragt hier: *τίς ἡ τῆς κινήσεως ἀρχὴ ἐν τῇ ψυχῇ*; und er antwortet: *ὁῦλον δὴ ὥσπερ ἐν τῷ ὅλῳ θεός, καὶ τῷ ἐκείνῳ. κινεῖ γάρ πως πάντα τὸ ἐν ἡμῖν θεῖον. λόγου δ' ἀρχὴ οὐ λόγος, ἀλλὰ τι κρεῖττον. τί οὖν ἂν κρεῖττον καὶ ἐπιστήμης εἴποι (l. εἴη) πλὴν θεός*; Nun handelt es sich hier freilich nicht um den Ursprung des Nus, sondern um die Frage nach dem Princip, durch welches die Seele in Bewegung gesetzt wird. Aber bei diesem Princip haben wir, sagt BRENTANO (S. 125), nicht an das nächste, sondern an das erste Princip unseres Erkennens zu denken. Indem Eudemos dieses in Gott sucht, »denkt er ihn offenbar als die wirkende Ursache des Nus selbst«, und somit

¹ De anima 91 a (198, 13 ff. Sp.) vgl. Phil. d. Gr. II b 848.

er Creatianer. Wenn also Eudemos sagt, in letzter Beziehung sei Gott, der unsere Seele bewegt, so soll diess nur bedeuten können: bewege die Seele, wiefern er den Nus geschaffen habe, der sie wege. Aber warum denn gerade dieses und nur dieses? Bewegen isst doch nicht hervorbringen. Gott bewegt unsere Seele, wenn er die Thätigkeit hervorruft. Diess würde er aber dadurch, dass er den vernünftigen Theil geschaffen hat, noch nicht thun; damit hätte er ihr die Bedingungen ihrer Thätigkeit gegeben, aber diese selbst nicht bewirkt. Dass er die Seele bewege, kann Eudemos nur dann sagen, wenn er der Meinung ist, sie erhalte durch ihn den Anstoss zu ihrer Thätigkeit. Und dass diess seine Meinung ist, lässt sich um so weniger bezweifeln, da er uns c. 15. 1249 b 7 ff. auch sagt, in welcher Weise Gott die Seele bewege. Wie alles, lesen wir hier, so müsse auch der Mensch seiner ἀρχῇ, dem ihn beherrschenden Antriebe, nachleben. Dieses sei aber ein doppeltes: wie der Kranke theils von der Heilkunst beherrscht werde, die ihm gebietet, was er zu thun hat, theils von der Gesundheit, als dem Zwecke, dem die Heilkunst dient, so verhalte es sich auch beim Erkennen. Gott beherrsche den Menschen nicht, indem er ihm Befehle ertheile, sondern indem er es sei, um dessen willen die Vernunft befiehlt (οὐ γὰρ ἐπιτακτικῶς χων ὁ θεός, ἀλλ' οὗ ἕνεκα ἡ φρόνησις ἐπιτάττει). Gott bewegt also den Menschen, und durch ihn die Seele, wiefern er als der höchste Gegenstand des Erkennens die Thätigkeit der Vernunft hervorruft, welche ihrerseits unser ganzes Verhalten beherrscht, indem sie (nach 1249 b 16 f.) den Werth oder Unwerth unserer Handlungen nach ihrem Verhältniss zum Gotteserkenntniss beurtheilt. Diess stimmt auf's beste zu dem aristotelischen Satze,¹ dass das Denkende von dem Gedachten bewegt werde; wie es auch mit der aristotelischen Lehre über die Bewegung der Welt durch die Gottheit (s. o. S. 1051, 2) übereinstimmt, dass Gott die Seele nach Eudemos ebenso bewegt, wie das Weltganze, denn in beiden Fällen bewegt er, indem er als das οὗ ἕνεκα die Bewegung hervorruft. Aber von einer Erschaffung des menschlichen Geistes durch die Gottheit findet sich hier so wenig wie dort eine Spur.

¹ Metaph. XII, 7. 1072 a 26: τὸ ὁρεκτὸν καὶ τὸ νοητὸν κινεῖ οὐ κινούμενοι . . . νοῦς ὑπὸ τοῦ νοητοῦ κινεῖται.

1

1882.

L.

SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

7. December. Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. DU BOIS-REYMOND.

1. Hr. SCHWENDENER legte eine Abhandlung des Hrn. Dr. G. KRABBE vor: Über die Beziehungen der Rindenspannung zur Bildung der Jahrringe und zur Ablenkung der Markstrahlen.

Die Mittheilung folgt in einem der nächsten Sitzungsberichte.

2. Hr. PETERS legte eine Abhandlung des Hrn. Dr. CARL CHUN, Privatdocenten an der Universität zu Leipzig, vor: Über die cyclische Entwicklung und die Verwandtschaftsverhältnisse der Siphonophoren — als Bericht über eine an der spanischen Küste und in der zoologischen Station zu Neapel mit Unterstützung der Akademie (s. oben S. 845) ausgeführte Untersuchung.

Die Mittheilung wird nach Vollendung der dazu gehörigen Tafeln in den Sitzungsberichten erscheinen.

3. Hr. KRONECKER las eine Abhandlung: Über die Composition der binomischen Gleichungen.

Die Mittheilung folgt umstehend.

4. Von dem Director der Königl. Sternwarte, Hrn. Prof. Dr. V. FOERSTER, war folgender vorläufige Bericht über die Ergebnisse der gestrigen Beobachtungen des Venusdurchganges eingelaufen:

»Der Königl. Akademie der Wissenschaften beehre ich mich im Namen der Commission für die Beobachtung des Venusdurchganges hierdurch ergebenst mitzutheilen, dass die beiden deutschen Stationen

1058 Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe vom 7. December.

in Nord-Amerika gestern sehr befriedigende Messungen erlangt zu haben scheinen; insbesondere hat der Leiter der Station Hartford (Connecticut), Dr. MÜLLER vom Potsdamer Observatorium, gemeldet, dass dort die grösste Anzahl vollständiger Heliometer-Messungen gelungen sei, welche in der Instruction überhaupt als durchführbar angenommen war. Von den Stationen in Süd-Amerika kann noch keine Meldung da sein. Im Übrigen ist es dort bisher im Wesentlichen nach Wunsch gegangen, wenn auch in Punta Arenas das Wetter sehr unhold gewesen ist. Dem Observatorium zu Potsdam sind gestern, während es hier bewölkt war, gute Beobachtungen und photographische Aufnahmen gelungen.



Die Composition Abelscher Gleichungen.

Von L. KRONECKER.

den Vorlesungen über die Theorie der algebraischen Gleichungen, die ich in diesem Winter an der hiesigen Universität halte, habe ich versucht, gleich im Anfange bei der Behandlung der Gleichungen dritten und vierten Grades den Inhalt des von mir im Monatsbericht vom 1853 S. 373 aufgestellten Satzes zu entwickeln, soweit derselbe auf die Gleichungen jener beiden Grade beschränkt und von der Beziehung der Kreistheilungs-Gleichungen entkleidet wird. Der citirte Satz, dass die Wurzeln jeder Abelschen Gleichung mit ganzzahligen Coefficienten als rationale Functionen von Wurzeln der Einheit dargestellt werden können, besagt nämlich für den Fall der Gleichungen dritten Grades nichts Anderes, als dass die Wurzeln jeder kubischen Abelschen Gleichung mit ganzzahligen Coefficienten sich als rationale Functionen von Wurzeln derjenigen speciellen Abelschen Gleichungen dritten Grades ausdrücken lassen, welche bei der Kreistheilung auftreten. Es sind dies die kubischen Gleichungen, welche GAUSS im Art. 358 der 9ten Section der *Disquisitiones arithmeticae* aufgestellt hat, und welche wir mit Beibehaltung der dortigen Bezeichnungen auf die Form:

$$(A) \quad (3x+1)^3 - 3n(3x+1) - n(3k-2) = 0$$

angegeben kann. Dabei ist n eine Primzahl von der Form $6h+1$, und die Zahl k ist von GAUSS durch die Gleichung

$$(3k-2)^2 + 27N^2 = 4n$$

bestimmt, während sich die drei Wurzeln der kubischen Gleichung als drei aus den n ten Wurzeln der Einheit zu bildenden Perioden von $(n-1)$ Gliedern bestimmen. Setzt man den Buchstaben p an Stelle von n , führt man ferner an Stelle der Zahlen k und N die durch die Bedingungen

$$p = r^2 - rs + s^2, \quad r \equiv s \pmod{3}$$

bestimmten Zahlen r und s ein und nimmt endlich $-y = 3x+1$, so erhält man die Form

$$(A') \quad y^3 - 3py + p(r+s) = 0$$

die von GAUSS a. a. O. aufgestellten Gleichungen. Zu allen den Gleichungen (A') , welche den verschiedenen Primzahlen p entsprechen, gehört aber noch die Gleichung

$$y^3 - 3y + 1 = 0$$

hinzunehmen, deren Wurzeln die drei aus 9^{ten} Wurzeln der Einheit gebildeten Perioden

$$2 \cos \frac{2\pi}{9}, 2 \cos \frac{4\pi}{9}, 2 \cos \frac{8\pi}{9}$$

sind, und welche entsteht, wenn man in (A')

$$p = 1, r = 1, s = 0$$

setzt. Dass alsdann die Reihe der auf diese Weise entstehenden Abelschen Gleichungen

$$(A') \quad y^3 - 3py + p(r + s) = 0 \quad (p = 1, 7, 13, 19, 31, \dots)$$

genügend ist, um durch deren Wurzeln die Wurzeln aller Abelschen Gleichungen dritten Grades rational darzustellen, giebt den wesentlichen Inhalt des oben citirten, im Monatsbericht von 1853 aufgestellten Satzes, soweit er die Abelschen Gleichungen dritten Grades betrifft, losgelöst von der Beziehung zur Kreistheilung. Um dieses Resultat herzuleiten, bedurfte es nur des Begriffes der »Composition« Abelscher Gleichungen, ganz analog jenem Begriffe der Composition allgemeiner algebraischer Formen, den ich in genauem Anschluss an die GAUSS'sche Composition der quadratischen Formen im §. 22, V meiner Festschrift zu Hrn. KUMMER's Doctor-Jubiläum eingeführt habe.

Bezeichnet man, wie in meinem Aufsatze im Monatsbericht vom December 1877 S. 845 eine rationale Function von n_1, n_2, \dots, n_v Grössen

$$x_{h_1, h_2, \dots, h_v} \quad \left(\begin{matrix} h_a = 0, 1, 2, \dots, n_a - 1 \\ a = 1, 2, \dots, v \end{matrix} \right)$$

als cyclisch, wenn sie bei der Substitution der Grössen

$$x_{h_1, h_2, \dots, h_a + 1, \dots, h_v} \text{ an Stelle von } x_{h_1, h_2, \dots, h_a, \dots, h_v} \quad (a = 1, 2, \dots, v)$$

unverändert bleibt, so sind jene n_1, n_2, \dots, n_v Grössen x die Wurzeln einer Abelschen Gleichung, wenn deren symmetrische und cyclische Functionen als Elemente des Rationalitäts-Bereichs genommen werden. Setzt man nun ferner

$$\sum x_{h_1, h_2, \dots, h_v} \cdot y_{k_1, k_2, \dots, k_v} = z_{h_1 + k_1, h_2 + k_2, \dots, h_v + k_v},$$

so werden hiermit unter der Voraussetzung, dass die Summation links über alle diejenigen n_1, n_2, \dots, n_v Werthsysteme der Indices erstreckt wird, für welche

$$h_1 + k_1, h_2 + k_2, \dots, h_v + k_v$$

festen Werthe behalten, n_1, n_2, \dots, n_v Grössen z definiert, deren cyclische Functionen ebensowohl zugleich cyclische Functionen der Grössen x , als solche der Grössen y sind. Dies erhellt unmittelbar daraus, dass die Substitution von

$z_{h_1 + k_1 + 1, h_2 + k_2, \dots, h_v + k_v}$ an Stelle von $z_{h_1 + k_1, h_2 + k_2, \dots, h_v + k_v}$ ebensowohl durch die Substitution von

$x_{h_1+1, h_2, \dots, h_v}$ an Stelle von x_{h_1, h_2, \dots, h_v}
 durch die Substitution von

$y_{k_1+1, k_2, \dots, k_v}$ an Stelle von y_{k_1, k_2, \dots, k_v}

wirkt werden kann. Die Grössen z sind demnach Wurzeln einer
 Abelschen Gleichung, wenn die symmetrischen und cyklischen Functionen
 der Grössen x und zugleich diejenigen der Grössen y als Elemente
 des Rationalitäts-Bereichs genommen werden, d. h. also, wenn der
 Rationalitäts-Bereich so beschaffen ist, dass sowohl die Grössen x als
 auch die Grössen y Wurzeln Abelscher Gleichungen sind, und es soll
 die Abelsche Gleichung, deren Wurzeln die n_1, n_2, \dots, n_v Grössen z
 sind, als eine solche bezeichnet werden, die aus den beiden
 Abelschen Gleichungen, deren Wurzeln die Grössen x und y
 sind, zusammengesetzt oder componirt ist.

ermit ist nur, in der gewöhnlichen Weise, eine Eigenschaft der durch
 die Gleichungen definirten algebraischen Functionen auf die Gleichungen
 übertragen; denn offenbar sind ja die Grössen z selbst, als
 lineare Functionen der Grössen x und y rational aus diesen zu-
 sammengesetzt. Nach der aufgestellten Definition ist der Rationalitäts-
 bereich der componirten Abelschen Gleichung aus den Elementen
 der Rationalitäts-Bereiche der Componenten zusammengesetzt, und
 ebenso ist der Gattungsbereich, welcher durch irgend eine der
 Wurzeln der componirten Abelschen Gleichung bestimmt wird, aus
 den Elementen zusammengesetzt, welche die beiden Gattungsbereiche
 der Wurzeln der Componenten bestimmen. Wenn also noch — ebenso
 wie bei GAUSS die Composition der Formen auf die der Classen über-
 tragen ist — die Composition der Gleichungen auf die der Gattungen,
 denen sie angehören, übertragen wird, so entspricht der Zusammen-
 setzung von Gattungen Abelscher Gleichungen die Zusammensetzung
 der Gattungsbereiche ihrer Wurzeln.

Bezeichnet man, wie in meinem oben citirten Aufsätze vom
 December 1877, mit $\omega_1, \omega_2, \dots$ primitive $n_1^{\text{te}}, n_2^{\text{te}}, \dots$ Wurzeln der
 Einheit und setzt

$$\omega_{h_1, h_2, \dots} = \sum_{r_1, r_2, \dots} \omega_1^{h_1 r_1} \omega_2^{h_2 r_2} \dots x_{r_1, r_2, \dots} \quad (r_\alpha = 0, 1, \dots, n_\alpha - 1)$$

$$\omega'_{h_1, h_2, \dots} = \sum_{s_1, s_2, \dots} \omega_1^{h_1 s_1} \omega_2^{h_2 s_2} \dots y_{s_1, s_2, \dots} \quad (s_\alpha = 0, 1, \dots, n_\alpha - 1)$$

$$\omega''_{h_1, h_2, \dots} = \sum_{t_1, t_2, \dots} \omega_1^{h_1 t_1} \omega_2^{h_2 t_2} \dots z_{t_1, t_2, \dots} \quad (t_\alpha = 0, 1, \dots, n_\alpha - 1),$$

wird:

$$\omega''_{h_1, h_2, \dots} = \omega_{h_1, h_2, \dots} \cdot \omega'_{h_1, h_2, \dots},$$

und die Ausdrücke ω der componirten Gleichung sind daher gleich den Producten der entsprechenden Ausdrücke ω der Componenten. Hierin liegt das Mittel zur Decomposition gegebener Abelscher Gleichungen in »elementare«, und da ich schon in jenem Aufsätze vom December 1877 gezeigt habe, dass sich — bei etwas weiter gefasstem Begriffe der Zusammensetzung — alle mehrfaltigen Abelschen Gleichungen aus einfachen »zusammensetzen« lassen, so braucht man bei der Decomposition Abelscher Gleichungen nur von einfachen auszugehen. Ich bemerke hierbei, dass ich schon in meinem im Monatsbericht von 1853 abgedruckten Aufsätze die Bezeichnung »Abelsche Gleichungen« für diejenigen eingeführt habe, die im Monatsbericht vom December 1877 als »einfache« von den mehrfaltigen unterschieden sind. Aber da sich bei der schon dort berührten Composition Abelscher Gleichungen zeigt, dass nur die einfachen Abelschen Gleichungen einer besonderen Behandlung bedürfen, weil die andern auf diese zurückzuführen sind, so erscheint es zweckmässig, wie ich es in allen meinen früheren Arbeiten gethan habe, die einfachen Abelschen Gleichungen schlechthin als »Abelsche Gleichungen« zu bezeichnen, die mehrfaltigen aber ausdrücklich durch Hinzufügung dieses Beiwortes zu charakterisiren.

Für eine (einfache) Abelsche Gleichung ist die oben mit ν bezeichnete Zahl gleich Eins. Es sind daher die n durch die Gleichung

$$x_{h' + h''} = \sum x_{h'}' x_{h''}'' \quad (h', h'' = 0, 1, \dots, n-1)$$

definirten Grössen x Wurzeln einer Abelschen Gleichung, wenn die Summation auf alle Werthe h', h'' erstreckt wird, für welche die Summe $h' + h''$ einen festen Werth hat. Dabei ist der Rationalitäts-Bereich der Gleichung für x aus den Elementen der beiden Rationalitäts-Bereiche zusammengesetzt, welchen die Abelschen Gleichungen x' und x'' angehören, und es ist

$$\omega_h = \omega_h' \omega_h'',$$

wenn

$$\omega_h = \sum \omega^{hr} x_r, \quad \omega_h' = \sum \omega^{hr} x_r', \quad \omega_h'' = \sum \omega^{hr} x_r'' \quad (h, r = 0, 1, \dots, n-1)$$

gesetzt wird und ω eine primitive n te Wurzel der Einheit bedeutet. Setzt man

$$\sum x_h x_h''' = x_{h + h'''} \quad (h, h''' = 0, 1, \dots, n-1)$$

so zeigt sich, dass durch Composition dreier Abelscher Gleichungen eine Abelsche Gleichung entsteht, deren n Wurzeln durch den Ausdruck

$$\sum x_h' x_h'' x_h'''$$

gegeben sind, wenn darin die Summation auf alle diejenigen Werthe h, h', h'' erstreckt wird, bei denen die Summe $h' + h'' + h'''$ einen festen Werth behält.

Frage der Decomposition Abelscher Gleichungen erfordert
 ung eines Rationalitäts-Bereiches ($\mathfrak{R}, \mathfrak{R}', \mathfrak{R}'' \dots$). Ist ein
 stgesetzt, so lässt sich eine Abelsche Gleichung n^{ten} Grades,
 arzeln x_0, x_1, \dots, x_{n-1} sind, aus zwei andern componiren,
 mit ϖ_h bezeichnete Ausdruck

$$\sum \omega^{hr} x_r \quad (r = 0, 1, \dots, n-1)$$

ein Product von zwei solchen Ausdrücken darstellen lässt,
 , wenn

$$\varpi_h^n = (\varpi'_h \varpi''_h)^n$$

a die n^{ten} Potenzen von $\varpi_h, \varpi'_h, \varpi''_h$ dem aus den Elementen
 $\omega; \mathfrak{R}, \mathfrak{R}', \mathfrak{R}'', \dots$

1 Rationalitäts-Bereich angehören, so ist die Frage der
 sition völlig bestimmt; ihre Lösung beruht auf der Zerlegung
 Factoren und bildet eine der interessantesten Anwendungen
 metischen Theorie algebraischer Grössen, deren Grundzüge
 meiner Festschrift zu Hrn. KUMMER's Doctor-Jubiläum aus-
 esetzt habe. Die erwähnte Frage leitet nämlich zu einer
 schen, arithmetisch-algebraischen Definition aller jener wich-
 ighungen, zu denen die neuere Entwicklung der Analysis
 nat, im Falle des absoluten Rationalitäts-Bereichs $\mathfrak{R} = 1$ zu
 stheilungs-Gleichungen, im Falle, wo \mathfrak{R} die Quadratwurzel
 nzen Zahl ist, zu den Theilungsgleichungen elliptischer
 n mit singulären Moduln. So ist für den Fall $\mathfrak{R} = 1$,
 n n Primzahl ist, die Reihe der »elementaren« Abelschen
 gen n^{ten} Grades, aus denen sich alle Abelschen Gleichungen
 setzen lassen, von vornherein dadurch zu charakterisiren, dass
 ür die Wurzeln Abelscher Gleichungen im Monatsbericht von
 372 aufgestellten Ausdrücke VIII $F(\alpha) = 1$ und $Nm f(\alpha)$,
 ϖ_{-h} , gleich Eins oder gleich einer Primzahl sei. Dabei ist
 i bemerken, dass der Nachweis der Existenz solcher Gleichun-
 so aus der Theorie der complexen aus n^{ten} Wurzeln der Ein-
 ldeten Zahlen hergeleitet werden muss, wie bei GAUSS für
 $n = 3$ an dem oben angeführten Orte auf die Theorie der
 chen Formen verwiesen wird, um den Nachweis zu führen,
 jede Primzahl p von der Form $6h + 1$ Zahlen r, s existiren,
 $= r^2 - rs + s^2$ wird, und dass demnach für jede solche Prim-
 ne Gleichung (A') existirt. Für den Fall $n = 4$ besteht die
 r elementaren Abelschen Gleichungen aus den quadratischen,
 urzeln die Quadratwurzeln aus -1 und aus den sämtlichen
 n der Form $4k - 1$ sind, und aus den biquadratischen:

$$x^4 - x^2 + \frac{b^2}{4p} = 0 \quad (p = a^2 + b^2),$$

in denen p gleich 2 und gleich den verschiedenen Primzahlen der Form $4k + 1$ zu nehmen ist, und deren Wurzeln durch $\cos \frac{1}{2} \text{Arc tg } \frac{b}{a}$ dargestellt werden können. Hierbei braucht man für a, b nur alle Zahlen zu nehmen, für welche $a + bi$ eine im GAUSS'schen Sinne primäre complexe Primzahl oder $1 + i$ ist, so dass die Zahlensysteme a, b abgesehen von der complexen Einheit durch die Gleichung

$$a^2 + b^2 = 2, 5, 13, 17, 29, \dots$$

bestimmt sind. Durch Composition von Abelschen Gleichungen dieser einen Reihe unter sich, so wie mit Gleichungen $x^2(x^2 - q) = 0$ für $q = -1, 3, 7, 11, \dots$, und mit solchen Gleichungen, die vier rationale Wurzeln haben, können alle Abelschen Gleichungen vierten Grades mit ganzzahligen Coefficienten gebildet werden, und man braucht dabei jede Gleichung der Reihe (B) nicht mehr als ein Mal mit sich selbst zu componiren. Es führt nämlich überhaupt die Composition einer irreductibeln Abelschen Gleichung n^{ten} Grades mit einer solchen, die n rationale Wurzeln hat, zu einer Gleichung derselben Gattung, und jede Gleichung der Gattung kann aus einer derselben durch eine solche Composition gebildet werden. Ferner führt die Composition einer Abelschen Gleichung mit sich selbst auf eine Gleichung derselben Gattung, aber so, dass dabei die Reihenfolge der Wurzeln, welche offenbar bei der obigen Begriffsbestimmung der Composition von Einfluss ist, in einer Weise verändert wird, bei welcher die cyklischen Functionen unberührt bleiben.

Über die Phasenunterschiede elektrischer Schwingungen.

Von A. OBERBECK
in Halle a. S.

(Vorgelegt von Hrn. HELMHOLTZ am 30. November [s. oben S. 1029].)

(Fortsetzung.)


In einer früheren Mittheilung in diesen Berichten (s. oben S. 125 bis 131) wurden von dem Verfasser Untersuchungen über die elektrodynamische Wechselwirkung elektrischer Schwingungen von verschiedener Phase besprochen. Bei Fortsetzung derselben stellte es sich als nothwendig heraus, über einen Apparat zu verfügen, welcher elektrische Schwingungen von constanter Amplitude, sowie leicht und direct messbarer Schwingungsdauer liefert. Hierzu schien der nach Angabe von Hrn. F. KOHLRAUSCH (POGG. Ann. Jubelband S. 290—303) construirte Sinusinductor am geeignetsten. Bei der Herstellung desselben für das hiesige, physikalische Institut liess der Verfasser eine Veränderung vornehmen, in Folge deren der Apparat gleichzeitig zwei Wechselströme von constanter Amplitude, gleicher Schwingungsdauer, aber beliebig zu veränderndem Phasenunterschied liefern kann.

Hierdurch konnten zunächst die Gesetze der elektrodynamischen Wechselwirkung elektrischer Schwingungen viel einfacher und directer durch den Versuch geprüft werden. Das weitere Studium dieser Erscheinungen führte sodann zu einer neuen und einfachen Methode, die Polarisation von Metallplatten in Flüssigkeiten unter der Einwirkung von Wechselströmen zu bestimmen.

I. Beschreibung eines Apparats zur Herstellung zweier Wechselströme von bestimmtem Phasenunterschied.

Bekanntlich rotirt bei dem Sinusinductor eine magnetisirte Stahlplatte innerhalb einer Multiplicatorrolle und erregt in derselben einen Inductionsstrom, dessen Intensität periodische Veränderungen erfährt. Diese Multiplicatorrolle wurde in der Weise durch zwei Multiplicatoren

von verschiedener Grösse ersetzt, dass der kleinere in dem Hohlraum des grösseren sich befand. Der innere Multiplicator kann in zwei zu einander senkrechten Stellungen durch Schrauben an der Messingplatte befestigt werden, welche das Räderwerk deckt, während der äussere Multiplicator um eine Axe drehbar ist, deren Richtung mit der Rotationsaxe des Magnets zusammenfällt.



Bilden die Windungsebenen der beiden Multiplicatoren (vergl. die Figur) einen Winkel $AMB = \eta$, so haben die beiden in denselben inducirten, elektromotorischen Kräfte einen Phasenunterschied η . Dieser Winkel wird an einer Kreistheilung mit Hülfe eines Zeigers C abgelesen, welcher an der unteren Seite des grösseren Multiplicators befestigt ist. Der innere Multiplicator kann auch so angebracht werden, dass seine Windungsebenen parallel mit MA' liegen, während der bewegliche Multiplicator auch in diesem Fall aus der parallelen bis in die senkrechte Stellung gedreht werden kann. Sind die Winkel der beiden Multiplicatoren in beiden Fällen dieselben, so haben die Grösse nach gleichen Phasenunterschiede, da die Rotationsrichtung des Magnets stets dieselbe bleibt, entgegengesetzte Vorzeichen. Selbstverständlich kann man den Apparat auch als Sinusinductor gewöhnlicher Construction benutzen. Dann sind beide Multiplicatoren parallel zu stellen und beide hintereinander in denselben Stromkreis einzuschalten.

Werden dagegen zwei verschiedene Stromkreise gebildet, von denen jeder einen der Multiplicatoren enthält, so werden in denselben Wechselströme von verschiedener Phase erregt. Die Phasen der Ströme sind nicht dieselben wie diejenigen der inducirten Kräfte. Diese

en Phasenverschiebungen lassen sich aber leicht durch Rechnung
F. KOHLRAUSCH, POGG. Ann. 148, S. 148—150) ermitteln.

Bezeichnet man die Anzahl der Stromwechsel in der Secunde
den Widerstand des einen Kreises mit w_1 , das elektrodynamische
dial des ganzen Stromkreises auf sich selbst mit p_1 , die zur Zeit t
rte, elektromotorische Kraft mit: $n E_1 \cos (n \pi t)$, die Stromstärke
, so ist:

$$p_1 \frac{di_1}{dt} + w_1 i_1 = n \cdot E_1 \cos (n \pi t), \text{ also:}$$

$$i_1 = \frac{n E_1}{w_1^2 + n^2 \pi^2 p_1^2} \{w_1 \cos (n \pi t) + p_1 n \pi \sin (n \pi t)\}.$$

Werden für den zweiten Stromkreis die entsprechenden Bezeich-
n benutzt, ist ferner der Winkel der beiden Multiplicatoren η ,
t für i_2 die Gleichung:¹

$$p_2 \frac{di_2}{dt} + w_2 i_2 = n E_2 \cos (n \pi t - \eta).$$

Es ist:

$$\frac{E_2 n}{w_2^2 + n^2 \pi^2 p_2^2} \{(w_2 \cos \eta - n \pi p_2 \sin \eta) \cos (n \pi t) + (w_2 \sin \eta + n \pi p_2 \cos \eta) \sin (n \pi t)\}.$$

Die elektrodynamische Wechselwirkung der beiden Ströme auf
ler ist proportional mit:

$$i_2 dt =$$

$$\frac{n^2 E_1 E_2}{n^2 \pi^2 p_1^2 (w_2^2 + n^2 \pi^2 p_2^2)} \{(w_1 w_2 + n^2 \pi^2 p_1 p_2) \cos \eta + n \pi (p_1 w_2 - w_1 p_2) \sin \eta\}.$$

der Strom des einen Multiplicators durch die festen Rollen
Elektrodynamometers, derjenige des anderen durch die beweg-
Rolle, so ist das Drehungsmoment der letzteren dem eben mit-
ten Ausdruck proportional. Sieht man dasselbe als Function
allein an, so kann man schreiben:

$$D = A \cos \eta + B \sin \eta.$$

ist A stets positiv, während B je nach der Zusammensetzung
eiden Stromkreise positiv oder negativ sein kann.

ch gebe zunächst als Beispiele einige am Elektrodynamometer
verschiedenen Umständen beobachtete Ablenkungen. Hierzu
n die Bestandtheile der beiden einzelnen Stromkreise angegeben

Werden gleichzeitig in beiden Multiplicatoren Ströme inducirt, so müsste man
ch auf die Induction der beiden Rollen auf einander Rücksicht nehmen. Da
en bei den später zu besprechenden Anwendungen meist in gekreuzter Stellung
fanden, so habe ich von der Berücksichtigung der gegenseitigen Induction
ren.

werden. Zu dem Ende soll abgekürzt der erste Multiplikator mit M_1 , der zweite mit M_2 , die beiden stets mit einander verbundenen festen Rollen mit F , die bewegliche Rolle mit B bezeichnet werden. Die Widerstände dieser Rollen waren zuvor gemessen worden. Weitere Widerstände, welche noch hinzugefügt wurden, waren stets ohne erhebliche Selbstinduction (meist mit Benutzung eines SIEMENS'schen Widerstandskastens).

Die zu der beweglichen Rolle führende Leitung enthielt einen Commutator. Es wurde stets für beide Stellungen desselben abgelesen und die Differenzen genommen, so dass die mitgetheilten Zahlen (α) die doppelten Ablenkungen repräsentiren.

1. { Kreis 1: $M_1 + F + 3\,000$ S.E; Gesamtwiderstand $4\,263$ S.E.
 { Kreis 2: $M_2 + B$; Gesamtwiderstand 829 S.E.

η	α
0°	+ 660
40°	+ 479
60°	+ 292
70°	+ 188
80°	+ 70
90°	— 48

2. { Kreis 1: $M_1 + F + w$ S.E; Wid. = $1\,263 + w$ S.E.
 { Kreis 2: $M_2 + B$; Wid. 829 S.E.
 $\eta = 90^\circ$.

w	α
0 S.E.	+ 540
500 "	+ 220
1 000 "	+ 83
1 200 "	+ 49
1 400 "	+ 28
1 600 "	+ 10
1 800 "	— 5
2 000 "	— 17
2 500 "	— 34

3. { Kreis 1: $M_1 + F + 1\,830$ S.E; Wid.: $3\,093$ S.E.
 { Kreis 2: $M_2 + B + 180$ S.E.; Wid.: $1\,009$ S.E.

η	α
0°	798
30°	685
50°	545
60°	432
70°	289
80°	150
90°	0

Vergleicht man die beobachteten Ablenkungen mit der Formel:

$$\alpha = A \cos \eta + B \sin \eta,$$

zeigt sich, dass bei der ersten Reihe B einen negativen Werth hatte, dass ferner bei der zweiten Reihe ($\alpha = B$) B durch Veränderung des Widerstandes w von positiven zu negativen Werthen übergeführt werden konnte, dass endlich in der letzten Reihe $B = 0$ war.

Von Wichtigkeit ist besonders der Umstand, dass man bei gezeigten Rollen stets durch passende Wahl der Widerstände in den beiden Kreisen die Ablenkung der beweglichen Rolle verhindern kann. Man kann dies benutzen, um die Inductionspotentiale zweier Rollen zu vergleichen. Es ist hierzu nicht einmal nöthig, dass die beiden Multiplicatoren ganz genau einen Winkel von 90° bilden.

Allgemein ist die Ablenkung Null, wenn:

$$\{w_1 w_2 + n^2 \pi^2 p_1^2\} \cos \eta + n \pi \{p_1 w_2 - w_1 p_2\} = 0$$

oder:

$$w_1 \{n \pi p_2 - w_2 \operatorname{ctg} \eta\} = n \pi p_1 \{w_2 + n \pi p_2 \operatorname{ctg} \eta\}.$$

Wird dann in den ersten Kreis eine neue Rolle gebracht, deren Widerstand w , deren Inductionspotential p ist, so muss man, um wiederum keine Ablenkung zu erhalten, noch einen weiteren Widerstand x in denselben Stromkreis einschalten. Dann besteht die Gleichung:

$$(w_1 + a + x) \{n \pi p_2 - w_2 \operatorname{ctg} \eta\} = n \pi (p_1 + p) \{w_2 + n \pi p_2 \operatorname{ctg} \eta\}.$$

Durch Combination mit der früheren Gleichung erhält man:

$$\frac{p_1 + p}{p_1} = \frac{w_1 + a + x}{w_1}, \quad \frac{p}{p_1} = \frac{a + x}{w_1}.$$

Nach dieser Methode wurden die Inductionspotentiale der beiden Multiplicatoren, sowie der Elektrodynamometer-Rollen mit dem Inductionspotential einer Rolle (R) verglichen, welches nach einer anderen Methode nach absolutem Maass gemessen war.

Mit Benutzung der früheren Bezeichnungen ergab sich:

$$M_1 = 0.5343 R.$$

$$M_2 = 0.2255 R.$$

$$F = 0.0942 R.$$

$$B = 0.0470 R.$$

Die Eigenthümlichkeit der eben beschriebenen Methode beruht darauf, dass die elektrodynamische Wechselwirkung der beiden Ströme Null wird, weil dieselben eine Phasendifferenz $\frac{\pi}{2}$ haben. Jede Veränderung in den beiden Stromkreisen, welche eine weitere Phasenschiebung bedingt, bewirkt daher einen Ausschlag. Als solche Veränderungen sind zu nennen:

1. Widerstandsänderungen.
2. Veränderungen der elektrodynamischen Potentiale der Kreise auf sich selbst, z. B. durch Einführung eines Eisenstabs in eine Rolle, welche zu dem einen oder anderen Stromkreise gehört.
3. Einschaltung von Flüssigkeiten mit polarisirbaren Metall-elektroden.

II. Über die Messung der durch Wechselströme bewirkten Polarisation von Metallplatten in Flüssigkeiten.

Hr. F. KOHLRAUSCH hat nachgewiesen (POGG. ANN. 148, 143—154), dass auch bei schnellem Wechsel der Richtung des polarisirenden Stromes die elektromotorische Kraft der Polarisation recht bedeutende Werthe erreichen kann. Derselbe fand, dass die Einschaltung einer Flüssigkeitszelle in den Stromkreis eines Sinusinductors Veränderungen der Amplituden der elektrischen Schwingungen bewirkt, welche zur Messung der Polarisation benutzt werden können. Die von Hrn. KOHLRAUSCH entwickelte Theorie ergibt, dass in diesem Fall gleichzeitig eine Phasenveränderung der Schwingungen eintritt, welche von der elektromotorischen Kraft der Polarisation abhängt. Es soll hier gezeigt werden, dass diese Phasenverschiebung mit Vorthail zur Bestimmung der Polarisation verwerthet werden kann.

Befinden sich die beiden Multiplicatorrollen in gekreuzter Stellung, sind ferner die Widerstände der beiden Stromkreise so geregelt, dass das Elektrodynamometer unter der Einwirkung der Wechselströme keine Ablenkung erfährt, so bewirkt die Einschaltung einer Flüssigkeitszelle im Allgemeinen sehr bedeutende Ausschläge. Dieselben können von der Veränderung des Widerstandes des betreffenden Stromkreises und von der Polarisation herrühren. Die im ersten Abschnitt mitgetheilten Versuche zeigen indess (vergl. Reihe 2), dass die erste Ursache verschwindend klein ist im Vergleich zur zweiten. Die Veränderung des Widerstandes w von 1600 S. E. auf 1800 S. E. bewirkte nur eine Veränderung des Ausschlags von + 10 auf — 5 Scalentheile. Die später mitzutheilenden Versuche sind aber unter noch viel günstigeren Verhältnissen angestellt. Ausserdem habe ich mich mehrfach direct überzeugt, dass die Vergrösserung des Flüssigkeitswiderstandes auf das vier- bis fünffache keinen Einfluss auf die erhaltenen Ablenkungen hatte. Dieselben rühren daher ausschliesslich von der Polarisation her.

Eine einfache an die von Hrn. F. KOHLRAUSCH (a. a. O.) gegebene Theorie sich anschliessende Rechnung zeigt, von welchen Umständen die Ablenkung des Elektrodynamometers in diesem Falle abhängt.

Ist in den ersten Stromkreis eine Flüssigkeitszelle mit Metall-
ktroden eingeschaltet, so gilt für die Intensität in demselben die
Differentialgleichung:

$$p_1 \frac{di_1}{dt} + w_1 i_1 + q \int i_1 dt = n E_1 \cos(n\pi t).$$

Hierin ist q eine Constante, welche den Werth der elektro-
motorischen Gegenkraft der Polarisation in dem betreffenden Fall
gibt.

Dann ist:

$$i_1 = \frac{n E_1 \left\{ w_1 \cos(n\pi t) + n\pi \left(p_1 - \frac{q}{n^2 \pi^2} \right) \sin(n\pi t) \right\}}{w_1^2 + n^2 \pi^2 \left(p_1 - \frac{q}{n^2 \pi^2} \right)^2}$$

Hat die inducirte elektromotorische Kraft des zweiten Strom-
kreises, wie zuvor, eine Phasendifferenz η gegen diejenige des ersten
Stromkreises, so ist das Drehungsmoment der beweglichen Rolle:

$$= \frac{\frac{1}{2} E_1 E_2 n^2 \left\{ \cos \eta \left[w_1 w_2 + n^2 \pi^2 \left(p_1 - \frac{q}{n^2 \pi^2} \right) \right] + n\pi \sin \eta \left[w_2 \left(p_1 - \frac{q}{n^2 \pi^2} \right) - w_1 p_2 \right] \right\}}{\left\{ w_1^2 + n^2 \pi^2 \left(p_1 - \frac{q}{n^2 \pi^2} \right)^2 \right\} \cdot \left\{ w_2^2 + n^2 \pi^2 p_2^2 \right\}}$$

War vor Einschaltung der Flüssigkeitszelle in den ersten Strom-
kreis bei gekreuzter Stellung der Multiplicatoren (η nahezu 90°) Sorge
genommen, dass kein Ausschlag erfolgte, so war:

$$\cos \eta [w_1 w_2 + n^2 \pi^2 p_1] + \sin \eta n\pi [w_2 p_1 - p_2 w_1] = 0.$$

Der vorige Ausdruck giebt dann:

$$D = \frac{-\frac{1}{2} q E_1 E_2 n \sin \eta \left\{ \frac{w_2}{\pi} + n p_2 \operatorname{ctg} \eta \right\}}{\left\{ w_1^2 + n^2 \pi^2 \left(p_1 - \frac{q}{n^2 \pi^2} \right)^2 \right\} \cdot \left\{ w_2^2 + n^2 \pi^2 p_2^2 \right\}}$$

Wegen der Stellung der Multiplicatoren ist: $\sin \eta = 1$, $\operatorname{ctg} \eta$ eine
kleine Grösse, welche mit k bezeichnet werden soll. Ferner kann man
so gross machen, dass das Glied $n^2 \pi^2 \left(p_1 - \frac{q}{n^2 \pi^2} \right)^2$ gegen w_1^2 sehr
klein ist. Dann ist:

$$D = \frac{q E_1 E_2 n \cdot w_2 \left\{ 1 + \frac{n p_2 \pi}{w_2} k \right\}}{2 \pi w_1^2 \left\{ w_2^2 + n^2 \pi^2 p_2^2 \right\}}.$$

Bei den bisher angestellten Versuchen ergab sich, dass die Aus-
schläge bei Veränderung der Schwingungszahlen n denselben nahezu

proportional waren. Bezeichnet man dieselben mit α , so kann man in erster Annäherung setzen:

$$q = \text{Const.} \frac{\alpha}{n}.$$

Als Beispiele theile ich einige von mir angestellte Beobachtungen mit, die ich indess nur als vorläufige ansehe, da ich eine systematische Untersuchung der Polarisationerscheinungen nach der beschriebenen Methode auszuführen beabsichtige.

Bei denselben bestand der erste Stromkreis aus dem Multiplicator M , den beiden festen Rollen des Elektrodynamometers F und einem hinzugefügten Widerstand von 1830 S.E., so dass der Gesamtwiderstand dieses Kreises 3093 S.E. betrug. In diesen Kreis wurde die Flüssigkeitszelle eingeschaltet.

Der zweite Kreis enthielt den Multiplicator M_2 , die bewegliche Rolle B und einen weiteren Widerstand von 170 S.E., so dass der Gesamtwiderstand desselben 999 S.E. betrug.

1. Platinplatten von 20[□]_{mm} Fläche in concentrirter Kochsalzlösung.

n	α	α/n
77.5	194.7	2.513
88.9	224.0	2.578
107.5	285.5	2.656
121.9	312.0	2.559

2. Kupferplatten von 20[□]_{mm} Fläche in concentrirter Kochsalzlösung.

n	α	α/n
86.2	84.2	0.977
103.1	103.5	1.004
117.6	118.7	1.009

Dieselben Kupferplatten in concentrirter Lösung von Kupfervitriol gaben Werthe von α/n , welche zwischen 0.10 und 0.17 lagen. Bei den bisher mitgetheilten Versuchen waren die Platten auf den Rückseiten ganz, auf den Vorderseiten bis auf das angegebene Flächenstück mit Wachs überzogen. Es schien von Interesse, die Abhängigkeit der Polarisation von der Fläche der eingetauchten Platten zu ermitteln. Zu dem Zweck waren die beiden Platten an einer Mikrometerschraube befestigt, durch welche sie bis zu einer genau feststellenden Tiefe in die Flüssigkeit getaucht werden konnten. Selbstverständlich waren die einander zugekehrten Seiten der Platten von dem Wachsüberzug frei.

Es ergab sich hierbei Folgendes, wobei mit f die wirksame Plattenfläche bezeichnet werden soll.

3. Platinplatten in concentrirter Kochsalzlösung.

f	n	α	α/n
25 □ mm.	84.3	216	2.562
50 "	83.3	142	1.705
75 "	84.7	122	1.440
100 "	80.0	103	1.287
150 "	81.9	77	0.940
25 □ mm.	110.5	298	2.700
50 "	107.5	213	1.981
75 "	111.1	172	1.548
100 "	111.1	149	1.371
150 "	104.7	117	1.117

Während die Grösse der wirksamen Metallfläche auf das Sechshe zunimmt, sinkt die Polarisirung noch nicht ganz auf den dritten Theil des ersten Werthes. Die Grösse q ist daher nicht, wie man erwarten sollte, der Plattenfläche umgekehrt proportional, sondern ändert sich nach einem complicirteren Gesetz, das in jedem Falle besonders festzustellen ist.

Die hier beschriebene Methode, die Polarisirung zu untersuchen, weicht anderen Methoden besonders bei Benutzung constanter Ströme gegenüber eine Reihe von Vorzügen, welche zum Schluss noch erwähnt werden sollen.

1. Die Messungen sind ganz unabhängig von einer andauernden Gleichheit der Platten, welche constante oder unregelmässig veränderliche Ströme bewirken kann.

2. Die polarisirenden Wechselströme können keine erheblichen Veränderungen in der Flüssigkeit (Concentrations-Unterschiede) oder den Elektrodenflächen hervorbringen.

3. Die Polarisirung wird gemessen, ohne dass der polarisirende Strom unterbrochen zu werden braucht.

4. Die Einwirkung des polarisirenden Stromes auf das Beobachtungs-Instrument ist durch die Versuchs-Anordnung ausgeschlossen. Ablenkungen desselben sind nur eine Folge der Phasen-Veränderung, welche die elektromotorische Kraft der Polarisirung hervorruft.

Dagegen macht sich als ein störender Umstand die langsame Abnutzung des rotirenden Magnets — d. h. die langsame Abnahme des magnetischen Moments — geltend. Da die mitgetheilten Ver-

suche innerhalb weniger Tage angestellt wurden, so wird in dieser Zeit eine erhebliche Veränderung des magnetischen Moments nicht stattgefunden haben. Sollen dagegen Versuchsreihen, welche über einen längeren Zeitraum sich ausdehnen, unter sich vergleichbar sein, so müssen regelmässige Controlbeobachtungen der angeführten Grösse vorgenommen werden.


Aus derartigen Beobachtungen kann dann auch gleichzeitig die Stärke und elektromotorische Kraft des polarisirenden Stromes festgestellt werden. Letztere erreicht den Maximalwerth nE_1 , wo E_1 mit der elektromotorischen Kraft eines DANIELL'schen Elements mit Hülfe des Elektrodynamometers verglichen worden war. Es war $E_1 = 0.03$, so dass für die Schwingungszahlen 80 und 120 die Maximalwerthe: 2.4 bis 3.6 Daniell betrugen.

Ausgegeben am 14. December.

1882.

LI.

SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.



14. December. Gesamtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. MOMMSEN.

1. Hr. ZELLER las: Über Begriff und Begründung der sittlichen Gesetze.

Der Vortrag wird in den Abhandlungen der Akademie erscheinen.

2. Hr. WEIERSTRASS legte eine Mittheilung des Hrn. LIPSCHITZ vor: Untersuchungen über die Bestimmung von Oberflächen mit vorgeschriebenen, die Krümmungsverhältnisse betreffenden Eigenschaften.

Die Mittheilung folgt umstehend.

3. Dem Assistenten am botanischen Garten in Bonn Hrn. Dr. FRIEDRICH JOHOW sind zu einer Reise nach Guayana und Westindien zur Erforschung der Entwicklungs- und Keimgeschichte tropischer Schmarotzerpflanzen 3000 Mark bewilligt worden.

4. Am 5. December starb Hr. THEODOR LUDWIG WILHELM VON BISCHOFF in München, correspondirendes Mitglied der physikalisch-mathematischen Classe.



Untersuchungen über die Bestimmung von Oberflächen mit vorgeschriebenen, die Krümmungsverhältnisse betreffenden Eigenschaften.

Von R. LIPSCHITZ.

Wenn es sich darum handelt, zu entscheiden, ob Oberflächen existiren, welche in Bezug auf ihre Krümmungsverhältnisse eine vorgeschriebene Beschaffenheit haben, und wenn verlangt wird, für den Fall der Existenz diese Oberflächen zu bestimmen, so ist häufig das Mittel angewendet worden, für die Punkte der betrachteten Oberfläche die Richtung der Normale durch den Endpunkt des parallelen Radius auf der mit der Einheit als Radius um ein beliebiges Centrum beschriebenen von GAUSS eingeführten Kugel abzubilden, und dann die Beziehung umzukehren, so dass der Ort eines Punktes der Oberfläche von dem Orte des entsprechenden auf der GAUSS'schen Kugel befindlichen Punktes abhängig wird. Die bezeichnete Umkehrung ist eine für die Theorie der Oberflächen fundamentale Operation. Um ihre nothwendigen Elemente kennen zu lernen, kann man dieselbe auf eine Mannigfaltigkeit von n Variabeln, für welche das Quadrat des Linearelements gleich der Quadratsumme von den Differentialen der Variabeln ist, übertragen, und dabei von der Umformung des Ausdrucks ausgehen, durch den die zugehörige Ausdehnung des Begriffs des Krümmungshalbmessers dargestellt wird. Mit diesem Gegenstande werde ich mich zunächst beschäftigen, und hierauf die Betrachtung der in unserem Raume vorhandenen Oberflächen folgen lassen.

I.

Innerhalb der Mannigfaltigkeit der n Variabeln $x_1, x_2, \dots x_n$, für die das Quadrat des Linearelements durch die Summe $\sum_i dx_i^2$ ausgedrückt wird, sei eine Function $\phi(x_1, x_2, \dots x_n)$ gegeben; der Buch-

stabe a , wie auch b , c , ... möge immer die Reihe der Zahlen von 1 bis n durchlaufen. Für die Mannigfaltigkeit der $(n-1)^{\text{ten}}$ Ordnung $\phi(x_1, x_2 \dots x_n) = \text{const.}$ wird dann der reciproke Werth des Krümmungshalbmessers ρ eines Normalschnitts durch den Ausdruck

$$(1) \quad \frac{1}{\rho} = \frac{\sum_{b,c} \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_b \partial x_c} dx_b dx_c}{N^{\frac{1}{2}} \sum_a dx_a^2}$$

bezeichnet, wo $\sum_a \left(\frac{\partial \phi}{\partial x_a} \right)^2 = N$ gesetzt ist, und wo die Differentiale dx , an die Bedingung

$$(2) \quad \sum_a \frac{\partial \phi}{\partial x_a} dx_a = 0$$

gebunden sind. Wenn man jetzt, wie in dem Aufsatz: Ausdehnung der Theorie der Minimalflächen, BORCHARDT's Journal für Mathematik Bd. 78, S. 25, die Grössen

$$(3) \quad \xi_b = \frac{\frac{\partial \phi}{\partial x_b}}{N^{\frac{1}{2}}}$$

einführt, so ergibt sich die Gleichung

$$\sum_b d\xi_b dx_b = \frac{\sum_{b,c} \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_b \partial x_c} dx_b dx_c}{N^{\frac{1}{2}}} - \frac{1}{2} \frac{\sum_b \frac{\partial \phi}{\partial x_b} dx_b}{N^{\frac{3}{2}}} dN,$$

und da der auf der rechten Seite abzuziehende Bruch wegen der Bedingung (2) verschwindet, so entsteht für $\frac{1}{\rho}$ die Darstellung

$$(4) \quad \frac{1}{\rho} = \frac{\sum_b d\xi_b dx_b}{\sum_a dx_a^2}.$$

An der erwähnten Stelle habe ich nachgewiesen, dass das Problem der Maxima und Minima von ρ zu dem System von n Gleichungen

$$(5) \quad d\xi_b + \omega dx_b = 0$$

führt, wo aus den $(n-1)$ reellen Werthen der für ω geltenden Gleichung $(n-1)^{\text{ten}}$ Grades durch die Relation $\omega = -\frac{1}{\rho}$ die $(n-1)$

reellen Werthe $\rho_1, \rho_2, \dots \rho_{n-1}$ der Grösse ρ hervorgehen. Ferner ist daselbst hervorgehoben, dass, wenn zu irgend zwei von einander verschiedenen Werthen, z. B. ρ_1 und ρ_2 , respective die Systeme von Differentialen $d^{(1)}x_b, d^{(2)}x_b$ und $d^{(1)}\xi_b, d^{(2)}\xi_b$ gehören, die beiden Gleichungen

$$(6) \quad \sum_b d^{(1)}x_b d^{(2)}x_b = 0,$$

$$(7) \quad \sum_b d^{(1)}\xi_b d^{(2)}\xi_b = 0$$

en. Es repräsentiren hier x_1, x_2, \dots, x_n die rechtwinkligen Coordinaten eines Punktes, $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ die Cosinus der Winkel, welche die Punkte (x_1, x_2, \dots, x_n) der Mannigfaltigkeit $\phi(x_1, x_2, \dots, x_n) = \text{const.}$ die Normale mit den n Axen bildet. Wegen der zwischen denselben bestehenden Gleichung

$$\sum \xi_i^2 = 1$$

kann $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ zugleich die rechtwinkligen Coordinaten eines Punktes einer Kugel von dem Radius Eins, die für $n = 3$ mit der gewöhnlichen Kugel zusammenfällt. Ferner folgt aus der Bedingung (2) die Relation

$$\sum \xi_i dx_i = 0.$$

Nachdem für jedes Werthsystem x_a das zugehörige System ξ_b bestimmt ist, soll diese Beziehung umgekehrt werden. Da die x_a durch die Gleichung $\phi(x_1, x_2, \dots, x_n) = \text{const.}$, die ξ_b durch die Gleichung (8) bestimmt sind, kann man einerseits die $(n-1)$ unabhängigen Variablen x_1, \dots, x_{n-1} , andererseits die $(n-1)$ Variablen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-1}$ auswählen, die letzteren als Functionen der ersteren auffassen, und die Umkehrung so bewerkstelligen, dass die ersteren als Functionen der letzteren betrachtet werden. Hierzu ist erforderlich, dass die Functionaldeterminante $\sum \pm \frac{\partial \xi_1}{\partial x_1} \frac{\partial \xi_2}{\partial x_2} \dots \frac{\partial \xi_{n-1}}{\partial x_{n-1}}$ einen von Null verschiedenen endlichen Werth habe. Sobald aber $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-1}$ als Functionen der unabhängigen Variablen x_1, x_2, \dots, x_{n-1} angesehen werden, liefert das System (5) zur Bestimmung von ω die Gleichung $(n-1)^{\text{ten}}$ Grades, welche sich beim Verschwinden der Determinante

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial \xi_1}{\partial x_1} + \omega, & \frac{\partial \xi_1}{\partial x_2}, & \dots, & \frac{\partial \xi_1}{\partial x_{n-1}} \\ \frac{\partial \xi_2}{\partial x_1}, & \frac{\partial \xi_2}{\partial x_2} + \omega, & \dots, & \frac{\partial \xi_2}{\partial x_{n-1}} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial \xi_{n-1}}{\partial x_1}, & \frac{\partial \xi_{n-1}}{\partial x_2}, & \dots, & \frac{\partial \xi_{n-1}}{\partial x_{n-1}} + \omega \end{vmatrix}$$

verschwindet. In Folge dessen ist die in Rede stehende Functionaldeterminante gleich dem in die Einheit dividirten Product der $(n-1)$ Werthe

$$\rho_1 \rho_2 \dots \rho_{n-1},$$

des Hr. KRONECKER in der Abhandlung: Über Systeme von Functionen mehrerer Variablen, Monatsbericht der Akademie vom August 1868, S. 695, als Ausdehnung des GAUSS'schen Krümmungsmaasses betrachtet hat. Mithin muss bei der vorzunehmenden Umkehrung

die Bedingung erfüllt sein, dass diese Grösse in keinem Theile der Mannigfaltigkeit $\phi(x_1, x_2 \dots x_n) = \text{const.}$ verschwinde. Unter dieser Voraussetzung werde ich die quadratischen Formen der Differentiale dx_i , welche den Zähler und Nenner des Ausdrucks (4) von $\frac{1}{\rho}$ bilden, in quadratische Formen der Differentiale $d\xi_b$ verwandeln, die Coefficienten der Formen durch ein gewisses System von Functionen der ξ_i ausdrücken, und zeigen, wie vermittelst desselben Systems von Functionen die Coefficienten in den Darstellungen der Differentiale dx_i durch die Differentiale $d\xi_b$ ausgedrückt werden.

Für das Differential dx_n liefert die Gleichung (9) durch die unabhängigen Differentiale $dx_1, dx_2 \dots dx_{n-1}$ den Ausdruck

$$(11) \quad -dx_n = v_1 dx_1 + v_2 dx_2 + \dots + v_{n-1} dx_{n-1};$$

der Kürze wegen ist

$$(12) \quad \frac{\xi_1}{\xi_n} = v_1, \quad \frac{\xi_2}{\xi_n} = v_2, \dots \quad \frac{\xi_{n-1}}{\xi_n} = v_{n-1}$$

gesetzt. Bei irgend zwei von einander verschiedenen Zeigern α und β aus der Reihe 1, 2, \dots $n-1$ gelten daher die Bedingungen der Integrabilität

$$(13) \quad \frac{\partial v_\alpha}{\partial x_\beta} = \frac{\partial v_\beta}{\partial x_\alpha}.$$

Ferner nimmt der Zähler in (4) durch Einführung der Differentiale $dx_1, dx_2, \dots dx_{n-1}$ und der Grössen $v_1, v_2, \dots v_{n-1}$ die Gestalt an

$$(14) \quad \sum_b d\xi_b dx_b = \xi_n (dv_1 dx_1 + \dots + dv_{n-1} dx_{n-1}),$$

so dass für $\frac{1}{\rho}$ die Darstellung

$$(15) \quad \frac{1}{\rho} = \frac{\xi_n \left(\frac{\partial v_1}{\partial x_1} dx_1^2 + \left(\frac{\partial v_1}{\partial x_2} + \frac{\partial v_2}{\partial x_1} \right) dx_1 dx_2 + \dots + \frac{\partial v_{n-1}}{\partial x_{n-1}} dx_{n-1}^2 \right)}{dx_1^2 + \dots + dx_{n-1}^2 + (v_1 dx_1 + \dots + v_{n-1} dx_{n-1})^2}$$

hervorgeht.

Da hier der Nenner eine wesentlich positive Form der $(n-1)$ Differentiale $dx_1, dx_2, \dots dx_{n-1}$ ist, so lässt sich nach einem zuerst für lauter ungleiche Werthe $\rho_1, \rho_2, \dots \rho_{n-1}$ aufgestellten, später von Hrn. WEIERSTRASS allgemein formulirten und bewiesenen Satze¹, der Zähler und Nenner des Bruches so transformiren, dass der Nenner gleich einer Summe von $(n-1)$ Quadraten wird, deren Basen lineare Ausdrücke von $dx_1, dx_2, \dots dx_{n-1}$ sind, und dass der Zähler in ein Aggregat übergeht,

¹ Monatsbericht d. Akad. vom 4. März 1858, S. 216.

dessen Summanden durch Multiplication der betreffenden Quadrate in die zugeordneten Grössen

$$\frac{1}{\rho_1}, \frac{1}{\rho_2}, \dots, \frac{1}{\rho_{n-1}}$$

entstehen.

Ich nehme nun an, dass statt x_1, x_2, \dots, x_{n-1} die Variablen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-1}$ eingeführt werden, und dass die erwähnten linearen Ausdrücke von $dx_1, dx_2, \dots, dx_{n-1}$ in lineare Ausdrücke von den in (12) definirten Quotienten v_1, v_2, \dots, v_{n-1} verwandelt seien, dividire Zähler und Nenner der rechten Seite von (15) durch ξ_n^2 , und erhalte die Gleichungen

$$\begin{aligned} 3) \quad \frac{1}{\xi_n^2} \sum dx_a^2 &= (P_{1,1} dv_1 + \dots + P_{1,n-1} dv_{n-1})^2 + \dots + (P_{n-1,1} dv_1 + \dots + P_{n-1,n-1} dv_{n-1})^2, \\ (17) \quad &\frac{\frac{\partial v_1}{\partial x_1} dx_1^2 + \dots + \frac{\partial v_{n-1}}{\partial x_{n-1}} dx_{n-1}^2}{\xi_n} \\ &= \frac{1}{\rho_1} (P_{1,1} dv_1 + \dots + P_{1,n-1} dv_{n-1})^2 + \dots + \frac{1}{\rho_{n-1}} (P_{n-1,1} dv_1 + \dots + P_{n-1,n-1} dv_{n-1})^2, \end{aligned}$$

wo mit $P_{\alpha,\beta}$ Functionen von $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-1}$ bezeichnet sind.

Jetzt kann man die Differentiale $dx_1, dx_2, \dots, dx_{n-1}$ in der Weise durch die Differentiale $dv_1, dv_2, \dots, dv_{n-1}$ ausdrücken, dass sich die auftretenden Coefficienten nur aus den Grössen $\rho_1, \rho_2, \dots, \rho_{n-1}$ und den Grössen $P_{\alpha,\beta}$ zusammensetzen. Zu diesem Zweck werde die linke Seite von (17) durch $dv_1, dv_2, \dots, dv_{n-1}$ dargestellt. Hierbei ist darauf zu achten, dass in Folge von (11) auch der Ausdruck

$$x_1 dv_1 + x_2 dv_2 + \dots + x_{n-1} dv_{n-1}$$

ein exactes Differential sein muss, und dass deshalb für jedes Paar verschiedener Zeiger α und β die Bedingungen der Integrabilität

$$(18) \quad \frac{\partial x_\alpha}{\partial v_\beta} = \frac{\partial x_\beta}{\partial v_\alpha}$$

gelten. Es erhält aber die linke Seite von (17) die Gestalt

$$(19) \quad \frac{dv_1 dx_1 + \dots + dv_{n-1} dx_{n-1}}{\xi_n} = \frac{\frac{\partial x_1}{\partial v_1} dv_1^2 + \left(\frac{\partial x_1}{\partial v_2} + \frac{\partial x_2}{\partial v_1} \right) dv_1 dv_2 + \dots + \frac{\partial x_{n-1}}{\partial v_{n-1}} dv_{n-1}^2}{\xi_n}.$$

Sieht man auf beiden Seiten von (17) die $(n-1)$ independenten Differentiale dv_α als allein veränderlich an, und bildet nach der Reihe die durch Zwei dividirten partiellen Differentialquotienten in Bezug auf $dv_1, dv_2, \dots, dv_{n-1}$, so erhält man links respective die durch ξ_n dividirten vollständigen Differentiale $dx_1, dx_2, \dots, dx_{n-1}$, und es entstehen für dieselben die gesuchten Ausdrücke

er durch die Quotienten $\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_{n-1}$ hervorgerufene Vorzug der Grösse ν_n aufheben, indem man bemerkt, dass nach (22)

$$\rho_{\alpha,1} dv_1 + \rho_{\alpha,2} dv_2 + \dots + \rho_{\alpha,n-1} dv_{n-1} = \frac{P_{\alpha,1} d\xi_1 + P_{\alpha,2} d\xi_2 + \dots + P_{\alpha,n} d\xi_n}{\xi_n}$$

ist. Werden nun auch dort statt $P_{\alpha,b}$ die Functionen $A_{\alpha,b}$ eingeführt, so erhält man nach Weglassung des Factors ξ_n das in Bezug auf $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ symmetrisch gebildete System von Ausdrücken

$$(27) \quad dx_\alpha = \rho_\alpha A_{1,\alpha} (A_{1,1} d\xi_1 + A_{1,2} d\xi_2 + \dots + A_{1,n} d\xi_n) \\ + \rho_\alpha A_{2,\alpha} (A_{2,1} d\xi_1 + A_{2,2} d\xi_2 + \dots + A_{2,n} d\xi_n) \\ + \dots \\ + \rho_{n-1} A_{n-1,\alpha} (A_{n-1,1} d\xi_1 + A_{n-1,2} d\xi_2 + \dots + A_{n-1,n} d\xi_n).$$

Gleichzeitig entstehen für die quadratischen Formen, welche in (4) den

Nenner und Nenner des Ausdrucks von $\frac{1}{\rho}$ bilden, die Darstellungen

$$\sum_\alpha dx_\alpha^2 = \rho_1^2 (A_{1,1} d\xi_1 + \dots + A_{1,n} d\xi_n)^2 + \dots + \rho_{n-1}^2 (A_{n-1,1} d\xi_1 + \dots + A_{n-1,n} d\xi_n)^2 \\ d\xi_\epsilon dx_\epsilon = \rho_\epsilon (A_{1,\epsilon} d\xi_1 + \dots + A_{1,n} d\xi_n)^2 + \dots + \rho_{n-1}^2 (A_{n-1,\epsilon} d\xi_1 + \dots + A_{n-1,n} d\xi_n)^2.$$

Aus (26) folgt bekanntlich, dass, je nachdem ein Zeiger ϵ dem Zeiger ϵ gleich oder von demselben verschieden ist, die Summe

$$(29) \quad \sum_\alpha A_{\alpha,\epsilon} A_{\alpha,\epsilon} + \xi_\epsilon \xi_\epsilon = 1 \text{ oder } 0$$

gilt. Wenn daher zu den Quadraten der $(n-1)$ Ausdrücke

$$A_{\alpha,1} d\xi_1 + \dots + A_{\alpha,n} d\xi_n$$

noch das Quadrat der Basis $\xi_1 d\xi_1 + \dots + \xi_n d\xi_n$ addirt wird, die gleich Null ist, so erhält man die fernere Gleichung

$$(30) \quad \sum_\alpha d\xi_\alpha^2 = (A_{1,1} d\xi_1 + \dots + A_{1,n} d\xi_n)^2 + \dots + (A_{n-1,1} d\xi_1 + \dots + A_{n-1,n} d\xi_n)^2.$$

Der ausgesprochenen Behauptung gemäss sind die Coefficienten der quadratischen Formen der Differentiale $d\xi_1, \dots, d\xi_n$, welche den Nenner und Nenner von $\frac{1}{\rho}$ ausmachen, als rationale ganze Functionen des Systems der Grössen $\rho_1, \rho_2, \dots, \rho_{n-1}$ und der Grössen $A_{\alpha,b}$ dargestellt, und gleichzeitig sind die Coefficienten in den Ausdrücken der Differentiale dx_α durch die Differentiale $d\xi_\epsilon$ ebenfalls rationale ganze Functionen desselben Systems von Grössen.

II.

In der bisherigen Untersuchung ist die Mannigfaltigkeit der $(n-1)^{\text{ten}}$ Ordnung betrachtet worden, welche durch die Gleichung $\phi(x_1, x_2, \dots, x_n) = \text{const.}$ bestimmt wird. Auf der Voraussetzung dieser Mannigfaltigkeit beruht die Existenz der Functionen ρ_α und

$A_{\alpha, b}$, und die Gültigkeit der mit Anwendung der ρ_α und $A_{\alpha, b}$ für die Differentiale dx_α aufgestellten Ausdrücke. Dagegen werde ich jetzt annehmen, dass die Grössen ρ_α und $A_{\alpha, b}$ als Functionen der Variablen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ beliebig gegeben seien. Dann erhebt sich die Frage, ob überhaupt eine Mannigfaltigkeit der $(n-1)^{\text{ten}}$ Ordnung existire, zu der jenes System von Functionen in der angegebenen Bedeutung gehört, und es folgt die zweite Frage, wie sich innerhalb der vorhandenen Mannigfaltigkeit die Grössen x_1, x_2, \dots, x_n als Functionen der Variablen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ bestimmen. Beide Fragen werden durch Benutzung der Ausdrücke in $d\xi_1, d\xi_2, \dots, d\xi_n$ beantwortet, die in dx_1, dx_2, \dots, dx_n gefunden sind. Für jeden Ausdruck hat man die Bedingungen der Integrabilität aufzustellen, und die erste Frage ist nothwendig zu bejahen oder zu verneinen, je nachdem sämtliche Bedingungen der Integrabilität erfüllt sind oder nicht. Sobald sie aber wirklich erfüllt sind, ergibt sich die Darstellung der Grössen x_α als Functionen der Variablen ξ_b durch Ausführung der Integration der bezüglichen vollständigen Differentiale.

Die soeben hervorgehobenen Fragen bezeichnen den Gesichtspunkt, von dem aus die gegenwärtige Untersuchung unternommen ist. Hiernach fällt das Hauptgewicht auf die Erforschung des Systems der Integrabilitätsbedingungen der für die Differentiale dx_α gebildeten Ausdrücke. Da die Functionen $A_{\alpha, b}$ mit den Grössen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ zusammen eine Substitution bilden, durch welche eine Summe von n Quadraten in sich selbst transformirt wird, und demgemäss die Eigenschaft haben, die obige Gleichung (30) zu erfüllen, so erkennt man leicht, dass jedes System von solchen Functionen erhalten wird, indem man ein einzelnes System dieser Art mit der allgemeinsten Substitution zusammensetzt, durch welche eine Summe von $(n-1)$ Quadraten in sich selbst transformirt wird, einer Substitution, deren Coefficienten sich durch $\frac{(n-1)(n-2)}{2}$ unabhängige Elemente rational darstellen lassen. Hieraus folgt aber mit Nothwendigkeit, dass die Eigenschaften des aufzustellenden Systems von Integrabilitätsbedingungen in der algebraischen Theorie der Summen von $(n-1)$ Quadraten ihre Wurzel haben.

Dieses System von Integrabilitätsbedingungen ist dem Inhalt nach ein System von partiellen Differentialgleichungen, in welchem die $(n-1)$ Functionen ρ_α und die $\frac{(n-1)(n-2)}{2}$ Elemente, durch welche nach dem soeben Gesagten die Functionen $A_{\alpha, b}$ ausgedrückt werden können, also im Ganzen $\frac{n(n-1)}{2}$ Functionen, in ihrer Abhängigkeit

von den Variablen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ bestimmt werden, welche letztere sich wegen der zwischen ihnen bestehenden Gleichung auf $(n-1)$ unabhängige Variable reduciren. Man kann jedoch die Integrabilitätsbedingungen der einzelnen Ausdrücke zusammenfassend darstellen, ohne ein System von unabhängigen Variablen einzuführen. In dem Aufsatz: Untersuchungen in Betreff der ganzen homogenen Functionen von n Differentialen, BORCHARDT's Journal für Mathematik. Bd. 70, S. 77, habe ich beiläufig bemerkt, dass sich die Integrabilitätsbedingungen eines mit den Differentialen dz_1, dz_2, \dots, dz_n gebildeten Ausdrucks,

$$a_1 dz_1 + a_2 dz_2 + \dots + a_n dz_n$$

mit Hülfe von zwei Charakteristiken der Differentiation d und δ zu der Gleichung

$$(1) \quad \delta(a_1 dz_1 + \dots + a_n dz_n) = d(a_1 \delta z_1 + \dots + a_n \delta z_n)$$

vereinigen lassen. Offenbar bleibt die Bedeutung dieser Gleichung ungeändert, wenn auch zwischen den Variablen z_1, z_2, \dots, z_n eine oder mehrere Gleichungen bestehen, und sie eignet sich deshalb für die zusammenfassende Darstellung der in Rede stehenden Integrabilitätsbedingungen.

Die Gleichungen (27) des vorigen Artikels gehen bei den Bezeichnungen

$$(2) \quad A_{\alpha,1} d\xi_1 + A_{\alpha,2} d\xi_2 + \dots + A_{\alpha,n} d\xi_n = l_\alpha(d\xi)$$

in die folgende Gestalt über

$$(3) \quad dx_\alpha = \rho_1 A_{1,\alpha} l_1(d\xi) + \dots + \rho_{n-1} A_{n-1,\alpha} l_{n-1}(d\xi).$$

Nach dem Vorbilde der Gleichung (1) werden dann die sämtlichen Integrabilitätsbedingungen der n Ausdrücke zu den n Gleichungen vereinigt

$$(4) \quad \begin{aligned} & \delta(\rho_1 A_{1,\alpha} l_1(d\xi) + \dots + \rho_{n-1} A_{n-1,\alpha} l_{n-1}(d\xi)) \\ & = d(\rho_1 A_{1,\alpha} l_1(\delta\xi) + \dots + \rho_{n-1} A_{n-1,\alpha} l_{n-1}(\delta\xi)). \end{aligned}$$

Zwischen denselben findet aber eine solche Abhängigkeit statt, dass man sie durch $(n-1)$ zusammenfassende Gleichungen von ähnlicher Art ersetzen kann. Wird die den Zeichen δ und d entsprechende Differentiation auf die einzelnen Summanden nach dem Schema

$$\delta(\rho_1 A_{1,\alpha} l_1(d\xi)) = \delta A_{1,\alpha} \rho_1 l_1(d\xi) + A_{1,\alpha} \delta(\rho_1 l_1(d\xi))$$

vorgenommen, die Gleichung (4) mit $A_{\alpha,\alpha}$ multiplicirt, und von $\alpha=1$ bis $\alpha=n$ summirt, so folgt das System von $(n-1)$ Gleichungen

$$(5) \quad \begin{aligned} & (\alpha, 1)_\delta \rho_1 l_1(d\xi) + (\alpha, 2)_\delta \rho_2 l_2(d\xi) + \dots + (\alpha, n-1)_\delta \rho_{n-1} l_{n-1}(d\xi) + \delta(\rho_\alpha l_\alpha(d\xi)) \\ & = (\alpha, 1)_d \rho_1 l_1(\delta\xi) + (\alpha, 2)_d \rho_2 l_2(\delta\xi) + \dots + (\alpha, n-1)_d \rho_{n-1} l_{n-1}(\delta\xi) + d(\rho_\alpha l_\alpha(\delta\xi)). \end{aligned}$$

Hier ist

$$(6) \quad \begin{aligned} (A_{\alpha,1} \delta A_{\beta,1} + A_{\alpha,2} \delta A_{\beta,2} + \dots + A_{\alpha,n} \delta A_{\beta,n} &= (\alpha, \beta)_\delta \\ (A_{\alpha,1} dA_{\beta,1} + A_{\alpha,2} dA_{\beta,2} + \dots + A_{\alpha,n} dA_{\beta,n} &= (\alpha, \beta)_d \end{aligned}$$

gesetzt, und man hat vermöge (26), I die Relationen

$$(7) \quad \begin{aligned} (\alpha, \beta)_\delta + (\beta, \alpha)_\delta &= 0, \\ (\alpha, \alpha)_\delta &= 0. \end{aligned}$$

Ich werde nun zeigen, dass das System (5) von $(n-1)$ zusammenfassenden Gleichungen die Erfüllung des ursprünglichen Systems nach sich zieht. Multiplicirt man (5) mit einem Factor $A_{\alpha, \epsilon}$ und summiert nach α von 1 bis $n-1$, so findet sich

$$(8) \quad \begin{aligned} \sum_{\alpha} A_{\alpha, \epsilon} (\alpha, 1)_\delta \rho_1 l_1(d\xi) + \dots + \sum_{\alpha} A_{\alpha, \epsilon} (\alpha, n-1)_\delta \rho_{n-1} l_{n-1}(d\xi) + \sum_{\alpha} A_{\alpha, \epsilon} \delta(\rho_{\alpha} l_{\alpha}(d\xi)) \\ = \sum_{\alpha} A_{\alpha, \epsilon} (\alpha, 1)_d \rho_1 l_1(\delta\xi) + \dots + \sum_{\alpha} A_{\alpha, \epsilon} (\alpha, n-1)_d \rho_{n-1} l_{n-1}(\delta\xi) + \sum_{\alpha} A_{\alpha, \epsilon} d(\rho_{\alpha} l_{\alpha}(\delta\xi)). \end{aligned}$$

Es ist aber

$$\sum_{\alpha} A_{\alpha, \epsilon} (\alpha, \beta)_\delta = \sum_{\alpha} A_{\alpha, \epsilon} (A_{\alpha,1} \delta A_{\beta,1} + \dots + A_{\alpha,n} \delta A_{\beta,n})$$

und daher nach (29), I

$$\sum_{\alpha} A_{\alpha, \epsilon} (\alpha, \beta)_\delta = -\xi_{\epsilon} \xi_1 \delta A_{\beta,1} - \xi_{\epsilon} \xi_2 \delta A_{\beta,2} \dots - \xi_{\epsilon} \xi_n \delta A_{\beta,n} + \delta A_{\beta, \epsilon}.$$

Weil aber vermöge der letzten Gleichung in (26), I

$$\begin{aligned} -\xi_{\epsilon} \delta A_{\beta,1} - \xi_n \delta A_{\beta,2} \dots - \xi_n \delta A_{\beta,n} \\ = A_{\beta,1} \delta \xi_{\epsilon} + A_{\beta,2} \delta \xi_2 \dots + A_{\beta,n} \delta \xi_n = l_{\beta}(\delta \xi) \end{aligned}$$

ist, so kommt

$$(9) \quad \sum_{\alpha} A_{\alpha, \epsilon} (\alpha, \beta)_\delta = \xi_{\epsilon} l_{\beta}(\delta \xi) + \delta A_{\beta, \epsilon}.$$

Mithin folgt aus (8) die Gleichung

$$(10) \quad \begin{aligned} \xi_{\epsilon} l_1(\delta \xi) \rho_1 l_1(d\xi) + \dots + \xi_{\epsilon} l_{n-1}(\delta \xi) \rho_{n-1} l_{n-1}(d\xi) \\ + \sum_{\alpha} A_{\alpha, \epsilon} \delta(\rho_{\alpha} l_{\alpha}(d\xi)) + \delta A_{1, \epsilon} \rho_1 l_1(d\xi) + \dots + \delta A_{n-1, \epsilon} \rho_{n-1} l_{n-1}(d\xi) \\ = \xi_{\epsilon} l_1(d\xi) \rho_1 l_1(\delta \xi) + \dots + \xi_{\epsilon} l_{n-1}(d\xi) \rho_{n-1} l_{n-1}(\delta \xi) \\ + \sum_{\alpha} A_{\alpha, \epsilon} d(\rho_{\alpha} l_{\alpha}(\delta \xi)) + dA_{1, \epsilon} \rho_1 l_1(\delta \xi) + \dots + dA_{n-1, \epsilon} \rho_{n-1} l_{n-1}(\delta \xi). \end{aligned}$$

Hier heben sich die in ξ_{ϵ} multiplicirten Summanden beiderseits fort, und es bleibt die für $\epsilon = \alpha$ gebildete Gleichung (4) übrig, womit die aufgestellte Behauptung erwiesen ist.

Das System von $(n-1)$ zusammenfassenden Gleichungen (5), welches somit den Inbegriff der zu erfüllenden Integrabilitätsbedingungen vertritt, schliesst ein System von partiellen Differentialgleichungen in sich, deren Anzahl folgendermassen bestimmt wird. Wenn man statt der Grössen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ $(n-1)$ unabhängige Variable einführt, so enthält jede der $(n-1)$ zusammenfassenden Gleichungen $\frac{(n-1)(n-2)}{2}$ Determinanten

zweiten Grades, die aus Differentialen mit den Charakteristiken d und δ gebildet sind, und liefert deshalb ebenso viele partielle Differentialgleichungen; mithin geben alle $(n-1)$ Gleichungen zusammen

$\frac{(n-1)(n-1)(n-2)}{2}$ partielle Differentialgleichungen, welche zwischen den ersten, in Bezug auf die $(n-1)$ unabhängigen Variabeln genommenen partiellen Differentialquotienten der oben erwähnten $\frac{n(n-1)}{2}$ Functionen bestehen.



Bericht über die Ergebnisse einer Bereisung Paphlagoniens.

Von Prof. G. HIRSCHFELD.

(Vorgetragen am 30. November [s. oben S. 1029].)

eine diesjährige Reise, welche in den Monaten August, September und October ausgeführt wurde, war wesentlich auf eine Klärung des Paphlagoniens und der angrenzenden Theile von Galatien und Pontus gerichtet. Die von mir berührten Gegenden, welche zwischen Parthenios im Westen und dem Thermodon im Osten gelegen waren, konnten im grossen Ganzen für unbekannt gelten. Für Paphlagonien waren zwei ziemlich unergiebigte Quertouren von AINSWORTH und HAMILTON bekannt geworden; die Küstenorte waren zum Theil, zum Theil seit TAVERNIER (1631—1664) nicht von Europäern besucht worden; der untere Lauf des Halys, des bedeutendsten kleinasiatischen Flusses, war durchaus unbekannt und galt eigentlich für ganz unzugänglich; endlich waren selbst die besuchtesten Orte und Städte dieses Gebietes nur ungenügend beschrieben. Schon C. RITTER hat auf alle diese Lücken besonders nachdrücklich hingewiesen. Ein geographischer und topographischer Gewinn durfte daher bei einer Reise in die betreffenden Gegenden von vorn herein für sicher gelten; doch ist das Unternehmen auch in Beziehung auf Denkmäler nicht ergiebig geblieben. Ich will im folgenden nur die wesentlichen Resultate der Reise hervorheben.

Die Erforschung begann mit der Westhälfte von Paphlagonien, welche zum grossen Theil ihre Entwässerung der ziemlich bedeutenden See des Devrikian-Irmak verdankt, eines bisher ganz unbekannten Baches von über 100^{km} Länge, welcher jenseits der Küstenkette entspringend nach mehrfachen schwierigen Durchbrüchen etwa 2 Stunden südlich vom alten Kytoros ins Meer geht. In seinem Gebiete im Norden fand sich ein Bestattungsplatz, wohl einheimischer Fürsten, auf welchem Phalli und Figuren von Löwen — einer ein Reh (?)

verschlingend — noch vorhanden sind. Am oberen Parthenios sind ansehnliche Reste, wohl einer Cultusanlage, erhalten.

Die erwähnte Küstenkette gerade ist es, welche im Alterthum die völlige Abgeschlossenheit des Innern gegenüber dem Saure griechischer Colonien herbeigeführt hat, da sie den natürlichen Verbindungswegen, den Flüssen, nur einen höchst engen Ausgang gestattet. In diesem Sinne wirkt dieselbe noch heute fort; die Küstenorte hat sie von jeher lediglich auf den Verkehr zur See hingewiesen, da der Landverkehr aufs äusserste durch Querzüge erschwert wird, welche in ihrer Längsrichtung engschluchtig an einander rücken und nach Norden zum Meere meist schroff und unnahbar abfallen. Die antiken Stätten an der Küste erscheinen zum grossen Theil abgewohnt, um so zu sagen; da sie noch bis ins Mittelalter hinein, ja auch wohl bis heute bewohnt geblieben sind, so weisen ihre Ruinen nur geringere antike Reste auf. Aber auch wo die letzteren so zahlreich sind wie in Amastris, ist der wissenschaftliche Gewinn, welchen man aus ihnen für das Alterthum ziehen kann, nicht gross. Ganz anders würde sich das Verhältniss in Beziehung auf das Mittelalter stellen und man bedauert nicht selten, dass Kleinasien bis jetzt wenigstens fast ausschliesslich in classisch-antiquarischem Interesse besucht und durchforscht worden ist.

Hinter der erwähnten Küstenkette, welche bei einer durchschnittlichen Höhe von 1000—1500^m eine Breite von etwa 25^{km} haben mag, und die an ihrer Meeresseite noch jetzt wie im Alterthume eine reiche und schöne Bewaldung zeigt, erhebt sich eine zweite, im ganzen höhere Gebirgskette, mannigfach gegliedert, aber auch sie ein starkes schwer durchbrochenes Hinderniss für die weiter kommenden Flüsse, deren Lauf dadurch in mehrere gleichsam zusammenhanglose Theile zerlegt wird. Dieser Zug sondert zugleich auf dem von mir eingeschlagenen Wege nach Süden die Zuflüsse des Halys von einander, dessen Gebiet ich bei Taschköprui-Pompeiopolis am alten Amnias betrat, nachdem ich die Hauptformen des östlichen Paphlagonien festzustellen gesucht hatte.

In das Thal des Halys selber stieg ich oberhalb seiner bekannten starken Biegung nach Osten resp. Nordosten hinab, wo sich der Devrektschai mit ihm vereinigt. Hier erwies sich nun, dass der grosse Fluss zunächst nicht in unzugängliche Steilufer eingesenkt liegt, sondern in einem beiderseits von Alters her wegsamen, wenn auch ziemlich engen Thale sich hinzieht. An seinem Ufer werden bald rechts bald links, kleinere und grössere fruchtbare wohlbevölkerte Ebenen frei. Der bedeutendsten dieser Ebenen, der Zeitün-owasi gegenüber am Durchbruche des Flusses zwischen zwei Felsen, unmittelbar an

inner Furth, liegt ein sehr stattliches Felsengrab, dessen Vorhalle von drei Säulen eigenthümlicher Bildung getragen wird; über denselben ist ein Giebel eingemeißelt, in welchem Thiere einander gegenüber stehen. Auf der Stufe vor den Säulen sind drei lagernde Löwen aus dem Felsen gehauen, deren mittlerer in ganzer Gestalt da liegt, während die seitlichen nur halb vom Felsen losgelöst sind. Die unsymmetrisch angelegte Thür in der Hinterwand der Vorhalle leitet in ein kleines Gemach, das zum grossen Theil von einem Felsenbette eingenommen wird.

Nachdem ich den Halys soweit als thunlich, d. h. bis auf drei bis vier Tagereisen von der Küste verfolgt und noch eine seiner Engschluchten auf entschieden antiker Strassenrichtung umgangen hatte, wendete ich mich wiederum nach Süden, zunächst nach der nur von AINSWORTH flüchtig besuchten grossen und lebhaften Stadt Iskelib mit alter Burg und Felsengräbern, deren Säulenformen und Beschaffenheit durch den Vergleich mit dem Halysgrabe ein besonderes Interesse gewinnen.

Der südlichste Punct, den ich beim Weitemarsche über Oejük und Bogazköi erreichte, war Jüsgat. Diesen suchte ich vor Allem deshalb auf, um durch einen diagonal nach Nordosten gerichteten Ritt nach Amasia das Flussgebiet des Iris an dieser Seite zu bestimmen, wo dasselbe auf den Karten sich in einer grenzenlosen Verwirrung befand. Es gelang im Tschekerekschai den nächst dem Lykos weitest aus bedeutendsten Zufluss des Iris, also doch sicherlich den Skylax, den Strabo festzulegen, welcher auf dem Tschamlübel, nördlich von Işık, entspringend, mit scharfer Wendung aus West- in Nordrichtung fließt. Alle früher westlich vom Tschekerek berührten Flussläufe liegen in denselben und lassen sich nunmehr sammt ihren Begrenzungen nach Aufnahmen und Erkundigungen leicht ordnen. Im Gebiete des Skylax sind nicht wenige Reste byzantinischer Kirchen erhalten. Hier wird wohl von jeher bei dem herrschenden Waldreichthum alles profane in vergänglichem Holzbau hergestellt und nur heilige Bauten in Stein, wie auch in Paphlagonien.

Von Amasia aus durchforschte ich das Gebiet der alten Phanaroia zwischen Iris und Lykos, konnte mehrere antike Ortslagen constatiren und richtete mich dann noch einmal nach Süden auf Tokat, wo verschiedene noch nicht beachtete Anzeichen ebenfalls auf eine antike, wenn auch kleine Ansiedelung deuten. Über Comana Pontica führte mich mein Weg dann nach Niksar (Neocaesarea) das ich allerdings wegen HAMILTON für Kabeira des Mithradates halte.

Als letzte Aufgabe hatte ich mir dieses Mal die Festlegung des Thermodon gestellt, der, wie ich überzeugt war, bisher nur nahe seiner Mündung berührt worden war. Überraschender Weise ergab sich aber als ein ganz kurzer, vom Kamme der Küstenkette ablaufender

Fluss, der hauptsächlich aus zwei Armen zusammenfliesst, welche erst wenige Stunden oberhalb des Meeres sich vereinigen. Der von den Alten gerühmte Wasserreichthum ist allerdings in Anbetracht der Kürze des Laufes erstaunlich, und dieser Umstand, sowie die verhältnissmässige Weite des Thales — gegenüber der Enge aller übrigen dortigen Küstenflüsse — mag dem Thermodon zu seiner hervorragenden Stellung in der Sage verholfen haben.

An den Besuch von Amisos, dem Endpunkt der Landreise, hat sich dann ein Ausflug nach Trapezunt geknüpft und die Rückreise ward zu einem lehrreichen Periplus der ganzen Nordküste Kleinasiens.

Die Landtour, welche mehr als 1500^{km} umfasst, ist mit ihrer weiteren Umgebung aufgenommen, und was an Landschaft und Monumenten bemerkenswerth erschien, auf Trockenplatten photographirt worden.



Über die Beziehungen der Rindenspannung zur Bildung der Jahrringe und zur Ablenkung der Markstrahlen.

Von Dr. G. KRABBE.

(Vorgelegt von Hrn. SCHWENDENER am 7. December [s. oben S. 1057].)

Geschichtliches.

Bildung der Jahrringe.

Obgleich noch keinerlei experimentelle Versuche über die Rindenspannung vorliegen, aus denen man mit Sicherheit irgend welche Schlüsse auf die Grösse derselben herleiten könnte, hat man gleichwohl dieser Spannung in Bezug auf die Wachsthumsvorgänge im Cambiumringe unserer Hölzer eine nicht unbedeutende Rolle zugeschrieben. In der ersten Auflage seines Lehrbuches sprach SACHS¹ zuerst die Vermuthung aus, dass die Differenzirung der Jahrringe in Frühjahrs- und Herbstholz eine Folge des Rindendruckes sei, der sich vom Frühling bis zum Herbst hin allmählich steigern soll. Auf S. 778 der vierten Auflage² des Lehrbuches äussert sich SACHS über diesen Gegenstand folgendermaassen: »Die alljährlich wiederkehrende Erfahrung zeigt, dass die Risse in der Borke, zumal dickerer Bäume, am Ende des Winters, Februar und März, sich vertiefen und erweitern, offenbar in Folge der starken Quellung des Holzkörpers, der in dieser Zeit am wasserreichsten ist, während die Borke in der trockenen Winterluft Zeit hatte, stark auszutrocknen und sich zusammenzuziehen. Sind nun die Risse in Folge der starken so erzeugten Spannung erweitert, was man leicht an den frischen Rissflächen erkennt, so beginnt in Folge des feuchten Frühjahrswetters die Borke zu quellen, die Spannung zwischen ihr und dem Holz wird viel geringer, und jetzt beginnt von neuem die Holzbildung im Cambium; indem während des Sommers der Holzkörper dicker wird, trocknet auch die Borke aus und wird enger. Die Spannung zwischen aussen und innen wächst

¹ SACHS, Lehrbuch der Botanik. 1. Aufl. 1868.

² SACHS, Lehrbuch der Botanik. 4. Aufl. 1874.

abermals, um im folgenden Frühjahr wieder sich auszugleichen. S entsteht nicht nur eine jährliche Periode der Querspannung, sondern diese ist auch, wie wir unten sehen werden, die Ursache der Bildung von Frühjahrs- und Herbstholz in den Jahreslagen des Holzkörpers.

Diesen Erörterungen gegenüber ist wohl die Bemerkung am Platze, dass es sich nicht empfiehlt, zur Orientirung über die Spannungsverhältnisse unserer Baumrinden Bäume oder Stellen solcher zum Ausgangspunkt der Betrachtung zu nehmen, an denen die Rinde bereits grössere Risse erhalten hat; denn wie sich die Druckwirkungen derselben nach dem Auftreten derartiger Veränderungen gestalten, darüber lassen sich a priori, ohne specielle Untersuchungen, gar keine festen und zuverlässigen Anhaltspunkte gewinnen. Um eine sichere, solide Basis zu haben, ist es wohl naturgemässer, die Untersuchungen mit solchen Objecten zu beginnen, deren Rinde noch keine die Spannungsverhältnisse wesentlich alterirende Veränderungen erlitten hat, wo daher auch die Verhältnisse für eine mechanische Erörterung des Gegenstandes möglichst einfacher Natur sind. Derartige Objecte sind auch gar nicht selten; bei unsern sämtlichen Bäumen ist die Rinde bis zu einem bestimmten Alter noch fast vollständig vorhanden. Es ist nun gar nicht einzusehen, wie an solchen Organen eine jährliche Periode der Querspannung in der von SACHS geschilderten Weise entstehen soll, und doch werden Jahrringe von gewöhnlichem Bau gebildet. So sind, um nur ein Beispiel anzuführen, bei *Pinus silvestris* und *Picea excelsa* bis zur Bildung des dritten oder vierten Jahrringes in der Beschaffenheit der Rinde noch keinerlei Veränderungen eingetreten, wie schon daraus hervorgeht, dass die Nadeln an diesen Trieben noch vorhanden sind. Es muss hier also offenbar der Cambiumring, da die Rinde im Laufe des Winters thatsächlich keine nachweisbaren Veränderungen erfährt, im Frühling seine Thätigkeit unter annähernd demselben Drucke beginnen, unter welchem er im Herbst seine Arbeit einstellte.

Dieselben Erwägungen lassen sich in Bezug auf excentrisch gebaute Holzkörper machen, bei denen die ungleiche Wachsthumintensität an den verschiedenen Seiten von dem jeweilig herrschenden Rinden-druck abhängig sein soll. Es ist jedem Botaniker bekannt, dass bei unregelmässig gebauten Ästen oder Bäumen das maximale resp. minimale Wachsthum öfter von einem Punkte des Umfanges nach einem andern hinübrückt. Eine derartige Änderung in der Wachsthumintensität, die sogar während der Ausbildung ein und desselben Jahrringes stattfinden kann, vollzieht sich auch an Objecten, deren Rinde noch vollständig vorhanden ist. Will man sich hier a priori eine Vorstellung von den Ursachen dieser Unregelmässigkeit im Wach-

thum des Cambiumringes machen, dann ist es doch natürlicher, den Sitz derselben nicht in einem veränderlichen Rindendruck, — denn es ist nicht einzusehen, woher diese Veränderlichkeit bei unverletzter Rinde kommen soll — sondern anderswo zu suchen.

Nachdem SACHS seine Vermuthung über die Ursachen der Jahrringbildung ausgesprochen hatte, wurden im Jahre 1872 von H. DE VRIES¹ einige Experimente angestellt, aus denen derselbe eine Bestätigung jener Vermuthung ableitete. H. DE VRIES beobachtete nämlich, dass sich in Folge von Rindeneinschnitten, welche im Herbst gemacht wurden, Frühjahrsholz bildete, und dass unter einer im Frühjahr um junge Bäumäste gemachten Ligatur Herbstholz zur Ausbildung gelangte. In den folgenden Jahren² erweiterte er seine Untersuchungen noch und veröffentlichte dieselben in einer 1876 erschienenen Abhandlung.³ Das Ergebniss derselben ist auf Seite 3 in folgenden Sätzen enthalten:

1. Der radiale Durchmesser der Libriformzellen (*fibres ligneuses*) ist von dem während ihrer Entstehung ausgeübten Rindendruck abhängig; je grösser dieser Druck ist, desto kleiner ist der radiale Durchmesser.
2. Die Zahl und die Weite der Gefässe in einer Holzschicht ist abhängig von dem Rindendruck, unter welchem diese Holzschicht entsteht; je grösser dieser Druck ist, desto kleiner ist die Zahl und der Durchmesser der Gefässe.

Wir begnügen uns hier mit einer blossen Erwähnung des Resultats, zu dem H. DE VRIES durch seine Experimente gekommen zu sein glaubt, und kommen später ausführlicher darauf zurück.

Ablenkung der Markstrahlen.

Es ist eine allgemeine Thatsache, dass bei excentrischen Ästen und Bäumen die Markstrahlen nicht, wie bei regelmässig gebauten Organen, die Jahrringe rechtwinklig durchsetzen, sondern stets eine Ablenkung nach der Seite maximalen Wachstums zeigen. Die Ursache dieser Erscheinung liegt nach SACHS⁴ in einer Verschiedenheit des Rindendruckes, welcher an der Seite geringsten Wachstums am grössten sein soll. In Folge hiervon sollen die Markstrahlen nach der Zone maximalen Wachstums »hinübergedrängt« werden.

¹ H. DE VRIES, Über den Einfluss des Druckes auf die Ausbildung des Herbstholzes. Flora 1875 S. 241.

² H. DE VRIES, Über den Einfluss des Rindendruckes auf den anatomischen Bau des Holzes. Flora 1875, S. 97.

³ *De l'influence de la pression du liber sur la structure des couches ligneuses annuelles. Extrait des Archives Néerlandaises, T. XI) 1876.*

⁴ SACHS, Über Zellenanordnung und Wachsthum. Arb. d. bot. Inst. in Würzb. und II, S. 194. (1879).

SCHWENDENER,¹ dem es nur darauf ankam, den Beweis zu liefern, dass die Entstehung orthogonaler Trajectorien durch die Wachsthum^sverhältnisse bedingt sei, verlegt aus theoretischen Gründen die Ursache des unregelmässigen Dickenwachsthums in den Cambiumring, dem gegenüber die Rinde sich passiv verhalten soll. Da hieraus nothwendig eine grössere Spannung der Rinde an der Zone maximalen Wachsthums folgt, so werden die Markstrahlen nach dieser Seite hin, nicht wie SACHS meint, geschoben, sondern gezogen.

In einer neueren Arbeit vertritt DETLEFSEN² wiederum die Ansicht von SACHS. Die KRAUS'sche Methode,³ aus der Contraction abgelöster Rindenstreifen auf die Spannungsintensität zu schliessen, mit Recht als unzuverlässig verwerfend, schlägt er selber zur Orientirung über diesen Gegenstand einen Weg ein, der noch um vieles unsicherer ist, als derjenige von KRAUS. Diese Behauptung kann nicht besser als mit des Verfassers eigenen Worten bewiesen werden. Seite 676 finden sich nämlich folgende Sätze: »Nicht selten findet man an älteren Ästen und Wurzeln, besonders wenn dieselben krumm gewachsen sind, ein ungleiches Verhalten der äusseren, nicht mehr wachsthumsfähigen Schichten (Periderm, Borke). Je glatter die Rinde ist, desto deutlicher tritt dasselbe hervor. Auf einer Seite des Astes ist die Rinde ganz glatt und blank, auf der andern ist sie durch feine quer verlaufende Runzeln uneben; ein Verhalten, das nur eine einzige Deutung zulässt: Die äussere Rindenschicht der glatten Seite ist stark gespannt, auf der andern Seite dagegen ist diese nicht mehr wachsende Schicht zu gross für das innere Gewebe, sie muss also, da sie sich von demselben nicht trennen kann, Falten erhalten.« Diese querverlaufenden Runzeln sind in Folge eines longitudinalen Druckes entstanden, und DETLEFSEN nimmt nun ohne Weiteres an, dass durch diesen Druck an der concav werdenden Seite eines Astes auch die Querspannung der Rinde vermindert werde. Dies wird aber in den concreten Fällen nicht bewiesen und ist voraussichtlich unrichtig.

Auf Seite 684 findet sich in Bezug auf die Rindenspannung dann noch folgender allgemeine Satz: »Jeder in beliebiger Richtung auf die Rinde wirkende Zug muss deren Gesamtspannung erhöhen, jedes Zusammendrücken derselben vermindert die Rindenspannung.« Theoretisch lässt sich hiergegen wenig einwenden; es fragt sich nur, wie

¹ SCHWENDENER, Über die durch Wachsthum bedingte Verschiebung kleinster Theilchen etc. Monatsbericht der Berl. Akad. der Wissenschaften, 1880.

² DETLEFSEN, Versuch einer mechanischen Erklärung des excentrischen Dickenwachsthums verholzter Achsen und Wurzeln. Arb. d. bot. Inst. in Würzb., Band II, Heft 4. 1882.

³ KRAUS, Die Gewebespannung des Stammes und ihre Folgen. Bot. Zeit. 1867, S. 105 ff.

ass die Änderung in der Rindenspannung, die durch Zug oder Druck beigeführt wird, in den einzelnen Fällen ist. Hierüber sagt aber DETLEFSEN nichts. Wenn abgelöste Rindenstücke, wie es in dem zehnten Satze heisst, in der Längsrichtung »keine merkliche Dimensionsänderung« zeigen, so ist diese Thatsache allerdings kein endgültiger Beweis für das Nichtvorhandensein einer Längsspannung; diese ist jedoch im Vergleich zur Querspannung so gering sein, dass man in der Praxis, ohne einen Fehler zu begehen, vernachlässigen kann.

Ausser den oben erwähnten Querrunzeln, unter denen stets eine stärkere Entwicklung des Holzkörpers beobachtet wurde, ist für DETLEFSEN auch die Ablenkung der Markstrahlen nach der maximalen Wachstumszone ein Beweis, dass an dieser Seite die Rindenspannung am geringsten ist. Die Arbeit SCHWENDENER's über diesen Gegenstand ist ihm entweder unbekannt geblieben, oder er hat dieselbe absichtlich nicht berücksichtigt, weil sie nicht in seinen a priori zurechtgelegten Gedankenkreis hineinpasste.

In dieser Weise fährt DETLEFSEN fort, Wachstumserscheinungen durch verschiedene Faktoren verursacht anzusehen, deren Vorhandensein weder er noch sonst jemand constatirt hat. Der grösste Rindendruck an der Seite des maximalen Wachstums ist für ihn eine bewiesene Thatsache, für die er in der letzten Hälfte seiner Abhandlung nach einer Erklärung sucht. Hierbei geht er aber nicht von Objecten aus, an denen die Druckwirkungen der Rinde möglichst einfacher Natur sind; er nimmt vielmehr die Ansatzstellen der Äste an Bäumen, also krumme, sattelförmige Stellen zum Ausgangspunkt seiner Betrachtung. Bei derartigen Flächen wird, auch wenn die Grösse der Rindenspannung nach irgend einer Methode zahlenmässig bekannt wäre, was bei DETLEFSEN nicht der Fall ist, die blosse Berechnung der Rindendruckwirkungen nach den verschiedenen Richtungen eine nicht ganz leichte Sache sein.

Aber nicht nur seine Untersuchungsmethode ist eine unzuverlässige, auch die Ergebnisse stehen mit der Wirklichkeit in auffallendem Widerspruch. S. 685 heisst es nämlich: »Es ist somit selbstverständlich, warum nach unten gebogene Äste immer excentrisch wachsen sind und zwar ist die Förderung des Dickenwachstums der Unterseite am beträchtlichsten an der Stelle der stärksten Krümmung.« Nun giebt es aber nach unten gebogene Lindenäste in Menge, die ihr Maximum ihres Zuwachses an der Krümmungsstelle nicht an der Unterseite, sondern an der Oberseite besitzen.

In einer grösseren Arbeit von KNY¹ »Über das Dickenwachsthum des Holzkörpers« wird auch die Rindenspannung excentrischer Organe

¹ KNY. Über das Dickenwachsthum des Holzkörpers in seiner Abhängigkeit von äusseren Einflüssen. Berlin 1882.

erörtert. Messungen, die nach der KRAUS'schen Methode ausgeführt wurden, machen es KNY wenigstens wahrscheinlich, dass der Rindendruck an der Seite minimalen Wachstums am grössten ist. In Bezug auf den Markstrahlenverlauf hat derselbe Autor die Beobachtung gemacht, dass zuweilen auch eine Ablenkung nach der Seite geringsten Wachstums vorkommt. Diese Verschiedenheit in der Ablenkung der Markstrahlen erklärt er in folgender Weise: „Diese Verschiedenheit in der Richtung der Markstrahlen an excentrisch gebauten Zweigen verlieren das auf den ersten Blick Befremdliche, wenn man erwägt, dass eine Ungleichheit der Transversalspannung zwischen Holz und Rindengewebe an Ober- und Unterseite eines Zweiges zwei einander entgegengesetzte und sich zum Theil aufhebende Wirkungen äussern muss. Einmal wird durch die Rindengewebe von dem Punkte stärkster Spannung aus auf die Zellen des Cambiums und ihre noch zartwandigen jüngsten Abkömmlinge ein Zug ausgeübt, welcher für sich allein zur Folge haben müsste, die Markstrahlen des jungen Holzkörpers nach der Richtung der stärksten Transversalspannung hin abzulenken. Andererseits wird jede Zelle des Cambiums, des jungen Holzes und der Markstrahlen das Bestreben haben, in der Richtung des geringsten Widerstandes zu wachsen. Für sich allein würde dies naturgemäss zu einer Ablenkung der Markstrahlen in der Richtung der geringsten Transversalspannung führen. Von der relativen Stärke beider bezeichneten Einflüsse und von anatomischen Bedingungen localer Art, welche sich zur Zeit der Beurtheilung entziehen, wird es abhängen, ob der Ausschlag im einzelnen Falle nach der einen oder anderen Richtung erfolgt.“ Wir werden später sehen, ob diese Ansicht richtig ist.

Aus Vorstehendem, welches nur das Wichtigste aus der Litteratur enthält, sieht man, dass unser Thema schon vielfach erörtert ist. Trotzdem aber ist die Rindenspannungsfrage ihrer Lösung auf empirischem Boden eigentlich um keinen Schritt näher geführt; denn wir sind auch heute noch im Unklaren darüber, ob und in welchem Maasse die Rindenspannung vom Frühling bis zum Herbst hin zunimmt, welche Rolle der Rindendruck bei der Entstehung der Jahrringe spielt, wie sich derselbe an excentrisch gebauten Organen gestaltet, ob er an der Seite maximalen oder minimalen Wachstums am grössten ist, ob daher die Ablenkung der Markstrahlen in Folge von Zug oder Schub stattfindet oder ob beides in Betracht kommen kann.

Diese Fragen zu lösen oder doch den Weg anzugeben, auf dem allein eine Lösung versucht werden kann, ist die Aufgabe, die ich mir im Folgenden gestellt habe. Bevor ich aber zur Darlegung

ner Resultate übergehe, entledige ich mich der angenehmen Pflicht, 1. Prof. Dr. SCHWENDENER für die vielfachen Unterstützungen, die selbe mir bei dieser Arbeit hat zu Theil werden lassen, meinen bindlichsten Dank abzustatten.

Untersuchungsmethode.

Um eine sichere Operationsbasis zu bekommen, musste ich vor 11 Dingen solche Objecte zum Ausgangspunkt meiner Messungen wählen, deren Rinde noch keine wesentlichen Veränderungen erfahren hatte. Eine derartige Rinde haben bis zu einem gewissen Alter vieleerer Holzgewächse, z. B. *Salix*, *Alnus*, *Populus*, *Fraxinus* u. s. w. Obgleich kleiner aber wird die mögliche Auswahl, sobald man Objecte wählt, deren Rinde so beschaffen ist, dass eine directe Messung ihrer Spannung ausgeführt werden kann. Abgesehen davon, dass diese bei einigen Rinden so gering ist, dass eine sichere Messung derselben nicht möglich ist, besitzen manche Bäume, z. B. Linde, Buche, Platan, eine Rinde, die bei den geringsten Verbiegung bricht. Sehr elastisches Material liefern dagegen die Nadelhölzer, deren Rinde sich gewöhnlich wie geschmeidiges Leder nach allen Richtungen biegen lässt; hieran schliessen sich die Salixarten, *Alnus*, *Fraxinus* u. s. w.

Was nun die Messungen betrifft, so führe ich dieselben in folgender Weise aus. Von irgend einem Baume oder Zweige, dessen Rinde die oben erwähnten Bedingungen erfüllt, werden Streifen von bestimmter Breite in der Querrichtung abgelöst. Einen solchen Rindenstreifen bringt man wiederum behutsam in seine frühere Lage zurück, dass er sich überall dicht an den Holzkörper anschliesst. Hierbei stellt sich heraus, dass bei der Mehrzahl unserer Holzgewächse der abgelöste Theil der Rinde nicht mehr die ursprüngliche Länge besitzt, sondern je nach der Art des Gewächses eine grössere oder geringere Verkürzung zeigt. Es ist nun ohne Weiteres klar, dass diejenige Rinde, die einen so verkürzten Rindenstreifen wieder auf seine ursprüngliche Länge auszudehnen vermag, das directe Maass seiner Spannung

Es kommt also darauf an, eine möglichst sichere Methode zur Bestimmung dieser Kraft zu finden. Bei den Nadelhölzern, deren Rinde, wie bereits erwähnt, sehr biegsam ist, stösst man hierbei auf keine Schwierigkeiten. Man giebt einfach die Verkürzung eines Rindenstreifens von bestimmter Breite mittelst eines Zirkels auf einem Blatt Papier so genau als möglich an und schneidet dann den Streifen an der Stelle, bis zu welcher er vom Holzkörper losgetrennt wurde ab. Nun wird das eine Ende des Rindenstreifens mittelst

einer Klemmschraube festgehalten, während das andere Ende mit einer Zange gefasst oder ebenfalls in einer Klemmschraube befestigt wird, jedoch so beschaffen sein muss, dass sich Gewichte an ihr anbringen lassen. Hierauf zieht man den Streifen gerade — sofern dies nicht schon durch sein Eigengewicht und das Gewicht der Zange oder Klemmschraube geschehen ist — und misst mit einem Zirkel seine Länge, d. h. die Entfernung von der Zange bis zum Befestigungspunkte. Nachdem dann die Zirkelöffnung noch genau um das Maass der Verkürzung des Rindenstreifens erweitert ist, werden so lange Gewichte an dem einen Ende desselben angehängt, bis seine Länge genau der Zirkelöffnung entspricht. Tritt dieser Moment ein, dann wird die Grösse des angehängten Gewichts notirt.

Bei denjenigen Bäumen, deren Rinde sich nicht so leicht, wie bei den Nadelhölzern, gerade ziehen lässt, oder wo nach einer solchen Manipulation die Messung fehlerhaft werden würde, muss man in anderer Weise zum Ziele zu gelangen suchen. Ich verfähre folgendermassen. Aus einer Anzahl von Scheiben aus trockenem Holz von etwa 2^{cm} Dicke und von verschiedener Grösse wähle ich jedesmal diejenige aus, die ungefähr den gleichen Umfang hat, wie der Ast oder Baum, dessen Rindenspannung gemessen werden soll. Auf der Peripherie dieser in einem Schraubstock oder sonstwie befestigten Scheibe wird das eine Ende eines abgelösten Rindenstreifens vermittelst einer Schraubenvorrichtung

Fig. 1.



(siehe Fig. 1 bei a) festgehalten, während das andere Ende, wie im ersten Falle, mit einer Zange gefasst oder in einer Klemmschraube (Fig. 1 bei b) befestigt wird. Hierauf wird die Länge des Rindenstreifens von der Zange bis zur Schraubenvorrichtung mit einem guten Millimeterbände oder dem Zirkel gemessen, mit diesem so, dass man ihn auf 10 bis 15^{mm} erweitert und diese Länge auf dem bogenförmigen Rindenstreifen successive abschlägt.

Die hier angegebene Methode ist zwar etwas umständlich, gewährt aber dafür den Vortheil, dass die Rinde fast gar keine Formveränderungen erfährt.

Bevor man aber die Messung durch Anhängen von Gewichten vornimmt, muss noch für die Aufhebung der Reibung so viel als

möglich gesorgt werden. Diese wird fast vollständig dadurch beseitigt, dass man zwischen Rinde und Scheibe kleine Walzen aus trockenem Holz oder noch besser Glasstäbchen einschiebt. Da verhältnissmässig grosse Gewichte in Anwendung kommen, um einen Rindenstreifen um einige Millimeter auszudehnen, so kann übrigens die Reibung keine bedeutende Rolle spielen. Bestreicht man die Peripherie der Holzscheiben mit Oel oder Seife, so können die beweglichen Glaswalzen ruhig fortgelassen werden.

Um zu wissen, welchen Unterschied es macht, ob man die Spannung der Rinde misst, indem man sie einfach gerade zieht oder über eine Scheibe spannt und zwar mit und ohne Zuhülfenahme der Walzen, habe ich eine Anzahl Controlversuche angestellt, indem Streifen von demselben Baum oder Ast nach allen drei Methoden gemessen wurden. Da sich eine nennenswerthe Differenz in der Grösse des angewandten Gewichts hierbei nicht herausgestellt, so habe ich, wo es anging, die erstere, weil einfachere Methode gewählt. Dass auch die Spannung der Rindenstreifen, ohne sie abzuschneiden, direkt am Baume gemessen werden kann, versteht sich von selbst. Ich habe es nur deshalb nicht gethan, weil diese Methode viel umständlicher ist, als die von mir geschilderten.

So einfacher Natur nun auch diese Versuche sind, so halte ich sie doch in Bezug auf die Sicherheit des Resultates für durchaus zuverlässig. Durch Anwendung complicirterer Apparate, zu denen ich anfänglich meine Zuflucht nahm, werden nur noch die Fehlerquellen vergrössert. So hat es z. B. wenig Werth, einen Messapparat anzuwenden, der eine Genauigkeit von 0.01^{mm} besitzt, wenn die Fehler der Einstellung, die mit solchen Versuchen verknüpft sind, ein Multipulum dieser Grösse betragen und unter Umständen 0.4^{mm} erreichen.

In der Angabe der Contractionsgrösse bin ich selten über 0.5^{mm} hinausgegangen. Dafür wurde aber, sobald ich mich über die Rindenspannung eines Baumes oder Astes orientiren wollte, stets eine grössere Anzahl von Streifen gemessen, und aus den erhaltenen Werthen das Mittel genommen.

Ich lasse hier nun eine Reihe von Tabellen folgen, in denen die Ergebnisse der Messungen enthalten sind. Ausser einer fortlaufenden Nummer ist noch mit römischen Ziffern die Zusammengehörigkeit der Tabellen bezeichnet, die die Spannungswerthe verschiedener Stellen desselben Baumes oder Astes enthalten. Die letzte Columnne enthält in Grammen die Grösse des Gewichts, welches zur Ausgleichung der Contraction erforderlich war. Der Radius bezieht sich auf die Dicke des Holzkörpers ohne Rinde.

I.

Regelmässig gebaute Organe.

Bildung der Jahrringe.

Tabelle 1.

Larix europaea.

Versuch vom 30. Mai 1882.

I.

No.	Dicke	Breite	Länge	Con- traction	Gewicht	Bemerkungen.
	mm.	mm.	mm.	mm.	Gramm.	
1.	2—2.5	15	60	2	2000	Die Versuchsstreifen wurden von einem regelmässig gewachsenen jungen Baume genommen. Der Radius des Holzkörpers betrug an der Stelle, von der die Streifen für diese Tabelle genommen wurden, 18 ^{mm} .
2.	"	"	"	2.5	2000	
3.	"	"	"	2.5	2000	
4.	"	"	"	2	2000	
5.	"	"	"	2	2000	
Summa:				11	10000	
Mittel:				2.2	2000	

Spannung eines Streifens von 1^{mm} Breite = 133.3 Gramm.

Contraction = 3.66%.

Tabelle 2.

Larix europaea.

Versuch vom 30. Mai 1882.

II.

No.	Dicke	Breite	Länge	Con- traction	Gewicht	Bemerkungen.
	mm.	mm.	mm.	mm.	Gramm.	
1.	1—1.5	15	40	1	1500	Die Versuchsstreifen wurden von einer höheren Stelle desselben Baumes, wie in I. genommen. Der Radius war hier 12 ^{mm} lang.
2.	"	"	40	1.5	1500	
3.	"	"	45	1.5	1500	
4.	"	"	45	1	1500	
5.	"	"	50	1	1500	
Summa:			220	6	7500	
Mittel:			44	1.2	1500	

Spannung eines Streifens von 1^{mm} Breite = 100 Gramm.

Contraction = c. 3%.

Tabelle 3.

Picea excelsa.

Versuch vom 7. Juni 1882.

I.

No.	Dicke mm.	Breite mm.	Länge mm.	Con- traction mm.	Gewicht Gramm.	Bemerkungen.
1.	3—3.5	15	100	2.5	3500	Die Streifen wurden von einer Tanne genommen, die an der Basis 93 ^{cm} Umfang hatte. Die Streifen für diese Tabelle sind etwa in $\frac{2}{3}$ ihrer Höhe von der Basis genommen. Der Radius war 50 ^{mm} lang.
2.	"	"	100	2.5	3500	
3.	"	"	100	2.5	3500	
Mittel:			100	2.5	3500	

Spannung eines Streifens von 1^{mm} Breite = 233.3 Gramm.

Contraction = 2.5 %.

Tabelle 4.

Picea excelsa.

Versuch vom 7. Juni 1882.

II.

No.	Dicke mm.	Breite mm.	Länge mm.	Con- traction mm.	Gewicht Gramm.	Bemerkungen.
1.	4—5	15	100	2	4500	Die Versuchsstreifen dieser Tabelle stammen von einer tieferen Stelle desselben Baumes wie in I. Der Radius hatte 86 ^{mm} Länge.
2.	"	"	100	2	4500	
3.	"	"	100	2	5000	
Summa:				6	14000	
Mittel:				2	4700	

Spannung eines Streifens von 1^{mm} Breite = 313.3 Gramm.

Contraction = 2 %.

Tabelle 5.

Alnus glutinosa.

Versuch vom 20. Juni 1882.

I.

No.	Dicke mm.	Breite mm.	Länge mm.	Con- traction mm.	Gewicht Gramm.	Bemerkungen.
1.	1—1.5	15	50	1.25	2200	Der Baum, dessen Spannungswerte in I, II und III enthalten sind, hatte 34 ^{cm} Umfang und etwa 8 ^m Höhe. Die Streifen dieser Tabelle stammen aus der Krone. Radius = 12 mm.
2.	"	"	"	1.25	2500	
3.	"	"	"	1.25	2400	
4.	"	"	"	1.25	2500	
Summa:				5	9600	
Mittel:				1.25	2400	

Spannung eines Streifens von 1^{mm} Breite = 160 Gramm.

Contraction = 2.5 %.

Tabelle 6.

Alnus glutinosa.

Versuch vom 20. Juni 1882.

II.

No.	Dicke mm.	Breite mm.	Länge mm.	Con- traction mm.	Gewicht Gramm.	Bemerkungen.
1.	2—2.5	15	100	2	3500	Die Streifen für diese Tabelle sind von demselben Baume wie in I genommen, etwa in $\frac{1}{3}$ seiner Höhe von der Basis. Radius = 34 mm.
2.	"	"	100	2	3500	
3.	"	"	100	2	3500	
Mittel:			100	2	3500	

Spannung eines Streifens von 1^{mm} Breite = 233.3 Gramm.

Contraction = 2 %.

Tabelle 7.

Alnus glutinosa.

Versuch vom 20. Juni 1882.

III.

No.	Dicke mm.	Breite mm.	Länge mm.	Con- traction mm.	Gewicht Gramm.	Bemerkungen.
1.	3.5	15	100	2	4100	Die Rindenstreifen wurden von dem basalen Theile desselben Baumes wie in I und II genommen. Radius = 47 ^{mm} .
2.	"	15	100	2	4100	
3.	"	15	100	2	4100	
Mittel:			100	2	4100	

Spannungsgrösse eines Streifens von 1^{mm} Breite = 273.3 Gramm.

Contraction = 2%.

Tabelle 8.

Populus alba.

Versuch vom 21. Juni 1882.

I.

No.	Dicke mm.	Breite mm.	Länge mm.	Con- traction mm.	Gewicht Gramm.	Bemerkungen.
1.	2	15	80	1.5	3000	Der Baum hatte 45 ^{cm} Umfang und 11—12 ^m Höhe. Die Rindenstreifen für diese Tabelle stammen aus der Krone. Radius = 18 ^{mm} .
2.	"	"	80	1.5	3000	
3.	"	"	80	1.5	3000	
Mittel:				1.5	3000	

Spannungsgrösse eines Streifens von 1^{mm} Breite = 200 Gramm.

Contraction = 1.9%.

Tabelle 9.

Populus alba.

Versuch vom 21. Juni 1882.

II.

No.	Dicke	Breite	Länge	Con- traction	Gewicht	Bemerkungen.
	mm.	mm.	mm.	mm.	Gramm.	
1.	2—2.2	15	90	1.75	3000	Die Versuchsstreifen wurden von einer tieferen Stelle desselben Baumes wie in I genommen. Radius des Holzkörpers = 24 ^{mm} .
2.	"	"	90	1.75	3100	
3.	"	"	90	1.75	3200	
4.	"	"	90	1.75	3100	
5.	"	"	90	1.75	3100	
Summa:					15500	
Mittel:					3100	

Spannungsgrösse eines Streifens von 1^{mm} Breite = 206.6 Gramm.

Contraction = c. 2⁰/₁₀.

Tabelle 10.

Populus alba.

Versuch vom 21. Juni 1882.

III.

No.	Dicke	Breite	Länge	Con- traction	Gewicht	Bemerkungen.
	mm.	mm.	mm.	mm.	Gramm.	
1.	3	15	90	1.75	3800	Die Versuchsstreifen sind etwa v der Mitte desselben Baumes v in I und II genommen. Rad = 48 ^{mm} .
2.	"	15	90	1.75	3800	
3.	"	15	90	1.75	3800	
Mittel:				1.75	3800	

Spannungsgrösse eines Streifens von 1^{mm} Breite = 253.3 Gramm.

Contraction = c. 2⁰/₁₀.

Tabelle 11.

Pinus silvestris.

Versuch vom 10. Juni 1882.

I.

No.	Dicke mm.	Breite mm.	Länge mm.	Con- traction mm.	Gewicht Gramm.	Bemerkungen.
1.	1—1.5	15	40	1.5	1000	Die Kiefer hatte 43 ^{cm} Umfang und etwa 10 ^m Höhe. Die Versuchsstreifen dieser Tabelle wurden aus der Krone genommen. Radius = 10 ^{mm} .
2.	"	"	40	2	1100	
3.	"	"	40	1.5	1000	
4.	"	"	40	2	1100	
5.	"	"	40	2	1100	
Summa:				9	5300	
Mittel:				1.8	1060	

Spannungsgrösse eines Streifens von 1^{mm} Breite = 70.6 Gramm.

Contraction = 4.5%.

Tabelle 12.

Pinus silvestris.

Versuch vom 10. Juni 1882.

II.

No.	Dicke mm.	Breite mm.	Länge mm.	Con- traction mm.	Gewicht Gramm.	Bemerkungen.
1.	2	15	70	3	900	Derselbe Baum wie in I. Die Rindenstreifen wurden von einer tieferen Stelle genommen. Radius?
2.	"	"	"	3	1150	
3.	"	"	"	3	1150	
4.	"	"	"	3	1100	
Summa:				12	4300	
Mittel:				3	1075	

Spannungsgrösse eines Streifens von 1^{mm} Breite = c. 72 Gramm.

Contraction = 4.3%.

Tabelle 13.

Pinus silvestris.

Versuch vom 10. Juni 1882

III.

No.	Dicke mm.	Breite mm.	Länge mm.	Con- traction mm.	Gewicht Gramm.	Bemerkungen.
1.	?	15	85	3	1200	Derselbe Baum, wie in I und II. Die Streifen stammen von einer tieferen Stelle. Radius = 25 mm.
2.		15	85	3	1300	
3.		"	85	3	1100	
4.		"	85	3	1200	
5.		"	85	3	1200	
Summa:				15	6000	
Mittel:				3	1200	

Spannungsgrösse eines Streifens von 1^{mm} Breite = 80 Gramm.

Contraction = 3.5 %.

Tabelle 14.

Pinus silvestris.

Versuch vom 10. Juni 1882.

IV.

No.	Dicke mm.	Breite mm.	Länge mm.	Con- traction mm.	Gewicht Gramm.	Bemerkungen.
1.	?	15	110	4	1150	An dieser Stelle hatte die Borke- bildung begonnen; die Dicke der Rinde variierte zwischen 0.5 und 3 mm. Radius = 34 mm. Derselbe Baum wie in I, II und III.
2.		"	110	4	1100	
3.		"	110	4	1200	
Summa:				12	3450	
Mittel:				4	1150	

Spannungsgrösse eines Streifens von 1^{mm} Breite = c. 77 Gramm.

Contraction = 3.6 %.

Tabelle 15.

Pinus silvestris.

Versuch vom 10. Juni 1882.

V.

No.	Dicke	Breite	Länge	Con- traction	Gewicht	Bemerkungen.
	mm.	mm.	mm.	mm.	Gramm.	
1.	0.5—2	15	100	3.5	900	Wegen der Borkebildung war die Dicke der Rinde variabel, 0.5—2 mm. Radius = 40 mm. Dieselbe Kiefer wie in I, II, III und IV. Die Streifen stammen etwa von der Mitte des Baumes.
2.	"	"	100	3	800	
3.	"	"	100	3.5	900	
4.	"	"	100	3	900	
5.	"	"	100	3	900	
Summa:				16	4400	
Mittel:				3.2	880	

Spannungsgrösse eines Streifens von 1^{mm} Breite = 59 Gramm.

Contraction = 3.2 %.

Tabelle 16.

Fraxinus excelsior.

Versuch vom 6. Juni 1882.

I.

No.	Dicke	Breite	Länge	Con- traction	Gewicht	Bemerkungen.
	mm.	mm.	mm.	mm.	Gramm.	
1.	2	15	65	2	3500	Der Versuchsst wuchs vom Stamme aus im Bogen nach oben. Seine äussere dem Stamm abgekehrte Seite war stark gewölbt, während die innere dem Stamme zugekehrte Seite flach war. Die Streifen dieser Tabelle stammen von der äussern convexen Seite.
2.	"	"	65	1.5	3500	
3.	"	"	65	2	4000	
4.	"	"	65	2	4000	
5.	"	"	65	1.5	3500	
Summa:				9	18500	
Mittel:				1.8	3700	

Spannungsgrösse eines Streifens von 1^{mm} Breite = 247 Gramm.

Contraction = 3 %.

Tabelle 17.

Fraxinus excelsior.

Versuch vom 6. Juni 1882.

II.

No.	Dicke	Breite	Länge	Con- traction	Gewicht	Bemerkungen.
	mm.	mm.	mm.	mm.	Gramm.	
1.	2	15	60	2	3500	Derselbe Ast wie in I. Die Ver- suchsstreifen wurden von der innern flachen Seite desselben genommen.
2.	»	»	60	1.5	3300	
3.	»	»	60	1.5	3300	
4.	»	»	60	2	3500	
5.	»	»	60	2	3500	
Summa:				9	17100	
Mittel:				1.8	3400	

Spannungsgrösse eines Streifens von 1^{mm} Breite = 227 Gramm.

Contraction = 3 %.

Tabelle 18.

Salix fragilis.

Versuch vom 5. Mai 1883

I.

No.	Dicke	Breite	Länge	Con- traction	Gewicht	Bemerkungen.
	mm.	mm.	mm.	mm.	Gramm.	
1.	1.5	12	70	2	2000	An der Stelle, von welcher die Versuchsstreifen für diese Ta- belle genommen wurden, betrug der Radius des Holzkörpers 26 ^{mm} .
2.	»	»	70	2	2200	
3.	»	»	80	2	2100	
4.	»	»	80	2	2300	
5.	»	»	80	2	2200	
6.	»	»	80	2.5	2500	
7.	»	»	85	2	2700	
8.	»	»	85	2.5	2800	
9.	»	»	85	2.5	2400	
10.	»	»	85	2.5	2500	
Summa:			800	22	23700	
Mittel:			80	2.2	2370	

Spannung eines 1^{mm} breiten Streifens = 200 Gramm.

Contraction = 2.75 %.

Tabelle 19.

Salix fragilis.

Versuch vom 5. Mai 1882.

II.

No.	Dicke	Breite	Länge	Con- traction	Gewicht	Bemerkungen.
	mm.	mm.	mm.	mm.	Gramm.	
1.	1.5	12	55	1.5	1500	Derselbe Ast, wie in I. Die Streifen wurden von einer jüngeren, dünneren Stelle genommen. Radius = 16 mm.
2.	»	»	50	1.5	1600	
3.	»	»	60	1.5	1600	
4.	»	»	55	1.5	1600	
5.	»	»	55	1.5	1500	
6.	»	»	50	1.5	1600	
7.	»	»	55	1.5	1600	
8.	»	»	50	1.5	1600	
9.	»	»	60	1.5	1500	
10.	»	»	50	1.5	1500	
Summa:			540	15	15600	
Mittel:			54	1.5	1560	

Spannung eines 1 mm breiten Streifens = 130 Gramm.

Contraction = 2.8%.

Tabelle 20.

Castanea vesca.

Versuch vom 1. Juni 1882.

I.

No.	Dicke	Breite	Länge	Con- traction	Gewicht	Bemerkungen.
	mm.	mm.	mm.	mm.	Gramm.	
1.	3—4	15	80	2	4000	Ein regelmässig gebauter Ast. Radius des Holzkörpers = 17 mm.
2.	»	»	80	2.5	4500	
3.	»	»	80	2.5	4500	
Summa:				7	13000	
Mittel:				2.3	4333	

Spannung eines 1 mm breiten Streifens = 290 Gramm.

Contraction = c. 3%.

Tabelle 21.

Castanea vesca.

Versuch vom 1. Juni 1882.

II.

No.	Dicke mm.	Breite mm.	Länge mm.	Con- traction mm.	Gewicht Gramm.	Bemerkungen.
1.	4—5	15	80	2.5	7000	Die Streifen wurden von einem älteren Theil desselben Astes wie in I. genommen. Radius = 29 mm.
2.	"	"	"	2.5	7000	
3.	"	"	"	2.5	7000	
4.	"	"	"	2.5	7000	
Mittel:				2.5	7000	

Spannung eines Streifens von 1^{mm} Breite = 466.6 Gramm.

Contraction = 3%.

Tabelle 22.

Fraxinus excelsior.

Versuch vom 13. Juni 1882.

I.

No.	Dicke mm.	Breite mm.	Länge mm.	Con- traction mm.	Gewicht Gramm.	Bemerkungen.
1.	1.5—2	15	50	1.5	2900	Der Werth in No. 4 (3200 Gramm) wurde für einen Streifen gefunden, der von einer concav gebogenen Stelle des Astes, an welcher die Rinde Querrunzeln hatte, stammt. Radius = 18 mm.
2.	"	"	50	1.5	2900	
3.	"	"	50	1.5	2900	
4.	"	"	50	1.5	3200	
Summa:				6	11900	
Mittel:				1.5	3000 (2980)	

Spannung eines 1^{mm} breiten Streifens = 200 Gramm.

Contraction = 3%.

Tabelle 23.*Fraxinus excelsior.*

Versuch vom 13. Juni 1882.

II.

No.	Dicke mm.	Breite mm.	Länge mm.	Con- traction mm.	Gewicht Gramm.	Bemerkungen.
1.	2	15	75	2	4100	Derselbe Ast wie in I. Die Streifen wurden von einer tieferen Stelle genommen. Radius = 25 mm.
2.	"	"	75	2	4200	
3.	"	"	75	2	4200	
Summa:				6	12500	
Mittel:				2	4166	

Spannung eines 1^{mm} breiten Streifens = 280 Gramm.

Contraction = 2.66%.

Tabelle 24.*Salix pentandra.*

Versuch vom 4. Juni 1882.

I.

No.	Dicke mm.	Breite mm.	Länge mm.	Con- traction mm.	Gewicht Gramm.	Bemerkungen.
1.	2	15	60	2	2100	Ein vom Stamm aus in ziemlich scharfem Bogen nach oben wachsender Ast. Die Streifen wurden von der äusseren stark gewölbten Seite des Astes genommen. Radius 25 mm.
2.	"	"	60	2	2100	
3.	"	"	60	2	2100	
4.	"	"	60	2	2300	
Summa:				8	8600	
Mittel:				2	2150	

Spannung eines 1^{mm} breiten Streifens = 143.3 Gramm.

Contraction = 3.3%.

Tabelle 25.

Salix pentandra.

Versuch vom 4. Juni 1882.

II.

No.	Dicke mm.	Breite mm.	Länge mm.	Con- traction mm.	Gewicht Gramm.	Bemerkungen.
1.	2	15	60	2	2100	Derselbe Ast wie in I. Die Streifen wurden von der inneren flachen Seite des Astes genommen.
2.	»	»	»	1.5	1900	
3.	»	»	»	2	2300	
4.	»	»	»	2	2000	
Summa:				7.5	8300	
Mittel:				1.9	2100 (2075)	

Spannung eines 1^{mm} breiten Streifens = 140 Gramm.

Contraction = 3%.

Tabelle 26.

Pinus Strobus.

Versuch vom 10. August 1882.

I.

No.	Dicke mm.	Breite mm.	Länge mm.	Con- traction mm.	Gewicht Gramm.	Bemerkungen.
1.	2.25	15	80	3.5	1300	Die Versuchsstreifen wurden von einem etwa 10 ^m hohen und 50 ^m dicken Baume genommen. Die Streifen für diese Tabelle stamme aus der Krone. Radius = 11 ^m
2.	»	»	80	3.5	1300	
3.	»	»	90	4	1300	
4.	»	»	90	4	1300	
5.	»	»	90	4	1300	
Summa:			430	19	6500	
Nittel:			86	3.8	1300	

Spannung eines 1^{mm} breiten Streifens = 86.6 Gramm.

Contraction = 4.4%.

Tabelle 27.

Pinus Strobus.

Versuch vom 10. August 1882.

II.

No.	Dicke mm.	Breite mm.	Länge mm.	Con- traction mm.	Gewicht Gramm.	Bemerkungen.
1.	2.5	15	130	5	1900	Die Versuchsstreifen dieser Tabelle stammen von einer tieferen Stelle desselben Baumes wie in I. Radius = 25 mm.
2.	»	»	135	5.5	2000	
3.	»	»	135	5.5	1800	
4.	»	»	130	5	1900	
5.	»	»	130	5	1900	
Summa:			660	26	9500	
Mittel:			132	5.2	1900	

Spannung eines 1^{mm} breiten Streifens = 127 Gramm.Contraction = 4⁰/₀.

Tabelle 28.

Pinus Strobus.

Versuch vom 10. August 1882.

III.

No.	Dicke mm.	Breite mm.	Länge mm.	Con- traction mm.	Gewicht Gramm.	Bemerkungen.
1.	2.75	15	150	6	2600	Die Streifen stammen von der Basis desselben Baumes wie im I. und II. Radius = 60 mm.
2.	»	»	150	6	2500	
3.	»	»	150	6	2600	
4.	»	»	150	6	2500	
5.	»	»	150	6	2500	
Summa:			750	30	12700	
Mittel:			150	6	2540	

Spannung eines 1^{mm} breiten Streifens = 170 Gramm.Contraction = 4⁰/₀.

Tabelle 29.

Salix Caprea.

Versuch vom 11. August 1882.

I.

No.	Dicke	Breite	Länge	Con- traction	Gewicht	Bemerkungen.
	mm.	mm.	mm.	mm.	Gramm.	
1.	1.5	15	65	1.5	2000	Ein etwa 10 ^m hoher Baum. Die Versuchsstreifen für diese Tabelle entstammen der Krone. Radius = 13 mm.
2.	"	"	65	1.5	2000	
3.	"	"	65	1.5	2000	

Spannung eines 1^{mm} breiten Streifens = 133.3 Gramm.

Contraction = 2.3⁰/₀.

Tabelle 30.

Salix Caprea.

Versuch vom 11. August 1882.

II.

No.	Dicke	Breite	Länge	Con- traction	Gewicht	Bemerkungen.
	mm.	mm.	mm.	mm.	Gramm.	
1.	2	15	100	2.5	3000	Derselbe Baum wie in I. Streifen sind von einer tiefe Stelle genommen. Radius = 22
2.	"	"	100	2.5	3000	
3.	"	"	100	2.5	3000	
4.	"	"	100	2.5	3000	

Spannung eines 1^{mm} breiten Streifens = 200 Gramm.

Contraction = 2.5⁰/₀.

Tabelle 31.

Salix Caprea.

Versuch vom 11. August 1882.

III.

No.	Dicke	Breite	Länge	Con- traction	Gewicht	Bemerkungen.
	mm.	mm.	mm.	mm.	Gramm.	
1.	2.75	15	135	3	3700	Derselbe Baum wie in I und II. Die Versuchsstreifen stammen etwa aus der Mitte. Radius = 38mm.
2.	"	"	130	3	3700	
3.	"	"	135	3	3700	
Summa:			400	9	11100	
Mittel:			133	3	3700	

Spannung eines 1^{mm} breiten Streifens = 247 Gramm.

Contraction = 2.26 %.

Tabelle 32.

Sorbus aucuparia.

Versuch vom 12. August 1882.

No.	Dicke	Breite	Länge	Con- traction	Gewicht	Bemerkungen.
	mm.	mm.	mm.	mm.	Gramm.	
1.	2—3	15	75	2	4500	Ein etwa 12 ^m hoher Baum. Die Versuchsstreifen stammen aus der Nähe der Basis. In der Krone war die Rinde nicht mehr ab- lösbar. Radius = 54mm.
2.	"	"	75	2	4500	

Spannung eines 1^{mm} breiten Streifens = 300 Gramm.

Contraction = 2.66 %.

Tabelle 33.

Aesculus Hippocastanum.

Versuch vom 7. August 1882

I.

No.	Dicke mm.	Breite mm.	Länge mm.	Con- traction mm.	Gewicht Gramm.	Bemerkungen.
1.	?	15	55	1.5	2800	Ein aufrecht wachsender Ast. Ra- dius = 13 mm.
2.	»	»	55	1.5	3000	
3.	»	»	60	1.5	3000	
Summa:			170	4.5	8800	
Mittel:			57	1.5	2933	

Spannung eines 1^{mm} breiten Streifens = 195.5 Gramm.

Contraction = 2.63%.

Tabelle 34.

Aesculus Hippocastanum.

Versuch vom 7. August 1882

II.

No.	Dicke mm.	Breite mm.	Länge mm.	Con- traction mm.	Gewicht Gramm.	Bemerkungen.
1.	?	15	80	2	3500	Derselbe Ast wie in I. Ra- dius = 19.5 mm.
2.	»	»	80	2	3500	
3.	»	»	80	2	3500	

Spannung eines 1^{mm} breiten Streifens = 233.3 Gramm.

Contraction = 2.5%.

Tabelle 35.

Pinus silvestris.

Versuch vom 9. August 1882.

I.

No.	Dicke	Breite	Länge	Con- traction	Gewicht	Bemerkungen.
	mm.	mm.	mm.	mm.	Gramm.	
1.	2	15	60	2.5	1400	Die Kiefer hatte etwa 10 ^m Höhe und 45 ^{cm} Umfang. Die Versuchsstreifen stammen aus der Krone. Radius = 14 ^{mm} .
2.	"	"	60	2.5	1400	
3.	"	"	60	2.5	1400	

Spannung eines 1^{mm} breiten Streifens = 93.3 Gramm.Contraction = 4⁰/₀.

Tabelle 36.

Pinus silvestris.

Versuch vom 9. August 1882.

II.

No.	Dicke	Breite	Länge	Con- traction	Gewicht	Bemerkungen.
	mm.	mm.	mm.	mm.	Gramm.	
1.	3	15	100	4	1500	Die Versuchsstreifen stammen von einer tieferen Stelle desselben Baumes wie in I. Radius = 27 ^{mm} .
2.	"	"	100	4	1700	
3.	"	"	100	4	1600	
4.	"	"	100	4	1500	
5.	"	"	100	4	1700	
Summa:					8000	
Mittel:					1600	

Spannung eines 1^{mm} breiten Streifens = 107 Gramm.Contraction = 4⁰/₀.

Tabelle 37.*Fraxinus excelsior.*

Versuch vom 13. August 1882.

No.	Dicke	Breite	Länge	Con- traction	Gewicht	Bemerkungen.
	mm.	mm.	mm.	mm.	Gramm.	
1.	?	15	85	1.5	3800	Der Ast war krumm gebogen und hatte an der concaven Seite Querrunzeln. Die Werthe a und b gelten für Streifen von der runzeligen Seite des Astes. Radius = 21 mm.
2.		"	85	1.5	3500	
3.		"	70	1.5	3500	
4.		"	70	1.5	a 4000	
5.		"	75	1.5	b 4000	
6.		"	75	1.5	3500	
Summa:			460	9	22300	
Mittel:			77	1.5	3717	

Spannung eines 1^{mm}. breiten Streifens = 248 Gramm.

Contraction = 2%.

Abgesehen von den Tabellen 14 und 15, welche die Werthe für solche Stellen von *Pinus silvestris* enthalten, an denen bereits Borkebildung eingetreten war, lässt sich aus unseren Messungen unmittelbar folgender Satz ableiten:

So lange die Structur der Rinde weder durch Borkebildung noch durch sonstige Vorgänge wesentliche Veränderungen erfahren hat, wächst ihre Tangentialspannung mit der Dickenzunahme des Holzkörpers.

Da wir aber auf die Beantwortung der Frage hinarbeiten, in welcher Weise die Differenzirung des Holzkörpers oder die Bildung der Jahrringe von dem Rindendruck abhängig sei, so kann für uns nur allein diejenige Kraft in Betracht kommen, die in der Richtung des Radius wirksam ist. Aus der Tangentialspannung muss daher erst der radiale Druck berechnet werden nach der Formel:

$$\text{Radialdruck} = \frac{\text{Tangentialspannung}}{\text{Radius}}.$$

Zur Basis für die Berechnung des in radialer Richtung wirkenden Druckes für eine bestimmte Fläche nehmen wir die Tangentialspannung eines 1^{mm} breiten Streifens. Dadurch gelangen wir zu einer Flächeneinheit von 1^{cm}. Da der Druck der Atmosphäre auf 1^{cm} Fläche etwa 10 Gramm beträgt, so lässt sich der radiale Rindendruck auch sehr leicht in Atmosphären ausdrücken.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen wollen wir uns an der Hand einiger concreter Beispiele über den radialen Rindendruck, wie an verschiedenen Objecten und an verschiedenen Stellen desselben objectes vorkommt, zu orientiren suchen. In der Krone der von uns gemessenen *Alnus glutinosa* beträgt die Tangentialspannung bei einem Radius des Holzkörpers von 12^{mm} 160 Gramm; darnach ist der Radialdruck gleich $\frac{160}{12} = 13.13$ Gramm. Etwas unterhalb der Mitte desselben Baumes ist die Tangentialspannung bei 34^{mm} Radius des Holzkörpers gleich 233.3 Gramm, der Radialdruck also gleich 6.9 Gramm. An der Basis des Baumes berechnet sich der radiale Druck der Rinde aus ihrer Tangentialspannung und dem Radius des Holzkörpers auf 5.8 Gramm.

Ähnlich gestalten sich die Verhältnisse bei *Populus*. Hier beträgt der Radialdruck der Rinde in der Krone 11.1, an einer tieferen Stelle 8.6 und ungefähr in der Mitte des Baumes 5.3 Gramm.

Wie man aus diesen Beispielen sieht, nimmt der in der Richtung des Radius ausgeübte Druck mit der Dickenzunahme des Holzkörpers ab; es steigert sich mit andern Worten die Tangentialspannung nicht dem Maasse, dass der Radialdruck gleich bleibt, geschweige denn grösser wird.

Bei den Nadelhölzern, die für eine Messung der Rindenspannung besonders günstige Objecte liefern, tritt die Abnahme des radialen Rindendruckes noch viel augenfälliger hervor, als bei *Populus* und *Alnus*. *Pinus sylvestris* und *Strobus* besitzen an den gemessenen Stellen von oben nach unten folgende Werthe:

P. sylvestris 7, 3.2, 2.27, 1.5, *P. Strobus* 7.9, 5, 2.83.

Da wir die Tangentialspannung jüngerer Theile, z. B. der Krone älterer Bäume kennen, so lässt sich leicht diejenige Spannung der Rinde berechnen, die nach einer bestimmten Dickenzunahme des Holzkörpers vorhanden sein muss unter der Voraussetzung eines unveränderlichen radialen Rindendruckes. Die in unsern Tabellen aufgeführte *Pinus Strobus* besitzt bei 11^{mm} Radius des Holzkörpers eine Tangentialspannung von 86.6 Gramm. Die Tangentialspannung bei 60^{mm} Radius des Holzkörpers berechnet sich darnach aus der Gleichung $60 = 86.6 : 11$ auf 472 Gramm. Die wirkliche durch Messung ermittelte Spannungsintensität beträgt 170 Gramm, etwa ein Drittel derjenigen Spannung, die unter der Voraussetzung eines unveränderlichen radialen Rindendruckes vorhanden sein muss. Wir gelangen auf rechnerischem Wege zu einer Spannungsintensität der Rinde, die selbst die dicksten Bäume von *Pinus Strobus* nicht erreichen.

Die Rinde von *Pinus silvestris* besitzt bei 10^{mm} Radius des Holzkörpers eine Tangentialspannung von 70.6 Gramm. Hiernach muss, soll der radiale Rindendruck nicht abnehmen, bei 40^{mm} Radius eine Tangentialspannung von 282.4 Gramm vorhanden sein. Die directe Messung giebt uns die Zahl 59, also nicht einmal ein Viertel des durch Rechnung gefundenen Werthes.

Es würde nur ermüden, wollten wir in dieser Weise fortfahren, die an andern Objecten gefundenen Werthe aufzuzählen. Mit Ausnahme eines Astes von *Fraxinus excelsior* hat sich überall eine Abnahme des radialen Rindendruckes herausgestellt. Der betreffende Ast von *Fraxinus*, dessen Spannungswerthe in den Tabellen 22 und 23 aufgeführt sind, zeigt bei einer Verlängerung des Radius von 18 auf 25^{mm} eine Zunahme des radialen Druckes von 0.1 Gramm.

Wir lassen hier jetzt eine Tabelle, in welcher die Werthe des radialen Rindendruckes für verschiedene Objecte enthalten sind, folgen und gehen dann zur Formulirung der wichtigsten Sätze über, die sich aus unseren Messungen ergeben.

	Name der Pflanze.		Tangentialspannung eines 1 ^{mm} breiten Streifens mm.	Länge des Radius mm.	Radialdruck pro □ ^{mm} Gramm.	Radialdruck in Atmosphären ¹
1.	<i>Larix europaea</i>	I	133.3	18	7.4	0.74
2.	"	II	100	12	8.33	0.833
3.	<i>Picea excelsa</i>	I	233.3	50	4.66	0.466
4.	"	II	313.3	86	3.64	0.364
5.	<i>Pinus silvestris</i>	I	70.6	10	7	0.7
6.	"	II	80	25	3.2	0.32
7.	"	III	77	34	2.27	0.227
8.	"	IV	59	40	1.5	0.15
9.	<i>Pinus silvestris</i>	I	93.3	14	6.66	0.666
10.	"	II	107	27	4	0.4
11.	<i>Pinus Strobus</i>	I	86.6	11	7.9	0.79
12.	"	II	127	25	5	0.5
13.	"	III	170	60	2.83	0.283
14.	<i>Alnus glutinosa</i>	I	160	12	13.33	1.333
15.	"	II	233.3	34	6.86	0.686
16.	"	III	273.3	47	5.8	0.58
17.	<i>Populus alba</i>	I	200	18	11.1	1.11
18.	"	II	206.6	24	8.6	0.86

¹ Der Luftdruck auf eine □^{mm} Fläche beträgt genau 10.3275 Gramm; wir nehmen denselben jedoch, um möglichst einfache Zahlen zu bekommen, zu 10 Gramm an.

Name der Pflanze.			Tangential- spannung eines 1 ^{mm} breiten Streifens. mm.	Länge des Radius mm.	Radial- druck pro □ mm Gramm.	Radialdruck in Atmosphären ¹
9.	<i>Populus alba</i>	III	253.3	48	5.3	0.53
0.	<i>Castanea vesca</i>	I	290	17	17	1.7
1.	"	II	466.6	29	16	1.6
2.	<i>Fraxinus excelsior</i>	I	200	18	11.1	1.11
3.	"	II	280	25	11.2	1.12
4.	<i>Salix fragilis</i>	I	130	16	8.12	0.812
5.	"	II	200	26	7.7	0.77
6.	<i>Salix Caprea</i>	I	133.3	13	10.3	1.03
7.	"	II	200	22	9	0.9
8.	"	III	247	38	6.5	0.65
9.	<i>Aesculus Hippocastanum</i>	I	195.5	13	15	1.5
0.	"	II	233.3	19.5	12	1.2
1.	<i>Sorbus aucuparia</i>	300	54	5.5	0.55

Es hat sich also auf empirischem Wege die Thatsache ergeben, dass der Radialdruck der Rinde mit der Dickenzunahme des Holzkörpers abnimmt. Da die Messungen an solchen Objecten ausgeführt sind, deren Rinde keine nennenswerthe Veränderungen zeigte, so ist es leicht versucht, aus der obigen Thatsache ohne Weiteres zu folgern, dass der Radialdruck der Rinde auch gegen den Herbst hin abnehme, da offenbar der Holzkörper während des Sommers durch die Thätigkeit des Cambiumringes einen Zuwachs erfährt. Nimmt aber der Rindendruck gegen den Herbst hin ab, dann kann selbstverständlich von ihm die Bildung des Herbstholzes, wie man bisher angenommen hat, nicht abhängig sein. Eine solche Folgerung wäre freilich doch etwas bedenklich, denn durch die Ablagerung eines neuen Jahresringes erhält der ganze Holzkörper einen verhältnissmässig nur geringen Zuwachs, während durch unsere Messungen der Radialdruck an solchen Stellen eines Objectes festgestellt wurde, die in der Mitte des Radius nicht selten um 1 bis 3^{cm} differirten. Die Thatsache, dass im Allgemeinen mit der Dickenzunahme des Holzkörpers der Rindendruck abnimmt, beweist darum noch nicht, dass derselbe auch während der Bildung eines Jahresringes schwächer wird. Die Annahme der Rinde, auch wenn in ihrer Structur keine grösseren Veränderungen nachzuweisen sind, kann sich im Laufe des Winters aus irgend welchen Gründen vermindern, so dass der Druck, unter

¹ S. vorher S. 1122.

welchem das Cambium im Frühling seine Thätigkeit beginnt, geringer ist als im vorhergehenden Herbst. Die Abnahme des Rindendruckes würde in diesen Fällen nicht durch eine gerade, sondern durch eine wellenförmige Linie zu veranschaulichen sein. Diese Linie muss sich bei unbeschränkter Dickenzunahme des Holzkörpers allmählich der Geraden nähern; bevor dies aber der Fall ist, wird der Frühling mit einem Wellenthale und der Herbst mit einem Wellenberge dieser Linie zusammenfallen.

Um daher unsere Frage, inwiefern die Differenzirung des Holzkörpers oder die Erzeugung von Frühjahr- und Herbstholz vom Rindendruck abhängig ist, in befriedigender Weise beantworten zu können, muss noch auf directem Wege durch Vergleichung von Messungen im Frühling und Herbst die Grösse festgestellt werden, um welche der Radialdruck der Rinde während einer Vegetationsperiode zu- oder abnimmt. Zuvor aber ist zu betonen, dass verschiedene Äste von demselben Baume und von gleicher Dicke in der Grösse der Rindenspannung selten genau übereinstimmen. Ich habe daher insofern einen Fehler begangen, als ich diese individuellen Schwankungen in der Rindenspannung anfänglich nicht berücksichtigte, vielmehr diejenigen Bäume und Äste, an denen eine Messung vorgenommen werden sollte, fast sämmtlich abhauen liess und somit im Herbst auf andere Exemplare angewiesen war. Da sich jedoch, wie ich mich durch eine Anzahl diesbezüglicher Messungen überzeugt habe, diese individuellen Schwankungen innerhalb enger Grenzen bewegen, so sind die an verschiedenen Exemplaren gefundenen Werthe für unsere Zwecke vollständig hinreichend.

Die im Herbst ausgeführten Messungen haben nun ungefähr dieselben Werthe ergeben, wie im Frühjahr. Darnach findet eine erhebliche Änderung in der Intensität der Rindenspannung während der Ablagerung eines Jahrringes nicht statt. Dieselbe Fichte (Tabelle 3), deren Spannungsintensität im Frühling einen Werth von 233.3 Gramm ergab, zeigte im Herbst eine Spannung von 200 Gramm. Da der Radius während des Sommers um die Dicke des gebildeten Jahrringes grösser geworden ist, so hat sich hier der radiale Rindendruck gegen den Herbst hin vermindert. Nehmen wir die Dicke des erzeugten Jahrringes zu 3^{mm} an, dann ergibt sich eine Verminderung des Radialdruckes von ungefähr 1 Gramm pro □^{mm}, eine Grösse, der man auf die Wachsthumsvorgänge im Cambiumringe keinen Einfluss zuschreiben kann.

Wo man nicht, wie hier bei *Picea excelsa*, Spannungswerthe desselben Exemplars in Vergleich ziehen kann, gelangt man in anderer Weise leicht zur Einsicht, dass zum Mindesten keine erhebliche Zu-

nahme des Rindendruckes gegen den Herbst hin stattfindet. Die Jahrringe einer von uns im Frühling gemessenen, ziemlich wüchsigen *Populus* besaßen durchweg eine Dicke von 6^{mm}. Die Tangentialspannung dieser Pappel ergab bei 18^{mm} Radius des Holzkörpers einen Werth von 200 Gramm. Unter der Voraussetzung eines unveränderlichen radialen Druckes musste hiernach im Herbst nach Ablagerung eines 5^{mm} dicken Jahrringes die Tangentialspannung 266.6 Gramm betragen. Eine derartige Steigerung in der Tangentialspannung der Rinde im Laufe des Sommers kommt bei *Populus*, wenn überhaupt, ebenfalls sehr selten vor. Es müsste die Rindenspannung im Herbst dann ganz andere Werthe ergeben, als es in Wirklichkeit der Fall ist. Lässt man nun erst eine Steigerung in dem radialen Rindendrucke während einer Vegetationsperiode eintreten, etwa in der Weise, wie er sich von der Basis bis zur Krone eines Baumes steigert, so gelangt man zu einer Tangentialspannung, die im Herbst bestimmt nicht vorhanden ist.

In der folgenden Tabelle sind einige Zahlen zusammengestellt, wie sie durch Messung im Frühling und Herbst an ungefähr gleich dicken, aber verschiedenen Exemplaren derselben Art gewonnen wurden. Nur die Werthe für *Picea excelsa* beziehen sich auf dasselbe Object.

	Name der Pflanze.		Tangentialspannung eines 1 ^{mm} breiten Streifens		Radius		Radialdruck	
			Frühling	Herbst	Frühling	Herbst	Frühling	Herbst
			Gramm.	Gramm.	mm.	mm.	Gramm.	Gramm.
1.	<i>Picea excelsa</i> . . .		233.3	200	50	53	4.7	3.77
2.	<i>Alnus glutinosa</i> . .	I	160	133	12	10	13.33	13.33
3.	„	II	233.3	240	34	35	6.86	7
4.	„	III	273.3	280	47	49	5.8	5.7
5.	<i>Pinus silvestris</i> . .	I	70.6	93	10	14	7	6.64
6.	„	II	80	107	25	27	3.2	4
7.	<i>Fraxinus excelsior</i> .		200	248	18	21	11.1	11.8

Wie aus dieser Tabelle hervorgeht, stimmen die im Herbst gefundenen Werthe so ziemlich mit denen des Frühling überein. Nirgends findet sich eine Differenz von 1 Gramm. Es handelt sich also um Gewichtsgrößen, denen man unmöglich eine Einwirkung auf die Differenzirung der Xylemelemente zuschreiben kann. Das Resultat unserer direkten Messungen lässt sich daher in folgenden Satz zusammenfassen:

Die Grösse, um welche der Radialdruck vom Frühlings bis zum Herbst zu- oder abnimmt, ist eine so geringe, dass ein Einfluss derselben auf die Thätigkeit des Cambiumringe nicht angenommen werden kann.

Wer gegen diesen Satz noch irgend welche Bedenken haben sollte, der sei nochmals an die Differenzen in der Grösse des Radialdruckes erinnert, wie sie in verschiedenen Höhen an demselben Objecte zu derselben Zeit vorkommen. Diese Unterschiede sind, wie die Tabelle auf Seite 1122 zeigt, weitaus bedeutender, als die geringen Schwankungen des Rindendruckes im Verlaufe einer Vegetationsperiode. Würde in Wirklichkeit die Differenzirung des Holzkörpers aus dem Cambiumringe von Änderungen in der Grösse des radialen Rindendruckes beeinflusst, dann müsste die anatomische Beschaffenheit des Holzes an verschiedenen Stellen eines Organes eine verschiedene sein: es dürfte z. B. bei den von uns untersuchten Bäumen in der Mitte oder an der Basis nur Frühlingsholz zur Ausbildung gelangen, während in der Krone nur Herbstholz erzeugt werden könnte. Derartige Unterschiede in der anatomischen Beschaffenheit des Holzes an verschiedenen Stellen eines Baumes sind aber, wie man sich durch eine mikroskopische Untersuchung leicht überzeugen kann, nicht vorhanden, woraus hervorgeht, dass selbst grössere Schwankungen des Rindendruckes die Thätigkeit des Cambiums nicht merklich beeinflussen.

Einstweilen sehen wir hiermit unsere Aufgabe als gelöst an: zur Aufdeckung der Ursachen, welche der Jahrringbildung zu Grunde liegen, sind weitere Untersuchungen erforderlich. Es soll hier nur noch mit einigen Worten darauf hingewiesen werden, dass man auch ohne Messungen in vielen Fällen nicht im Zweifel darüber sein kann, dass ein vom Frühlings bis zum Herbst sich steigernder Druck nicht die Ursache der Jahrringbildung ist. Die Rinde mancher Bäume, besonders der Platane und Buche, contrahirt sich zu keiner Jahreszeit um eine messbare Grösse. Schon aus diesem Grunde kann von irgend einer erheblichen Steigerung im Rindendruck gegen den Herbst hin nicht die Rede sein. Nun aber besitzen die Buche und Platanen gerade so, wie die Bäume mit ausgeprägter Rindenspannung, deutliche Jahrringe.

Die Herbstgrenze des Jahrringes wird bei der Linde von 3—4 Schichten tangential stark gestreckter Zellen gebildet. Der Übergang in diese Zellformen ist ein so unvermittelter, dass gar nicht einzusehen ist, woher so plötzlich die Druckkräfte kommen sollen. Eine derartige Streckung resp. Abplattung der Zellen in radialer Richtung hervorrufen könnten. Eine solche unvermittelte Abplattung

Herbstzellen kommt nach SANIO¹ auch bei *Clematis Vitalba* und *Aquifolium* vor.

Vie diese Abplattung der Herbstzellen, so werden sich bei der Untersuchung jedenfalls noch manche andere Erscheinungen finden, die nicht in eine Beziehung zu Druckwirkungen gebracht werden können. Dahin gehört vor allen Dingen die Dickenzunahme der Zellwände nach der Herbstgrenze hin.

Bei *Alnus glutinosa* habe ich die Beobachtung gemacht, dass an Stellen von feuchtem, nahrungsreichem Boden die Gefässe bis in die Mitte des Sommers an Grösse zunahmen und dann wiederum im Herbst kleiner wurden. Von Schwankungen im Rindendruck wie ich mich durch Messungen überzeugt habe, konnte diese Abänderung in der Grösse der Gefässe nicht abhängen.

Auf diese Andeutungen müssen wir uns hier beschränken; mit einer ausführlichen Erörterung des Gegenstandes würden wir den Rahmen dieser Arbeit weit überschreiten.

Nachdem wir an der Hand directer Messungen einen Einblick in die Spannungsverhältnisse der Rinde unserer Holzgewächse erlangt haben, mögen die Versuche von H. DE VRIES² noch mit einigen Worten berührt werden. Es ist dies um so nothwendiger, als der genannte Autor zu einem anderen Resultat gelangt ist, das fast in allen botanischen Werken als richtig anerkannt wird.

H. DE VRIES hat die Beobachtung gemacht, dass nach Verminderung des Rindendruckes durch Rindeneinschnitte nicht nur die vom Cambiumring gebildeten Holzelemente weithlumiger wurden, sondern dass eine grössere Anzahl von Gefässen zur Ausbildung gelangte. Dieser Punkt ist besonders hervorzuheben. Wer die H. DE VRIES'schen Versuche genauer betrachtet, wird finden, dass das nach den Einschnitten gebildete Holz in manchen Fällen fast nur durch eine grössere Anzahl von Gefässen charakterisirt ist, vorausgesetzt, dass die Grenze zwischen dem vor der Operation gebildeten Holzelementem nach derselben entstandenen richtig angegeben ist, wofür directen Beweise vorliegen. Es soll nun nach H. DE VRIES die Weite der Zellen als auch die morphologische Differenzirung des Holzkörpers von Druckwirkungen der Rinde abhängig sein; es wird eine Cambiumzelle, die sich unter bestimmtem Druck zu einer Libriformzelle ausgebildet hätte, nach Aufhebung oder Verminderung dieses Druckes zu einem Gefäss werden. Die Erklärung

¹ Bot. Zeit. 1863, S. 391.

² De l'influence de la pression du liber sur la structure des couches ligneuses. (Extrait des Archives Néerlandaises. T. XI. 1876.)

einer solchen Erscheinung hat man sich wohl etwas zu leicht gemacht, denn es ist nicht anzunehmen, dass eine so tiefgreifende Änderung im anatomischen Bau des Holzkörpers, wie sie nach den Rindeneinschnitten eintritt, nur von Änderungen in der Grösse der Rindenspannung verursacht sei. Oder ist etwa ein Gefäss eine grössere Libriformzelle oder umgekehrt diese ein kleineres Gefäss?

H. DE VRIES hat, unter einseitiger Berücksichtigung des Rindendruckes, ganz ausser Acht gelassen, dass seine Experimente nothwendig pathologische Erscheinungen im Gefolge haben mussten; denn durch seine Operationen wurden der Pflanze ohne Zweifel nicht unbedeutende Wunden beigebracht, die um so tiefer in das Leben derselben eingreifen mussten, als die Einschnitte im Umkreise eines Astes in grösserer Anzahl gemacht wurden. Es ist nun eine allgemeine Erscheinung, dass die Pflanze, sobald sie in irgend einer Weise verletzt wird, ihre Wunden so schnell als möglich zu heilen sucht. Warum dies geschieht, lässt sich vorläufig nicht weiter erklären, wir wissen aber, dass es zweckmässig ist, denn wenn kein Verschluss der Wunden stattfindet oder nicht in gehöriger Weise zu Stande kommt, so ist der normale Lebensverlauf einer Pflanze für immer gestört. Damit aber ein schneller Verschluss der Wunde herbeigeführt werde, ist ein intensiver Zufluss von Nährstoffen nach der Wundstelle hin erforderlich. Ausserdem wird in Folge von Rindeneinschnitten, wodurch die zarten Cambiumzellen an mehreren Stellen blossgelegt werden, die Verdunstung nicht unbedeutend gesteigert. Zu ihrer Ausgleichung ist ebenfalls eine Steigerung des Säftezuflusses nach der Wundstelle hin nothwendig. Nun wissen wir, dass die Gefässe in hervorragender Weise mit der Function der Saftleitung versehen sind¹. Es ist daher in hohem Grade wahrscheinlich, dass aus diesen Gründen eine vermehrte Gefässbildung nach den Rindeneinschnitten eintritt. Die Pflanze muss Wege haben, auf denen das zum Verschluss der Wunden und zur Ausgleichung einer gesteigerten Verdunstung erforderliche Material herbeigeschafft wird. Höchst wahrscheinlich würde nach Rindeneinschnitten in der H. DE VRIES'schen Weise auch dann eine vermehrte Gefässbildung eintreten, wenn die zwischen je zwei Einschnitten stehen gebliebenen Rindenpartien durch geeignete Vorrichtungen denselben Druck, wie im unverletzten Zustande, auf den Cambiumring ausübten.

Was nun den zweiten Theil der H. DE VRIES'schen Experimente betrifft, nämlich die Erzeugung von Herbstholz unter einer Ligatur, so

¹ J. VESQUE et CH. VIET, De l'influence du milieu sur la structure anatomique des végétaux. Ann. d. Sc. nat. 6. série T. XII. (1881). — VOLKENS, Über Wasserausscheidung in liquider Form an den Blättern höherer Pflanzen. EICHLER's Jahrb. des K. bot. Gartens u. s. w. Band II. Zugleich Inauguraldissert. Berlin. 1882.

wurde hierdurch das Leben der Pflanze in noch höherem Grade, als durch die Rindeneinschnitte gefährdet; denn den Schaden, welcher nur durch diese zugefügt wird, vermag sie in den meisten Fällen wieder zu repariren, während sie einer Ligatur gegenüber gerade zu machtlos sein muss. Dabei wurde bei der Anlegung dieser Ligatur so wenig vorsichtig verfahren, dass zuweilen eine vollständige Verchiebung der Cambiumzellen in tangentialer Richtung eintrat, wie nachträglich an den braun gefärbten Zellen deutlich zu sehen war. Ausserdem erwähnt H. DE VRIES mit keinem Worte die Grösse, um welche er durch seine Operation den normalen Rindendruck vermehrte. Da dieser höchst wahrscheinlich durch die Anlegung eines starren Verbandes vermittelt einer, wenn auch dünnen Schnur um das zehn- bis zwanzigfache gesteigert wurde, so ist zu verwundern, dass die Pflanze überhaupt noch zu wachsen im Stande war. Es zeigt dies eben nur, dass das Wachsthum des Cambiumringes von den Schwankungen des Rindendruckes, wie sie in der normalen, unverletzten Pflanze vorkommen, nicht beeinflusst werden kann.

Wie beinahe Alle, die über Rindenspannung geschrieben haben, so befindet sich auch H. DE VRIES in dem Glauben, dass die von der Rinde erzeugten Druckkräfte enorm gross seien: ja er gebraucht sogar zu ihrer Bezeichnung an einer Stelle das Wort »colossal.«¹ Man hat hier, wie es so oft geschieht, einen Zustand geschildert, über dessen Natur man gar keine bestimmte Vorstellung haben konnte. Selbst jetzt, nachdem die Grösse des Rindendruckes experimentell festgestellt ist, lässt sich genau genommen noch nicht beurtheilen, ob derselbe relativ gross oder klein ist, denn dazu ist eine Kenntniss derjenigen Kräfte erforderlich, die im Cambiumringe thätig sind, und von diesen wissen wir zur Zeit nichts Positives. Bedenkt man aber, dass das Cambium selbst unter einer Ligatur, wie sie von H. DE VRIES angewandt wurde, noch zu wachsen vermag, dann lässt sich wenigstens mit einiger Wahrscheinlichkeit annehmen, dass der hydrostatische Druck in den Cambiumzellen dieselbe Grösse besitzt, wie in andern lebenden Zellen. Für diese ist in einigen Fällen von PFEFFER,² H. DE VRIES, AMBRONN und Anderen ein Druck von 5 und noch mehr Atmosphären nachgewiesen worden. — Nehmen wir das Mittel aus unsern sämtlichen Versuchen, dann ergibt sich ein Rindendruck von etwa 8 Gramm

¹ Flora 1875. S. 97.

² PFEFFER, Pflanzenphysiologie Bd. I. S. 54; hier findet sich auch eine ausführliche Litteraturangabe. Wircitiren noch: AMBRONN, Über die Entwicklungsgeschichte und mechanischen Eigenschaften des Collenchyms. PRINGSHEIM'S Jahrbuch Bd. XII. S. 530. SCHWENDENER, Über Bau und Mechanik der Spaltöffnungen. Monatsbericht der Berliner Akademie der Wissenschaften. 1881. S. 850.

pro \square^{mm} , nicht ganz eine Atmosphäre. Für die Laubhölzer stellt sich dieser Druck etwas höher, und für die Coniferen beträgt der Rindendruck im Durchschnitt eine halbe Atmosphäre (5 Gramm). Vergleicht man hiermit die Druckkräfte im Innern der Cambiumzellen, dann schrumpft das vermeintliche Riesenmaass des Rindendruckes jedenfalls etwas zusammen.

II.

Unregelmässig gebaute Organe.

Ablenkung der Markstrahlen.

Sind schon unter den regelmässig gebauten Holzkörpern die für eine directe Messung der Rindenspannung brauchbaren Objecte nicht gerade häufig, so wird die Zahl derselben bei excentrisch gebauten Organen noch erheblich kleiner. Solche Organe sind zwar häufig, es ist aber nicht leicht, Objecte mit so excentrischem Baue zu finden, dass in der Rindenspannung der ungleichen Wachsthumzonen erhebliche Unterschiede zu Tage treten. Ausserdem muss ein Ast oder Baum, soll er für unsere Zwecke brauchbar sein, trotz seiner Excentricität einen regelmässigen Bau besitzen, d. h., das maximale resp. minimale Wachstum muss in den successiven Jahresschichten auf derselben Axe fortrücken; liegen die ungleichen Wachsthumzonen in den aufeinanderfolgenden Jahrringen an verschiedenen Orten oder tritt sogar während der Ablagerung eines Jahrringes ein Wechsel ein, so sind selbstverständlich an einem derartigen Objecte die Spannungsverhältnisse der Rinde so complicirter Natur, dass ein klarer Einblick in dieselben unmöglich ist. Aus diesen Gründen ist das empirische Material, welches wir vorzulegen im Stande sind, nicht sehr umfangreich; es wird aber gleichwohl vollständig genügen, um für bestimmte Fälle die Ursachen klar zu legen, durch welche die Ablenkung der Markstrahlen bedingt wird.

In den folgenden Tabellen sind die Spannungswerthe der ungleichen Wachsthumzonen verschiedener Holzkörper enthalten. Von den Tabellen gehören stets je zwei so zusammen, dass die eine die Werthe der Rindenspannung an der Seite maximalen, die andere die entsprechenden Werthe an der Seite minimalen Wachstums enthält.

Tabelle 1.*Tarus baccata.*

Versuch vom 15. Mai 1882.

I.

No.	Dicke mm.	Breite mm.	Länge mm.	Con- traction mm.	Gewicht Gramm.	Bemerkungen.
1.	1—1.5	12	50	1	700	Hyponastischer Ast. Die Streifen wurden von der Zone geringsten Wachstums genommen. Krümmungsradius = 13 mm.
2.	"	"	"	1	750	
3.	"	"	"	1	700	
4.	"	"	55	1	600	
5.	"	"	55	1	700	
6.	"	"	"	1	550	
7.	"	"	"	1	600	
8.	"	"	55	1	700	
9.	"	"	55	1	600	
10.	"	"	"	1	800	
Summa:			520	10	6700	
Mittel:			52	1	670	

Spannung eines 1^{mm} breiten Streifens = 56 Gramm.Contraction = 2⁰/₁₀.**Tabelle 2.***Tarus baccata.*

Versuch vom 15. Mai 1882.

II.

No.	Dicke mm.	Breite mm.	Länge mm.	Con- traction mm.	Gewicht Gramm.	Bemerkungen.
1.	1—1.5	12	60	1	1000	Derselbe Ast wie in I. Die Versuchsstreifen wurden von der Zone maximalen Wachstums genommen. Krümmungsradius = 14 mm.
2.	"	"	60	1	850	
3.	"	"	60	1	750	
4.	"	"	60	1.5	800	
5.	"	"	45	1	900	
6.	"	"	45	1.5	950	
7.	"	"	60	1.5	900	
8.	"	"	45	1	900	
9.	"	"	45	1	900	
10.	"	"	50	1.5	950	
Summa:			530	12	8900	
Mittel:			53	1.2	890	

Spannung eines 1^{mm} breiten Streifens = 74 Gramm.Contraction = 2.3⁰/₁₀.

Tabelle 3.*Pinus silvestris.*

Versuch vom 29. Mai 1882.

I.

No.	Dicke	Breite	Länge	Con- traction	Gewicht	Bemerkungen.
	mm.	mm.	mm.	mm.	Gramm.	
1.	1.5—2	15	65	3	2500	Die Versuchsstreifen wurden von einer jungen Kiefer genommen, welche vom Winde schief geweht und nun im Bogen aufwärts wuchs. Die Streifen für diese Tabelle wurden von der Zone stärksten Wachstums genommen. Krümmungsradius = 17 ^{mm} .
2.	"	"	60	3	2500	
3.	"	"	65	2.5	2000	
4.	"	"	65	2.5	2000	
5.	"	"	65	3	2500	
6.	"	"	65	2	2000	
7.	"	"	65	2	2000	
8.	"	"	65	2.5	2500	
9.	"	"	65	2	2000	
10.	"	"	65	2.5	2200	
11.	"	"	65	2.5	2200	
12.	"	"	70	2.5	2500	
Summa:			780	30	26900	
Mittel:			65	2.5	2240	

Spannung eines 1^{mm} breiten Streifens = c. 150 GrammContraction = 3.8^{0/0}.**Tabelle 4.***Pinus silvestris.*

Versuch vom 29. Mai 1882.

II.

No.	Dicke	Breite	Länge	Con- traction	Gewicht	Bemerkungen.
	mm.	mm.	mm.	mm.	Gramm.	
1.	1.5—2	15	55	2	2000	Dieselbe Kiefer wie in I. Die Streifen wurden von der minimalen Wachstumszone genommen. Krümmungsradius = 14 ^{mm} .
2.	"	"	55	1.5	1500	
3.	"	"	55	1.5	1700	
4.	"	"	55	1.5	1500	
5.	"	"	55	1.5	1700	
6.	"	"	55	2.5	1900	
Summa:			330	10.5	10300	
Mittel:			55	1.75	1700	

Spannung eines Streifens von 1^{mm} Breite = 113.3 Gramm.Contraction = 3.2^{0/0}.

Tabelle 5.

Picea excelsa.

Versuch vom 6. Juni 1882.

I.

No.	Dicke	Breite	Länge	Con- traction	Gewicht	Bemerkungen.
	mm.	mm.	mm.	mm.	Gramm.	
1.	1.5—2	15	50	1	2500	Excentrisch gebauter Ast von <i>Picea excelsa</i> (hyponostisch). Die Versuchsstreifen wurden von der Zone maximalen Wachstums genommen. Krümmungsradius = 20 mm.
2.	"	"	50	1	2900	
3.	"	"	50	1	2700	
4.	"	"	50	1	2500	
5.	"	"	60	1.5	2500	
6.	"	"	60	1.5	3000	
7.	"	"	60	1.5	2900	
8.	"	"	60	1	2500	
9.	"	"	50	1	2500	
10.	"	"	60	1.5	3000	
11.	"	"	60	1	2500	
12.	"	"	60	1.5	3000	
13.	"	"	60	1.5	3000	
14.	"	"	60	1.5	3000	
15.	"	"	60	1.5	2700	
16.	"	"	60	1.5	3000	
17.	"	"	60	1.5	3000	
18.	"	"	60	1.5	3000	
Summa:			1030	23.5	50200	
Mittel:			58	1.3	2800	

Spannung eines 1^{mm} breiten Streifens = 187 Gramm.

Contraction = 2.24 %.

Tabelle 6.*Picea excelsa.*

Versuch vom 6. Juni 1882.

II.

No.	Dicke mm.	Breite mm.	Länge mm.	Con- traction mm.	Gewicht Gramm.	Bemerkungen.
1.	1.5 — 2	15	60	1	2500	Derselbe Ast wie in I. Die Streifen wurden von der Zone minimalen Wachstums genommen. Krümmungsradius = 19 mm.
2.	"	"	60	1	2500	
3.	"	"	60	1	2500	
4.	"	"	60	1	2500	
5.	"	"	60	1.5	2500	
6.	"	"	60	1	2300	
7.	"	"	60	1.5	2500	
8.	"	"	60	1	2500	
9.	"	"	60	1	2500	
10.	"	"	60	1	2500	
11.	"	"	60	1.5	2800	
12.	"	"	60	1	2500	
13.	"	"	60	1	2500	
14.	"	"	60	1.5	2500	
Summa:			840	16	35100	
Mittel:			60	1.15	2500	

Contraction eines 1^{mm} breiten Streifens = 166.6 Gramm.Contraction = c. 2 $\frac{1}{2}$ %.**Tabelle 7.***Fraxinus excelsior.*

Versuch vom 3. Juni 1882.

I.

No.	Dicke mm.	Breite mm.	Länge mm.	Con- traction mm.	Gewicht Gramm.	Bemerkungen.
1.	2 — 3	15	60	2	3300	Excentrisch gewachsener junger Baum. Die Streifen wurden von der maximalen Wachstumszone genommen. Krümmungsradius = 23 mm.
2.	"	"	60	2	3200	
3.	"	"	60	2	3400	
Summa:				6	9900	
Mittel:				2	3300	

Spannung eines 1^{mm} breiten Streifens = 220 Gramm.Contraction = 3.3 $\frac{1}{2}$ %.

Tabelle 8.*Fraxinus excelsior.*

Versuch vom 3. Juni 1882.

II.

No.	Dicke mm.	Breite mm.	Länge mm.	Con- traction mm.	Gewicht Gramm.	Bemerkungen.
1.	2—3	15	60	2	3000	Derselbe Baum wie in I. Die Versuchsstreifen wurden von der minimalen Wachstumszone genommen. Krümmungsradius = 18 mm.
2.	"	15	60	1.5	2700	
3.	"	15	60	1.5	2600	
4.	"	15	60	2	2700	
Summa:				7	11000	
Mittel:				1.75	2750	

Spannung eines 1^{mm} breiten Streifens = 183.3 Gramm.Contraction = c. 3⁰/₁₀.**Tabelle 9.***Fraxinus excelsior.*

Versuch vom 1. Juni 1882.

I.

No.	Dicke mm.	Breite mm.	Länge mm.	Con- traction mm.	Gewicht Gramm.	Bemerkungen.
1.	1.5	15	60	2	3200	Excentrisch gebauter Ast. Die Streifen wurden von der Zone maximalen Wachstums genommen. Krümmungsradien = 19 mm.
2.	"	"	60	2	3000	
3.	"	"	60	2	3200	
4.	"	"	70	2	3300	
5.	"	"	70	2	3300	
6.	"	"	70	2	3300	
7.	"	"	70	2	3200	
Summa:				14	22500	
Mittel:				2	3200	

Spannung eines 1^{mm} breiten Streifens = 213.3 Gramm.Contraction = 3⁰/₁₀.

Tabelle 10.

Fraxinus excelsior.

Versuch vom 1. Juni 1882.

II.

No.	Dicke. mm.	Breite mm.	Länge mm.	Con- traction mm.	Gewicht Gramm.	Bemerkungen.
1.	1.5	15	70	1.5	2400	Derselbe Ast wie in I. Streifen stammen von der minimalen Wachstumszone. Krümmungsradius = 15 ^{mm} .
2.	"	"	70	1	2500	
3.	"	"	70	1.5	2500	
Summa:				4	7400	
Mittel:				1.3	2500	

Spannung eines 1^{mm} breiten Streifens = 166.6 Gramm.

Contraction = 2 ⁰/₁₀.

Tabelle 11.

Fraxinus excelsior.

Versuch vom 3. Juni 1882.

I.

No.	Dicke mm.	Breite mm.	Länge mm.	Con- traction mm.	Gewicht Gramm.	Bemerkungen.
1—2	1.5	15	40	1	2000	Excentrischer Ast. Zone maximalen Wachstums. Radius gleich 16 ^{mm} .

Spannung eines 1^{mm} breiten Streifens = 133.3 Gramm.

Contraction = 2.5 ⁰/₁₀.

Tabelle 12.

Fraxinus excelsior.

Versuch vom 3. Juni 1882.

II.

No.	Dicke mm.	Breite mm.	Länge mm.	Con- traction mm.	Gewicht Gramm.	Bemerkungen.
1—2	1.5	15	40	1	1500	Derselbe Ast wie in I. Minimale Wachstumszone. Radius gleich 14 ^{mm} .

Spannung eines 1^{mm} breiten Streifens = 100 Gramm.

Contraction = 2.5 ⁰/₁₀.

Aus vorstehenden Tabellen ergibt sich unmittelbar folgender Satz:

An excentrisch gewachsenen Bäumen und Ästen ist die Tangentialspannung der Rinde, so lange diese keine wesentlichen Veränderungen erfahren hat, an dem Orte maximalen Wachsthum's am grössten.

Dieser Unterschied in der Intensität der Tangentialspannung fällt je nach der Grösse der Excentricität eines Baumes oder Astes verschieden aus. Bei der Mehrzahl der untersuchten Objecte verhält sich die Rindenspannung an der Seite maximalen zu derjenigen an der Seite minimalen Wachsthum's wie 4 zu 3 oder 5 zu 4. Nur bei *Picea reclusa* mit vielen und schwach entwickelten Jahrringen, die überdies nicht selten zwei oder noch mehr Maxima des Zuwachses besaßen, tritt dieser Unterschied weniger stark hervor.

Wie bereits einleitend bemerkt wurde, ist Kny¹ zu einem andern Resultate gekommen. Derselbe hat nämlich gefunden, dass an excentrisch gewachsenen Ästen von *Tilia grandifolia* abgelöste Rindenstreifen in der Zone minimalen Wachsthum's sich in stärkerer Masse contrahiren, als an der entgegengesetzten, und hieraus den Schluss gezogen, dass auch entsprechend der grösseren Contraction die Rindenspannung in dieser Seite am grössten sei. Obgleich ich in Uebereinstimmung mit Kny ebenfalls eine etwas stärkere Contraction der Rinde an der Seite minimalen Wachsthum's beobachtet habe, so komme ich doch in bezug auf die Grösse der Rindenspannung zu einem andern Ergebniss. Kny hat nämlich einen ganz wesentlichen Factor, die Dicke der Rinde, unberücksichtigt gelassen. An allen excentrischen Lindenästen, die ich untersucht habe, war die Rinde an der Seite stärksten Wachsthum's doppelt so dick, als an der andern. Wäre die Rindensubstanz homogen, so müsste hiernach, um einen Rindenstreifen von bestimmter Breite aus der Zone maximalen Wachsthum's um eine gewisse Grösse auszu dehnen, das Doppelte des Gewichts in Anwendung kommen, welches einen Streifen von derselben Breite an der Seite minimalen Wachsthum's um die nämliche Grösse ausdehnt. Wenn nun auch in Wirklichkeit die Structur der Rinde eines Lindenastes nicht an allen Punkten des Umfanges genau dieselbe ist, so wird doch ohne Zweifel das Gewicht, welches zur Ausgleichung der Contraction eines Rindenstreifens aus der Zone stärksten Wachsthum's erforderlich ist, grösser sein, als dasjenige, welches dieselbe Arbeit an einem Streifen aus der Zone

¹ Kny. Über das Dickenwachsthum des Holzkörpers in seiner Abhängigkeit von äussern Einflüssen. Berlin 1882.

geringsten Wachsthum zu leisten im Stande ist. Die Linde dient daher nur noch zur Bekräftigung unseres obigen Satzes.

Treten wir nun der Frage nach den Ursachen der Markstrahlenablenkung etwas näher. Um diese Frage befriedigend beantworten zu können, müssen wir zuvor darüber im Klaren sein, wie die radial wirkenden Kräfte an excentrisch gebauten Organen vertheilt sind. Hierüber giebt die folgende Tabelle, in der die radialen Druckgrößen der entgegengesetzten Wachsthumzonen enthalten sind, Aufschluss. Das + Zeichen bedeutet Zone stärksten und das – Zeichen Zone geringsten Wachsthum.

	Name der Pflanze.		Tangentialspannung eines 1 mm breiten Streifens in	Krümmungsradius in	Radialdruck pro 1 mm.	Druck in Atmosphären.
			Gramm.	mm.		
1.	{ <i>Taxus baccata</i> }	+	74	14	5.3	0.53
2.		–	56	13	4.3	0.43
3.	{ <i>Pinus silvestris</i> }	+	150	17	9	0.9
4.		–	113.3	14	8	0.8
5.	{ <i>Picea excelsa</i> }	+	187	20	9	0.9
6.		–	166.6	19	8.8	0.88
7.	{ <i>Fraxinus excelsior</i> . . }	+	220	23	9.6	0.96
8.		–	183.3	18	10.2	1.02
9.	{ <i>Fraxinus excelsior</i> . . }	+	213.3	19	11.2	1.12
10.		–	166.6	15	11.1	1.11
11.	{ <i>Fraxinus excelsior</i> . . }	+	133.3	16	8.3	0.83
12.		–	100	14	7.14	0.714

Nach der vorstehenden Tabelle kann an excentrisch gebauten Organen der radiale Rindendruck in dem einen Falle am Orte intensivsten, in einem andern an der Stelle schwächsten Wachsthum am grössten sein. Von dem Unterschiede in der Grösse der Tangentialspannung und von den Krümmungsradien der verschiedenen Zonen wird es abhängen, ob an einem gegebenen Objecte das Eine oder das Andere der Fall ist. Dieser Unterschied in dem Radialdruck der verschiedenen Seiten eines excentrischen Astes ist jedoch bei den in obiger Tabelle aufgeführten Beispielen ein ganz unbedeutender. Die grösste Differenz beträgt, wie die Tabelle zeigt, etwa ein Gramm, ein Gewicht, welches ohne Bedenken vernachlässigt werden darf.


Wir können daher, ohne einen erheblichen Fehler zu begehen, für die von uns untersuchten Objecte den Radialdruck an allen

inkten des Umfanges als gleich gross annehmen. Da hiernach das Wachstum des Cambiumringes in radialer Richtung überall denselben Widerstand zu überwinden hat, so kann der hiervon abhängige Druck im Cambium keine Ablenkung der Markstrahlen bedingen. Diese wird daher nur durch einen von der gespannten Rinde ausgehenden Zug verursacht.

Man sieht aber bei einiger Überlegung sofort ein, dass mit den uns aufgeführten Beispielen, was die Grösse des Radialdruckes in den verschiedenen Wachstumszonen eines excentrischen Organes trifft, nicht alle Fälle, die in der Natur vorkommen können, erschöpft sind. Ist der Umfang eines excentrischen Astes kreisförmig, dann stehen die radialen Druckgrössen der ungleichen Wachstumszonen, weil die Krümmungsradien gleich sind, in demselben Verhältnisse zu einander, wie die entsprechenden Tangentialspannungen. Es können aber auch die Curven, welche das Wachstum des Verdickungsringes an verschiedenen Seiten eines Objectes begrenzen, verschiedenartig sein, dass in der Länge der Krümmungsradien, die von der Krümmung dieser Curven abhängig ist, bedeutende Unterschiede zu Tage treten. Der Krümmungsradius an der maximalen Zuwachszone kann doppelt so lang sein als an der andern Seite und umgekehrt. Wo derartige Differenzen in der Grösse der Radien vorhanden sind, müssen sich auch ziemliche Unterschiede in den radialen Druckgrössen der ungleichen Wachstumszonen herausstellen. Ist z. B. die Tangentialspannung an der im Wachstum geförderten Seite für einen 1 cm breiten Streifen gleich 150 Gramm und der Radius gleich 10 mm, die Tangentialspannung an der andern Seite gleich 120 Gramm bei 5 mm Radius, dann ergibt sich eine Differenz in der Grösse des Radialdruckes von 9 Gramm, d. h. ungefähr eine Atmosphäre. Kehrt man das Verhältniss der Radien um, dann steht der Cambiumring in der Zone minimalen Wachstums unter einem radialen Überdruck von ungefähr einer halben Atmosphäre. Ein derartiger Überdruck, der an einer Seite eines excentrischen Organs auf dem Verdickungsringe lasten kann, darf selbstverständlich mit Rücksicht auf seine Wirkung nicht so ohne Weiteres vernachlässigt werden; er kann Verschiebungen im Cambium hervorrufen und daher auch die Art und Weise des Markstrahlenverlaufes an excentrischen Organen mitbedingen. Bevor daher in allgemeingültiger Weise über die Ursache der Markstrahlenablenkung etwas ausgesagt werden kann, ist die Frage zu beantworten, wie sich der Verlauf der Markstrahlen an excentrischen Organen gestaltet, wenn man den radialen Kräften die sichtbare Wirkung zuschreibt.

Um dies klar zu legen, gehen wir von der Voraussetzung aus, dass an der Seite maximalen Wachstums sowohl die Tangentialspannung der Rinde als auch der Radialdruck grösser sei, als an der gegenüberliegenden Seite.

Fig. 2.



In Fig. 2 repräsentire die orthogonale Trajectorie *a b* den Verlauf eines Markstrahls, wie er zu Stande kommt, wenn seitliche Kräfte keine Ablenkung bedingen. Wegen des grösseren Contractionsbestrebens der Rinde am Orte stärksten Wachstums steht der Markstrahl während seiner Ausbildung unter dem Einfluss eines continuirlichen Zuges nach dieser Seite hin. Die Linie *a c* gebe den Verlauf des Markstrahls an, wie er sich gestalten würde unter der Voraussetzung,

dass nur dieser tangentielle Zug nach einer Seite hin auf ihn einwirkt. Der grössere radiale Druck an derselben Seite wird dagegen zur Folge haben, dass die Cambiumzellen nach der entgegengesetzten Seite in der Richtung der Pfeile zwischen *a* und *c* zu wachsen bestrebt sind. Da ein freies Gleiten der Cambiumzellen nicht möglich ist, weil sie mit der Rinde und dem Holzkörper anatomisch verwachsen sind, so muss dieses Wachstumsbestreben der Cambiumzellen eine Ausbiegung des Markstrahls nach der minimalen Zuwachszone zur Folge haben. Der grössere Radialdruck an der einen Seite übt auf den Markstrahl dieselbe Wirkung aus, wie der Wind, der senkrecht auf das Segel eines Schiffes stösst und dieses nach einer Seite hin aufbläht. Ein unter dem Einfluss dieser entgegengesetzt wirkenden Zug- und Druckkräfte entstandener Markstrahl muss daher nothwendig im Holzkörper anders verlaufen, als in der Rinde. Halten sich diese Kräfte in ihrer Wirkung auf das innerste Stück *x* unserer Trajectorie das Gleichgewicht, dann bleibt natürlich der Markstrahlenverlauf eines excentrischen Organes im Xylem ein orthogonaler und nur in der Rinde kann der tangentielle Zug eine Ablenkung hervorrufen. Es lässt sich sogar ein so bedeutender Überdruck an der maximalen Zuwachszone denken, dass die Markstrahlen im Holzkörper nach einer anderen Seite abgelenkt werden als in der Rinde. Durch die punktirte Linie unserer Figur würde dieser Fall etwa zu veranschaulichen sein. Wie dem nun aber auch sei, da stets durch den radialen Überdruck ein Theil der Zugspannung ausser Wirkung gesetzt wird, so muss zum Mindesten die Ablenkung eines Markstrahls im Holzkörper eine geringere sein, als in der Rinde.

Einen derartigen Markstrahlenverlauf habe ich jedoch niemals beobachten können; er scheint auch von Andern bis jetzt nicht beobachtet zu sein. Es lässt sich hieraus folgern, dass der Radialdruck bei der Ablenkung der Markstrahlen keine augenfällige Rolle spielt.

Hiermit soll aber keineswegs jeder Einfluss der radialen Kräfte auf die Wachsthumsvorgänge im Cambiumringe geleugnet werden. In vielen Fällen lassen sich gewisse örtliche Unregelmässigkeiten, kleine Verbiegungen, zuweilen Knickung eines Markstrahls, besonders am Beginn eines Jahrringes beobachten. Inwieweit bei dem Zustandekommen dieser Erscheinungen die radialen Kräfte beteiligt sind, entzieht sich natürlich einer genauen Berechnung. Diese Unregelmässigkeiten sind jedoch für uns insofern von untergeordneter Bedeutung, als durch sie der Markstrahlenverlauf im Grossen wenig alterirt wird. Die eigentliche Ursache der Markstrahlenablenkung ist daher ein in der Richtung der Tangente wirkender Zug. Da wir nun auf Grund directer Messungen wissen, dass dieser Zug an der im Wachsthum geförderten Seite eines Organes am stärksten ist, so gelangen wir zu folgendem allgemeinen Satze:

Die Markstrahlen werden nach dem Orte maximalen Wachstums hinübergezogen in Folge des grösseren Contractionsbestrebens der Rinde an dieser Seite.

Nach den obigen Erörterungen können wir uns in Bezug auf die Ansicht Kny's über die Ursache der Markstrahlenablenkung kurz fassen. Kny geht offenbar, obgleich er sich nicht in dieser Weise ausdrückt, von der Voraussetzung aus, dass an der Seite der stärksten Tangentialspannung auch der radiale Druck, der auf den Cambiumzellen lastet, ein Maximum erreiche. Es ergeben sich so zwei Kräfte, die in der soeben dargelegten Weise wirken und sichtbar zum Ausdruck kommen müssten, vorausgesetzt, dass der radiale Überdruck gross genug ist. Es brauchen jedoch, was Kny nicht weiter in Erwägung zieht, die Zug- und Druckkräfte nicht immer in einem Gegensatz zu einander zu stehen, denn der Radialdruck kann auch an der Seite geringsten Wachstums am stärksten sein. In diesen Fällen, die in der Natur vorkommen, äussern die ungleichen Spannungen eines excentrischen Organes nicht zwei entgegengesetzte Wirkungen, sondern die grössere Tangentialspannung an der einen und der grössere radiale Druck an der anderen Seite steigern sich in ihren Folgen, indem sie gleichsinnig wirken.

Was nun die Wirkungsweise des tangentialen Zuges betrifft, von dem, wie wir gesehen haben, die Ablenkung der Markstrahlen ver-

ursacht wird, so müssen wir auf die bekannte Arbeit SCHWENDENER's¹ verweisen. Hier ist dieser Gegenstand in Übereinstimmung mit unsern empirisch gewonnenen Thatsachen nach allen Seiten theoretisch erörtert. Nur auf einen Punkt, der bereits früher von SCHWENDENER in seinen Vorträgen über Physiologie erörtert wurde, gestatten wir uns hier in aller Kürze die Aufmerksamkeit zu lenken. Der Verlauf der Markstrahlen, wie er an excentrischen Organen zu beobachten ist, lässt sich nur unter der Annahme einer stärkeren Tangentialspannung an der Seite maximalen Wachsthum's befriedigend erklären. Nimmt man eine grössere Tangentialspannung an der Seite minimalen Wachsthum's an, dann muss aus den in der betreffenden Abhandlung dargelegten Gründen, deren Kenntniss hier vorausgesetzt wird, die Ablenkung der Markstrahlen nach dieser Seite hin stattfinden und das Maximum der Ablenkung muss in den untern Quadranten an der Zone geringsten Zuwachses liegen. Ein solcher Markstrahlenverlauf ist in Wirklichkeit nicht zu beobachten. SCHWENDENER hatte daher thatsächliche Anhaltspunkte, wenn er eine stärkere Tangentialspannung an der Zone maximalen Wachsthum's annahm.

Wie nun die Fälle, in welchen KNY eine Ablenkung der Markstrahlen nach dem Orte geringsten Wachsthum's beobachtet hat, zu deuten sind, bleibt einstweilen dahingestellt. Gehörten die betreffenden Organe, worüber die abgebildeten Sektoren leider nicht genügend Aufschluss geben, zur Kategorie jener Objecte, deren Jahrringe mehrere Maxima des Zuwachses zeigen, dann ist selbverständlich ein klarer Einblick in das Verhältniss der Zug- und Druckkräfte zu einander und somit auch in ihre Wirkungsweise nicht mehr möglich.

Zum Schluss sollen hier noch einige Bemerkungen über einen Gegenstand Platz finden, der auf unsere erste Frage, in wiefern nämlich die Bildung von Frühlings- und Herbstholz vom Rindendruck abhängig sei, Bezug hat. Bekanntlich zeigt der Holzkörper excentrischer Organe an den verschiedenen Wachsthum'szonen auch einen verschiedenen Charakter. An der Seite maximalen Wachsthum's differenziren sich aus dem Cambiumringe Xylemelemente, welche mehr die Beschaffenheit des Frühlingsholzes besitzen, während an der anderen Seite mehr Herbstholz erzeugt wird. Man hat diese Erscheinung ebenfalls mit Druckwirkungen der Rinde in Verbindung gebracht, indem behauptet wurde, der grössere Rindendruck an der Seite minimalen Wachsthum's gebe dem Jahrringe den Charakter des Herbstholzes, während an der

¹ SCHWENDENER, Über die durch Wachsthum bedingte Verschiebung kleinster Theilchen in trajectorischen Curven. Monatsber. der Berl. Akad. d. Wiss. 1880.

entgegengesetzten Seite in Folge des geringeren Rindendruckes mehr Frühlingsholz entstehe. Wie nun aus unserer obigen Tabelle, in der die Werthe des Radialdruckes an den ungleichen Wachsthumzonen enthalten sind, hervorgeht, besteht ein derartiger Unterschied in der Grösse des radialen Rindendruckes nicht. Es kann daher auch die ungleiche Differenzirung des Holzkörpers an den verschiedenen Seiten eines excentrischen Organes nicht von einem ungleichen Rindendruck abhängig sein.

Ausgegeben am 21. December.



1882.

LII.


SITZUNGSBERICHTE

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.



21. December. Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. DU BOIS-REYMOND.

1. Hr. W. PETERS las: Über *Opisthoplus degener*, eine neue Gattung und Art der Schlangen mit ganz eigenthümlicher Bezahnung.

2. Hr. KRONECKER las: Über die kubischen Abelschen Gleichungen des Bereiches ($\sqrt{-31}$).

Beide Mittheilungen folgen hier.



Über *Opisthoplus degener*, eine neue Gattung und Art der Schlangen mit ganz eigenthümlicher Bezeichnung.

VON W. PETERS.

Die erste ausführliche, auf alle ihnen bekannte Arten ausgedehnte Untersuchung des Gebisses der Schlangen verdanken wir DUMÉRIL und BIBRON, welche in ihrem grossen vortrefflichen Werke »*Erpétologie générale*« dasselbe vorzugsweise der Classification zu Grunde gelegt haben.

So theilen sie die Schlangen ein in fünf Sectionen, von denen die erste, die der *Scolecophidier*, dadurch ausgezeichnet ist, dass sie nur im Oberkiefer oder nur im Unterkiefer Zähne hat, die zweite, die der *Azemiophidier*, sowohl oben wie unten, aber nur glatte solide Zähne, die dritte, die der *Aphoberophidier* oder *Opisthoglyphi*, im Oberkiefer vorn glatte, hinten gefurchte Zähne hat, während die beiden letzten, die zweifellos giftigen, nach ihnen vorn im Oberkiefer entweder gefurchte (*Apistophidier*) oder durchbohrte (*Thanatophidier*) Zähne haben.

Über die Bezeichnung der beiden ersten und der fünften Abtheilung ist hier nichts zu bemerken, und was die vierte Abtheilung anbelangt, so ist sowohl von mir, wie von Anderen nachgewiesen worden, dass die Giftzähne derselben, wie die der Vipern, einen Giftcanal, und ausser demselben noch eine vordere Längsfurche haben. Was aber die dritte Abtheilung, die der *Opisthoglyphi*, anbetrifft, so sprechen sich DUMÉRIL und BIBRON zuerst (*Erp. gén.* 1844. VI. S. 69) entschieden darüber aus, dass die gefurchten hinteren Oberkieferzähne durchaus nicht giftleitend seien und nannten eben deshalb die hierher gehörigen Schlangen *Aphoberophidier*. Später (a. a. O. 1854. VII. S. 781 ff.) erklärten sie dieselben für Giftschlangen, deren Biss aber nur in dem Falle giftig und tödtlich sei, wenn die ergriffene Beute bis in den hinteren Theil des Mauls gelangt sei. Diese Ansicht ist aber durch Beobachtungen an lebenden Thieren in keiner Weise bestätigt worden und sie wird von denjenigen, welche wie der verstorbene Dr. A. SMITH viele Jahre in heissen Gegenden sich genau

mit Schlangen beschäftigt haben, durchaus bestritten, wie ich selbst auch niemals nach dem Bisse opisthoglypher Schlangen tödtliche Folgen oder Symptome gefährlicher Erkrankung in dem tropischen Africa gesehen habe. Die Speicheldrüsen, welche sich an der Basis dieser Zähne finden, sind auch in ihrem Bau nicht den Giftdrüsen, sondern mehr den gewöhnlichen Speicheldrüsen ähnlich. Es wäre jedoch sehr wünschenswerth, dass man auch mit dem Secret dieser Drüsen Vergiftungsversuche machte, wie dieses mit dem der Giftdrüsen der Vipern geschehen ist.

Bei allen Schlangen mit gefürchten hinteren Oberkieferzähnen, welche man bis jetzt kennen gelernt hat, findet man ausser denselben ohne Ausnahme vordere ungeführte solide Zähne. Eine Art dagegen, welche ich neuerdings erworben habe, ist von allen anderen dadurch ausgezeichnet, dass sie ausser einem langen hinteren Furchenzahn im Oberkiefer gar keine Zähne hat. Durch den Habitus, die Pholidosis und die runde Pupille kommt sie am meisten überein mit den americanischen *Leptognathi*, bei denen aber immer nur kurze glatte Oberkieferzähne vorkommen. Ich habe mich daher genöthigt gesehen, eine besondere Gruppe für sie aufzustellen, welche ich wegen ihres Gebisses *Opisthoplus*¹ genannt habe.

OPISTHOPLUS nov. gen.

Maxilla edentula, excepta parte postrema dente longo sulcato armata; dentes palatini pterygoideique bini elongati; mandibula utrinque dentibus octo vel novem. Caput latum, argute distinctum, scutis supra 9. Nasale utrinque simplex, frenale nullum, submentalia brevia. Pupilla rotunda. Corpus subcompressum, abdomen margine rotundatum. Squamae laeves. Anale subcaudaliaque duplicia.


Der verlängerte Oberkiefer ist dünn und zahnlos, bis auf das hinterste Ende, in welchem ein sehr langer gefurchter Zahn steht. Sowohl in den Gaumen-, wie in den Flügelbeinen fand ich nur wenige dünne, ziemlich lange Zähne, und in jeder Hälfte des Unterkiefers acht bis neun, von denen die vorderen die längsten sind.

Der breite Kopf ist wohl abgesetzt von dem dünnen Halse, hat eine kurze abgerundete Schnauze und hohe, abfallende Seiten. Das mittelgrosse Auge hat eine runde Pupille. Das einfache Nasale reicht bis an das Anteorbitale, da das Frenale fehlt. Oberkopfschilder in gewöhnlicher Zahl. Die Submentalia sind kurz. Der Körper ist mässig zusammengedrückt, an den Bauchseiten abgerundet, mit glatten

¹ Ὀπίσθιος, ὀπλον.

Schuppen bedeckt, welche ein schwer „sichtbares“ Endgrübchen haben. Anale und Subcaudalia sind getheilt.

Das Vaterland dieser eigenthümlichen Gattung habe ich nicht erfahren können, glaube aber wegen ihrer Ähnlichkeit mit den *Leptognathi*, dass sie in America zu Hause ist. Dafür spricht auch der Inhalt des Magens, ein *Vaginulus*, eine Molluskengattung, welche auch in America vorkommt.¹



OPISTHOPLUS DEGENER nov. spec.

O. supra olivaceus, subtus virescens, nigro adpersus. Squamis 15- ad 16- seriatis, abdominalibus 137, anali diviso, squamis subcaudalibus 62.

Der Kopf ist fast doppelt so lang wie breit und nur ein Drittel niedriger als breit. Rostrale viel breiter als hoch, convex, oben kaum vortretend. Internasalia trapezoidal, vorn viel schmaler als hinten, links mit dem Präfrontale verschmolzen, welches merklich breiter, aber kaum länger als jenes ist. Frontale lang hexagonal, vorn stumpf, hinten spitzwinkelig, mit fast parallelen Seitenrändern. Parietalia nicht länger als das Frontale, hinten abgerundet. Nasale lang, mit dem hinteren schmälern Ende an das Anteorbitale stossend, da ein Frenale fehlt; das Nasenloch ist sichelförmig, in der vorderen Hälfte des Nasale gelegen. Es sind zwei Postorbitalia vorhanden, welche hinten an das erste Temporale stossen, welchem letzteren noch fünf oder sechs Temporalia in zwei Reihen folgen. Supralabialia rechts sechs, von denen das zweite und dritte an das Auge stossen, links sieben, durch Theilung des zweiten, so dass hier das dritte und vierte an's Auge stossen. Mentale klein, breit dreieckig, durch das erste Paar der Infralabialia von den Submentalia getrennt. Infralabialia sieben, von denen drei oder vier mit den Submentalia in Berührung stehen. Es sind zwei Paar kurze Submentalia vorhanden, von denen das erstere das längere ist. Hinter ihnen folgen, nur von ihnen durch zwei

¹ Hr. Prof. von MARTENS, der sich so speciell mit den Mollusken beschäftigt hat, fand diesen *Vaginulus* von den bisher bekannten Arten am ähnlichsten dem *V. Kraussi* Férussac aus Westindien.

Der Magen enthielt einen noch wohl erhaltenen *Vaginulus*.

Oben olivenbraun, auf der Mitte des Nackens einen helleren Streifen an den Seiten des Nackens und des vorderen Theils des Rückens eine Reihe entfernt stehender kleiner schwarzer Flecke. Unten bläulichgrünlich, mit Schwarz besprenkt, welches am Rande der Bauchschilde dichter gedrängt erscheint. Auch die Unterseite des Schwanzes dicht mit Schwarz besprenkt.

Totallänge 35^{cm}; Kopflänge 14^{mm}; Kopfbreite 8^{mm}; Schwanz 72^{mm}

Über die Lebensweise dieser Schlange ist nichts bekannt, während das schwach entwickelte Gebiss der Nahrung, in Weichthieren bestehend, entspricht.

Die kubischen Abelschen Gleichungen des Bereichs $(\sqrt{-31})$.

Von L. KRONECKER.

Anknüpfend an meine kleine Abhandlung vom 7. December will ich hier an einem charakteristischen Beispiel in Kürze den ebenso überraschenden als befriedigenden Aufschluss über die arithmetisch-algebraische Natur der singulären Moduln der elliptischen Functionen mittheilen, welchen mir zwar der Hauptsache nach schon jene Untersuchungen, deren Resultate in den Monatsberichten vom Februar und April 1880 abgedruckt sind, gebracht,¹ aber doch erst meine neuen Studien über die Composition Abelscher Gleichungen völlig klar gemacht haben.

Bezeichnet man mit ζ eine durch die Gleichung $\zeta^2 + \zeta + 8 = 0$ oder $2\zeta + 1 = \sqrt{-31}$ bestimmte ganze algebraische Zahl, so sind alle ganzen algebraischen Zahlen des Gattungs-Bereichs $(\sqrt{-31})$ durch $a + b\zeta$ repräsentirt, wenn a, b irgend welche ganze Zahlen bedeuten. Die sämtlichen kubischen Abelschen Gleichungen des Gattungs-Bereichs $(\sqrt{-31})$ werden erhalten, wenn man die drei Wurzeln x_0, x_1, x_2 durch Gleichungen

$$(x_0 + \omega^h x_1 + \omega^{2h} x_2)^3 = (g_0 + \omega^h g_1 + \omega^{2h} g_2)^2 (g_0 + \omega^{2h} g_1 + \omega^h g_2) \quad (h=0, 1, 2)$$

bestimmt, in denen ω eine primitive dritte Wurzel der Einheit und jede der drei Grössen g eine Zahl des Rationalitäts-Bereichs $(\sqrt{-31})$ bedeutet. Bei der Decomposition der kubischen Abelschen Gleichungen des Gattungs-Bereichs $(\sqrt{-31})$ handelt es sich also nach den Darlegungen in meiner vorigen Abhandlung um die Zerlegung jener Ausdrücke

$$(x_0 + \omega^h x_1 + \omega^{2h} x_2)^3$$

in Factoren, d. h. es müssen ganze algebraische Zahlen von der Form:

$$(g_0 + \omega^h g_1 + \omega^{2h} g_2)^2 (g_0 + \omega^{2h} g_1 + \omega^h g_2),$$

in denen g_0, g_1, g_2 ganze algebraische Zahlen des Bereichs $(\sqrt{-31})$ sind, in Factoren von eben derselben Form zerlegt werden.

¹ Vergl. die bezüglichen Mittheilungen im §. 19. S. 67 und 68 meiner Festschrift zu Hrn KUMMER's Doctor-Jubiläum.

Die sämtlichen Primformen des Gattungs-Bereichs (ζ, ω) ergeben sich aus der Zerlegung der gewöhnlichen Primzahlen in ihre algebraischen Primtheiler. Die Primzahlen selbst sondern sich darnach in vier Kategorien: $p, q, \mathfrak{p}, \mathfrak{q}$, und sie werden durch die Relationen

$$\begin{pmatrix} -31 \\ p \end{pmatrix} = 1, \quad \begin{pmatrix} -3 \\ p \end{pmatrix} = 1; \quad \begin{pmatrix} -31 \\ q \end{pmatrix} = -1, \quad \begin{pmatrix} -3 \\ q \end{pmatrix} = 1 \\ \begin{pmatrix} -31 \\ \mathfrak{p} \end{pmatrix} = 1, \quad \begin{pmatrix} -3 \\ \mathfrak{p} \end{pmatrix} = -1; \quad \begin{pmatrix} -31 \\ \mathfrak{q} \end{pmatrix} = -1, \quad \begin{pmatrix} -3 \\ \mathfrak{q} \end{pmatrix} = -1$$

von einander geschieden, in welchen die Parenthesen-Brüche in üblicher Weise die Legendre'schen Zeichen für den quadratischen Restcharakter der Zahlen -3 und -31 bedeuten. Die Anzahl der verschiedenen Classen algebraischer Formen ist für die Gattungs-Bereiche $(\sqrt{-3})$ und $(\sqrt{3}, 31)$ gleich *Ein*s, für den Gattungs-Bereich $(\sqrt{-3}, 31)$ aber gleich *Drei*, und da die algebraischen Formen des Gattungs-Bereichs $(\sqrt{-3}, \sqrt{-3}, 31)$ sich — im Sinne relativer Äquivalenz — aus denen jener drei Bereiche zusammensetzen lassen, so ist die Classenanzahl für den Bereich $(\sqrt{-3}, \sqrt{-3}, 31)$ ebenfalls gleich *Drei*. Die Primzahlen p sondern sich hiernach in solche (p^0) , welche sich als Normen ganzer algebraischer Zahlen des Bereichs $(\sqrt{-3}, \sqrt{-3}, 31)$ darstellen lassen, und in solche (p') , deren Kubus erst diese Eigenschaft besitzt. Diese Primzahlen p' sind es, deren Verhalten bei den Abelschen Gleichungen besonders hervorgehoben zu werden verdient.

Für alle Primzahlen p giebt es ganze Zahlen r, s , so dass

$$\text{Nm}(r - \zeta) \equiv 0 \pmod{p}, \quad \text{Nm}(s - \omega) \equiv 0 \pmod{p}$$

wird, und die ganze algebraische Form mit den Unbestimmten u, u', u'' :

$$pu + (r - \zeta)u' + (s - \omega)u''$$

ist für die Zahlen p^0 einer ganzen algebraischen Zahl des Bereichs (ζ, ω) absolut äquivalent, gehört also der Hauptclasse an, während für die Primzahlen p' erst die dritte Potenz jener Form eine Form der Hauptclasse ist. Wird nun für diesen letzteren Fall jene Form selbst oder eine ihr absolut äquivalente Form mit $F(u, \zeta, \omega)$ bezeichnet, so sind die drei Classen algebraischer Formen durch

$$1, F(u, \zeta, \omega), (F(u, \zeta, \omega))^2$$

zu repräsentiren. Die mit $F(u, \zeta, \omega)$ conjugirte Form $F(u, \zeta, \omega^2)$ muss demnach entweder der Form $F(u, \zeta, \omega)$ oder deren Quadrat relativ äquivalent sein. Das Letztere ist aber unmöglich, da alsdann

$$F(u, \zeta, \omega) F(u, \zeta, \omega^2) \text{ relativ äquivalent } F(u, \zeta, \omega)^3$$

wäre, also das Product der Formen $F(u, \zeta, \omega), F(u, \zeta, \omega^2)$ der Hauptclasse angehören und einer ganzen algebraischen Zahl des Bereichs (ζ) oder $(\sqrt{-3}, 31)$ absolut äquivalent sein würde, während die Primzahl p' , welcher

$$\text{Nm } F(u, \zeta, \omega) \text{ oder } \text{Nm } (F(u, \zeta, \omega) \cdot F(u, \zeta, \omega^2))$$

absolut äquivalent ist, nicht als Norm einer ganzen algebraischen Zahl $a + b\zeta$ dargestellt werden kann. Hiernach ist nothwendig

$$F(u, \zeta, \omega) \text{ relativ äquivalent } F(u, \zeta, \omega^2),$$

also auch

$$F(u, \zeta, \omega)^2 \cdot F(u, \zeta, \omega^2) \text{ relativ äquivalent } \text{Eins},$$

d. h. es finden, wenn $H(\zeta, \omega)$ und $\Theta(\zeta, \omega)$ ganze algebraische Zahlen des Bereichs (ζ, ω) bedeuten, die absoluten Äquivalenzen

$$F(u, \zeta, \omega)^3 \propto H(\zeta, \omega), \quad F(u, \zeta, \omega)^2 \cdot F(u, \zeta, \omega^2) \propto \Theta(\zeta, \omega)$$

statt, oder also die Gleichungen

$$F(u, \zeta, \omega)^3 = E^0(u, \zeta, \omega) \cdot H(\zeta, \omega)$$

$$F(u, \zeta, \omega)^2 \cdot F(u, \zeta, \omega^2) = E'(u, \zeta, \omega) \cdot \Theta(\zeta, \omega),$$

in denen $E(u, \zeta, \omega)$, $E'(u, \zeta, \omega)$ primitive oder Einheits-Formen bezeichnen. Aus diesen beiden Gleichungen folgt die Relation

$$H(\zeta, \omega)^2 \cdot H(\zeta, \omega^2) \cdot \bar{E}(u, \zeta, \omega) = E^0(u, \zeta, \omega)^3 \cdot \Theta(\zeta, \omega)^3,$$

wenn $\bar{E}(u, \zeta, \omega) = E^0(u, \zeta, \omega)^2 \cdot E'(u, \zeta, \omega)$ gesetzt wird, und aus dieser Relation ist nach jenem im §. 15, IX meiner oben citirten Festschrift entwickelten Satze zu erschliessen, dass

$$H(\zeta, \omega)^2 H(\zeta, \omega^2) = \Theta(\zeta, \omega)^3 \cdot E(\zeta, \omega)$$

sein muss, wo $E(\zeta, \omega)$ eine ganze algebraische Einheit des Bereichs (ζ, ω) , d. h. eine ganze algebraische Zahl dieses Bereichs bedeutet, deren Norm gleich Eins ist.

Alle diejenigen kubischen Abelschen Gleichungen, für welche

$$(x_0 + \omega x_1 + \omega^2 x_2)(x_0 + \omega^2 x_1 + \omega x_2)$$

nur eine Potenz von p' ist, sind in solche zu zerlegen, bei denen

$$(x_0 + \omega x_1 + \omega^2 x_2)^3 = H(\zeta, \omega)^2 H(\zeta, \omega^2)$$

ist, und $H(\zeta, \omega)$ ist eine ganze algebraische Zahl, deren Norm der Kubus von p' ist. Nun wird aber nach der obigen Entwicklung alsdann

$$x_0 + \omega x_1 + \omega^2 x_2 = \theta(\zeta, \omega) \sqrt[3]{E(\zeta, \omega)},$$

d. h. alle diese Abelschen Gleichungen gehören, wenn nur eine einfache Einheit $\pm \omega^n$ zu $E(\zeta, \omega)$ als Factor hinzugefügt wird, zu derselben Gattung wie die eine Abelsche Gleichung, deren drei Wurzeln ξ_0, ξ_1, ξ_2 durch die Gleichungen

$$\xi_0 + \xi_1 + \xi_2 = \eta_1 + \eta_2, \quad \xi_0 + \omega^2 \xi_1 + \omega \xi_2 = \sqrt[3]{\eta_1}, \quad \xi_0 + \omega \xi_1 + \omega^2 \xi_2 = \sqrt[3]{\eta_2}$$

gegeben sind, wenn η_1, η_2 die conjugirten Fundamental-Einheiten

$$\eta_1 = 1 - \zeta + 3\omega, \quad \eta_2 = 1 - \zeta + 3\omega^2$$

bedeuten. Im Bereiche (ζ, ω) giebt es nämlich nur die eine Fundamental-Einheit η_1 und jede Einheit $E(\zeta, \omega)$ ist also als eine ganze

Potenz von η_1 , multiplicirt mit einer einfachen Einheit, darzustellen. Diese eine Gleichung¹

$$(x - \xi_0)(x - \xi_1)(x - \xi_2) = x^3 - 10x + \sqrt{-31}(x^2 - 1) = 0$$

charakterisirt aber jene merkwürdige Gattung von Gleichungen, deren Wurzeln die zu $\sqrt{-31}$ gehörigen singulären Moduln der elliptischen Functionen sind, und diese Gleichung bildet demnach, so zu sagen, die »Einheitsgleichung« für die kubischen Abelschen Gleichungen des Bereichs $(\sqrt{-31})$, ebenso wie für den absoluten Rationalitäts-Bereich jene Gleichung $y^3 - 3y + 1$ (vergl. S. 1060), deren Wurzeln durch die neunten Wurzeln der Einheit gegeben werden. Aber noch besser wird jene besondere, und jede derselben Gattung angehörige, kubische Abelsche Gleichung des Bereichs $(\sqrt{-31})$ vor allen übrigen dadurch charakterisirt, dass bei deren Auflösung die Kubikwurzel aus einer ganzen algebraischen Zahl des Bereiches $(\sqrt{-3}, \sqrt{-31})$ zu nehmen ist, welche im arithmetischen, aber nicht im algebraischen Sinne ein vollständiger Kubus ist,

dass daher die Gattung algebraischer Zahlen, welche durch die Wurzeln jener besonderen Gleichung definirt wird, gewissermassen arithmetisch dem Bereiche $(\sqrt{-31})$ selbst angehörig und algebraisch demselben unmittelbar »associirt« erscheint. —

Wie es in dem hier entwickelten speciellen Falle von $(\sqrt{-31})$ genügt, eine Abelsche Gleichung zu nehmen, bei deren Auflösung nur die Wurzel aus einer Einheit vorkommt, so findet dies allgemein für den Fall $\sqrt{-D}$ statt, wenn $-D$ eine im Gauss'schen Sinne reguläre Determinante quadratischer Formen ist. Aber für irreguläre Determinanten treten ebensoviel besondere Abelsche Gleichungen auf, als Formen zur Composition nöthig sind, und dass auf diese Weise ein merkwürdiger Zusammenhang der Composition Abelscher Gleichungen mit der Composition der quadratischen Formen aufgedeckt wird, kann wohl als eine Bewährung der Principien angesehen werden, welche ich in meiner vorigen Abhandlung aufgestellt habe.

¹ Vergl. meine Mittheilung im Monatsbericht vom April 1880.

Über die cyklische Entwicklung und die Verwandtschaftsverhältnisse der Siphonophoren.

Von Dr. CARL CHUN,

Privatdocent in Leipzig.

(Vorgelegt von Hrn. PETERS am 7. December [s. oben S. 1057].)

Hierzu Taf. XVII.

Der Königlichen Akademie der Wissenschaften, welche durch Verleihung eines Reisestipendiums dem Verfasser die Möglichkeit gewährte, an den Küsten Spaniens und in der Zoologischen Station zu Neapel Untersuchungen über die Schwimmpolypen anzustellen, fühlt sich derselbe zu ehrerbietigstem Danke verpflichtet und erlaubt sich zugleich, im Nachfolgenden eine kurze Übersicht seiner Resultate vorzulegen. Die ausführliche Darstellung seiner Untersuchungen wird er in einer Monographie der Siphonophoren geben, welche er auf den Vorschlag von Hrn. Prof. A. DOHRN hin für die »Fauna und Flora des Golfes von Neapel« übernommen hat.

Durch liebenswürdiges Entgegenkommen und bereitwillige Unterstützung jeglicher Art suchten die Hrn. ROBERT SLOMAN in Hamburg, Capitän PEYN von der »Marseille« und die Beamten der Station seine Arbeit zu fördern. Ihnen Allen spricht der Verfasser hiermit seinen herzlichsten Dank aus.

I. Die cyklische Entwicklung von *Monophyes primordialis* CHUN.

Im Jahre 1853 wies LEUCKART¹ die merkwürdige Thatsache nach, dass die an dem Stamme der Diphyiden gruppenweise vereinigten Anhänge sich loslösen und von der Colonie getrennt, eine freie Existenz führen. Eine ganze Reihe vermeintlich selbständiger, unter die Gattungen *Eudoxia* und *Ersaea* vertheilter Arten (die »monogastrischen Diphyiden«) erwiesen sich somit als zu dem Entwicklungszyklus der Diphyiden

¹ Die Siphonophoren. Eine zoologische Untersuchung. 1853. S. 56.

gehörig. Als man späterhin durch HUXLEY,¹ PAGENSTECHER² und CLAUS³ auf sehr einfach gebaute kleine Siphonophoren mit nur einer Schwimmglocke, welche wir mit CLAUS als Monophyiden bezeichnen wollen, aufmerksam wurde und an deren Stamme dieselbe gruppenweise Anordnung der polymorphen Individuen wahrnahm, da lag die Vermuthung nahe, dass auch hier die Gruppen sich loslösen möchten. Thatsächlich wies CLAUS in einem interessanten Aufsätze nach, dass die von GEGENBAUR unter dem Namen *Diplophysa* beschriebenen monogastrischen Colonien die freigewordenen geschlechtsreifen Abkömmlinge von *Monophyes* repräsentiren.

Soweit demnach unsere Erfahrungen über den cyklischen Entwicklungsgang der Monophyiden und Diphyiden einerseits und der höchststehenden Siphonophoren, nämlich der Velelliden, andererseits reichen, so war man berechtigt, anzunehmen, dass die Brut der Eudoxien und Diplophysen bez. der von den Velelliden aufgezogenen und sich loslösenden Medusen, nämlich der Chrysomitren, wieder die polymorphe Ammengeneration liefere.

Zu meiner Überraschung belehrte mich jedoch das Studium einer neuen Art von *Monophyes*, dass die cyklische Entwicklung der Siphonophoren noch weitere Complicationen aufweist.

Indem ich nun in Kürze den Bau und die Entwicklung von *Monophyes primordialis*, wie ich diese neue Art benenne, darstelle, so folge ich dem Gange, welchen die Untersuchung nahm.

Unter der reichen pelagischen Fauna Malaga's, welche mir der Fang mit dem Schwebnetze lieferte, fiel mir öfters ein kleines Siphonophorenstöckchen auf, das einem *Diphyes* ausserordentlich ähnlich sah. Allerdings fehlte bei sämtlichen Exemplaren eine zweite untere Schwimmglocke — ein Umstand, der zunächst nicht frappiren konnte, da ja leicht die beiden Schwimmglocken der Diphyiden bei stärkerer Berührung sich loslösen. Obwohl ich nun mit der grössten Vorsicht bei dem Fange verfuhr, so gelang es mir doch nie, eine Colonie mit der vermissten zweiten Schwimmglocke aufzufinden. Da es weiterhin nicht möglich war, irgend eine Insertionsstelle für letztere nachzuweisen, so kam ich auf die sich späterhin bestätigende Vermuthung, dass ich es mit einer sehr aberrant gebauten Monophyide zu thun habe. Ich hielt sie anfänglich für neu, überzeugte mich jedoch späterhin, dass zwei treffliche ältere Beobachter, WILL und BUSCH, das

¹ The Oceanic Hydrozoa (Ray-Society). 1859. p. 50 Taf. III. Fig. 4.

² Eine neue Entwicklungsweise bei Siphonophoren, Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. XIX. S. 244.

³ Schriften zoologischen Inhalts. II. Die Gattung *Monophyes* CLAUS und ihr Abkömmling *Diplophysa* GEGENBAUR Taf. IV.

siphonophorenstöckchen beobachtet und abgebildet hatten. WILL¹ entdeckte es in Triest und hielt es ebenso wie Busch² und die späteren Beobachter für ein *Diphyes*. Er nannte es *Diphyes Kochii*, unter welchem Namen es dann auch von Busch genauer beschrieben wurde mit dem ausdrücklichen Vermerk, dass er in dem Auffinden der weiten Schwimmglocke nicht glücklicher gewesen sei, als der Entdecker. Da BUSCH eine offenbar mit *Diphyes Kochii* identische Form auf vermeintliche Differenzen hin als *Muggiara* beschreibt, so combinire ich die von den ersten Beobachtern gewählten Namen und bezeichne die Siphonophore als *Muggiara Kochii*.

Was nun den Bau derselben, wie ich späterhin in Neapel genauer zu untersuchen Gelegenheit fand, anbelangt, so gleicht die hohe laschenförmige Schwimmglocke durchaus einer Diphyidenglocke (Fig. 2). Sie ist mit fünf flügelartig ausgezogenen Kanten versehen, von denen zwei sich gegen den Glockenrand ansehnlicher entwickeln und einen richterförmigen Raum begrenzen, in welchen der Stamm mit seinen Anhängen zurückgezogen werden kann. Der aus quergestreiften spindelförmigen Muskelzellen bestehende Schwimmsack kleidet die Subumbrella aus und findet seinen Abschluss am Glockenrande in einem sehr contractilen Velum. An der verbreiterten Seite der Glocke, oberhalb des trichterförmigen Gallertmantels bemerkt man leicht den oben genannten Saftbehälter mit seinem Öltropfen — ein Organ, das die mannichfachsten Deutungen erhielt, ohne dass sie nach meiner Ansicht das Richtige getroffen hätten. Ich halte ihn nämlich für einen hydrostatischen Apparat, bestimmt mittelst des specifisch leichteren Öltropfens dem schweren Stamme mit seinen Anhängen gewissermaßen ein Gegengewicht zu bieten und die Schwimmglocke in annähernd senkrechter Stellung zu erhalten. Von der Basis dieses Saft- oder Ölbehälters entspringen vier (von WILL und Busch übersehene) Gefässe, welche unter der Subumbrellarmuskulatur gelegen sind und neben dem Glockenrande in ein Ringgefäss einmünden. Zwei dieser Gefässe laufen an den Seitenwandungen in die Höhe, um in zierlichem Bogen umzubiegen und gegen den Rand abzustei- gen, ein drittes erreicht die Kuppe der Subumbrella und mündet der Ursprungsstelle gegenüber in den Ringcanal ein, indessen das entsprechende vierte Gefäss nur einen ganz kurzen Verbindungsast zwischen letzterem und dem Abgang der genannten Gefässe darstellt. Gefässe und Saftbehälter münden in den contractilen Stamm der ganzen

¹ Horae Tergestinae. 1844. S. 77. Taf. II. Fig. 22.

² Beobachtungen über Anatomie und Entwicklungsgeschichte einiger wirbellosen Seethiere. 1851. S. 46.

Colonie mit seinen polymorphen Anhangsgruppen ein. Im Allgemeinen ist er nicht von ansehnlicher Länge; mehr als zwölf Individuengruppen habe ich an demselben nicht beobachtet. Letztere nehmen von der Basis des Stammes bis zu dessen distalem Ende an Grösse stetig zu. Ursprünglich bestehen sie aus vier von Entoderm ausgekleideten Knospen, deren grösste sich zu einem Magenschlauche ausbildet, indessen zwei kleinere über ihr gelegene die Anlage der Deckschuppe und der Genitalschwimglocke repräsentiren; die vierte an der Basis des Magenschlauchs gelegene und frühzeitig sich mehrfach buchtende differenzirt sich zu dem Fangfaden mit den Nesselbatterieen. Ohne auf die Entwicklung dieser Knospen näher einzugehen, so erwähne ich nur, dass die Anlage der Deckschuppe sich abplattet und sichelförmig gekrümmt um den Stamm zu wachsen beginnt. Ihr entodermaler Hohlraum bildet den Saftbehälter und die flügel förmig ausgewachsenen Seitentheile umfassen die Genitalglocke. An den untersten Individuengruppen constatiren wir somit zunächst den beweglichen, seine gelblich-roth gefärbte Mundöffnung oft trichterförmig erweiternden Magenschlauch mit dem ektodermalen Zellwulst an seiner Basis, weiterhin den Fangfaden mit seinen amöboid beweglichen ektodermalen Zellfortsätzen und den an langen Nebenfäden befestigten nierenförmigen Nesselbatterieen von hochgelber Farbe und endlich die Genitalglocke mit ihrem centralen, die Geschlechtsproducte bildenden Klöppel und den vier in einen Ringcanal einmündenden Gefässen. Rasch wächst die Umbrella der Geschlechtsglocke zu ansehnlicher Grösse heran und beginnt, unterstützt durch ein Velum, Pumpbewegungen auszuführen, bis schliesslich an der Insertionsstelle der Deckschuppe die Gruppe von dem Stamme sich loslöst, um längere Zeit hindurch eine selbständige Existenz zu führen.

Auch diese geschlechtsreif werdenden monogastrischen Colonien (Fig. 3) sind der Aufmerksamkeit der schon mehrfach erwähnten Forscher, WILL und BUSCH, nicht entgangen, ohne dass sie allerdings die Beziehungen derselben zu der *Muggiaea* erkannt hätten. Als *Ersaea pyramidalis* beschreibt nämlich WILL¹ eine Siphonophore, welche offenbar mit der so genau von BUSCH² studirten *Eudoxia Eschscholtzii* identisch ist. Die *Eudoxia Eschscholtzii* nun repräsentirt die Geschlechtsgeneration der *Muggiaea*. Von den am weitesten ausgebildeten Individuengruppen der *Muggiaea* unterscheidet sie sich äusserlich nur durch die Form der Deckschuppe, welche sich ansehnlich verdickte und als letzte Andeutung an ihre flügel förmige Verbreiterung

¹ Horae Terg. S. 81. Taf. II. Fig. 17.

² A. a. O. S. 33, Taf. IV. u. V.

zwei Kanten aufweist, die sich von dem Gipfel gegen die Genitalglocke erstrecken. Letztere hat ihre volle Grösse erreicht, zeigt auf dem Querschnitte vier flügel förmig ausgezogene Kanten von ungleicher Grösse und lässt stets die vier von BUSCH übersehenen Gefässe mit ihrem Ringkanal erkennen. Dass die Eudoxien getrennten Geschlechtes sind und in dem dem Magenstiel einer Meduse entsprechenden Klöppel Samen und Ei produciren, haben wir zuerst durch BUSCH erfahren. Er machte weiterhin auf die Thatsache aufmerksam, dass neben dieser Schwimmglocke eine zweite entsteht, deren Bedeutung ihm allerdings unklar blieb. Erst LEUCKART¹ und GEGENBAUR² constatirten bei verschiedenen Eudoxien, dass diese zweite Schwimmglocke ein accessorisches Gebilde repräsentirt, bestimmt, die grössere erste nach einiger Zeit zu ersetzen. Ich habe die erste Anlage dieser zweiten Glocke bereits an den noch dem Stamme der *Muggiaea* anhaftenden Gruppen in Form einer kleinen Knospe (Fig. 2, x) wahrgenommen. Von Interesse schien mir nun die Beantwortung der Frage zu sein, ob ein ständiger Nachschub neuer Genital-Schwimmglocken stattfindet und ob weiterhin das Geschlecht der Eudoxien während dieses Wechsels alterirt wird. Ohne die Vorsichtsmaassregeln zu schildern, vermittelt deren es mir gelang, bei gehöriger Durchlüftung und Ernährung, die zarten Colonien einige Tage hindurch am Leben zu erhalten, so erwähne ich, dass neben dieser zweiten accessorischen Knospe wiederum die Anlage einer dritten und neben dieser — wie es mir in einem Falle zu constatiren gelang — die Anlage einer vierten Knospe zur Ausbildung gelangt. Sobald die älteste Glocke ihre Genitalproducte entleert hat, was meist noch während ihres Verbandes mit der *Eudoxia* stattfindet, wird sie durch die rasch heranwachsende Reserveglocke verdrängt und abgestossen, die nun ihrerseits demselben Loos anheimfällt. Stets produciren nun die Reserveglocken dieselben Geschlechtsproducte, wie die erste Glocke; ein Wechsel des Geschlechts findet demnach nicht statt. Da ich die Angaben LEUCKART's über den Wechsel der Ersatzschwimmglocken bei *Eudoxia campanula* bestätigen konnte, da weiterhin bei allen genauer untersuchten Diplophysen und Eudoxien solche Ersatzknospen beobachtet wurden, so können wir allgemein behaupten, dass die Eudoxien ohne Änderung des Geschlechts successive durch einen der Strobilisation analogen Vorgang eine Brut medusen förmiger Geschlechtsthiere erzeugen.

Beobachtet man den mit reifen Eiern erfüllten Genitalklöppel, so nimmt man an denselben eine eigenthümliche Erscheinung wahr.

¹ A. a. O. S. 47.

² Beiträge zur näheren Kenntniss der Schwimmpolypen. 1854. Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. V. S. 290.

Sie liegen zwischen Ektoderm und Entoderm, welches letzteres sie fast vollständig überzieht und nur einen kleinen, dem Ektoderm anliegenden Theil der Eioberfläche frei lässt. An dieser Stelle trifft man stets den grossen, peripher gelegenen Kern mit seinem Kernkörperchen. Zwischen Ektoderm und der vom Entoderm nicht überzogenen Eiperipherie sammelt sich etwas Flüssigkeit an, in welcher zwei bis drei Richtungsbläschen wahrgenommen werden. MÜLLER, der zuerst auf dieses Verhältniss aufmerksam machte, hielt diese Einrichtung für einen Mikropylapparat. Ich kann jedoch seiner Auffassung nicht beistimmen, da ich weder in der ektodermalen, bisweilen ausgebuchteten dünnen Ektoderm lamelle eine Öffnung fand, noch auch befruchtete Eier im Genitalklöppel antraf. Was er für eingedrungene Spermatozoen hält, sind offenbar nur die Richtungsbläschen. Der Kern mit dem umgebenden Plasma wird gewöhnlich von dem angrenzenden Ektoplasma überwallt, so dass er im Grunde einer grubenförmigen Vertiefung gelegen ist. Beobachtet man nun die völlig reifen Eier, so constatirt man, dass nach und nach der Kern sich vorwölbt und die Einsenkung verschwindet, bis er schliesslich, von dem anliegenden Eiplasma umhüllt, als linsenförmige Erhebung über die Eiperipherie hervorragt. Die zarte Ektodermhülle wird hierbei ebenfalls etwas vorgedrängt und gespannt. Nach kurzer Zeit verschwindet rasch die Hervorwölbung und der Kern zieht sich soweit zurück, dass wieder eine grubenförmige Vertiefung entsteht. So werden nun ziemlich regelmässig, etwa zweimal in der Minute, Pumpbewegungen von einem Theile der Eioberfläche ausgeübt, die offenbar den Zweck haben, die dünne Ektodermhülle zu sprengen und dem Ei den Austritt und die Befruchtung zu ermöglichen. Thatsächlich sieht man auch, dass die Eier einzeln und nicht gleichzeitig aus dem Klöppel entleert werden.

Nach unseren bisherigen Kenntnissen von der Entwicklung der Siphonophoren zu schliessen, so sollte man erwarten, dass aus dem befruchteten Ei der *Eudoxia Eschscholtzii* die *Muggiaea* ihre Entstehung nähme. Ich war daher nicht wenig frappirt, als ich mit letzterer gleichzeitig in dem pelagischen Auftrieb eine zierliche Siphonophore antraf, welche auf den ersten Blick als ein ächtes *Monophyes* sich documentirte und doch Magenschläuche und Nesselbatterien aufwies, die auch bei der scrupulösesten Prüfung von denjenigen der *Eudoxia Eschscholtzii* nicht zu unterscheiden waren. Was nun zunächst die Organisation dieser kleinsten und unter allen Siphonophoren am einfachsten gebauten Colonie, welche von keinem der früheren Beobachter gesehen wurde, anbelangt, so besteht sie im Wesentlichen aus einer medusenförmigen Schwimmglocke, einem Magenpolypen und einem Fangfaden. (Fig. 1.) Die Glocke ist mützenförmig gestaltet und von seitlich

symmetrischem Bau. Die Kuppe der Umbrella erscheint zipfelartig ausgezogen und abgerundet. Neben der Insertionsstelle der übrigen Anhänge erheben sich zwei Gallertwülste als erste Andeutung einer unvollkommenen Scheide. Vier Gefäße, welche von der Basis des die Umbrella schräg durchziehenden und mit einem Öltropfen ausgestatteten Saftbehälters entspringen, versorgen die Subumbrella, um dann in einen auf dem Velum gelegenen Ringcanal einzumünden. Dass der Magenschlauch und der Fangfaden durchaus mit jenen der *Eudoxia Eschscholtzii* übereinstimmen, habe ich bereits hervorgehoben. So einfach wie das eben geschilderte *Monophyes* sind allerdings nur die jüngsten Exemplare gebaut; an etwas älteren lässt sich noch eine weitere Complication beobachten. Magenschlauch mit Fangfaden sind nämlich von der Basis des Saftbehälters abgerückt und communiciren mit letzterem mittelst eines contractilen Abschnittes: der ersten Andeutung eines Stammes. Dagegen treten nun an diesem kleinen Stamme direct neben dem Saftbehälter neue Knospenanlagen auf und zwar zunächst eine nach oben (der Kuppe der Umbrella) gekehrte ansehnliche Knospe und späterhin ihr gegenüber eine Gruppe von vier Knospen. (Fig. 5). Während die zuerst entwickelte Knospe, wie dies bald deutlich hervortritt, die Anlage einer Schwimmglocke repräsentirt, so fällt an der Gruppe von vier Knospen die identische Ausbildung mit jenen Knospengruppen auf, deren wir bereits früherhin an dem Anfangstheile des Stammes von *Muggiaea* zu erwähnen hatten. Thatsächlich können wir uns der Auffassung nicht entschlagen, dass die vier Knospen die Constituenten einer *Eudoxia Eschscholtzii*: Magenschlauch, Fangfaden, Deckschuppe und Genitalglocke repräsentiren. Doch wie erklären wir uns nun die räthselhafte Erscheinung, dass von zwei so ganz differenten Formen, wie sie die *Muggiaea* und *Monophyes primordialis* repräsentiren, Knospenanlagen gebildet werden, die in ihrer weiteren Entwicklung durchaus harmoniren und beidemale zu der *Eudoxia Eschscholtzii* heranwachsen? Die Lösung aller der sich aufdrängenden Fragen ist eine nicht minder überraschende: aus der am Ursprung des Stammes von *Monophyes primordialis* gelegenen Anlage einer Schwimmglocke geht nämlich die fünfkantige Schwimmglocke der *Muggiaea* hervor. Die *Muggiaea Kochii* repräsentirt demnach nicht eine selbständige Art, sondern sie wird von *Monophyes primordialis* aufgeammt, um sich sodann unter Mitnahme des gesamten Stammes und der späteren Eudoxiengruppen von dem Mutterthier loszulösen und eine freie Existenz zu führen. In Fig. 4 stelle ich ein frei gefischtes Stadium dar, welches klar den Zusammenhang von *Muggiaea* und *Monophyes* demonstirt. Die Schwimmglocke der ersteren hat bereits die fünf-

kantige Gestalt erlangt und lässt deutlich den charakteristischen Gefässverlauf erkennen. Die Mündung der Glocke ist von derjenigen der *Monophyes*-Glocke abgewendet, so dass beide in entgegengesetztem Sinne lebhaft Pumpbewegungen ausführen. In fast allen später beobachteten Fällen (durch Züchten des *Monophyes* ist es mir sechsmal gelungen die Glocke der *Muggiaea* zur halben Grösse der *Monophyes*-Glocke heranwachsen zu lassen) waren die Glocken in gleichem Sinne angeordnet. Der Stamm ist bereits von ansehnlicher Länge und lässt ausser dem endständigen Magenschlauch mit dem Fangfaden noch die Anlage einer weiteren Eudoxiengruppe erkennen. Beobachtet man nun in einem Uhrsälchen mit reichlichem Wasser die beiden sehr lebhaften Pumpbewegungen ausführenden Glocken, so gelingt es bisweilen sich direct von der Trennung derselben zu überzeugen, insofern meist nach einer heftigen Pumpbewegung von Seiten einer der Glocken der zarte verbindende Stammtheil abreisst und beide nun selbständig sich fortbewegen. So erklärt es sich denn auch, dass man in dem Auftriebe öfters ausser den isolirten Geschlechtsglocken der Eudoxien die aller Anhänge baaren Glocken von *Monophyes* antrifft. Nach ihrer Lostrennung wächst die Glocke der *Muggiaea* rasch heran und erreicht etwa die dreifache Grösse der *Monophyes*-Glocke. Doch nicht nur an der eben geschilderten fast völlig entwickelten Glocke der *Muggiaea* lässt sich der Zusammenhang beider Generationen nachweisen, sondern selbst schon an der unscheinbaren kuglichen Knospe tritt bei genauerer Prüfung der für die ausgebildete Glocke charakteristische Gefässverlauf deutlich hervor. Ein Blick auf Fig. 5 zeigt, wie die Gewebe des Stammes an dem Aufbau der Knospe sich betheiligen, wie das Ektoderm continuirlich in die äussere Knospenwand übergeht (schon früher wurde die Umbrella durch eine ektodermale Einstülpung gebildet), während das Entoderm durch eine Ausbuchtung die Anlage des Saftbehälters und die Gefässlamelle entstehen lässt, in welcher letzterer die Gefässe den für die entwickelte *Muggiaea* typischen Verlauf nehmen.

Die Thatsache, dass neben einer kleinen mützenförmigen Schwimmglocke eine zweite von so gänzlich differenter Gestalt und Grösse geknospt wird mit der Bestimmung, sich von derselben loszulösen und dieselbe Function wie die primäre Glocke auszuüben, dürfte unter den Cölenteraten einzig dastehen. Wir constatiren zwar am Stamme der Siphonophoren die mannigfachsten polymorphen Anhänge, allein stets ist auch die differente Gestalt durch eine differente Leistung bedingt: die medusenförmige Locomotive ist anders gebaut, als die an demselben Stocke geknospte medusenförmige Genitalschwimmglocke. Wie erklärt es sich nun, dass hier zwei mit derselben Leistung, nämlich der Ortsbewegung des Stockes, betraute Glocken so differenten

Habitus annehmen? Ich weiss keine andere Antwort auf diese Frage zu geben, als dass die kleine mützenförmige *Monophyes*-Glocke wohl für die Fortbewegung des einen Magenschlauches mit dem Fangfaden ausreicht, dass jedoch mit der Verlängerung des Stammes und der Vermehrung der Individuengruppen die Nothwendigkeit entsteht, durch eine grössere und schlanke, das Wasser leicht durchschneidende Glocke den Widerstand zu paralysiren, welchen der lang ausgezogene und nachschleifende Stamm mit den Anhängen einer raschen Ortsbewegung entgegensetzt. Dass die diphyidenähnliche Glocke der *Muggiaea* einer solchen Anforderung ausgezeichnet entspricht, wird Jeder erfahren, der das pfeilschnell durch das Wasser schiessende Stöckchen herauszufangen versucht.

Wenn ich nun auch glaube, es als feststehendes Factum nachgewiesen zu haben, dass der cyklische Entwicklungsgang dieser niedrigst stehenden Siphonophoren aus drei Generationen sich zusammensetzt, so verlangt doch eine wissenschaftliche Methode den Nachweis, dass aus den Eiern der von *Muggiaea* geknospten Eudoxien die *Monophyes primordialis* ihre Entstehung nimmt. Obwohl sich der Untersuchung mehrere Schwierigkeiten in den Weg stellen, bedingt durch die Kleinheit und Durchsichtigkeit der winzigen Eier und weiterhin durch den Umstand, dass nur sehr selten gleichzeitig männliche Eudoxien mit vollständig reifen, stecknadelförmigen Spermatozoen und weibliche Schwimmglocken gefunden werden, welche an den charakteristischen Pumpbewegungen des den Eikern umgebenden Plasma's als mit befruchtungsfähigen Eiern erfüllt sich documentiren, so ist es mir doch nach mehreren fehlgeschlagenen Versuchen schliesslich gelungen, eine künstliche Befruchtung herbeizuführen und den Nachweis zu liefern, dass aus den Eiern der *Eudoxia* ein flimmernder Embryo entsteht, welcher zu der *Monophyes* heranwächst. Sieben reife Eier, welche in dem Klöppel einer Genitalglocke enthalten waren und von denen eines gerade aus der gesprengten Ektodermhülle auszutreten begann, versetzte ich am 23. September in ein Gefäss, das von reifen, einem männlichen Klöppel entnommenen Spermatozoen wimmelte. Da es mir an dem spärlichen Materiale wesentlich darauf ankam, die späteren Entwicklungsstadien zu züchten, so unterliess ich es, die ersten Furchungserscheinungen zu beobachten. Sie müssen in der warmen Jahreszeit einen rapiden Verlauf nehmen, denn am nächsten Tage fand ich zu meiner Freude bereits sieben freischwimmende Embryonen vor. Der jüngste repräsentirte eine kugelrunde Planula mit dünnen flimmernden Ektodermzellen und grossen polyedrisch abgeplatteten, den gesammten Innenraum erfüllenden Entodermzellen. Er beginnt rasch eine ovale Gestalt anzunehmen und differenzirt an dem einen

Pole gelbrothes Pigment. Letzterer repräsentirt den späteren Mundpol, oder genauer gesagt diejenige Stelle, an welcher die Mundöffnung des Magenpolypen zum Durchbruch gelangt. Bei der rotirenden Ortsbewegung ist er stets nach hinten gekehrt. Seitlich von dem pigmentfreien, bei der Fortbewegung vorauseilenden Pole entsteht eine Ektodermeinstülpung: die Anlage der Subumbrella der Schwimmglocke. Unterhalb derselben wulstet sich die Körperwandung in Form einer Knospe hervor, aus der unter mehrfach wiederholten Buchtungen der Fangfäden seine Entstehung nimmt. Das Entoderm sondert sich inzwischen, wie dies HAECKEL und METSCHNIKOFF bereits erkannten, in eine centrale Zellmasse mit deutlich nachweisbaren Kernen und in eine kleinzellige dem Ektoderm anliegende Schichte. Letztere repräsentirt das definitive Entoderm, während erstere allmählich der Resorption anheimfällt. Die Schwimmglockenanlage vergrössert sich ansehnlich; die Gefässlamelle mit ihrer seitlichen, den späteren Saftbehälter darstellenden Ausbuchtung tritt deutlich hervor und der Embryo erlangt die in Fig. 6 gezeichnete Form. Am dritten Tage (Fig. 7) ist die Identität mit *Monophyes* unverkennbar. Die Schwimmglocke ist mützenförmig gestaltet, lässt in ihrer Gefässlamelle die Höhlungen der vier Radiärgefässe mit dem Ringcanal deutlich erkennen und beginnt bereits, obwohl sie noch von zarten Flimmereilien bedeckt wird, Pumpbewegungen auszuführen. Seitlich hängt ihr ein grosser hauptsächlich aus den saftreichen Entodermzellen bestehender Wulst an, der continuirlich in den noch geschlossenen Magenschlauch übergeht. Letzterer ist intensiv roth gefärbt und weist einen von Saftzellen freien centralen Hohlraum auf. An seiner Basis wölben sich die zahlreichen pilzförmigen Knospen der Fangfädenanlage hervor. Indem nun die Saftzellen resorbirt werden, der Fangfaden mit seinen Nesselbatterieen sich verlängert und schliesslich die Mundöffnung des Magenschlauchs zum Durchbruch gelangt, so nimmt am Ende des dritten Tages die Larve eine Gestalt an, welche durchaus mit den jüngsten frei gefischten Stadien von *Monophyes* übereinstimmt.

Nachdem somit der Beweis erbracht ist, dass das befruchtete Ei der *Eudoxia Eschscholtzii* zu *Monophyes primordialis* sich entwickelt, so haben wir also in dem Entwicklungsgange der letzteren folgende Stadien zu verzeichnen:

1. Die Planula.
2. Der Embryo mit den Knospenanlagen für Schwimmglocke und Fangfaden.
3. *Monophyes primordialis*.
4. *Muggiaea Kochii*.
5. *Eudoxia Eschscholtzii*.

II. Die Verwandtschaftsbeziehungen der Siphonophoren.

Mit dem Nachweis, dass in den Entwicklungsgang der Monophyiden drei Generationen eingreifen, werden mehrere Fragen angeregt, welche zum Theil einer weiteren Untersuchung als Richtschnur dienen mögen, zum Theil bereits jetzt beantwortet werden können. Vor Allem wäre zu eruiern, ob — wie es mir sehr wahrscheinlich dünkt — auch die übrigen *Monophyes*-Arten eine dritte Generation aufweisen. In seinen »Oceanic Hydrozoa« bildet HUXLEY mehrere *Diphyes*-Arten ab (Taf. I. Fig. 3. und 4. *Diphyes mitra* und *D. Chamissonis*), bei denen eine zweite Schwimmglocke nicht beobachtet wurde. Möglicherweise repräsentiren sie Monophyiden vom Bau der *Muggiaca*. Doch nicht nur für die Monophyiden, sondern auch für die gesamten Calycophoriden dürfte aus Gründen, die ich später noch andeuten werde, der Nachweis einer eventuell vorkommenden dritten Generation zu erbringen sein. Eine weitere Frage, die wir jetzt schon in bejahendem Sinne beantworten können, würde diejenige sein, ob die *Monophyes primordialis* mit ihrem complicirten Wechsel heteromorpher Generationen wirklich die einfachste Siphonophore repräsentirt oder ob sie nicht eher als eine rückgebildete Form zu betrachten sei. Wenn ich mich gegen letztere Auffassung entscheide, so beziehe ich mich nicht nur auf ihre einfache Organisation, welche in den einfachen histologischen Verhältnissen sich widerspiegelt, sondern auch auf ihre Embryonalentwicklung. Wäre sie eine rückgebildete Siphonophore, so könnten wir erwarten, dass analog den Larven der Physophoriden larvale Organe aufträten, welche abgeworfen oder durch definitive Gebilde ersetzt würden. Ganz im Gegentheil lässt uns die Embryonalentwicklung der *Monophyes primordialis* einen so einfachen Verlauf erkennen, wie ihn die übrigen Siphonophoren nicht mehr aufweisen. Wenige Tage genügen, um das befruchtete Ei direct in das ausgebildete Thier überzuführen. Endlich spricht für ihre primitive Organisation der Umstand, dass die gesamten Calycophoriden in ihrer Entwicklung ein Stadium durchlaufen, welches bis in das Detail den Bau von *Monophyes primordialis* recapitulirt. *Monophyes primordialis* ist die Stammform der Siphonophoren. Soweit wir bis jetzt die Embryonalentwicklung der Calycophoriden kennen, so nimmt sie einen Verlauf, welcher mit derjenigen von *Monophyes primordialis* fast identisch ist. Überall wird am Keim zunächst die Knospe für eine Schwimmglocke und dann eine für den Fangfaden angelegt. Es bildet sich eine Larve, welche dem *Monophyes* unter Umständen zum Verwechseln ähnlich sieht. Selbst Äusserlichkeiten — so die mützenförmige Gestalt — werden so getreu recapitulirt, dass man geradezu

die Abbildung, welche z. B. METSCHNIKOFF von der Larve der *Epibulia* (*Galeolaria*) *aurantiaca* giebt (Zeitschrift f. wissensch. Zool. Bd. XXIV. Taf. VII. Fig. 14) für die Darstellung unseres *Monophyes* halten könnte.

Fassen wir nun das eben erwähnte Stadium von *Epibulia* genauer in das Auge, so fällt an demselben noch eine weitere Complication auf, welche das Interesse in Anspruch nimmt. Wie nämlich an der Basis des Stammes von *Monophyes* die Glocke der *Muggitea* angelegt wird, so findet sich auch genau an derselben Stelle bei der *Epibulia*-Larve die Knospe für eine zweite Schwimmglocke. Ist dieselbe nun bestimmt, nach ihrer Reife von der ersten Glocke sich abzulösen. (was, nach der opponirten Stellung der Schwimmglockenmündungen zu schliessen, nicht unwahrscheinlich erscheint) oder repräsentirt sie die Anlage der zweiten Diphydenglocke? Mit einem Worte: besitzen die Diphyiden ebenfalls drei Generationen, oder repräsentiren sie höher entwickelte Monophyiden, bei denen zwei frei werdende Generationen in eine zusammengezogen sind? Die spätere Untersuchung muss hierüber Auskunft geben; immerhin ist es schon als ein Gewinn zu bezeichnen, wenn wir Zeit und Ort, wo eine dritte Generation auftreten könnte, genau anzugeben wissen.

Aus den bisherigen Erörterungen dürfte zur Genüge hervorgegangen sein, dass die Monophyiden zu den Calycophoriden die nächsten verwandtschaftlichen Beziehungen erkennen lassen. Wir können sie geradezu als die niedrigst stehenden Calycophoriden betrachten und dürften diese Ordnung am besten in drei Familien: in die Monophyiden mit einer Schwimmglocke, die Diphyiden mit zwei und die Polyphyiden mit mehr als zwei Schwimmglocken eintheilen. Jene Familie, für welche ich die Benennung Polyphyiden vorschlage, zeigt nun mehrere Eigenthümlichkeiten, als deren bemerkenswerthe hervorgehoben ist, dass die Individuen zwar gruppenweise an dem Stamme vertheilt sind, allein nicht mehr in Gestalt von Eudoxien frei werden. Männliche und weibliche Schwimmglocken besitzen eine auffällig kleine Umbrella und bringen die Geschlechtsproducte in dem grossen Klöppel zur vollen Reife, ohne von dem Stamme als Medusen sich loszulösen. Während bei den Monophyiden und Diphyiden die cyklische Entwicklung sich auf zwei resp. drei Generationen vertheilt, so sind dieselben hier in eine zusammengezogen.

Wie erklärt es sich nun, dass eine directe Entwicklung bei den Polyphyiden und Physophoriden eingreift, um dann wiederum bei den höchst organisirten Siphonophoren, nämlich den Velelliden, einem Generationswechsel Platz zu machen? Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir etwas weiter ausholen. Wie ich oben andeutete, so besitzen die Calycophoriden einen hydrostatischen Apparat

in Gestalt des sogenannten Saftbehälters mit seinem Öltropfen. An Stelle des specifisch leichten Öles wird nun bei allen übrigen Siphonophoren ein compressibles Medium, ein Gasgemenge, an dem oberen Ende des Stammes ausgeschieden. Es tritt bei ihnen ein neues Organ, der Luftsack, auf, welches, ursprünglich von geringer Grösse, immer ansehnlichere Dimensionen annimmt und schliesslich bei den Rhizophysen, Physalien und Vellelen nicht nur auf die Physiognomie, sondern auch auf die gesammte Organisation bedingend einwirkt. Was die Entwicklung des Luftsackes anbelangt, so kann ich die Angaben METSCHNIKOFF's nach Untersuchungen an den Embryonen von *Halistemma pictum* (= *H. Tergestinum* CLAUS) bestätigen. An dem bei der Ortsbewegung vorauseilenden Pole der Planula bemerkt man eine solide Verdickung des Ektodermes, die schliesslich von ihrem Mutterboden sich abschnürt und von dem kleinzelligen Entoderm umgeben, etwas in die Tiefe rückt. Durch Auseinanderweichen der abgeschnürten Ektodermzellen entsteht ein mit granulirter Flüssigkeit erfüllter und rasch sich erweiternder Hohlraum. Die Ektodermzellen scheiden mit Ausnahme der dem hinteren Pol der Planula zugekehrten Partie eine zarte Chitinlamelle nach dem Innenraum der Blase ab und beginnen gleichzeitig ein Gasgemenge zu secerniren, welches oberhalb der Flüssigkeit sich ansammelt. Der vollkommen geschlossene Luftsack nimmt frühzeitig flaschenförmige Gestalt an und communicirt bei den ächten Physophoriden nie mit der Aussenwelt. Bei seiner relativ unansehnlichen Entwicklung spielt er, soweit eine Ortsbewegung, d. h. ein Sinken und Aufsteigen in Betracht kommt, eine nur untergeordnete Rolle. Dagegen wird diese in wirksamer Weise, ebenso wie bei den Polyphyiden, durch eine grosse Zahl von Schwimmglocken bewerkstelligt bez. bei der einzigen, der letzteren entbehrenden Physophoride, nämlich der *Athorybia*, durch medusenartige Schwimbewegungen von Deckstücken.

Darf es uns nun befremdlich erscheinen, dass hier, wo für die Verbreitung der Art vermittelst zahlreicher, energisch wirkender Schwimmglocken Vorsorge getroffen ist, die Geschlechtsthiere selbst unbeweglich am Stamme befestigt bleiben? Dass für die Monophyiden und Diphyiden bei ihrer wenig ausgiebigen Locomotion vermittelst einer oder zweier Schwimmglocken das Beweglichmachen der Geschlechtsthiere ein wirksames Instrument für die Verbreitung der Art abgiebt, liegt auf der Hand. Bei den Polyphyiden lassen männliche und weibliche Individuen noch eine medusenförmige Ausbildung erkennen, allein die Umbrella erscheint reducirt um dann bei den mit noch zahlreicheren Schwimmglocken ausgestatteten Physophoriden lediglich eine mantelartige Umhüllung des einzigen Eies darzustellen.

Ist nun unsere Auffassung richtig, dass das Loslösen der Geschlechtsindividuen als Compensation für eine nicht ausreichende Ortsbewegung und die hieraus resultirende mangelhafte Verbreitung der Art auftritt, so haben wir zum Schlusse noch zu untersuchen, wie die übrigen, eine active Locomotion meist völlig aufgebenden Siphonophoren, ihre Fortpflanzung bewerkstelligen. Mit den Physophoriden vereinigte man vielfach die Rhizophysiden und Physalien. Von den ersteren unterscheiden sie sich jedoch in so vielfacher Hinsicht, dass ich vorschlage, beide als eine eigene Ordnung der »Pneumatophoriden« den Calyphoriden und Physophoriden an die Seite zu setzen. Vor Allem nimmt ihr Luftsack eine imponirende Grösse an und communicirt durch eine Öffnung mit der Aussenwelt. Locomotionsorgane in Form von Schwimmglocken oder beweglichen Deckstöcken fehlen und die für die Polypen charakteristischen »Leberstreifen« sind in zahlreiche isolirte Zöttchen aufgelöst. Während die *Rhizophysa* durch Compression der Blase auf- und abzusteigen vermag, so treibt dagegen die erwachsene *Physalia* mit ihrer gewaltigen, gewissermaassen den ganzen Stamm ausfüllenden Blase an der Oberfläche des Meeres als Spiel von Wind und Wellen umher.

Über ihren »Geschlechtsverhältnissen« schwebt immer noch ein gewisses Dunkel und wenn ich es auch noch nicht vollkommen zu lichten vermag, so glaube ich doch der Lösung um einen Schritt näher gekommen zu sein. Bekanntlich sprach HUXLEY die Vermuthung aus, es möchten bei *Physalia* die neben zahlreichen männlichen medusoiden Gemmen sitzenden medusenartigen Knospen zu weiblichen Geschlechtsthieren sich entwickeln und von der Colonie sich ablösen. Ich zweifelte lange an der Richtigkeit von HUXLEY's Vermuthung, muss ihm jedoch jetzt nach Untersuchung ganz reifer Geschlechtstrauben, welche ich Freund v. PETERSEN verdanke, durchaus beistimmen. Sie entstammen einer grossen *Physalia*, die nach den Frühjahrsstürmen von 1879 im Golfe von Neapel erschien. Auf den ersten Blick nimmt man an ihnen eine ansehnliche Zahl von Medusen wahr, die durch ihre Grösse imponiren. Vermittelst langer, von einem Canal durchzogener Stiele sitzen sie zwischen den mit fast reifen Spermatozoen erfüllten Gemmen und den für *Physalia* charakteristischen Geschlechtstastern fest. Bei genauerer Untersuchung lässt sich in dem Gallertschirm leicht eine ansehnliche, von einem Velum umsäumte Öffnung erkennen, welche in die Schirmhöhle hereinführt. Letztere ist von Ektodermzellen ausgekleidet, welche an jugendlichen Exemplaren zu Wülsten angeordnet vorspringen, an älteren jedoch sich eben ausbreiten und an ihrer Basis zahlreiche circular verlaufende glatte Muskelfasern differenziren. Die Gefässlamelle umgiebt die Epithelmuskulatur der Subumbrella und

lässt im Querschnitt das Lumen von vier Gefässen erkennen, welche unterhalb des Velums in einen Ringcanal einmünden. Einen ekto-dermalen Faserstrang, der an der Basis des Velums verläuft, bin ich geneigt, als Nervenring zu deuten. Dagegen lassen sich weder Tentakelwülste, noch Randkörper, noch endlich Geschlechtsorgane nachweisen. Ein Magenstiel, in dessen Wandung vermuthlich die Geschlechtsorgane ihre Entstehung nehmen werden, ist durch eine kleine Erhebung im Grunde der Schirmhöhle angedeutet.


Ziehen wir nun die ansehnliche Grösse dieser Medusen (sie messen in der Breite 2^{mm}, in der Länge mit dem Stiel 5—6^{mm}) und ihre auf ein freies, selbständiges Leben hindeutende Organisation in Betracht, so dürfte es kaum einem Zweifel unterliegen, dass nach der Entwicklung einer Mundöffnung und der Tentakelwülste sie sich abtrennen und zu weiblichen Anthomedusen heranwachsen. Durch Beweglichmachen der weiblichen Geschlechtsthierc wird also wiederum bei den auf eine passive Locomotion angewiesenen Physalien die Verbreitung der Art gesichert. Dass jedoch wirklich die Medusen sich abschnüren, dafür spricht noch folgende Wahrnehmung. Bei Untersuchung der Geschlechtstrauben findet man hin und wieder 3^{mm} lange Gallertstiele vor, die von einem Gefäss durchzogen werden. Sie gleichen durchaus dem basalen stielförmig ausgezogenen Abschnitt der Medusenknospen und lassen sich leicht von den Geschlechtstastern unterscheiden. Thatsächlich belehrt eine genaue Untersuchung, dass die Medusen sich nicht in ihrer ganzen Länge loslösen, sondern dass ihre untere stielförmig ausgezogene Hälfte an der Genitaltraube sitzen bleibt. Bedenkt man, dass die Physalien stets in Schwärmen zusammenleben und dass bei der Massenproduction von Spermatozoen leicht ein Contact derselben mit den von den Medusen erzeugten Eiern möglich ist, so kann es nicht befremdlich erscheinen, wenn lediglich die weiblichen Individuen eine freie Existenz führen.

Doch was ich hier von den Geschlechtsverhältnissen der *Physalia* mittheilte, das können wir mit grösster Wahrscheinlichkeit auch auf diejenigen der *Rhizophysa filiformis* übertragen. Bisher wurden als Geschlechtsorgane der letzteren kleine, isolirt am Stamme entspringende Träubchen von maulbeerartigem Aussehen beschrieben, ohne dass es jedoch gelungen wäre, Geschlechtsproducte in ihnen wahrzunehmen. Es war mir daher von grossem Interesse, als ich an einem im October erschienenen Exemplar von *Rhizophysa* den Nachweis liefern konnte, dass diese maulbeerförmigen Anhänge sich zu Geschlechtstrauben entwickeln, welche mit denen einer jungen *Physalia* fast verwechselt werden könnten. Jeder der buckelförmigen Wülste an den Träubchen beginnt sich nämlich lang oval auszuziehen, erscheint an

seiner Basis stiel förmig verjüngt und lässt ungefähr in seiner Mitte die Anlage einer Medusenknospe erkennen. Wie noch ältere Geschlechts- träubchen zeigen, so entstehen im Umkreis der die Gestalt einer Meduse deutlicher zur Schau tragenden Knospe etwa sechs bis acht aus Ekto- und Entoderm gebildete Auswüchse, indessen das distale Ende des gesammten Seitenastes in einen Geschlechtstaster sich auszieht. Die ältesten (am untersten Ende des Stammes sitzenden) Genitaltrauben bestehen demnach aus einem mit Muskelfasern reichlich ausgestatteten und sehr contractilen Stiele, dessen Hohlraum mit demjenigen des Stammes communicirt und sich andererseits in etwa zwölf Seitenäste erstreckt. Jeder dieser Seitenäste gleicht mit seinen Anhängen so völlig den entsprechenden der *Physalia*, dass ich nicht anstehe, die Medusenknospe für die Erzeugerin der Eier, die buckelförmigen Knospen für junge Samenkapseln zu halten. Die Beobachtung von noch weiter entwickelten Genitalanlagen würde dann schliesslich darüber Aufschluss geben, ob — wie es mir sehr wahrscheinlich dünkt — auch bei *Rhizophysa* die weiblichen Individuen in Form von Medusen frei werden.

Jedenfalls glaube ich nachgewiesen zu haben, dass *Rhizophysa* und *Physalia* nahe verwandtschaftliche Beziehungen erkennen lassen, welche uns berechtigen, sie zu der Ordnung der »Pneumatophoriden« zu erheben. Was speciell nun für die Frage nach dem Ursprung des Generationswechsels bei den Siphonophoren von Interesse erscheint, das ist der Umstand, dass mit dem Aufgeben einer activen Locomotion (denn kaum dürfte das Auf- und Absteigen der *Rhizophysa* für eine Verbreitung der Art in horizontaler Richtung in Betracht kommen) wieder die Nothwendigkeit resultirt, wenigstens die weiblichen Geschlechtsthiere in Form von Anthomedusen beweglich zu machen. Werfen wir nun schliesslich noch einen Blick auf die höchststehenden Siphonophoren, nämlich die Velelliden, so erscheinen sie an eine passive Ortsbewegung auf der Oberfläche des Meeres so vollkommen angepasst, dass sie nicht einmal mehr ihren gekammerten Luftsack zu comprimiren vermögen. Begreiflich, dass bei der Unmöglichkeit, irgend eine active Locomotion auszuüben, männliche wie weibliche Geschlechtsthiere in Form kleiner Medusen, nämlich der *Chrysomitren*, frei werden.

Um nun zum Schlusse unser Urtheil über die cyklischen Entwicklungsvorgänge der Siphonophoren kurz zu resümiren, so stehe ich nicht an zu behaupten, dass dieselben eine enge Beziehung zu der Ortsbewegung erkennen lassen. Wo zahlreiche, energisch wirkende Schwimmglocken, wie bei den Polyphyiden (*Hippopodius*) und Physophoriden auftreten, da bleiben die Geschlechtsthiere sessil und werden oft zu medusoiden Gemmen rückgebildet. Wo nur eine (Mono-



phyiden) oder zwei (Diphyiden) Schwimmglocken eine wenig ausgiebige Locomotion bewerkstelligen, da wird für die Verbreitung der Art durch den merkwürdigen Process der Eudoxienbildung Sorge getragen. Ja es kann vorkommen, wie ich es von *Monophyes primordialis* nachwies, dass die erste Schwimmglocke durch eine heteromorph gebildete zweite ersetzt wird, welche besser geeignet ist, den lang nachschleifenden Stamm mit den Eudoxiengruppen fortzubewegen. Bei der primitiven Organisation dieses *Monophyes* erscheint dann die Lebensgeschichte der Art über drei auseinander hervorgehende Generationen vertheilt. Fehlen endlich, wie bei den höchst organisirten Siphonophoren, den Pneumatophoriden und Discoiden, die Locomotiven und erfolgt die Ortsbewegung auf passive Weise, so wird die Verbreitung der Art durch Beweglichmachen der Geschlechtsthierc ermöglicht. Ein Generationswechsel ist es, welcher als Glied des Polymorphismus in den Entwicklungsgang der Siphonophoren eingreift und zwar bei den höchststehenden Vertretern derart, dass an einer polymorphen Ammen- generation entweder nur weibliche (Pneumatophoriden) oder männliche und weibliche (Discoiden) Anthomedusen geknospt werden, die erst nach ihrer Lostrennung zur Geschlechtsreife gelangen.

Tafelerklärung.

Die cyklische Entwicklung von *Monophyes primordialis*.

Allgemein gültige Bezeichnungen:

sch. Schwimmglocke. *g.sch.* Genitalschwimmglocke. *v.* Velum. *s.* Saftbehälter. *m.* Magenschlauch. *f.* Fangfaden. *st.* Stamm. *d.* Deckschuppe. *ek.* Ektoderm. *en.* Entoderm.

Fig. 1. Erste Generation: *Monophyes primordialis* Ch. Vergr. $\frac{60}{1}$. *x.* Knospe der *Muggiaea*-Glocke. *fl.* Flügelartige Gallertwülste.

Fig. 2. Zweite Generation: *Muggiaea Kochii*. WILL und BUSCH. Nach 60facher Vergr. gezeichnet. *K.* Kanten der Glocke. An der letzten Individuengruppe ist die Anlage der Reservegenitalglocke (*x*) bereits sichtbar.

Fig. 3. Dritte Generation: *Eudoxia Eschscholtzii*. BUSCH. ♀. Nach 60facher Vergr. gezeichnet. Die grosse Genitalschwimmglocke (*g.sch.*₁) hat am vorhergehenden Tage die Eier aus dem Genitalklöppel entleert. Die zweite Genitalschwimmglocke (*g.sch.*₂) hat sich aus einer einfachen Knospe binnen achtzehn Stunden zu einer bereits die Eikeime bergenden Schwimmglocke entwickelt und neben ihr tritt die Knospenanlage der dritten Genitalschwimmglocke (*g.sch.*₃) auf.

Fig. 4. *Monophyes primordialis* in Zusammenhang mit der *Muggiaea*-Glocke. Nach 60facher Vergr. gezeichnet.

Fig. 5. Die junge *Muggiaea*-Knospe mit der ersten Anlage einer Individuengruppe und dem obersten Stammtheil. Nach 275facher Vergr. gezeichnet. g_1 seitliches Gefäss. g_2 medianes Gefäss. *s. u.* Subumbrella. *r. K.* Ringkanal. *y.* Abgerissene Ansatzstelle an *Monophyes primordialis*.

Fig. 6. Aus Eiern der *Eudoxia Eschscholtzii* gezüchteter Embryo am zweiten Tage mit der Anlage der Schwimmglocke des Nesselfadens und des Magenschlauches. Vergr. $\frac{180}{1}$. *ga.* Gallerte. *s. u.* Subumbrella. *s. z.* entoderme Saftzellen. *en.* definitives Entoderm.

Fig. 7. Larve vom dritten Tage, welche bereits die Gestalt von *Monophyes primordialis* erlangt hat. *s. z.* Anhängender Haufen von Saftzellen. Nach 90facher Vergr. gezeichnet.

SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

21. December. Sitzung der philosophisch-historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. MOMMSEN.

Hr. DROYSEN las: Zum Münzwesen Athens.
Die Mittheilung wird in diesen Berichten erscheinen.

Ausgegeben am 2. Januar 1883.

100

MEMORANDUM

100-100000-100

100-100000-100

100-100000-100
100-100000-100

Elohim, El (אלהים, אל).

1882.
LIV.

Von TH. NÖLDEKE
in Strassburg i. E.

(Vorgelegt von Hrn. DILLMANN am 23. November [s. oben S. 1011].)

E. NESTLE hat vor Kurzem in einem sehr lesenswerthen Aufsatz¹ darzulegen gesucht, dass אלהים ein Plural von אל sei. Diese Ansicht, auf welche auch G. HOFFMANN schon gekommen war, scheint Manches für sich zu haben. NESTLE weist zunächst darauf hin, dass אלהים im A. T. ausserordentlich häufig, אלה selten, אל leidlich häufig, אלים ganz selten ist. Betrachten wir diese Thatsachen etwas näher.²

Dass der Singular אלה der Sprache des A. T. eigentlich fremd ist, hat man längst bemerkt. Bloss der Verfasser des Hiob³ gebraucht mit bewusster Absicht אלה als regelmässigen Gottesnamen. Sonst findet es sich nur in wenigen Dichterstellen aus einigermaassen älterer Zeit, nämlich Ps. 18, 32, wo es durch die Entlehnung Jes. 44, 8 wenigstens als sehr alte Lesart gegenüber dem אל des Samueltextes erwiesen wird, wie denn auch Prov. 30, 5 bei der Wiederholung von Ps. 18, 31 אלה aus v. 32 statt יהוה eingesetzt ist; Hab. 3, 3; Deut. 32, 15, 17 (auch beim Samaritaner); Ps. 50, 22. 114, 7 (wo aber vor יעקב leicht ein י ausgefallen sein könnte). Dann steht es in dem sehr späten Psalm 139, 19 und in der gehobenen Sprache des Gebets Neh. 9, 17. In reiner Prosa nur 2 Par. 32, 15 (im Munde eines Heiden) und Dan. 11, 37—39 von heidnischen Göttern. Wie ungebrauchlich das Wort in der guten Prosa war, zeigt sich namentlich auch darin, dass es in den prosaischen Theilen des Hiob nicht vorkommt; da heisst es nach dem gemeinen Sprachgebrauch אלהים, das

¹ Theologische Studien aus Württemberg 1882. S. 243 ff.

² Ich habe für die folgenden Zusammenstellungen ausser NESTLE's Angaben fast nur die BUXTORF-BAER'sche Concordanz benutzt.

³ NESTLE hätte dies Meisterstück hebräischer Poesie nicht mit zu den Stücken rechnen sollen, „welche an der Grenze des hebräischen Sprachgebrauchs liegen“!

sich auch einige Male in den poetischen Reden des Buches findet, aber vielleicht nicht ursprünglich.¹

Häufiger ist nun **אל**. Aber auch dies ist ein wesentlich poetisches Wort. Ein Viertel aller Fälle (über 50) kommt auf die dichterischen Theile des Hiob. in denen es noch etwas mehr gebraucht wird als **אלה**. Ungefähr ein Drittel aller Psalmen enthält **אל**, aber es ist auch in den Psalmen nicht annähernd so beliebt wie **אלהים**. In Dichterstellen finden wir **אל** auch sonst, ferner etliche Male bei den Propheten von Hosea bis zu Deuterjesaias und seinen Zeitgenossen. Der Pentateuch hat es besonders in gewissen festen Verbindungen wie **אל קנא**. Aber gerade die am wenigsten poetischen Theile des Pentateuchs und die am wenigsten poetischen Propheten vermeiden es. In der ganzen »Grundschrift« oder dem »Priestercodex« kommt es nur in dem als fester Eigenname geltenden **אל שרי** vor.² Ezechiel hat es nie und Jeremia nur 32, 18 in der aus Deut. 10, 17 genommenen Stelle (welche auch Neh. 1, 5, 9, 32 und Dan. 9, 4 benutzt ist).³ Dass **אל** der lebenden Sprache fehlt, ergibt sich namentlich daraus, dass es niemals in den Büchern der Richter,⁴ Samuels, der Könige und selbst der Chronik vorkommt, ausgenommen in poetischen Stücken. Die Anwendung im Pentateuch und bei einigen Spätern ist also, abgesehen von einigen festen Redensarten, nur eine Anlehnung an den poetischen Sprachgebrauch.

Dagegen ist **אל** von den ältesten bis zu den spätesten Zeiten sehr beliebt zur Bildung von Eigennamen. Es findet sich schon in **ישראל** und in einer Anzahl Gentilnamen⁵ wie **ימואל** oder **נמואל** Gen. 46, 10. Num. 26, 12; **מלכיאל** Gen. 46, 18. Num. 26, 45; **עמיאל**; **היחמאלי** 1. Sam. 27, 10. 30, 29 u. s. w. Besonders beachte noch den Namen **אלעזר**, den wir als Bezeichnung eines levitischen Geschlechts werden fassen müssen, mag er als **אֶלְעָזָר**, Sohn Aharon's, oder als **אֶלְעִזָּר**, Sohn Mose's erscheinen. Städtenamen mit **אל** finden wir auf israelitischem Gebiet gegen zwölf, z. B. **קבצאל**, **יזרעאל**, **ביתאל**.⁶ Dass uns sichere

¹ Auch **יהוה** Job 12, 9 und **אדני** 28, 28 mögen an die Stelle eines andern Gottesnamens getreten sein. Da die verschiedenen Bezeichnungen Gottes im A. T. leicht vertauscht werden konnten und erweislich mitunter vertauscht sind, so darf man natürlich auf einzelne Fälle nicht zu viel Gewicht legen. Die Gesamtergebnisse sind doch sicher.

² Sehr zweifelhaft ist **אלהי יחזקאל** Num. 16, 22.

³ Jer. 51, 56 ist bekanntlich aus dem Ende des Exils.

⁴ Allerdings findet es sich in dem auf eine uralte Quelle zurückgehenden Bericht über Abimelech in einem historischen Gottesnamen: **אל ברי** Jud. 9, 46. Dies ist gewiss das Echte. **באל ברי** 9, 4 eine Änderung, gemacht, um den nach späteren Begriffen durchaus unerlaubten Gottesdienst deutlich als einen abgöttischen zu bezeichnen; vgl. 8, 33.

⁵ Die Listen der Chronik lasse ich absichtlich fast ganz unberücksichtigt.

⁶ Dieser Name kann vorisraelitisch sein, braucht es aber nicht.

Individualnamen mit אל erst aus dem Ende der Richterzeit begegnen (שמראל; und auch Saul's Grossvater אביאל 1. Sam. 10, 1. 14, 52 wird eine historische Person sein), darf man einfach darauf schieben, dass wir aus älterer Zeit überhaupt sehr wenig geschichtlich sichere Personen kennen. In grosser Anzahl treffen wir Namen, die mit אל anfangen oder enden, in der Familie und Umgebung David's. Ist es auch immerhin möglich, dass אל hier einigemal Correctur für בעל ist, wie אלדע 2. Sam. 5, 16 wohl richtiger בעלדע heisst 1. Par. 14, 7, so ist das doch schwerlich in grösserem Umfang geschehen. Aus dem Reiche Israel nenne ich nur die Propheten אליהו und אלישע. Aus der späteren Zeit des Reiches Juda haben wir (namentlich auch bei Jeremia) eine ganze Reihe von solchen Namen. Sehr viele finden wir dann wieder bei Esra und Nehemia.¹ Man kann geradezu sagen: wir kennen solche Namen mit אל aus allen Perioden desto zahlreicher, je zahlreicher die uns aus ihr bekannten Namen überhaupt sind. Es ist dann aber ganz natürlich, dass אל nun auch bei der Bildung unhistorischer Namen viel verwendet ist; ich meine Namen wie בצלאל (Erbauer der »Stiftshütte«), ברכאל Iob 32, 2 und viele in den Listen Num. 1, 5 ff. 13, 4 ff. 34, 24 ff., welche durchaus nicht mit den Geschlechtsverzeichnissen Gen. 46 u. s. w. zusammenzustellen sind.

Aus dem A. T. lässt sich also schon erkennen, dass אל zwar ein sehr alter hebräischer Gottesname ist, dass er aber schon ziemlich früh ausser Übung gekommen war und nur in der Poesie oder der gehobenen Rede, sowie in einzelnen Redensarten fest gehalten wurde. Scheint nun אלהי wenigstens nach dem Gebrauch des A. T. eine künstliche Rückbildung aus אלהים zu sein, welche der Prosa völlig fremd blieb, so steht das Resultat fest: der gemeine Sprachgebrauch des Hebräischen hatte gar keinen Singular von אלהים. Ihm genügte der Plural vollkommen auch zur Bezeichnung des Singularis. Man beachte z. B. Fälle wie נסדך אלהי 2 Reg. 19, 37: בעל זרוב אלהי עקרון 2 Reg. 1, 2, 3, 6, 16.² Dass man diesen Plural nicht auch zu Eigennamen verwandte, erklärt sich hinlänglich aus der Schwerfälligkeit, die solche Bildungen gehabt hätten.³ Den Gebrauch des Plurals

¹ Also auch ziemlich viele aus der eigentlichen »Epoche der grossen Synagoge« (LAGARDE in den Gött. Nachrichten 1882. S. 178). Aus den nächstfolgenden Jahrhunderten bis zur Makkabäerzeit sind überhaupt nicht viele jüdische Namen überliefert.

² Die Mischnasprache gebraucht nach aramäischer Weise den Sg. אלהי, vgl. z. B. להיח לאלהים als Paraphrase von להיח לאלהים Tosefta, Ab. z. 4. 5. Sie hat auch einen neuen Plural אלהות »Götter« eb. 4. 7 (andere Beispiele siehe bei LEVY, Neuhebr. Wörterbuch s. v., wo dieser Plural vom Abstract אלהי nicht gehörig geschieden ist).

³ In der alten Zeit, wo sich die Weise hebräischer Eigennamen feststellte, wurde אלהים vielleicht noch pluralisch construiert. In Genitivconstruction hat das Phöniciische allerdings Ἀβδελωνυμος (und Varr.) = עבדאלם (s. die Belege bei SCHRÖDER 129).

(אִמָּהּ) (seltner אִמָּהּ); אִמָּהּ: אִמָּהּ.

² מִקְבִּילָא und מִקְבִּילָא: (מִקְבִּילָא).

Mandäisch noch עֲסִידָא (und Nebenformen) zu מִקְבִּילָא »Lippe«.

Arabisch ferner سَنَآت: سَنَآت (und سَنَآت).

⁴ (عَصَوَات und عَصَهَات: »Dorngewächs«).

Dem Äthiopischen fehlen solche Bildungen, wie es scheint.

Das Hebräische hat nur אִמָּה, Pl. אִמָּהוֹת, st. c. אִמָּהוֹת, mit Suffixen אִמָּהוֹת u. s. w.

Dazu kommt aber das gleich vom Entdecker, E. RENAN, richtig gedeutete phönicische דִּלְהָ (Umm el 'awāmid), Pl. von דִּלְ Ps. 141, 3 (= דִּלְהָ)⁵.

Sonst hat das Hebräische jene Plurale durch gewöhnliche auf תֵּן ersetzt: יָדוֹת, יָדוֹת; אֲבֹת, אֲבֹת; אֲמֹת, אֲמֹת; שְׁמוֹת, שְׁמוֹת. Von חֵם kommt kein Plural vor. עֲצִים bildet עֲצִי, עֲצִי (wie عَصَوْنَ [neben عَصَهَات] und אֲעִין). Wie diese Plurale mit הֵן meidet das Hebräische ja auch die im Aramäischen nicht selten mit zugesetztem וּ. Da nämlich כְּהוֹתֵי Esra 4, 7 und פְּהוֹתֵי Esra 8, 36. Neh. 2, 7, 9 Fremdwörter sind, so lässt sich wohl nur קְשֹׁת zu dieser Formation ziehen, als Pl. nicht von dem später künstlich gebildeten קְשִׁי, sondern von קֶשֶׁת (statt קְשֶׁת geschrieben) Ez. 9, 2, 3, 11 = talm. קִישָׁת, קִישָׁת (s. die Var. zu Pes. 109^a), syr. كِسَن, arabisirt كِسَن. Sonst hat das Hebräische

¹ Ich bedaure sehr, dass ich die falsche Form אִמָּהּ in meine syrische Grammatik S. 83 aufgenommen habe; an der einzigen Belegstelle Efr. III, 613 A ist mit PAYNE-SMITH אִמָּהּ zu lesen, wie schon die Construction als Masc. verlangt. Und für אִמָּהּ eb. bitte ich אִמָּהּ zu setzen. — Davon אִמָּהּ (erst spät?), Gauhari belegt ein aus אִמָּהּ zurückgebildetes אִמָּהּ »Mutter«.

² Davon מִקְבִּילָא »appellavit« u. s. w.

³ Davon سَنَآت n. s. w.

⁴ Kāmil 470. Dazu عَصَا, nom. unitatis عَصَاهُ eb.; Hamāsa 488; Labid 8. 103.

⁵ Im Syrischen durch das nur aus den Glossensammlungen bekannte אִמָּהּ, »Thürflügel« repräsentirt (HOFFMANN'S BA 235. 583; PAYNE-SMITH 38); etwa edhlāthā zu sprechen.

⁶ Mischnahebr. nach dem Aram. אִמָּהּ, z. B. M. Qidd. 4, 4. Dafür haben aber wenigstens die Ausgaben oft אִמָּהּ.

⁷ Alle diese Formen lassen sich reichlich belegen. Das syr. كِسَن (fem.) ist im Gebrauch dem griech. ξέτερος angeähnt. כֵּן und כֵּן wechseln nach כֵּן und כֵּן auch sonst. — Genau entsprechend ist der vermuthlich sehr alte Pl. קְשִׁי vom קֶשֶׁת »Bogen« im jerus. Targūm.

schlechts sehr erwünscht war¹. Ebenso bildeten die Syrer, und nur sie², neben מַמְיָהּ (שְׁמִיָּהּ) Esra 5, 4, 10 u. s. w.; mand. שְׁמִיָּהּ ein männliches מַמְיָהּ. Also sind alle diese männlichen Formen für jung zu halten und kann אֱלֹהִים nicht wohl zu ihnen gehören.

Weiter ist zu berücksichtigen, dass diese um ein *h* erweiterten äusseren Plurale ganz kurzen, zweiradicaligen Wörtern angehören, denen sich die Verwandtschaftswörter אב und חם anschliessen³. Es handelt sich also um Bildungen, die auch sonst mancherlei Erweiterungen erfahren, darunter im Arabischen solche mit *h*, vgl. شَفَاءٌ: أَمْرَاءٌ, مِيَاءٌ, شَفَاءٌ, شَفَاءٌ u. s. w. إِنْسَاءٌ, إِنْسَاءٌ ist allerdings eine regelmässige Bildung von med. gem., aber bei diesem Worte ist die Analogie von أَب, أُم massgebend gewesen, wie sich ja die semitischen Wörter für »Vater« und »Mutter« vielfach gegenseitig beeinflussen. Ist nun אֱל ein solches Wort wie יר, שם? Mit anderen Worten: hat es einen ursprünglich kurzen Vocal? Ich glaube in den Monatsberichten der Kgl. Akd. (1880, 14. Oct. S. 760ff.) die ursprüngliche Länge des *e* in אֱל ziemlich wahrscheinlich gemacht zu haben. Da sich aber LAGARDE in den Gött. Nachrichten 1882, S. 173 ff. sehr energisch für das Gegentheil ausgesprochen hat, so halte ich es für zweckmässig, die Frage noch einmal aufzunehmen. Ich muss dabei allerdings zum Theil schon Gesagtes noch einmal kurz wiederholen und stellenweise etwas weit ausgreifen⁴.

Eine in Memphis gefundene Inschrift aus der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts v. Chr. enthält eine Menge semitischer Namen, von denen ein Theil arabisch und nicht hebräisch⁵ ist. Zu diesen

¹ Welchen Plural אֱלֹהִים in jüdisch-aram. Dialecten bildet, hat mir auch Dr. LANDAUER nicht nachweisen können. Vom Fem. מַמְיָהּ kenne ich den Plural noch immer nicht.

² Im samaritanischen Targum Num. 1, 2 hat zwar der Polyglottentext אֱלֹהִים, aber alle Petermannschen Handschriften haben, nach einer gütigen Mittheilung Prof. BARTH'S, אֱלֹהִים; so auch NUTT'S Codex.

³ Aus diesem Grunde ist es nicht statthaft, אֱלֹהִים, das den Plural von אֱלֹהִים ersetzt, hierher zu ziehen und den, übrigens gar nicht seltenen, Singular אֱלֹהִים für eine Rückbildung aus jenem anzusehen (Gesenius, Thes. I, 109a). Hier ist אֱלֹהִים wohl nur ein Ersatz für אֱלֹהִים. Zu beachten ist, dass אֱלֹהִים stets männlich, אֱלֹהִים natürlich weiblich ist.

⁴ Gebiete, die mir fremd sind oder auf denen noch zu viel Unsicherheit herrscht — also assyrische, Sinai- und späthauranische Inschriften — musste ich leider ganz unberücksichtigt lassen. Für's Himjarische, mit dem ich wenig Bescheid weiss, hat mir Prof. D. H. MÜLLER mehrere dankenswerthe Mittheilungen gemacht.

⁵ So Ασάδος = أَسَدٌ; Ιεγούσος = يَغُوثٌ, wofür gerade in der muthmasslichen Heimath dieser Leute in edomitischer Grundform oder aber in hebräischer Umbildung

gehören auch, nach ihren ersten Hälften, sicher $\text{Αυδηλος} = \text{עֹד} + \text{אֵל}$ und $\text{Αυφηλος} = \text{עֹפ} + \text{אֵל}$ ¹. Finden wir nun in den folgenden Jahrhunderten auf dem Gebiete am westlichen Rand der syrischen Wüste weitere Namen mit אֵל , in griechischer Schrift $\eta\lambda$, deren erste Hälfte nur arabisch sein kann, z. B. Ουαθηλος , semitisch وهابيل (وعبيل) geschrieben, so können wir als sicher annehmen, dass bei diesen Arabern das von ihnen viel gebrauchte אֵל el lautete. Die Sprache dieser Leute müsste sich viel weiter von dem uns näher bekannten Arabischen entfernen, als wir sonst annehmen können, wenn wir voraussetzen wollten, auch bei ihnen hätten die hebräischen Dehnungsgesetze gegolten: mithin haben wir allen Grund, ihr el als Zeugniß für die ursprüngliche Länge des Vocals anzusehen.

Nun hat jedoch LAGARDE a. a. O. diesen zahlreichen inschriftlichen Namen alles Gewicht nehmen wollen, indem er meint, die Umwohner Palästina's hätten אֵל einfach den Juden entlehnt, natürlich in der damals bei diesen üblichen Aussprache, welche allerdings im Hebräischen sehr wohl aus el hätte entstanden sein können. Aber LAGARDE'S Annahme ist durchaus willkürlich. Wir finden schon in den spärlichen Stammlisten der Völker südlich und östlich von Israel von Alters her Namen mit אֵל . Fasst doch שמעאל eine Menge solcher Stämme zusammen: zu ihnen gehört אדבאל Gen. 25, 13. Ferner haben wir אלדעה Gen. 25, 4 und רעאל von Midian; אליז , Vater des חזן , (welcher im Iliob als אליז החימי auftritt), רעאל , מנדיאל von Edom; dazu einen sicher historischen Individualnamen מהיטבאל Gen. 36, 39. Wenn uns nun später in denselben Gegenden viele Namen mit אֵל begegnen, so können wir doch kaum bezweifeln, dass solche Namen dort durch alte Tradition heimisch waren und die beglaubigte Aussprache el die echte, nicht erst den Juden entnommene war.

Jedoch LAGARDE sagt: »Als Israel aus Babylonien nach Palästina zurückgekehrt war, wollten alle umwohnenden Völker an den Segnungen der Theokratie Theil nehmen. Sie wollten es auf ihre Weise, aber sie wollten es. Als die Maccabäer das Judenthum so weit gefestigt hatten, dass die Schriftgelehrsamkeit sich zu entwickeln Raum und

עז erscheint Gen. 36, 18 (nach 1 Par. 1, 35, Sam. und LXX so auch Gen. 36, 5, 14, wo das Kthib עז hat); Χαλαφαςος (Fem. zu dem beliebten خَلَف , wie auch خليفة als Name vorkommt: »Ersatz«, vergl. مسلط Barh. h. eccl. II, 25; Martyr. I, 4; amharisch Kásá [s. d'Abbadie s. v.]; Ἀντίγονος). Βορακος zeigt die in arabischen Namen häufige Form فعل .

¹ Mit Umsetzung in's Hebräische würden diese אֵל (nicht mit אֵל und ähnlichen zu verwechseln) und אֵל lauten. Schwerlich wären aber diese Namen möglich.

Ruhe fand, da machte sich abermals ein Zudrang zu Israel bemerklich. Nicht gerade Jude wollte man werden, aber im Schatten und Frieden des Tempels suchte man — vielleicht aus Aberglauben — Schutz.«

»Die Machtsphäre der Theokratie reichte ohne Frage über Idumäa, sie reichte auch über Auranitis und Batanäa hinweg.«

»Die Anerkennung der Theokratie gab sich äusserlich durch die Namen kund, welche man seinen Kindern beilegte. Kein אל in Namen der Ghassânidenzeit, auch kein אל in Namen der Herodiadenperiode und des ihr vorangehenden Jahrhunderts der Geschichte Petras beweist irgend etwas dafür, dass die arabischen Stämme jenseits des Jordan, dass die idumäischen oder nabatäischen Bewohner Petras das Wort אל als einheimisches Sprachgut besessen. Im Gegentheile: von vorne herein ist wahrscheinlich, dass sie אל von den Juden entlehnten.«

Nun frage ich: ist das nicht reine Phantasie? Wo in aller Welt zeigt sich denn bei den Nachbarvölkern im Süden und Osten ein Zudrang zu den Juden und ihrer Theokratie? Der armselige Zustand der Rückgekehrten vor Esra und Nehemia konnte ihnen doch nicht imponiren! Daraus, dass einige Juden moabitische, ammonitische oder philistäische Weiber hatten (Neh. 13, 23), wird man das nicht schliessen. Nachher aber, mit der Vollendung des Judenthums, schlossen sich ja die Juden selbst ängstlich von ihren Nachbarn ab, und diese vergalteten ihnen das mit gründlicher Abneigung oder auch offener Feindschaft. Allerdings hat Johannes Hyrcanus (135—106 v. Ch.) die Idumäer, welche damals im südlichen Juda (nicht mehr in ihrem alten Gebiete) wohnten, unterworfen und zur Beschneidung gezwungen (Josephus Ant. 13, 9, 1; vergl. Bell. jud. 1, 2, 6), aber die Namen der Inschrift von Memphis reichen höher hinauf, können nicht erst nach diesem Ereigniss entstanden sein, wenn anders die betreffenden Leute überhaupt aus dem von da an den Juden unterworfenen Lande stammten. Jenseits des Jordans haben aber die Hasmonäer in den nicht von Juden bewohnten Gegenden nie festen Fuss gefasst. Die Herodäer haben freilich von 23 v. Ch. an lange Zeit ein grosses Stück des nichtjüdischen Gebiets, aus welchem unsere Inschriften stammen, beherrscht. Sie verdankten das aber nur der Gnade der Kaiser. Dass sie unter ihren arabischen und aramäischen Unterthanen irgend Propaganda für das Judenthum gemacht oder nur begünstigt hätten, wird von vorn herein kein Verständiger voraussetzen. Im Gegentheil hätte es ihnen nur unbequem sein können, wenn sie auch in den Aussenländern mit den Frommen und Hierarchen von Judäa und Galiläa hätten rechnen müssen. Herodes der Grosse errichtete ja selbst an solchen Stellen Palästinas, wo die Juden in der Minderheit waren, Göttertempel, Amphitheater und andere Werke,

welche den Juden ein Greuel sein mussten. Die durchaus heidnische Haltung der Herodäer auf heidnischem Gebiete bestätigen auch unsere Monumente. Herodes der Grosse lässt sich vor dem Tempel des Himmelsgottes **בשמי** (DE VOGÜÉ, Hauränische Inschrift nr. 2) zu Si'a eine Statue errichten, WADDINGTON 2364. Eine Weihinschrift vor einem andern hauränischen Tempel (in Mušennef) feiert denselben Agrippa I., welcher doch sogar nach der Überlieferung der Schriftgelehrten in Jerusalem von den Priestern als ein echter Jude anerkannt wurde¹ Wp. 2365 = WETZSTEIN 30 u. s. w. Dass sich unter solchen Fürsten jüdische religiöse Art ausgebreitet habe, ist wenig wahrscheinlich und wird durch Nichts bezeugt. Wir finden denn auch auf diesem ganzen Gebiet bis zur christlichen Zeit nur reines Heidenthum, heidnische Tempel, heidnische Namen. Die Leute mit **אל** machen keine Ausnahme. Die Inschrift von Memphis ist dem Apollo, Zeus und anderen Göttern geweiht; die darauf vorkommenden Namen mit **אל** werden also kaum ganze oder halbe Juden bezeichnen. **Αννηλος** errichtet in Kerak (Haurân) dem **Διὶ Μαρνᾷ τῷ κυρίῳ** einen Bau WETZSTEIN 183: **Ταννηλος** in Dāmā einen solchen der **Αθηνᾷ τῇ κυρία** (wohl *Allât*) WETZSTEIN 119 = Wd. 2453 (vergl. 2081. 2216. 2308. 2345. 2410. 2453. 2461: WETZSTEIN 16. 17). **Ουαδδηλος Μαθειου**² τοῦ Ουαδδηλου hat sich im Jahre 151 bei einem Tempelbau betheiligt Wd. 2372 u. s. w. Wir müssten denn doch starke positive Gründe haben, um anzunehmen, dass **ηλ** in diesen Inschriften irgend vom Judenthum ausgehe! Und wie steht es nun gar mit der Benennung eines heidnischen Gottes jener Gegend als **אל**? Das kleine Bruchstück einer Inschrift aus Si'a mit aramäischen Charakteren nennt denselben Gott, welcher auf einer anderen (aus Bostra) **אלה קצרי** (DE VOGÜÉ, Nab. no. 4) heisst. **קצרי אל** d. V., Haur. 5. Sollte dieser Heidengott auch unter den Schutz des jüdischen Tempels gestellt werden? Da **קצרי** entschieden arabische Form trägt, so werden wir auch **אל** hier für arabisch halten, und der nabatäische Unterthan **נשראל**, welcher im Jahre 11 des Königs **מלכ** (= **مالک**), d. i. entweder um 40 v. Ch. oder um 50 n. Ch., diesem **קצרי** eine Weihinschrift setzt d. V., Nab. 4, ist sicher auch ein Araber, kein offener oder geheimer Jude.

Dass **אל** in diesen Gegenden so häufig ist, spricht allein schon dafür, dass es nicht fremder Herkunft war, zumal specifisch israeli-

¹ M. Sota 7. 8. Sifre zu Deut. 17, 15. Letztere Stelle verdanke ich DERENBOURG, Hist. de la Paléatine, 216, dessen Urtheil über diese «race moudite» (S. 222) ich durchaus beistimmen muss.

² Der Gen. **Μαθειου** noch CJ4559; **Μαθειου** CJ4593, vergl. **Μαθου** WETZSTEIN 177; aram. in Palmyra **ܡܬܝܘܡܐ** **ܡܬܝܘܡܐ**; in Edessa (christlich) **ܡܬܝܘܡܐ** ZDMG XXXVI, Tab. 1 (S. 166).

tische Bildungen mit יהוה, יהו, יה ganz fehlen¹, während doch Herodäische Namen viel gebraucht wurden². LAGARDE meint allerdings, von dem »in den Balmen des Esdras wandelnden Israel« sei אל »als einer von ihm persönlich überschrittenen niederen Stufe der Offenbarung angehörig« betrachtet: »erklärt das nicht, warum Auranitis, Idumäa, Palmyra mit אלhaltigen Namen so reich gesegnet³ erscheinen? Alle גרי השער und alle, die auf dem Wege waren es zu werden oder werden zu wollen, feiten sich nach Esdras mit dem Namen אל: sie bekannten sich durch ihn zum دین ابراهيم, vielleicht nur zum دین نوح« (a. a. O. S. 179). Wenn nur die erste Voraussetzung zu begründen wäre, dass es dort so Viele gegeben habe, die sich in irgend einer Weise zur Proselytenstellung drängten! Und es heisst doch eine rührende Bescheidenheit bei den stolzen Arabern voraussetzen, dass sie sich, bei aller Sehnsucht nach dem Heil von Jerusalem, mit Bewusstsein der Namen enthalten hätten, welche das ganze und volle Judenthum ausdrückten, wohl aber mit Eifer nach solchen gegriffen hätten, die sie (angeblich) als Juden dritten Grades bezeichnen sollten. Das war wohl so die Stellung von Leuten wie der Araberhauptling Zabdiel (1. Makk. 11, 17) oder der Nabatäerkönig רבאל! Und ausdrücklich hebe ich noch einmal hervor, dass sich auf den sehr zahlreichen Inschriften der hauranischen und benachbarten Gebiete (der späteren römischen Provinz Arabia) keine Spur von Judenthum zeigt, aber der regste Eifer für alle möglichen heidnischen Culte.

Man könnte aber in anderer Weise bestreiten, dass dies אל eine arabische Form sei. In jenen Ländern, welche in den betreffenden Perioden von nabatäischen und vielleicht noch anderen Arabern bewohnt wurden, hatten vorher überall oder doch auf grossen Strecken Hebräer im weiteren Sinne gewohnt. Dass die Moabiter »hebräisch« sprachen, wissen wir jetzt; daraus lässt sich ein Schluss auf die Ammoniter ziehen. Auch von den Edomitern ist zunächst am wahrscheinlichsten, dass ihre Sprache der israelitischen sehr nahe stand. Vielleicht sprachen selbst manche der Nomaden wie Midianiter u. s. w. nicht eigentlich arabisch, sondern eine hebräische Mundart. Als nun die Nabatäer, echte Araber, vordrangen, könnten sie immerhin den auf jenen Gebieten einheimischen Gottesnamen — ausser den oben S. 98 genannten edomitischen Namen mit אל vgl. noch die Orte נחליאל

¹ Den שדיה העבר העליון Neh. 2, 10, 19 wird man nicht als Gegeninstanz gebrauchen wollen.

² Ἡρώδης, Ἡρόδης Wd. 2115. 2453 (= WETZSTEIN 113). 2547. Ἀρχέλαος Wd. 2145. 2543. Besonders beliebt waren selbst noch lange nach dem Untergang des Geschlechts, die Namen Φίλιππος (auch der Kaiser Philippus Arabs war ja ein Hauränier) und Ἀγρίππας.

³ Ich kenne aus Palmyra nur drei solche Namen.

Num. 21, 19 und אֶלְעָה¹ — angenommen und selbständig verwendet haben. Aber auch diese Annahme hätte grosse Bedenken gegen sich. Die Beliebtheit von אֶ, während sonstige hebräische Elemente in diesen Namen kaum nachweisbar sind, spricht entschieden dafür, dass es den dortigen Arabern von Haus aus bekannt war. Übrigens dürfte man auch gar nicht ohne Weiteres voraussetzen, dass die nicht israelitischen Hebräer die Dehnungsgesetze unseres alttestamentlichen Textes angewandt hätten, dass auch bei ihnen also *el* zu *el* hätte werden müssen.

Eine Entlehnung des Namens אֶ von Seiten der Haurânier u. s. w. anzunehmen, sind wir um so weniger veranlasst, je weiter derselbe überhaupt bei den verschiedensten Semiten verbreitet war. Dass ihn auch die Aramäer hatten, ist nicht zu bezweifeln². Dann ist er, wie bekannt, bei den Himjaren beliebt³, die denn doch auch im sprachlichen Sinne Araber sind. Da wäre es wohl verkehrt, ihn mit allen Kunstgriffen den arabischen Nabatäern rauben zu wollen, bei denen er so stark documentirt ist. Zudem lassen sich auch im Gebiete des Arabischen im engeren Sinne noch einige mit אֶ (يَل) gebildete Namen nachweisen⁴. Will man diese nun aber auch sämmtlich für versprengte himjarische Namen halten, so spricht doch wieder die Schreibung

¹ Freilich auf einem Gebiete, um das zwischen den Kindern Lot's und den linksjordanischen Stämmen Israel's viel gekämpft ist.

² Zu dem, was ich a. a. O. S. 772 beigebracht habe, fügt mir ROBERTSON-SMITH noch den אֶלְיָהוּ 1 Reg. 11, 23. Auf die uralten Namen אֶלְיָהוּ Gen. 22, 22 f. 24, אֶלְיָהוּ Gen. 22, 21 hätte ich mehr Gewicht legen sollen. — Noch immer kann ich mich nicht entschliessen, den Nisibenischen Götzen אֶלְיָהוּ = אֶלְיָהוּ für eine Erdichtung zu halten, schon weil, wie ich bereits hervorhob, אֶ bei den Syrern ganz ausser Gebrauch gekommen war, und besonders, weil in solchen Heiligenleben derartige Namen überhaupt nicht erfunden zu sein pflegen. Die Lesart der Pariser Handschrift אֶלְיָהוּ, auf welche BICKELL aufmerksam gemacht hat (Conspectus rei Syrorum literariae 26 Ann.) und die mir ZOTENBERG bestätigt, ist sicher nur eine Entstellung. Natürlich würde ich aber auf diesen Götzenamen allein keine Schlüsse bauen. — Nicht sicher beweisen lässt sich bis jetzt, dass die Aramäer *el* gesprochen hätten, so wahrscheinlich es ist.

³ Hierher gehört schon אֶלְיָהוּ Gen. 10, 26 (vergl. אֶלְיָהוּ mit וֶדֶד = וֶדֶד) und אֶלְיָהוּ Gen. 10, 28 (wozu mir D. H. MÜLLER als schlagende Parallele den himjar. Namen אֶלְיָהוּ giebt). — Hypothesen über urzeitliche Wanderungen aus Palästina nach Jemen zu machen, bloss um das Vorkommen von אֶ hier zu erklären, haben wir keine Veranlassung.

⁴ Ich hebe noch einmal hervor, dass bei den Arabern allmählich einfache oder vereinfachte Personennamen durchaus das Übergewicht bekommen haben, so dass wir unter den Tausenden, die uns bekannt sind, verhältnissmässig wenige finden, in denen Götternamen vorkommen, und zwar stets im Genitiv, nie mehr als Subject. — Zu dem, was ich a. a. O. 768 f. gegeben, füge noch خَيْلِ bei den Kelb (Muh. b. Habib 15 paen.).

mit א dafür, dass hier ein langer Vocal war¹. Nun drücken die Araber ursprünglich kurzes *i* (*e*) vor auslautendem Wurzelconsonant in himjarischen Namen wirklich als kurzes *i* aus, z. B. in كِب = כרב (in verschiedenen Personennamen), in den Personennamen يَنْعَم = יחנעם, = نَاعِط = שמר = שמר, דמעהר = ذو معابر, ינעם = יחנעם. Natürlich liesse sich denken, dass trotzdem bei einsilbigen Wörtern wie אל eine Dehnung stattgefunden haben könnte, aber besonders wahrscheinlich ist das doch nicht. Wenn nun in Hamdāni's Iklil, wie mir D. H. MÜLLER schreibt, einige alte Namen auf אל mit אל geschrieben werden, z. B. مرثد ال, موعب ال, so darf man darin wohl eine buchstäbliche Wiedergabe der himjarischen Schreibung sehen: der genannte Gelehrte hat ja eben bewiesen, dass die jemenischen Antiquare die alten Inschriften noch lesen, freilich nicht mehr verstehen konnten¹.

Dafür, dass אל einen ursprünglich langen Vocal hatte, sprechen also sehr erhebliche Thatsachen. Dagegen dürfte doch nicht aufkommen, dass LAGARDE eine »neutropassive« Form, die sich dann allerdings für אל herausstellt, einem Gottesnamen nicht angemessen findet⁵. Ich denke, schon כן, לך, יר⁶ können uns über dies Bedenken hinwegheben, noch mehr der genau so gebildete Gottesname⁷ ישר.

¹ Der sicher aus dem Himjarischen (שמר) stammende Name شراحيل wird auf der Inschrift vom Jahre 568 سرحيل (شرحيل) (Α?)σαραηλος geschrieben. Der Vers des 'Amr b. Ma'dikarib bei Ibn Doraid 243, 5 bestätigt die Messung *sardhila*.

² D. H. MÜLLER, dem ich einen Theil dieser Beispiele verdanke, macht mich dazu auf יסר ינעם = יסר ינעם in einer noch nicht publicirten Inschrift aufmerksam.

³ Noch jetzt üblich.

⁴ Südarab. Studien 15 ff. (Wiener Sitzungsber., phil.-hist. Classe 1877, April 115 ff.). Man könnte übrigens auch annehmen, dass ל hier ein Ausdruck für *l* sein soll, wie sich zuweilen أبرواز neben أبرويز für persisches *Abarwēz* und Ähnliches findet.

⁵ Orientalia II, 8; Gött. Nachr. a. a. O. 187 ff. — י is allerdings aus dieser Reihe auszuschliessen, nicht etwa, weil es nicht gut hebräisch wäre, sondern weil es zu ישר gehört; s. die Zusammenstellungen in DILLMANN's lex. aeth. 309 sq. Vrgl. dazu noch *herauci* »verlobt« im Mehri ZDMG XXVII, 264.

⁶ In der Inschrift von Memphis genau vocalisirt wie אל: Κοσμηρος; das kann natürlich nicht heissen »Kos ist Client«, sondern nur »Kos ist Patron«. Wie مولى und ولى kann auch جار beide Seiten des Verhältnisses bezeichnen; eine sichere Stelle für die allerdings seltene Bedeutung »Patron« ist Hamāsa 148.

⁷ Siehe u. A. die alte Gemme mit לנשר oder לנשר DE Vogüé, Mélanges arch. 77. Die Entlehnung aus dem Assyrischen wäre doch erst zu beweisen!

Wenn Semiten den »König« מֶלֶךְ und den »Mann« رَجُلٌ mit »neutropassiven« Formen bezeichneten, konnten sie ja wohl auch einen Gottesnamen der Art gebrauchen¹.

Also auch aus dem Grunde, dass אֱלֹהִים wahrscheinlich einen ursprünglich langen Vocal hat, ist NESTLE'S Ansicht kaum zulässig, dass es der Singular von אֱלֹהִים sei.

Endlich würde diese Hypothese zu äusserst bedenklichen weiteren Annahmen nöthigen. אֱלֹהִים oder eine ihm genau entsprechende Form müsste schon im Ursemitischen von אֱלֹהִים gebildet sein und schon da einen secundären Singular *ilāh* (oder ähnlich) erzeugt haben, der dann im Hebräischen wieder ziemlich vergessen, im Aramäischen und Arabischen aber zur Herrschaft gelangt wäre. Der Ausgangspunkt der Untersuchung, die Seltenheit des hebräischen אֱלֹהִים, würde dabei übrigens für diese Frage alle Bedeutung verlieren. Dass diese ganze Annahme sehr unwahrscheinlich wäre, muss Jeder zugeben. Trotzdem würde ich sie, zumal das Zusammenstimmen aramäischer und arabischer Formen die um *h* vermehrten Plurale als ursemitisch erweist, immer noch eher billigen, als die andere, von NESTLE selbst aufgestellte Vermuthung, aramäisches *ilāh*, *alāh* und arabisches *ilāh* seien dem Hebräischen entlehnt. Dies müsste, da das Aramäische in *ilāh d* zeigt, schon zu einer Zeit geschehen sein, wo auch die Hebräer noch so, ohne Übergang des *d* in *ō*, sprachen. Wie sie jedoch in so alter Zeit zu einem solchen Einfluss auf grosse Nachbarvölker gekommen sein sollten, um ihnen gerade ein derartiges Wort zuzuführen, ist unerfindlich. Aber selbst wenn man die Hypothese so vereinfacht, dass man eine secundäre Bildung *ilāh* (aus אֱלֹהִים) schon in die Zeit verlegt, wo wenigstens Hebräer und Aramäer noch dieselbe Sprache redeten — wobei allerdings wieder die Thatsache, welche diese Untersuchung veranlasste, für sie bedeutungslos würde —, böte sie die grösste Schwierigkeit. NESTLE führt ja selbst an, dass אֱלֹהִים auch den Himjariten bekannt war. Die Entlehnung durch sämtliche Araber müsste also doch in eine uralte Zeit hinaufgehen, für die wir durchaus nicht berechtigt

¹ Wagten die Äthiopier ja sogar, Gott auch *lé'ul* (ἑὸς) zu nennen mit einer Bildung, wie *meūt* »todt« und verfallen daher durchaus der γραφὴ ἀπειθείας, welche LAGARDE Gött. Nachr. a. a. O. 188 gegen mich zu erheben scheint: »Es ist Hrn. Nöldeke aufbehalten gewesen — aus Gewohnheit und Gedankenlosigkeit thaten es vor mir alle, die sich zur Sache geäussert haben —, es ist Hrn. Nöldeke aufbehalten gewesen, אֱלֹהִים Gott ausdrücklich mit *el* auf Eine Stufe grammatischer Werthung zu stellen.« Es war auch wohl nicht schön, Gott zu benennen אֱלֹהִים, da dies dieselbe Bildung wie אֱלֹהִים ist, אֱלֹהִים, das grammatisch mit אֱלֹהִים, אֱלֹהִים (קדש ברוך הוא; קדש ישראל; קדש), das mit אֱלֹהִים in eine Classe gehört u. s. w. Man lasse doch die Theologie aus der Grammatik fort!

sind, einen grossen religiösen Einfluss der Hebräer oder Aramäer auf die Araber anzunehmen. Wollten wir aber auch einmal das himjarische אלה ignoriren oder durch neue Künsteleien zu erklären suchen, so ist doch schon die Entlehnung des arabischen *ilāh* aus dem Aramäischen äusserst unwahrscheinlich. Selbst für die Jahrhunderte vor Muhammed, in denen mit so vielen anderen Culturwörtern auch manche religiöse Ausdrücke aus dem Aramäischen in's Arabische gedrungen sind, dürfen wir nicht wohl annehmen, dass gerade das einzige Wort, welches »Gott« schlechtweg bedeutet, als Fremdwort eingewandert sei. Ein Wort für diesen Begriff mussten die Araber doch haben. Nun ist aber *ilāh* sicher uralt im Arabischen. Denn eben die Form الله beweist durch die ganz ungewöhnliche, nur noch bei الناس¹ vorkommende, Verkürzung ihr Alter und ihren starken Gebrauch. Dass die Araber, noch bevor sie den Monotheismus kennen lernten, auch einen determinirten Ausdruck für »der Gott« gehabt haben werden, darf man doch nicht in Abrede stellen. Dazu kommt allerdings noch die von NESTLE abgelehnte, aber dennoch äusserst wahrscheinliche Erklärung der Ἀλιλάτ Herodot's als Fem. von *ilāh* mit dem Artikel الالة. Die Ἀλιλάτ ist doch sicher nicht verschieden von der in der Nachbarschaft der Herodotischen »Araber«, im Nabatäerreich und in Palmyra, allein und in Personennamen mehrfach vorkommenden אלה. Wir haben da אלה »die Göttin in Ṣalḥad« DE VOGÜÉ, Nab. 6: אלה »die Mutter der Götter« eb. 8; die Personennamen אלהבא eb. 2 und sehr häufig in Palmyra in der Schreibung אלהבא Ουαβαλλαθας, Vabalathus² (= وَهَبُ اللاتِ Ibn Doraid 315, 2); אלהבא (= نَصْرُ اللاتِ *) Palmyra D. V. 150; אלהבא (= عَبْدُ اللاتِ *) eb. 94: אלהבא (= سَلَمُ اللاتِ *)³ eb. 7. 54. Die genaue Aussprache haben wir in der im Korān und

¹ Beiläufig bemerke ich, dass ohne Artikel im classischen Arabisch أناس die allein übliche Form ist, neben welcher ناس² äusserst selten vorkommt; einige Fälle in unseren Ausgaben werden auf Versehen beruhen. Dagegen kommt wiederum الأناس nur ganz vereinzelt bei Dichtern vor; viel häufiger الله.

² Auch übersetzt Ἀσινόδουρος.

³ Diese drei kenne ich im Arabischen nur in den durch Weglassung von اللات oder einem andern Gottesnamen vereinfachten Formen نصر, عبد (Αβδω Wb 2008: حصر in der Doctrina Addaei), سلم (gerade bei den Stämmen der syrischen Wüste beliebt, s. Muh. b. Ḥabib 14).

sonst erhaltenen Form أَلَّات , die sich ja auch noch in den Namen زَيْدُ اللَّاتِ eb. l. 4: سَكَنُ اللَّاتِ , سَعْدُ اللَّاتِ , شَكَمُ اللَّاتِ , تَيْمُ اللَّاتِ Ibn Dor. a. a. O.; شَبَعُ اللَّاتِ WÜSTENFELD, *Stammt.*, findet.¹ Wir dürfen also ruhig annehmen, dass die Araber schon im grauen Alterthum *ildh*, *al'ildh* hatten und daraus in derselben Weise, wie die Aramäer ܐܠܗܐ ², ein weibliches *al'ildhat* bildeten, welches im Lauf der Zeit zu *allât* wurde, wie *al'ildh* zu *allâh*. Damit wird aber eine Entlehnung aus dem Aramäischen undenkbar.

Die sprachlichen und historischen Gründe, welche ich gegen die Ansicht, אל sei der Singular von אלהים und *ilîh*. אלה secundär, aufgeführt habe, sind, das weiss ich wohl, nicht alle von gleichem Gewicht. Aber wenn schon der eine oder andere für sich allein jener Hypothese höchst gefährlich sein dürfte, so genügen alle zusammen gewiss, sie zu beseitigen.

Da nun also אל wahrscheinlich einen ursprünglich langen Vocal hat, so bleibt immer das Nächste, es mit אֵלִי zusammenzustellen. Diese hat die Bedeutung »voran sein«. Wären selbst alle anderen Stützen dieser Annahme hinfällig³, so bliebe immer das aramäische ܐܠܝܐ und das arabische أُولَى ⁴ im Zusammenhang mit ואל (הואֵל). Auch

¹ Durch das lange *â* wird die von NESTLE hingeworfene Vermuthung, ʾAlalât sei möglicherweise das Fem. von אל mit Artikel (a. a. O. 252), widerlegt.

² U. A. in den Namen zweier Dörfer bei Haleb كفر لاهتا und كفر لاه (Jâqût s. v.) — Arabisch الاحة als Ortsname s. Bekrî s. v. (wonach Einiges bei Jâqût s. v. zu berichtigen).

³ Dass αἰλ , αἰλῆ u. s. w. im Koptischen »Widder« heisst, bestätigt mir DÜMICHEN. Ebenso, dass εἰσευλ , εἰσευλ , εἰσευλ u. s. w. »Hirsch« sei. Im Altägyptischen bezeichne *ar* oder *al*, je nachdem, den Ziegen-, Antilopen- oder sonst einen Bock. Die Wurzel bedeuete »aufstürzen«. Die Etymologie passt gut, aber man kann doch fragen, ob ein Wort wie אל nicht eher von den semitischen Hirten zu den Ägyptern gekommen sein sollte als umgekehrt. Für אֵל , אֵיל , äth. *hajal* ist der semitische Ursprung noch wahrscheinlicher, aber freilich ist bei diesem Worte die Ableitung von der Bedeutung »vorne sein« bloss möglich.

⁴ LAGARDE beruft sich a. a. O. S. 183 auf Gauhari, LANE und DOZY für die Ableitung von أُولَى aus ואל . »Schön finde ich es nicht, dass Hr. Nöldeke Lane, Dozy und Gauhari hier ganz mit Stillschweigen übergeht: mir wiegen die Namen Lane, Dozy, Gauhari schwerer als der Name Nöldeke, selbst wenn dieser Name den andern Namen Gesenius zur Beilage hat.« Also Namen gegen Gründe! Nun, LANE und DOZY haben mit ihrer Anordnung schwerlich aussagen wollen, dass sie von der Ableitung aus ואל überzeugt seien; sie folgen nur der in den Wörterbüchern herkömmlichen Weise. Übrigens citirt LANE selbst die Ansicht eines älteren arabischen

das arabische آل »regieren«¹ (wozu das ganz gewöhnliche (إبالة) gehört sicher hierher. Trotzdem muss ich gestehen, dass ich jetzt jene Etymologie nicht mehr so fest halte wie früher. Es liesse sich denken, dass אל »Gott« ein altes Bilitterum wäre, das man schon in der semitischen Urzeit durch Verlängerung des Vocals in die Analogie der Trilittera hineingezogen hätte. Denn derartige Vorgänge, die wir gerade bei den gebräuchlichsten Substantiven (יד, שם, מא, שח u. s. w.) in der späteren Entwicklung mannigfach beobachten können², haben sich vermuthlich auch schon in der Zeit vor der Trennung der semitischen Sprachen in ziemlichem Umfange ereignet.³ Nicht bloss steht neben אל »Gott« das gemeinsemitische ildh »Gott«, sondern auch noch einige andere bedeutungsverwandte und sehr ähnliche Formen. »Götter« ist im Himjarischen אלאל, was man kaum anders als *أَلَالَة oder etwa *𐩇𐩣𐩪𐩠 umschreiben kann. Das lässt sich gewiss nicht direct von ildh ableiten, sondern höchstens durch einen Metaplasmus der Wurzelgestalt von ʾl; natürlicher ist es aber, auch für den Singular eine, vielleicht ungebräuchliche, Form med. gem. anzunehmen. Da wir nun im Hebräischen אלילים Jes. 10, 10 (gewöhnlich im Plural אלילים) »Götze« haben, so kann man kaum umhin, dies mit jenem אלאל zu verbinden.⁴

An einen Zusammenhang von אלו, »schwören« mit אלה »Gott« haben schon Mehrere gedacht; neben diesem steht nun wieder

Sprachgelehrten, dass אל die Wurzel von אול sei. LAGARDE hätte auch noch EWALD (gr. ar. I, 235), FLEISCHER (Beiträge 1870, 282) nennen können, um so mehr

als sie sich ausdrücklich für die Ableitung von אל erklären. Er hätte auch anführen können, dass einige arabische Gelehrte sogar die Ableitung von اول angenommen haben. Das Alles kann aber nicht bestehen gegenüber der Thatsache des aramäischen Anfang-, »Vorhersein«. Dies ist durch die in den »landläufigen Lexica« gegebenen Stellen völlig gesichert; dreizehn davon sind aus dem officiellen Prophetentargum, so dass an eine Entlehnung aus dem Arabischen nicht zu denken ist.

¹ Kāmil 535. Die Bedeutung dieser Wurzel wäre also ähnlich wie die des griech. αἴμα »voran sein«, »herrschen« u. s. w., s. CURTIUS, Etym. 189f.

² Zu dem, was ich Mand. Gramn. § 87 hierüber gesagt habe, liesse sich noch Vieles hinzufügen. Merkwürdig ist, dass sich gerade von diesen Wörtern mehrere im Ägyptischen wiederfinden.

³ Ein solches Wort könnte z. B. auch imm »Mutter« sein.

⁴ Ich wage nicht, die in einer Handschrift des Iklil nach einer Mittheilung

D. H. MÜLLER'S öfter vorkommende Schreibung مرثدال mit = zu verwerthen; die Autorität einer sehr jungen Handschrift ist dazu nicht ausreichend. — Die hebräischen Propheten sahen in אלילים »Götze« natürlich bloss אלילים, »elend«, aber ursprünglich wird das nicht sein. — Wäre nicht اللات, so könnte man Herodot's Ἀλαάτ zu diesem Worte ziehen.

⁵ Darin, dass hebr. אלה sein & immer festhält, darf man wohl nicht einen Übergang in der Bildung אלה sehen, sondern nur einen Fall, ähnlich wie bei אלהים im st. c.

Zum Münzwesen Athens.

Von JOH. GUST. DROYSSEN.

(Vorgelegt am 21. December 1882 [s. oben S. 1173].)

I.

In den Bemerkungen zum Finanzwesen des älteren Dionys von Syrakus ist gelegentlich erwähnt worden, dass von den Sachkundigen das Silbergeld der guten attischen Zeit dem Gewicht nach in zwei Arten unterschieden werde, in der einen, der früheren

die Tetradrachme	die Drachme
bis zu 17.464 Gramm,	4.366 Gramm,

in der anderen, der späteren

bis zu 17.34	•	4.336	•
--------------	---	-------	---

Ist man befugt, in diesen Ziffern normale Gewichte zu erkennen?

Es mag dahingestellt bleiben, ob die sogenannten Wappenmünzen, ohne Schrift und auf der Rückseite so gut wie durchgehend mit dem *Quadratum incusum*, attische Münzen sind; die erhaltenen Stücke sind ausser kleineren Nominalen meist Didrachmen, einige Drachmen, wenige Tetradrachmen; sie reichen hinauf bis

17.40 Gramm,	8.59—8.71 Gramm,	4.20 Gramm,
--------------	------------------	-------------

sie sinken hinab bis

17.00	•	7.70	•	3.90	•
-------	---	------	---	------	---

Aber eben so sinken die sicheren attischen Tetradrachmen und Drachmen. Bei dem verschiedenen Zustand der Erhaltung oder Abnutzung dieser Münzen ist auf dem Wege der Wägung kein sicheres Maass für ihr normales Gewicht zu gewinnen.

Damit ist ein Punkt berührt, über den zwei der jetzt namhaftesten Numismatiker verschiedener Meinung sind. Nach Hrn. FRIEDLAENDER'S Ansicht (v. SALLET Numis. Zeitsch. IX. S. 101) muss man, wenn durch Wägungen das normale Gewicht eines Nominals festgestellt werden soll, dem Gewicht des besterhaltenen Exemplars immer noch etwas hinzurechnen. Hr. IMHOOF-BLUMER dagegen meint, dass das nur für Goldmünzen insgemein, für Silbermünzen nur bei denen, die nach dem fünften Jahrhundert geprägt sind, gelten könne, da vor dieser Zeit gleiche Nominalen in Silber, selbst solche, die noch fast stempelfrisch erscheinen, oft um ein Merkliches differiren (in den Monats-

berichten der Berl. Akad. 1866, S. 656 und mit einigen Erweiterungen in dem Annuaire de Numismatique 1882, Separatabdruck S. 5).

Solche Differenzen — und in einzelnen Fällen steigen sie bis zu 10 Procent — konnten nur bei höchst unzulänglicher Justirung entstehen; sie mussten den Verkehr, wenn es sich um irgend namhafte Summen handelte, in unerträglichster Weise stören, ja dahin führen, dass man im innern Verkehr bei 100, bei 50 Drachmen schon nicht mehr zählte, sondern wog, Agio forderte und zahlte, kurz alle wesentlichen Zwecke die mit der Prägung von Staatswegen erreicht werden sollten, einbüsste.

Die Athener rühmten sich das schönste Silbergeld zu haben: »rein und fein« (οὐ κεκιβδηλευμένον) »von richtigem Gewicht« (ὁρθῶς κοπέν) »wohl geprobt« (εὖ κεκωδωνισμένον). Arist. Ran. 720. Dass sie technisch genau zu justiren verstanden, zeigt ihre Goldprägung¹; wie sollten sie nicht auch ihr Silbergeld nach fester Norm geprägt, wie namentlich ihr Grosstück, die Tetradrachme, nur so ungefähr richtig »bis gegen 17.50 Gramm« ausgebracht haben? Und eben so andrerseits: »fremde Kaufleute« sagt Xenophon, »die für ihre Waaren statt Rückfracht aus Athen attisches Silbergeld heimbringen, machen ein gutes Geschäft; denn wo immer sie es verkaufen, erhalten sie Aufgeld;«² natürlich weil es mehr werth war, mehr Silber enthielt als z. E. syrakusische Tetradrachmen nach demselben Münzfuss, die jenem an Kunst und Schönheit weit überlegen waren. Also man verstand sehr wohl den Feingehalt zu erkennen und zu controliren; wie der Trapezit, der Argyrognomon dabei verfuhr, wissen wir nicht.³

Silbergeld verliert durch die Circulation nicht unbedeutend an Gewicht. Nach den von KARMARSCH (Handbuch der Technologie I.

¹ Der attische Goldstater wiegt in den erhaltenen Exemplaren bis 8.60 und 8.64 Gramm. Nach den Wägungen des Berliner Münzcabinets geben die ausgelegten Stücke

der Stater	8.60 Gramm,
der halbe Stater	4.30 „ „
der viertel Stater	2.144 „ „
der sechstel Stater	1.435 „ „
der zwölftel Stater	0.715 „ „

also das letzte Stück, der Goldobol, nur um 0.0016 weniger als $\frac{1}{12}$ von 8.60 Gramm. Weitere Nominale giebt Beulé Monnaies d'Athènes p. 42, nämlich Goldstückchen von 0.55—0.35 (Halbobolen) — 0.17—0.8 Gramm. Die kleinsten attischen Silbermünzen, der Halb- und Viertelobol, die als $\frac{1}{12}$ und $\frac{1}{24}$ Drachme

wiegen sollten,	wiegen noch
0.3613	0.35
0.1801	0.18

und das, obschon die kleinsten Stücke in der Circulation natürlich sich am meisten abnutzten.

² Xenoph. de rehit. III. 2 πλεῖον τοῦ ἀρχαίου λαμβάνοντες.

³ Lucian Hermotim. c. 64 καὶ ὑπάρχειν σοι κατὰ τοὺς ἀργυρογνώμονας διασηραῖσθαι ἃ τε δόκιμα καὶ ἀκίβδηλα, καὶ ἃ παρακεκρωμένα.

S. 545) angestellten Wägungen zahlreicher Thalerstücke von 1857 hat jedes in Procenten des ursprünglichen Gewichts durchschnittlich eine jährliche Minderung von 0.0242 erlitten. Dürfte die Circulation attischer Tetradrachmen eben so rasch und angreifend gedacht werden wie die der Thaler Vereinsgeld von 18.51 Gramm, so würde die Tetradrachme von 17.464 nach 10 Jahren auf 17.42, nach 50 Jahren auf 17.25, nach 200 Jahren auf 16.61 gesunken sein. Ihr Umlauf war vielleicht minder hastig, dafür ihr Silber weicher als das mit 10 Procent Kupfer legirte Silber der Thaler. Wenn die Legirung des älteren attischen Silbers, wie nachgewiesen ist, nur 2 Procent betrug, so verlor das Geldstück um so schneller an seinem Gewicht.¹ Dass die zu leicht gewordenen Zehn-, Vier-, Eindrachmenstücke weder verrufen noch zu vollem Werth eingezogen wurden, scheint aus dem Zustand der erhaltenen Stücke sich zu ergeben.

II.

Sicherern Boden für unsere Frage geben die noch vorliegenden positiven Zeugnisse über die Normirung des attischen Silbers seit Solon. Freilich sind es drei von einander abweichende Angaben, mit denen man zu rechnen hat.

1. Plutarch giebt nach Androtion an (Sol. 15): »Solon habe die Mine auf 100 Drachmen gesetzt, während sie bis dahin nur 73 gezählt habe,« — wie längst anerkannt ist, ein verkehrter Ausdruck Plutarchs, der in seiner Quelle gefunden haben mag, dass Solon aus 73 alten Drachmen 100 neue gemacht habe.

2. Ein Volksbeschluss aus später, vielleicht mithradatischer Zeit (C. I. A. II. 476) sagt: die Handelsmine (ἡ μνᾶ ἡ ἐμπορικὴ) soll wiegen 138 Drachmen nach den Gewichten in der Münzanstalt (πρὸς τὰ στάδια τὰ ἐν τῇ ἀργυροκοπείᾳ). Also nach den Normalgewichten für die Prägung ist hier die Regel für das Handelsgewicht bestimmt.

3. Böckh (Metrol. Untersuchungen S. 120) hat höchst scharfsinnig aus einer Stelle des Priscian² nachgewiesen, dass nach Dardanos, auf

¹ Dass von den uns erhaltenen Tetradrachmen zahlreiche unter 17.00 ja unter 16.50 Gramm wiegen, scheint zu erweisen, dass auch die arg abgenutzten Stücke noch in Cours blieben. Man könnte versuchen aus ihrem Gewicht zu berechnen, wie lange sie in Cours geblieben, wenn man genau sagen könnte, wie viel sie bei ihrer schwachen Legirung durchschnittlich im Jahr verlieren mussten, und mehr noch, was die späteren Jahrhunderte, wo so viele von ihnen, in der Erde oder den Trümmern des Alterthums gefunden, als Agraffen, Halsschmuck, Gehänge u. s. w. getragen worden sind, von ihnen abgenutzt haben.

² Priscians Worte sind: (de figuris numm. c. 2 p. 319 ed. Krehl): talentum Atheniense parvum minae octoginta et unciae quattuor.

den sich Priscian beruft, das Verhältniss des Handelsgewichts zum Münzgewicht auf $100:138\frac{8}{9}$ normirt gewesen ist.

Dass durch die solonische Reduction ein Talent geschaffen wurde von 26 196 Gramm Gewicht, erhellt wohl mit Sicherheit aus der in einem frühern Vortrag besprochenen Reduction des alt-sicilischen Litrensystems und die Begründung des reducirten auf den Nummos, d. h. auf die attische Didrachme zu 8.732 Gramm.

Und wenn das solonische Talent von 26 196 Gramm durch Reduction der Drachme nach dem Verhältniss von 73:100 entstanden ist, so war die Silbermünze, die Solon vorfand und reducirte, nach dem Handelsgewicht, das spät hinab in Athen in Geltung geblieben ist, geprägt gewesen, das Talent zu 36 156 Gramm, die Drachme also zu 6.026 Gramm — d. h. nach dem sogenannten aiginäischen Fuss.

Die folgende Tabelle giebt die Gewichte nach den vier genannten Systemen in Grammen:

	Talent.	Mine.	Tetradrachme.	Drachme.
vorsolonisch	36 156	602.6	24.104	6.026
zu 73:100	26 393	439.883	17.59533	4.3988
„ 100:138	26 196	436.6	17.464	4.366
„ 100:138 $\frac{8}{9}$	26 010	433.5	17.34	4.335

Wenn das Litrensystem, das vor Ol. 70 in Sicilien neu geordnet worden ist, auf ein Silbertalent von 26 196 Gramm führt, so muss man aus der freilich unklar von Plutarch ausgedrückten Angabe in den Atthis des Androtion entweder schliessen, dass nach Solon, — sagen wir in der Zeit der Peisistratiden — das Münzgewicht um ein nicht Unbedeutendes gemindert ist, von 26 393 auf 26 196, oder annehmen, dass Androtion's Angabe nur eine ungefähre war (73 statt 72.5), dass er nicht eben die Absicht gehabt hat, mit der Genauigkeit eines Wardein zu sprechen.

Wenn der Volksbeschluss aus später Zeit die Drachme des Handelsgewichtes nach den in der Münze aufbewahrten Normalgewichten für die Silberdrachme bestimmt, und diese auf ein Talent von 26 196 Gramm führen, nach welchem schon vor Ol. 70 das sicilische Litrensystem regulirt worden ist, so hat in Athen für die Silberprägung vor 500 bis in das erste vorchristliche Jahrhundert dasselbe Normalgewicht für die Münzen bestanden.

Dardanos, auf den sich Priscian beruft, hat, wie neuerer Zeit nachgewiesen worden ist, nicht vor der Zeit Constantins geschrieben; aber seine Schrift hat speciell die Gewichte (περί σταθμῶν) behandelt; und da von attischer Silberprägung in seiner Zeit nicht mehr die Rede sein konnte, so bezeichnet seine Formel für das talentum magnum,

wie er es nennt, nämlich $100 : 138\frac{8}{9}$, die Norm irgend einer Zeit des attischen Alterthums, und zwar eine solche, die gegen das Normalgewicht in der Münze um etwas geringer ist (26 010 Gramm gegen 26 196 im Talent), aber in der Differenz zwischen den erhaltenen Tetradrachmen bis zu 17.46 und denen bis zu 17.34 eine Bestätigung zu finden scheint.

Giebt es eine Möglichkeit diese Differenz zu erklären und damit zu verificiren?

III.

Die attischen Silbermünzen, abgesehen von denen aus der »Zeit der gesunkenen Kunst« etwa seit dem chremonideischen Kriege, seit Mikon und Eurykleides (Gesch. der Hell. III. 2. 56. und 219), hat man nach Technik und Styl, nach dem Schriftcharakter ihrer Beischrift, nach ihrem Gewicht in drei Reihen gesondert, die freilich chronologisch nicht gleichen Schrittes gehen.

1. Dem Gewicht nach. Es wird eine Tetradrachme von 17.67 Gramm angeführt (Mus. Britt. S. 125), die ganz isolirt steht¹. Die schwersten Tetradrachmen von bester Erhaltung wiegen

17.44 bis 17.47 Gramm.

Ein Dekadrachmon in dem schönen Exemplar des Berliner Münz-cabinets wiegt 42.70 Gramm, und in dem Exemplar des brittischen Museums 43.16 Gramm, Gewichte die für die Tetradrachmen resp. 17.08 und 17.264 geben würden. Wenn andere Tetradrachmen von bester Erhaltung 17.32 Gramm wiegen, so scheint man auf eine zweite Gewichtsart schliessen zu dürfen, die etwa

bis 17.33 Gramm

steigt. Es muss dahingestellt bleiben, ob als eine dritte Art diejenigen zu bezeichnen sind, welche

von 17.20 bis 17.0

und tiefer hinabsinken. Lassen wir zunächst diese dritte Art aus dem Spiel, so fällt es auf, wie sich die beiden anderen zu den aus dem Verhältniss $100 : 138$ und dem von $100 : 138\frac{8}{9}$ entwickelten Gewichten, die wir als die normalen bezeichnen wollen, schicken:

	normal	effectiv
nach $100 : 138$	17.464	17.47 bis 17.44
» $100 : 138\frac{8}{9}$. .	17.34	17.32 » 17.28.

¹ Ich weiss nicht, ob man recht thut, diese und einige ähnliche Stücke, die von anderen Prägestädten vorkommen, mit der Bezeichnung »übermünzt« gleichsam zu rechtfertigen. Man müsste doch solche angeblich übermünzten Stücke erst genauer untersuchen, nicht bloss wägen.

2. In Betreff des Styls und der Besonderheiten des Gepräges verweise ich auf das von Numismatikern, namentlich von v. Prokesch-Osten (Abh. der Berl. Akad. 1848 S. 1) Dargelegte.

Die Münzen aus der Zeit der »gesunkenen Kunst« oder »des neuen Styls«, — jene breitgeschlagenen, in ihrer Zeichnung des Athenekopfes und seines Schmucks überladenen, auf der Rückseite mit Monogrammen, Personennamen, Beizeichen gefüllten, — fasst man als eine »zweite Classe« zusammen, gegenüber denen der vorhergehenden drei oder vier Jahrhunderte; man unterscheidet in dieser, der ersten Classe, wie man sie nennt, eine erste Abtheilung »alterthümlichen Styls«, deren Typus in der zweiten und dritten Abtheilung, der des »strengen« und der des »vollkommenen Styls« im Wesentlichen festgehalten ist, in der Art, dass das quadratum incusum der ersten Abtheilung auch in der zweiten und, wenn auch bescheidener, noch in der dritten sich bemerklich macht.

Das Berliner Münzcabinet hat von der ersten dieser drei Abtheilungen — und nur diese geht uns zunächst an — 36 Tetradrachmen, in vier Reihen (*a. b. c. d.*), deren Folge nach dem Styl und der Technik ihres Gepräges bestimmt ist.

Die der Reihe *a* sind dicke klumpige Stücke, 24 an der Zahl, bis zu 17.36 und 17.44 Gramm an Gewicht, mit sicherem, wenn auch nicht besonders tiefem quadr. inc., — der Pallaskopf auf der Schau-seite alterthümlich, das Auge wie von vorn gesehen, meist sehr rund, in dem Ohr ein Zierrath —, der Helm mit einem Kamm und den Ansätzen des Busches, ohne anderen Schmuck, als dass die untere Leiste des Helmkammes über dem Nackenblech an das Helmrund sich kreisförmig wie zum Halten anschmiegt; — endlich die Stirnhaare des Kopfes, bei einigen Stücken in vier bis sechs sogenannten Spucklocken wie angeklebt, bei andern wie gekürzt in parallelen Strehlen auf die halbe Stirn hinab hängend, bei andern in weichen Formen dem Ohr zu gekämmt. Eine von diesen Tetradrachmen ist gewaltsam, wie mit einer Axt, gekerbt, als habe man sehen wollen, ob die Münze subärat sei, wie in der Berliner Sammlung ähnlich eine attische Drachme, auch makedonische, bisaltische, edonische u. s. w. Münzen vorkommen; dass dies persische Marken, diese Stücke also älter als die Perserkriege seien, ist vermuthet worden, aber nicht zu erweisen.

Die Reihe *b* charakterisirt ein reines und tiefes quadr. inc.; zwei von den sechs Stücken dieser Reihe haben auf der Rückseite den Ölzweig neben der Eule nicht links oben hängend, sondern rechts unten stehend, eine dritte statt des Zweiges die Mondsichel. Auf zweien ist das Stirnhaar der Pallas in Spucklocken endend, in den vier andern in parallelen Strehlen auf die halbe Stirn hinabhängend. Das Gewicht dieser sechs Stücke geht bis 17.16 Gramm hinauf.

Schon in dieser Reihe *b* ist ein Stück, dessen Schriftlinie sich den Umrissen der Eule folgend ein wenig biegt. In den vier Stücken der Reihe *c* kommt zu dieser Eigenthümlichkeit noch ein weniger tiefes quadratum incusum und auf der Stirnplatte des Helms drei stehende Olivenblätter, wie man sie bezeichnet hat. Auf einem dieser Stücke zeigt sich die kreisförmige Halte am Helmrund zu einem stylisirten Geranke entwickelt. Das Stirnhaar der Pallas ist bei zwei Stücken in parallelen Strehlen auf die halbe Stirn herabhängend, bei zweien in weichen Formen zur Seite gekämmt, dann gegen das Ohr im Wulst hinabgerundet. Auf der Rückseite zeigt sich bei dem Olivenzweig die Mondsichel und ist der Ölzweig nicht dem rechten Winkel, in dem er steht, entsprechend gebreitet, sondern in zwei langen Blättern mit dem Fruchtstyl zwischen ihnen fast parallel herabhängend. Das Gewicht dieser vier Stücke reicht bis zu 17.08 Gramm hinauf.

Endlich die Reihe *d*, zwei Tetradrachmen, die das Theta mit dem Kreuz haben. Die Form dieser Münzen ist nicht ganz so klumpig, wie die in der Reihe *a*, aber der Typus eben so einfach, ohne die drei Blätter auf dem Helm, das Auge der Pallas ebenso unperspectivisch gezeichnet, in dem der einen der Augapfel scharf bezeichnet, das Stirnhaar dieses Stückes in parallel überhängenden Strehlen, das des andern gewellt wie zur Seite gekämmtes Lockenhaar; der Haarschopf, der unter dem Nackenblech des Helmes herabhängt, sauberer detaillirt als bei den anderen Reihen. Das Gewicht des einen Stückes ist 17.15 Gramm, das des andern 16.52.

Da die drei stehenden Blätter auf dem Helm, die die Reihe *c* charakterisiren, in den Prägungen der nächstweiteren Abtheilungen der Classe I beibehalten sind, so wird man geneigt sein, diese Reihe *c* der Reihe *d*, welche diesen Schmuck nicht hat, der Zeit nach nicht vorausgehn, sondern folgen zu lassen. Zu dem Ölzweig auf der Rückseite wären drei Ölblätter auf der Schauseite ein Pleonasmus; und ihre Zeichnung ist wenig charakteristisch, es könnten eben so gut andere Blätter, z. B. von der Myrthe sein; deren Deutung aus dem Harmodiosliede läge nahe genug.

Und wenn ausser diesem bedeutsamen Helmschmuck auf den vier Stücken der Reihe *c* auch das Rund, in das die untere Leiste des Helmkammes ausläuft, hier zuerst zu einem zierlich stylisirten Geranke entwickelt, in den Prägungen der folgenden Abtheilungen typisch bleibt, so führt diese Reihe *c* um so deutlicher zu ihnen hinüber.

Dass von den drei Reihen *a*, *b*, *d* die erste stylistisch und technisch hinter der dritten merklich zurücksteht, dürfte wohl nicht ohne Weiteres für das höhere Alter von *a* entscheiden, wie denn selbst

die recht unschönen Spucklocken, die der Pallaskopf in *a* und *b* häufig hat, noch auf den Vasenbildern aus der Mitte des fünften Jahrhunderts oft vorkommt.

3. Die Beischrift und der Schriftcharakter. Sicher attisch sind uns nur die Münzen, welche das AΘE als solche erkennen lässt. Erst mit dem Pallaskopf tritt diese Beischrift auf.

Von den drei Buchstaben, die sie bilden, hat im attischen Gebrauch jeder seine besonderen Wandlungen, die der Zeit nach nicht parallel gehen.

Einen chronologisch ziemlich sicheren Anhalt bietet die sorgfältig gemeisselte Weihenschrift des Altares, den Peisistratos, des Hippias Sohn als Archon, also vor Ol. 67 dem pythischen Apollon errichtet hat C. I. A. I. 373^c. Sie hat die drei Buchstaben in der Form A. E. Θ. In denselben Formen giebt dieselben die Inschrift der von den Athenern in Delphoi geweihten Stoa C. I. Ant. 3^a: τὴν στοάν καὶ τὰ ὄπλα [α κ]αὶ τὰ κρωτήρια ἐλόντες τῶν πο[λεμίων], der deutliche Rest des *c* in dem letzten Worte zeigt, dass nicht Περσῶν dagestanden hat.

Als älter erweist sich der zweite, der attische Theil der sogenannten sigeischen Inschrift C. I. Ant. 492, indem er die Formen A⚡Θ hat und wechselnd vor- und rückwärts geschrieben ist.

Freilich das A und gelegentlich auch das Θ hat auch noch Euphronios in seinen rothfigurigen Vasenbildern gebraucht. Und A neben E und Θ findet sich noch in dem Verzeichniss der Gefallenen von Ol. 80 C. I. A. I. 433. Für unsern Zweck liegt weniger daran, wie spät hinab in Athen das Θ und ⚡ oder ⚡, als wie hoch hinauf das Θ und E reicht.

Unser einziger sicherer Anhalt dafür ist, so viel mir bekannt, dass sich auf einem Inschriftstein, der zu dem Eilbau der themistokleischen Mauer Ol. 75 (478) verwendet worden ist (C. I. A. I. 479) Θ neben ⚡ und A findet. In der wiedergefundenen Hermeninschrift (Mittheil. des Arch. Inst. in Athen V. S. 266), die früher nur und sehr incorrect in Fourmont's Abschrift vorlag, kommt nebeneinander Θ und Θ, ebenso ⚡ und ⚡, A, A und A vor. In dieselbe Reihe hipparchischer Inschriften scheint die in C. I. A. 381 mitgetheilte zu gehören, ein Epigramm des Anakreon, den nach dem Tode des Polykrates Ol. 64 Hipparch nach Athen berief; in sauberer Schrift giebt sie A neben E, ein Theta kommt in ihr nicht vor.

Die gewiss alterthümlichste Form ⚡ findet sich in nicht wenigen Inschriften, welche Θ haben, wenigstens nach der Wiedergabe derselben im C. I. A. I; so 480. 482, auch 18 und 27 nach den im Nachtrag gegebenen Abschriften, während die früheren vor Köhler E hatten.

Aus den angegebenen Thatsachen lässt sich kein sicheres Resultat für die Chronologie dieser drei Buchstaben ziehen, nur das eine vielleicht, dass Θ auch schon vor der Weihung des pythischen Altars, vor Ol. 67 neben \oplus in Gebrauch gewesen ist.

Die in der Reihe *a* aufgeführten Tetradrachmen, die dem Styl nach für die ältesten gelten, haben $\Lambda\Theta E$ oder $\Lambda\Theta\epsilon$.

Von denen der Reihe *b* haben fünf $\Lambda\Theta\epsilon$, eine $\Lambda\Theta E$.

Die der Reihe *c* haben $\Lambda\Theta\epsilon$.

Die der Reihe *d* haben $\Lambda\oplus\epsilon$ und $\Xi\oplus\Lambda$, das Kreuz im Theta hier liegend, da stehend.

Auch der Schriftcharakter dieser vier Reihen zeigt einen gewissen Unterschied, nur nicht so, dass er der paläographischen Unterschiedenheit entsprechend sich vertheilt. Bald sind die Buchstaben wie mit einem Cantstichel eingeritzt, in einigen namentlich das ϵ so, dass man in dem stärker markirten Endpunkt der Querstriche gleichsam das Einsetzen des Stichels zu bemerken glaubt; andere erscheinen rundlich erhöht, als wenn sie mit dem Boltstichel in die Stanze gegraben wären; andere, in denen die Buchstaben einen platten Rücken haben, können nur mit einem Flachstichel eingegraben sein.

IV.

Auf die Frage, von der wir ausgingen, hat sich uns aus den Kategorien des Gewichts, des Gepräges, der Schrift keine genügende Antwort ergeben. Und auch nur wenig weiter führt ein technisches Moment, das bisher absichtlich übergangen ist.

In der ältesten Technik des Prägens hat — abgesehen von gewissen grossgriechischen Münzen mit convexer Vorderseite und nur fast gleicher concaver Rückseite — nur die Schauseite ein Bildwerk, das sie von der in den Amboss eingelassenen Matrize durch den Prägeschlag empfangen hat; das quadratum incusum der andern Seite ist der Abdruck der für den Schlag auf den Schröttling gelegten Stanze und ihrer Einschnitte, die wohl das Ausgleiten beim Schlage hindern sollten.

Erst allmählig ist man dazu fortgeschritten, diesen Einschnitten eine regelmässige Gestalt, etwa die eines durch zwei Diagonalen getheilten Vierecks, zu geben, dann auch wohl, etwa in der Mitte dieser Vierecktheilung, in einem kleinen oft kreisförmigen Spiegel ein Bildwerk zu schneiden — so in den ältesten Münzen von Syrakus einen kleinen weiblichen Kopf; erst allmählig erfüllt dann dies Bildwerk die ganze Rückseite und es bleibt das vertiefte Viereck nur eine Umrandung des Spiegels.

In welchen Zeiträumen diese Übergänge sich folgten, ist nicht mehr ersichtlich; gewiss nicht überall in denselben.

Die Münzen mit Pallaskopf und Eule, die ihre Beischrift als attische Münzen sicher stellt, beginnen erst nachdem die Technik die zuletzt bezeichnete Stufe erreicht hat.

In (Aristot.) Oecon. II. 5. wird von dem Tyrannen Hippias neben andern Geschichten angeführt, dass er das in Athen umlaufende Silbergeld verrieff und ein neues Gepräge einführte.¹ Die Nachricht mag, wie die meisten in dieser Schrift, aus guter Quelle stammen: der gebrauchte Ausdruck zeigt, dass das neue Gepräge kraft eines Volksbeschlusses eingeführt worden ist. Hr. IMHOOF-BLUMER sagt, »ohne Zweifel« sei dies neue Gepräge eben das von dem an immer beibehaltene: »Pallaskopf und Eule« gewesen.

Wenigstens möglich ist es. Es ist der Mühe werth sich klar zu machen, was sich mit dieser Hypothese weiter ergeben würde.

Nicht nothwendig, dass erst nach dem Tode des Peisistratos Ol. 63 dieser Typus eingeführt worden sei. Wenn eine Schatzung auferlegt, wenn ein Volksbeschluss über Einführung eines neuen oder anderen Typus gefasst wurde, so ist in amtlichen Formen und wohl formell der Verfassung gemäss verfahren worden, wie ja nach Thukydides bekanntem Ausdruck (VI. 54) die Peisistratiden das Regiment in der Art führten, dass immer einer aus der Familie ἐν ταῖς ἀρχαῖς war. So in amtlicher Stellung konnte Hippias schon während des Vaters Lebzeiten jene Neuerung veranlasst haben, wenigstens in dessen dritter »Tyrannis« seit Ol. 59: zu jung für die ἀρχαὶ war er da nicht mehr, da der Vater schon bei seiner zweiten Vertreibung elf Jahre vorher, sich durch ihn bestimmen liess in dem nahen Eretria zu bleiben und sich da zur Rückkehr bereit zu halten.

Weiter könnte man aus dem etwas auffälligen Ausdruck τὸ νόμισμα τὸ ὃν Ἀθηναῖοις entnehmen wollen, dass es beliebiges Silbergeld in den Händen der Athener gewesen sei, nicht gerade attisches. Aber wenn das attische Volk sich versammelte ἐπὶ τῷ κόψαι ἕτερον χαρακτῆρα, so hatten sie doch wohl schon attisches Gepräge, sonst würde statt ἕτερον wohl δημόσιον oder dergleichen gesagt sein.

Aber die durch ihre Umschrift als attisch documentirten Münzen reichen ihrer Technik nach nicht in die erste Hälfte des sechsten Jahrhunderts hinauf. Und dass die schon erwähnten Wappenmünzen, die allerdings meist auf attischem Boden gefunden worden sind, alle oder die meisten ihrer vierzehn Reihen attische seien, ist eine Hypothese,

¹ Arist. Oecon. II. 5: τὸ δὲ νόμισμα τὸ ὃν Ἀθηναῖοις ἀδόκιμον ἐποίησεν· τάξας δὲ τιμὰν ἐκέλευσε πρὸς αὐτὸν ἀνακομιζέειν· συνελθόντων δὲ ἐπὶ τῷ κόψαι ἕτερον χαρακτῆρα ἐξέδωκε τὸ αὐτὸ ἀργύριον.

überdies eine solche, die in Betracht des Verfassungszustandes des solonischen Athens zu Schlüssen führen würde, die zu tief greifen, als dass man sie auf eine so unsichere Induction hin wagen dürfte, zumal da sich sonst keine Spuren finden, dass das Athen der solonischen Verfassung nicht sowohl Ein Staat (*μία πόλις*), als eine Föderation von Gemeinden, Geschlechtern, Stämmen oder dergleichen gewesen sei.

Denn diese vierzehn Reihen von Münzen,¹ mit eben so vielen verschiedenen Typen auf der Schauseite — freilich in vier Reihen


¹ Von den fünfzehn Reihen, die als Wappenmünzen angeführt zu werden pflegen, hat Hr. IMHOOF-BLUMER die letzte (A. Eberkopf, R. vertieftes Viereck) bereits ausgeschieden; sie führt auf einen anderen als den solonischen Münzfuss.

Vier andere Reihen sind nur mit je einem oder zweien Stücken kleinster Nominale vertreten (No. 10 Mistkäfer, No. 11 Frosch, No. 12 Granatapfel, No. 13 Auge); sie haben sämtlich auf dem R. ein diagonal geviertheiltes Viereck.

Weiter folgen sieben Reihen (No. 2 Dreibein, No. 3 Knöchel und No. 4 stehende Eule, No. 5 Hintertheil eines Pferdes, No. 6 Vordertheil eines Pferdes, No. 7 Pferd mit hoher Mähne auf einer Basis stehend, No. 9 Amphore), die das Gemeinsame haben, dass sie das Bild auf der Schauseite mit einem Ringe (ein Stück in No. 6 mit einem Doppelringe) einschliessen. Aus jeder dieser sieben Reihen sind Didrachmen, Drachmen und kleinere Nominale erhalten; alle haben auf der Rückseite das mit Diagonalen geviertheilte Viereck. Das Gewicht der Didrachmen steigt bis 8.40, ja 8.66 Gramm, sinkt bis 8.10, ja 8.00 Gramm.

Es bleiben noch zwei Reihen, die jede in sich ein technisches Fortschreiten erkennen lassen.

In der Reihe No. 1, mit dem Rade auf der Schauseite, führt Hr. IMHOOF-BLUMER 6 Didrachmen (bis zu 8.50 und 8.59 Gramm Gewicht), 5 Drachmen, etwa 10 kleinere Stücke an; das Berliner Museum hat von diesen kleineren 38. Eine der Didrachmen hat das Rad in sehr alterthümlicher Form, wie wenn es aus einem Brett durch vier kleeblatt-

artige Rundausschnitte  gemacht wäre; die vier anderen zeigen ein Rad mit vier

Speichen. Jene eine hat das diagonal getheilte vertiefte Viereck auf der Rückseite mit den meisten anderen gemein. Von den Drachmen hat die eine sechs vertiefte unregelmässige Felder, eine zweite 5 ebenfalls unregelmässige. Von den kleineren Nominalen zeigt eine Vierteldrachme einen unförmlichen Einschlag, zwei Obolenstücke Einschläge unregelmässiger Form. Endlich hat eine der Berliner Didrachmen und zwei der Halbobolen ein Rad, das in der Mitte zwischen dem alterthümlichen und dem mit vier Speichen steht, indem je drei zierlich geformte, nach dem Rande zu divergirend

gebogene Stäbe  statt der Speichen sind.

Noch bestimmter tritt die chronologische Folge in No. 14 hervor, deren Bild auf der Schauseite der Medusenkopf ist. Die der Zeit nach ältesten dieser Reihe sind wohl 8 Didrachmen (bis 8.71 Gramm hinauf) mit diagonal geviertheiltem Viereck auf der Rückseite; derselben Art ist das quad. inc. der Obolen, $\frac{3}{4}$ Obolen, $\frac{1}{4}$ Obolen dieser Reihe, etwa 6 an der Zahl. Dann folgen dem Styl nach Didrachmen mit einem Löwenkopf von vorn in einem der vier Theilstücke des Vierecks. Dann 4 Tetradrachmen (bis 17.40 Gramm hinauf) deren Rückseite in dem Spiegel des quad. inc. den Kopf eines Löwen von vorn gesehen zeigt; eine fünfte hat dafür einen Stierkopf von vorn.

Unter den alten euböischen Münzen, die Hr. IMHOOF-BLUMER verzeichnet (von Karystos, Chalkis, Eretria), finden sich allerdings auch Tetradrachmen, aber keine von

nur in kleinsten Nominalen mit wenigen Exemplaren vertreten — sind nicht als attische Staatsmünzen eine der anderen gefolgt; solcher Wechsel des Gepräges in den fünfzig Jahren vom Archontat des Solon bis zur dritten Tyrannis der Peisistratiden, wäre höchst seltsam: — sondern sie gehen nebeneinander her, wie man aus den technischen Wandelungen innerhalb einiger dieser Reihen erkennt. Aber andererseits, dass nur in einer dieser Reihen Tetradrachmen neben Didrachmen vorkommen, in den anderen die Didrachme das Grossstück ist, würde gar wohl dazu passen, dass Syrakus seiner neuen Gewichtsordnung das Didrachmen von 8.732 Gramm = 2180 Gramm Kupfer zu Grunde gelegt hat.

Es bleibt nur die Alternative: entweder diese Münzen sind attische; dann muss man sich entschliessen die solonischer Verfassung anders zu fassen, als man auf Grund der literarischen Zeugnisse zu thun sich gewöhnt hat, und es würde das Verdienst der Peisistratiden sein, auch in dem einheitlichen Gepräge der Landesmünze den Gedanken der *μία πόλις* einen grossen Schritt weiter geführt zu haben, wie sie es in andern Dingen nachweislich gethan haben, unter andern mit der Erhebung der alterthümlichen Panathenäen zu einer grossen Festfeier in jedem fünften Jahre mit ihren musischen, gymnischen und hippischen Agonen, recht eigentlich zu einem Staatsfest — oder diese Münzen sind nicht attische; dann hat Attika bis zu den Peisistratiden kein eigenes Geld gehabt und Solon's Reduction hat darin bestanden, dass er fremdes Geld, euböisches oder auf euböischen Fuss geprägtes anderer Städte, an der Stelle des bis dahin landesüblichen aiginäischen recipirte; dann floss allerlei Geld nach Athen — nur nicht auf dem Wege der »Tributentrachtung der Unterthanen der Bundesgenossen«; denn als Athen solche hatte, nahm es nur attisches Geld in Zahlung, das die Pflichtigen, wenn nicht anders, bei den Trapeziten mit Aufgeld kaufen mochten.

Es ist ein Dilemma, das sich aus den bis jetzt vorliegenden historischen Materialien nicht lösen, auch mit Wahrscheinlichkeitsgründen nicht beseitigen lässt, nicht einmal mit dem, dass Syrakus den attischen Münzfuss nicht eingeführt haben könne, bevor es attische Münzen gab. Denn dass Syrakus den attischen Münzfuss angenommen habe, ist nicht eine positive Überlieferung, sondern aus dem, was

ihnen ohne wenigstens den Anfangsbuchstaben, oder die zwei, drei ersten Buchstaben des Stadtnamens, ohne den Hahn von Karystos, das Rad von Chalkis, den Polypen von Eretria in dem vertieften Viereck der Rückseite.

Weder auf den Tetradrachmen mit dem Gorgoneion No. 14, noch auf den anderen Didrachmen, Drachmen und kleineren Stücken der obigen vierzehn Reihen findet sich ein Buchstabe.

vorliegt, geschlossen; und dass das syrakusische Gepräge um eine Stufe älter ist, als die älteste sicher attische Münze, beweist in dieser Frage nichts, da Syrakus nicht die Technik, sondern den Münzfuss von Athen, den von Solon eingeführten, übernahm; die Anfänge der syrakusischen Prägung mit dem weiblichen Köpfchen im Spiegel des quadratum incusum könnten trotz der älteren Technik, die sie zeigen, sehr wohl später sein, als die ältesten sicher attischen Prägungen.

V.

Wie dem auch sei, dass Solon den attischen Münzfuss geändert hat, steht durch ausdrückliche Zeugnisse und durch den Zusammenhang dieser Änderung mit seiner Verfassungsreform fest. Dass er sich dem euböischen Münzfuss angeschlossen habe, ist nicht positiv überliefert, sondern wird aus den Gewichten der beiderseits erhaltenen Stücke, die älter sind als die Schlacht bei Marathon, und aus dem Namen »euböisches Talent«, der für das attische Talent gebraucht wurde, geschlossen. Wenigstens diese Identität der Bezeichnung ist dahin zu beschränken, dass das »euböische Talent« zur Bezeichnung des Gewichtes gebraucht wurde, und das attische Geldtalent mit dem euböischen Gewichtstalent nur so lange identisch war, als Athen nicht die Tetradrachme von 17.464 Gramm auf 17.34 herabgesetzt hatte.

Wäre für die solonische Reduction das von Androtion angegebene Verhältniss 73:100 völlig authentisch, so hätte zwischen dem solonischen und euböischen Talent ein nicht unbedeutender Unterschied stattgefunden:

1 Talent solonisch	26 393 Gramm,
1 » euböisch	26 196 »

Die Handelsbedeutung der euböischen Städte, die seit dem Ielantischen Kriege im Sinken war und die die attischen Interessen weniger zum Anschluss als zur Rivalität auffordern musste, konnte Solon wohl nicht veranlassen, zu ihrem Münzfuss überzugehen, und er war als Handelsmann weit genug umher gekommen, um selbst aus den in Asien üblichen Geldsystemen das für Athen geeignete zu entwickeln.

Freilich, die Angabe des Androtion ist vielleicht, wie wir sahen, nur eine ungefähre und das solonische Münzsystem in der That dem damaligen euböischen Gewicht- und Münzsystem conform gewesen, — und dann lassen sich, nach Art solcher allgemeinen Argumentationen, ebenso gut Gründe dafür anführen, dass Solon, etwa damit der attische Handel um so leichter in den Plätzen, die an das euböische Geld gewöhnt waren, Eingang fände u. s. w., eben das euböische Münzsystem angenommen habe.

Wie und nach welchen Combinationen er verfuhr, darf man nicht mehr errathen wollen. Aus den Thatsachen, die uns noch vorliegen, den attischen Münzen selbst, ergeben sich Momente, die uns weiterführen.

Wir fanden für zwei Perioden der attischen Münzen — abgesehen von der solonischen, aus der wir nicht sicher sind attische Münzen zu haben — zwei Normalgewichte für die attische Tetradrachme:

das ältere 17.464 Gramm.

das jüngere 17.34 »

Wir sahen, die Tetradrachmen der älteren Periode, die uns erhalten sind, bleiben, bis auf eine zu schwere, unter dem normalen Gewicht; sie sinken zum Theil bis auf 17.08, ja bis auf 16.52 Gramm hinab. Es wird wohl nicht daraus zu folgern sein, »dass man schon in der ersten Periode häufig unter dem Normalgewicht münzte«: und noch weniger ist jenes doppelte Normalgewicht damit erklärt. d. h. in seiner Bedeutung nachgewiesen.

Man bedang sich in Athen in Geschäften wohl Zahlungen in »vollwerthigem Metall« ἀργύριον δόκιμον Demosth. XXXV. 24. Wenn die Athener sich ihrer »schönen, richtig gewertheten« Drachmen rühmen durften, so mussten sie, wenn auch ihr Silber in der Circulation sich abnutzte, doch sicher sein, dass es richtig ausgeprägt worden war; unmöglich konnte das, was man heut die Toleranz nennt, bis auf 5 Procent zu wenig hinabreichen, wie in jenen Beispielen die Tetradrachme von 16.52 Gramm geben würde. Die Münzer mussten jeden Schröttling wiegen und wenn er, zu leicht oder zu schwer, die erlaubte Fehlergrenze überschritt, ihn ausschliessen. Welche Fehlergrenze gesetzlich festgestellt war, wissen wir nicht; heut bei der allerdings hochentwickelten Technik, ist in den deutschen Münzen für Silber Abweichung bis zu 0.005 vom Schrot, bis zu 0.003 vom Korn die Toleranz.

Das Verhältniss von Schrot und Korn, von Wichte und Sichte, wie man ehemals sagte, ist natürlich für den Werth der Münze entscheidend. Nur das Korn bestimmt ihren Werth, die hinzugefügte Legirung ist so gut wie werthlos.

Giebt es die zweierlei Normalgewichte für die attischen Tetradrachmen

17.467 Gramm und 17.34 Gramm,

so ist entweder mit ihrem Gewicht auch ihr Werth ein anderer geworden, oder man hat ihren Werth festgehalten und nur die Legirung geändert, oder beides ist verändert worden.

Wenn aus der Zeit um 350 ein Zeugniss vorliegt, dass für attisches Silber ausser Landes Aufgeld gezahlt wird, so ist wohl sicher, dass

damals ihr Silbergeld noch nicht im Werth gemindert, dass der Feingehalt fixirt war; sagen wir beispielsweise: für die Tetradrachme auf 17.20 Gramm,

so hatte	die von 17.464	0.26 Gramm Kupfer,
	" " 17.34	0.14 " "

in jener war 0.985, in dieser 0.991 Feingehalt.

Dass das minder schwere Drachmengeld das spätere war, ist ausser Zweifel. Wie kam man zu dieser Veränderung? und in welcher der drei möglichen Arten, die angeführt sind, veränderte man?

Als man in Athen in der Form, die allein sicher attisch ist, zu prägen begann, war die Technik des Prägens über das Stadium hinaus, wo sie möglichst reines Silber nahm, das um so leichter zu prägen ist, je weniger Legirung es hat.

Mehrfach ist in neuerer Zeit attisches Silbergeld chemisch untersucht worden, am meisten solches der »zweiten Classe«, also der späten Zeit, etwa seit 250 v. Chr. Die Aufzählung dieser Analysen wird der zweite Anhang geben; hier nur das für die nächste Frage Maassgebende.

Unter drei analysirten Stücken, die sicher der Zeit der ersten Classe angehören, hatte das eine an Silber 0.986,
 ein zweites und drittes 0.983,
 ein viertes 0.9644,

und in diesem fand sich daneben Gold 0.000173. In den Tetradrachmen der Classe II ist, wie es scheint, durchgehend Gold, BEULÉ schmolz 87 solche Tetradrachmen zusammen, und diese Masse gab Gold 0.002 bei 0.966 Silber. Er analysirte sieben Tetradrachmen derselben späteren Art und jede von ihnen hatte Gold 0.0016, während das Silber in ihnen von 0.924 bis 0.978 wechselte. Eine von HUSSEY analysirte Drachme jüngster Prägung hatte Silber 0.9161, Gold 0.0026.

HULTSCH, der diese Dinge mit Sorgfalt und voller Sachkenntniss erörtert hat, ist der Ansicht (S. 172), dass das Vorhandensein des Goldes in diesen Münzen nur zufällig sei: »denn die Alten wussten nichts von dem Vorhandensein des Goldes in Silber«. Ist dem wirklich so, dann hat er es mit Recht als »ein merkwürdiges Spiel des Zufalls« bezeichnet, »dass die zwei Tausendtheile Gold gerade den Ausfall decken, den der Werth der Münze durch die 32 Tausendtheile werthloser Legirung erleidet«.¹ Wenn aber, wie die Ägypter in ihrem

¹ HULTSCH verfährt nicht ganz correct, wenn er in diesen Münzen nach 250 v. Chr. das Gold noch zu dem 15½fachen Werth des Silbers rechnet, den es vielleicht in der Zeit der Perserkriege hatte.

Nilwasser, die Lydier in ihrem Flusssand die minimalen Stückchen Gold erkannten. so die Athener in ihrem laurischen und maroneischen Bleiglanz, vielleicht in gewissen Lagen desselben, gelegentlich ein Blättchen Gold fanden, so werden sie darin ein Mittel erkannt haben. ihr Silber stärker zu legiren, ohne den Feingehalt der Münze zu beeinträchtigen.

Dass Alexander der Grosse den attischen Münzfuss angenommen habe, schliesst man aus dem Gewicht seiner Münzen. Wir haben kein ausdrückliches Zeugniß über das Normalgewicht seiner Tetradrachmen; wenn die uns erhaltenen bis 17.27 und 17.29 Gramm wiegen,¹ so darf man vermuthen, dass das attische seiner Zeit, dem er sich anschloss, bereits auf 17.34 herabgesetzt war.

Nach der Analyse HUSSEY's (S. 71) hatte eine Tetradrachme Alexanders

Silber 0.96718,

Gold 0.00364.

Wenn damals das Gold den zehnfachen Werth des Silbers hatte, so ersetzten die drei Tausendtheile Gold reichlich die fehlenden drei Hunderttheile Silber.

Von den oben angeführten attischen Münzen der Classe I ist die von 0.983, wie die Analyse ergab, ohne Gold, die von 0.986 bei noch schwächerer Legirung ohne Zweifel ebenso.

Es mag zur weiteren Orientirung noch angeführt werden, was sich aus HUSSEY's Analysen von Münzen anderer hellenischer Staaten ergeben hat. Die älteren Stücke von Aigina hatten

	0.9687 Silber,
	0.0313 Kupfer,
die »alten« von Argos	0.9666 Silber,
	0.0334 Kupfer,
die späten von Argos	0.9574 Silber,
	0.0026 Gold,
	0.0400 Kupfer,
die korinthischen schon in der »mittleren« Zeit	0.9593 Silber,
	0.00104 Gold,
	0.0395 Kupfer.

Wie dankenswerth diese Analysen auch sind, sie reichen doch nicht so weit, dass man sich nicht noch nach anderen Methoden umsehen sollte, die Münzen nach ihrem Gehalt zu fragen ohne sie zerstören zu müssen. Durch das specifische Gewicht schien es mir

¹ HULTSCH S. 181 führt nach HUSSEY eine Tetradrachme Alexanders von 17.92 Gramm (genauer 17.87 Gramm) und nach MIONNET zwei andere von 17.71 Gramm an. Die bei Weitem meisten, die gewogen sind, gehen nicht über 17.29 hinaus; häufiger sind die Drachmen schwerer als 4.36 Gramm.

möglich ein weiteres Element für die gesuchte Antwort zu gewinnen. Hr. HOFFMANN hatte die grosse Güte einige solche Wägungen zu veranstalten.

Ich wählte zu diesem Zwecke drei Stücke aus der kleinen Münzsammlung des Dr. H. DROYSEN. Zunächst eine schön erhaltene attische Tetradrachme aus der Zeit des »strengen« Styls, dem »vollkommenen« näher stehend als dem »alterthümlichen«;

sie wiegt noch	17.1740	Gramm
ihr specifisches Gewicht ist...	10.534	»
sie enthält demnach Silber	0.98 also	16.888
Kupfer	0.02	»
		0.286

Sodann zur Vergleichung eine syrakusische Tetradrachme (Zwanzig-Litrenstück) von ganz guter Erhaltung, dem Typus nach in der Mitte stehend zwischen den zwei Stücken bei HEAD S. 7 und tab. 1 No. 3 und 4, also der Zeit Gelons und Hierons angehörend;

sie wiegt noch	16.7493	Gramm
ihr specifisches Gewicht ist.....	10.469	»
sie enthält Silber	0.939 also	15.896
Kupfer.....	0.061	»
		0.853

Von einer dritten, einer Tetradrachme Alexanders, wird in Anhang 2 zu sprechen sein.

Dass in der specifisch gewogenen attischen Tetradrachme kein Gold ist, ergibt sich aus der schwachen Legirung, in der sie mit den beiden von HUSSEY analysirten goldlosen gleich ist. Und man wird demnach vermuthen dürfen, dass in Athen, wenigstens bis in die Zeit des »strengen« Styls hinein, noch nicht Gold in die Mischung gethan wurde. Wenigstens normalmässig noch nicht; mit jener Drachme »von rohestem und frühestem Styl«, in der HUSSEY 0.9644 Silber und 0.000173 Gold (16 Grains auf das Troypfund) fand, muss es eine besondere Bewandtniss haben, da das wenige Gold,¹ selbst wenn zur Zeit dieser Prägung Gold zu Silber wie 1 : 15 $\frac{1}{2}$ stand, nur eine geringe Wertherhöhung gab, die von 0.9644 auf 0.9670; das Talent dieser Drachme würde enthalten haben

¹ Als man 1840 auf der Berliner Münze 1 Million Thaler in $\frac{1}{6}$ Stücken einschmolz, fand sich durch eine zufällige Entdeckung, dass in der Masse von fast genau 65 000 Pfund (129 786 Gramm) in dem Kupfer, womit die Stücke versetzt waren (52.08 Silber gegen 47.92 Kupfer). Gold enthalten war in einem zwar sehr geringen und deshalb früher nicht bemerkten Antheil. (HOFFMANN, Kleine Schriften S. 565). Diese Angaben nach dem Gewicht, auf die im Text angewandte Berechnung reducirt, war in dieser Masse

Silber.....	0.51476
Kupfer ...	0.48476
Gold	0.00048.

Silber . . . 25 263.6581 Gramm

Kupfer . . . 927.7563 »

Gold . . . 4.2256 »

der Feingehalt desselben wäre gewesen 25328.655 Gramm, d. h. um 432 Gramm zu gering.¹

Wenn HEAD die syrakusischen Tetradrachmen bis in die Zeit des Agathokles hinab auf normal

17.49 Gramm

ansetzt, so würden 1500 solcher Stücke, nach attischer Art ein Talent, gewogen haben

26 235 Gramm,

also um 39 Gramm mehr als das Talent attischer Tetradrachmen nach der Formel 100 : 138. Ich weiss nicht, ob HEAD diese Normale 17.49 Gramm nur aus dem Gewicht der erhaltenen Münzen combinirt hat. Hätten die Syrakuser ihr Litrensystem auf diese Norm geregelt, so würden sie den Werth des Silbers gegen Kupfer auf 1 : 249.0074 gerechnet haben, nicht auf das einfache und übersichtliche 1 : 250.

Nach dem gefundenen specifischen Gewicht würden diese 1500 syrakusische Tetradrachmen enthalten

Silber . . . 24 598.044 Gramm

Kupfer . . . 1 597.956 »

die vollwichtige syrakusische Tetradrachme also

Silber . . . 16.3980 Gramm

Kupfer . . . 1.0653 »

Ziffern, die den normalen in Athen so nahe kommen (17.4633 gegen attisch 17.464), wie man bei Berechnung aus dem specifischen Gewicht nur irgend erwarten darf.

Wir fanden das Talent der älteren attischen Tetradrachme von 17.464 Gran. 26 196 Gramm, die Analyse ergab in HUSSEY's Drachme ohne Gold

Silber . . . 0.983 »

Kupfer . . . 0.017 »

also in dem Talent Silber 25 750.668 »

Kupfer . . . 445.332 »

¹ Da es müssig sein würde, die Frage der Echtheit über diese nicht mehr vorhandene Münze aufzuwerfen, so bleibt nur die Alternative, dass entweder ohne Absicht, nur zufällig Gold in dieser Münze war, oder dass man zur Zeit ihrer Prägung auf niedrigerem Fuss prägte. Solche Herabsetzung des Münzfusses ist darum wahrscheinlicher, weil, wenn das Gold in der Münze war, ohne dass man es gewollt hatte, die Herabsetzung nur um so grösser gewesen sein würde. Noch bliebe denkbar, dass man mit dem Zusatz Gold den Werth der Münze auf die damals normale Höhe von 0.983 also die Tetradrachme auf die Höhe von 17.173 fein habe bringen wollen; in diesem Falle müsste das Gold damals — etwa in der Zeit vom Sturz der Peisistratiden bis zum Fall von Milet — mehr als 30fache des Silbers gegolten haben, woran nicht zu denken ist.

So schwach legirtes Silber musste sich in der Circulation stark abnutzen. Dass man von 0.986 auf 0.983 herabgegangen war, um die Legirung auf 0.017 zu erhöhen, konnte noch nicht viel wirken; und doch durfte man nicht den Feingehalt noch mehr schädigen, um die Legirung zu verstärken. Es kam darauf an, den gleichen Feingehalt und eine stärkere Legirung zu combiniren. Es ist gleichgültig, ob die Athener, so wie früher angedeutet worden ist, oder auf einem anderen Wege dazu gekommen sind, für diesen Zweck ein wenig Gold in die Mischung zu thun. Geschah das in einer Zeit, wo Gold gegen Silber wie 1 : 11 1/2 stand, so mischten sie

	Silber	0.961 Gramm,
	Gold	0.002 "
	Kupfer	0.037 "
ihr Talent von 26196 Gramm hatte dann	Silber	25174.156 "
	Gold	51.392 "
	Kupfer	969.252 "
und die Tetradrachme von 17.464 Gramm:	Silber	16.7828 Gramm,
	Gold	0.0349 "
	Kupfer	0.6461 "

Wenn das aus den attischen Bergwerken gelieferte oder gekaufte Silbererz einmal kein Gold enthielt, so warf man in die für 1500 Tetradrachmen bestimmte Schmelzung 6 Stateren oder Dareiken, um die vollwerthige Mischung herzustellen.

Unter den wenigen bisher untersuchten Stücken der Classe I giebt es kein Beispiel dieses Übergangs.

Vielleicht verband man mit dieser Veränderung gleich eine zweite. Es konnte in der Zeit, wo 7000 Talente geprägtes Silber auf der Burg lagen, gelegentlich ein kluger Trapezit oder Metalleut ausgerechnet haben, wie viel in dieser Geldmasse Kupfer enthalten sei und in der Legirung werthlos da liege, ohne Zinsen zu tragen; er hätte auf 180000 Kilo Silber etwa 3000 Kilo Kupfer gefunden.¹ Ersetzte man jetzt in der Mischung 0.0023 Silber mit Gold, so dass man fortan statt der früheren 0.017 Legirung jetzt 0.037 hätte nehmen können, so mochte es mehr als genug erscheinen, wenn man sich auf 0.030 beschränkte; man hatte immer noch eine Legirung, die fast doppelt so stark war als die bisherige. Dann war fortan in dem Talent

¹ Wir kennen den damaligen Preis des Kupfers in Athen nicht. In Syrakus wurde bei der Reduction vor der Zeit Dionys' I. 2 Drachmen = 1090 Gramm Kupfer gerechnet. Nach diesem Preise berechnet enthielten die 7000 Talente mit reichlich 3000 Kilo Kupfer ein todes Capital, das nach attischem Zins jährlich über 7 Minen hätte bringen können.

	Silber	25 174.356 Gramm.
	Gold	52.392 "
	Kupfer	783.352 "
		<hr/> 26 010 Gramm.
und in der Tetradrachme	Silber	16.7828 Gramm.
	Gold	0.0353 "
	Kupfer	0.5223 "
		<hr/> 17.3404 Gramm.

d. h. man hatte an die Stelle des alten Normalgewichts nach dem Verhältniss von 100:138 ein neues nach dem Verhältniss von 100:138⁸/₉ gesetzt.

Zum Schluss mögen noch zwei Bemerkungen gestattet sein.

Der oben gebrauchte Ausdruck, dass Syrakus den attischen Münzfuss angenommen habe, ist nicht in dem ganzen Umfang, in dem man jetzt diesen Ausdruck verstehen würde, richtig. Syrakus nahm wohl das attische Münzgewicht an, das Zwanziglitrenstück war der alten attischen Tetradrachme fast völlig gleich an Gewicht, nur um 0.03 Gramm schwerer; aber wenn es, wie in der specifischen Wägung sich ergab, 0.74 Gramm Silber weniger enthielt, so liess sich der Athener in Syrakus für seine Tetradrachme ein Zwanziglitrenstück und noch einen Dodrans (³/₄ Litren) obenein zahlen; und in Athen erhielt der Sikeliot für seine Tetradrachme nur 23 Obolen statt 24; das attische Talent war um 256 Drachmen besser als 1500 syrakusische Tetradrachmen, denen es dem Gewicht nach um 8 Drachmen nachstand.

Nach der Autonomie der hellenischen Staaten ist die Gleichheit ihres Münzfusses bei Weitem noch nicht ein Zeugniß für die Gleichwerthigkeit ihrer Münzen, falls nicht einzelne durch Münzverträge sich gegenseitig verpflichtet hatten, von dem gleichen Gewicht Feingold oder Feinsilber die gleiche Stückzahl gleicher Nominale auszubringen.¹ Welcher Wirrwarr in dem Geldverkehr, wie tagtägliche Gelegenheit zu Agiotage und Übervortheilung davon die Folge sein musste, sieht man aus den analogen Zuständen in deutschen Landen um die Zeit, als von Reichswegen der Guldenfuss eingerichtet wurde, der wenigstens die Goldprägung einheitlich normiren sollte, während von der Silber-

¹ Das Fragment des Münzvertrages zwischen Mytilene und Phokaia (NEWTON Transac. of the Roy. Soc. II. Ser. XVIII. S. 543). in dem die beiden Städte übereinkommen, Jahr um Jahr wechselnd die ihnen gemeinsamen Goldmünzen zu prägen, lässt durch ein von beiden bestelltes Gericht den mit der Prägung beauftragten Beamten dechargiren, und wenn er das Gold zu leicht ausgebracht (τὸ χρυσίον περὶ ὑδαρτέτερον εἶλωv) ihn mit dem Tode bestrafen. Es muss also von beiden Staaten nicht bloss ein Normalgewicht angenommen, sondern zugleich die Toleranz im Feingehalt bestimmt worden sein, innerhalb deren das Gold noch nicht für ὑδαρτέτερον galt.

prägung in dem Reichstagsschluss gesagt wurde, »dass sie nach des Landes Gelegenheit von mancherlei Sachen wegen nit auf Ein Korn zu bringen sei . . . «¹

Sodann ein Zweites. Wenn die Römer in dem Friedensvertrage bei Polyb. XXII. 26 dem König Antiochus III. auferlegten, 12 000 Talente ἀργυρίου Ἀττικοῦ ἀρίστου zu zahlen, so meinten sie nicht bloss $12\,000 \times 1500$ Tetradrachmen attisches Geld; denn sie bestimmten das Gewicht des Talent, dass es nicht weniger als 80 Pfund römisch, d. h. 26 196 Gramm wiegen sollte; sondern sie forderten attisches Silber vom besten Korn. Und in gleicher Weise ist es zu verstehen, wenn die Römer in dem Frieden mit den Aitolern eine Zahlung ansetzen: ἀργυρίου μὴ χειρόνος Ἀττικοῦ, also von dem Feingehalt des attischen παραχρῆμα μὲν τάλαντα Εὐβοικὰ διακόσια u. s. w. also 2000 Talente Gewicht.

Wann in Athen die Gewichtsminderung der Tetradrachmen von 17.464 auf 17.34 eingeführt worden ist, wird nicht überliefert. Aus dem Verhältniss von Schrot und Korn des Silbergeldes der perikleischen, der demosthenischen Zeit wird es sich nach der dargelegten Hypothese vielleicht ergeben; sie selbst wird lehren, ob die Zeiten so zu unterscheiden sind oder nicht.

In der Rechnung hat diese Hypothese nichts Bedenkliches. Freilich traut sie den Athenern ein Maass metallurgischer Kenntniss und technischer Präcision zu, für die wir wenigstens literarische Zeugnisse nicht haben. Aber oft genug sind wir bei historischen Forschungen in der Lage, mehr als die sogenannten Quellen uns bieten, aus den Überresten entnehmen zu können, wenn wir sie zum Sprechen zu bringen vermögen. Ob die dargelegte Hypothese Evidenz genug hat, dass das, was sie voraussetzt, als erwiesen gelten kann, mögen die Technologen entscheiden.

¹ Reichsabschied von 1495. Musterhaft ist ein Theil dieser deutschen Münzverhältnisse erörtert von PÜCKERT, das Münzwesen Sachsens 1518—1545. Erste Abtheilung 1862.

Anhang 1.

Die Abnutzung des attischen Silbergeldes.

Die Abnutzung der Gold- und Silbermünzen im Verkehr hat man neuester Zeit mehrfach untersucht. Die Münzen, welche man dabei in Betracht gezogen hat, sind alle stärker legirt, als es die attischen waren, und von den, ich glaube einzigen modernen Geldstücken, die noch feiner als sie ausgebracht worden sind, den sogenannten hannövrishen Cassengulden mit nur 0.007 Legirung, die wenig in Umlauf gekommen sind, scheint eine Angabe ihrer Abnutzung nicht veröffentlicht worden zu sein.

Nach KARMARSCH, Beiträge zur Technik des Münzwesens, 1856, verliert das französische Silbergeld von 0.900 Feingehalt jährlich durchschnittlich

Fünffrancstück 0.0052

Zweifrancstück 0.0165

Einfrancstück 0.0279

das englische Silbergeld von 0.925 Feingehalt

halbe Krone 0.0174

Schilling 0.0403

Sixpence 0.0628

die kleineren Nominale verlieren so viel mehr wegen ihrer stärkeren Circulation. Die preussischen Thaler verlieren nach KARMARSCH jährlich $\frac{1}{24}$ auf Tausend ($\frac{1}{3333}$), nach M. W. MILLER $\frac{1}{27}$ ($\frac{1}{3704}$).

Andere Angaben über diese Frage, die mein College Hr. SCHMOLLER die Güte gehabt hat mir zusammenstellen zu lassen, ergaben nicht immer dieselben, aber doch ähnliche Resultate. Sie, wie die Berechnungen von KARMARSCH, beziehen sich fast durchgehend auf solche Münzstücke, die nur eine kurze Umlaufzeit gehabt haben, da neuerer Zeit die über ein gewisses Maass abgenutzten Exemplare eingezogen und eingeschmolzen werden.

Ein Beispiel längerer Umlaufzeit bot mir ein preussischer Thaler von 1750, der nach dem damals eingeführten GRAUMANN'schen System in dem Gewicht von 22.2719 Gramm mit 16.7039 Gramm Feingehalt ausgebracht war; er ist über 100 Jahre in Umlauf gewesen und wiegt jetzt noch 22.198 Gramm. Durch die so viel stärkere Legirung war er so viel besser geschützt als der Thaler von 1857 mit 0.900 Gramm Feingehalt.

Nur zur Veranschaulichung giebt die folgende Tabelle die Scala der Abnutzung einer attischen Tetradrachme von 17.464 Gramm unter der Annahme, dass sie in Procenten ihres ursprünglich vollen Gewichts

wie die preussischen Thaler von 1857 durchschnittlich 0.0242 Gramm im Jahre verloren hat.

Sie verlor von 17.464 Gramm jährlich 0.0042263 Gramm,			
sie hat also	verloren	und wiegt noch	
nach 5 Jahren	0.0211315 Gramm	17.4428685 Gramm	
» 10 »	0.042263	» 17.421737	»
» 20 »	0.084526	» 17.379474	»
» 30 »	0.126798	» 17.337211	»
» 40 »	0.169052	» 17.294948	»
» 50 »	0.211315	» 17.252685	»
» 60 »	0.253578	» 17.210422	»
» 70 »	0.295841	» 17.168159	»
» 80 »	0.338104	» 17.125896	»
» 90 »	0.380367	» 17.083633	»
» 100 »	0.42263	» 17.04137	»
» 150 »	0.63394	» 16.83186	»
» 200 »	0.84526	» 16.61874	»

u. s. w.

Darf man bei Erörterung des Münzfusses und des Werthes antiker Münzen diesen Gesichtspunkt ihrer Abnutzung durch die Circulation in Anschlag bringen, wie mir nothwendig scheint, so ergiebt sich, in wie weit für beide Fragen das blosse Bruttogewicht der erhaltenen Stücke maassgebend sein kann.

Anhang 2.

Die Legirung als Criterium.

Aus den 14 Analysen attischer Drachmenstücke und dem specifischen Gewicht einer nicht analysirten scheinen sich noch weitere beachtenswerthe Momente zu ergeben.

Mein College, Hr. Dr. LEHMANN-FILHÉS, hat die Güte gehabt, die in der specifischen Wägung einer attischen, einer syrakusischen und einer Alexander - Tetradrachme gefundenen Ergebnisse weiter zu berechnen und mir die Formeln zu entwickeln, aus denen auch für die analysirten Stücke die Fragen, auf die es in der folgenden Zusammenstellung ankommt, sich beantworten lassen.

Er fand, indem er das in der Wägung der attischen Tetradrachme (No. 3) gefundene specifische Gewicht 10.534 und das daraus abgeleitete Verhältniss Silber 0.98, Kupfer 0.02, ein Paar Stellen weiter rechnete, das Verhältniss der beiden Metalle an ihr

Silber 0.9834,

Kupfer 0.0166,

und demgemäss in dieser Münze enthalten

Silber 16.888 Gramm,

Kupfer 0.286 „ .

Diese alte Tetradrachme, die nach dem Normalgewicht der älteren Zeit 17.464 Gramm gehabt haben wird, wiegt zur Zeit nur noch 17.1740 Gramm; ihr Feingehalt ist in demselben Verhältniss gemindert.

In der folgenden Tabelle sind die bisher analysirten oder specifisch gewogenen attischen Silbermünzen nach Classe I und Classe II zusammengestellt, zwischen beiden diejenigen analysirten Münzen, deren Beschreibung nicht ausreicht zu entscheiden, welcher von beiden Classen sie angehören.¹ Jede dieser analysirten Tetradrachme ist in dem Zustand der Abnutzung, in dem sie 17.1740 Gramm wog, in Rechnung gesetzt.

¹ Die einzelnen Geldstücke sind mit a. oder sp. bezeichnet, je nachdem sie analysirt oder specifisch gewogen sind, sowie mit den Anfangsbuchstaben der Namen BEULÉ, HUSSEY, RAUCH, DROYSSEN, J. BARTHELÉMY, um die Provenienz der Angaben zu bezeichnen.

Classe I.

	pro Mille			in Grammen			spezifisches Gewicht.
	Silber.	Kupfer.	Gold.	Silber.	Kupfer.	Gold.	
1. a. J B.	0.986	[]		16.9335	[0.2405]		10.5344
2. a. H.	0.9833	0.0166		16.8871	[0.2869]		
3. sp. D.	0.9834	0.0166		16.8889	[0.2850]		
4. a. H.	0.964409	0.035416	0.000173	16.5626	0.6080	0.0029	

Unbestimmt.

5. a. J B.	0.958	[]	?				
6. a. J B.	0.978	[]	?				
7. a. R.	0.933	[]	?				

Classe II.

	pro Mille			in Grammen			spezifisches Gewicht.
	Silber.	Kupfer.	Gold.	Silber.	Kupfer.	Gold.	
8. a. B. ¹	0.966	0.032	0.002	16.5900	0.5445	0.0343	10.431
9. a. H.	0.9190 ²	0.0784	0.0026	15.783	1.3464	0.04465	
10. a. B. ³	0.966	[]	0.0016	16.5900	0.5564	0.0275	10.512
11. a. B.	0.924	[]	0.0016	15.8686	0.2777	0.0275	10.434
12. a. B.	0.978	[]	0.0016	16.7962	0.3503	0.0275	10.535
13. a. B.	0.934	[]	0.0016	16.0407	1.1060	0.0275	10.452
14. a. B.	0.974	[]	0.0016	16.7273	0.4190	0.0275	10.527
15. a. B.	0.947	[]	0.0016	16.2637	0.8827	0.0275	10.476
16. a. B.	0.932	[]	0.0016	16.0063	1.1404	0.0275	10.448

Gold ist nach dieser Tabelle durch Analyse nachgewiesen in einem Stück der Classe I, in sämtlichen der Classe II; von den drei zwischen beiden Classen angeführten ist darüber keine Notiz gegeben.

Wir wissen nicht, wie hoch der Feingehalt der alten Tetradrachmen von 17.464 normirt war; die No. 3 würde, wenn sie noch vollwichtig wäre, 17.1633 Gramm haben, ungefähr ebensoviel No. 2, No. 1 käme auf 17.2154 Gramm. Es scheint die Norm für den Feingehalt 17.20 Gramm gewesen zu sein. Bei dem Zustand der Abnutzung, in dem die Tetradrachmen No. 1, 2 nur noch

¹ Unter dieser No. 8 ist die Durchschnittssumme von 87 Tetradrachmen der Classe II, die BEULÉ einschmolz, angegeben.

² Diese Ziffer ist nach HULTSCH S. 171 angesetzt; HUSSEY's Angaben nach Troy-pfund ergaben 0.91617.

³ Die folgenden 7 Nummern sind in der Folge angeführt, wie GROTEFEND (Chron. Ordnung 1872) deren Chronologie anders als BEULÉ geordnet hat; sicher ist auch diese keinesweges.

17.1740 Gramm wiegen. würde ihr Feingehalt sich auf 16.93 und 16.88 Gramm gemindert haben.

Wir durften vermuthen, dass man, um stärker legiren zu können, so viel Gold in die Mischung that, dass der Werth der Procente Silber, die man fortliess, damit ersetzt wurde. Der Werth des Goldes in der griechischen Welt ist in der Zeit des Perikles vielleicht das 13 fache des Silbers gewesen, früher noch höher, bis 15 und vielleicht noch ein Wenig mehr; allmählig sinkt der Cours des Goldes; der Redner Lykurg kaufte Gold zu 11.47 Silber. Seit Alexander's Eroberungen die Massen Goldes aus den Schatzhäusern des Perserreiches in den Verkehr geworfen hatten, stellte sich das Verhältniss auf 1 : 10.

Aus dem specifischen Gewicht lässt sich nicht unmittelbar entnehmen, ob in einer Silbermünze Gold ist oder nicht.

Da das Kupfer specifisch leichter ist, als die beiden Edelmetalle, so wird in dem Maasse, als der Procentsatz des Kupfers in der Mischung steigt, deren specifisches Gewicht sinken; das Gold steigert dies Gewicht nicht um so viel, dass der Verlust an dem Volumen Silber, dessen Werth es ersetzt, dadurch ausgeglichen wird, obschon das Gold im specifischen Gewicht fast doppelt so schwer ist als Silber.

Wenn es richtig ist, dass die 7 Tetradrachmen der Classe II, deren Analyse BEULÉ giebt (No. 10 bis No. 16), sämmtlich das gleiche Quantum Gold 0.0016 enthalten, so scheint das auf einer gesetzlichen Bestimmung zu beruhen, um so mehr, da der Silbergehalt in ihnen auffallend schwankt.

Wenn die eingeschmolzenen 87 Tetradrachmen BEULÉ's (No. 8) im Durchschnitt auf das Stück bei 0.966 Silber 0.002 Gold ergeben, so ersetzt dies Gold, im Werth von 1 : 10 genommen, 0.020 Silber; es hatte also der Feingehalt dieser Tetradrachmen im Durchschnitt

bei Gewicht 0.968 an Werth 0.988.

Auch von den 7 Tetradrachmen, die BEULÉ analysirte, sind No. 12, No. 14 und No. 10 noch vollwerthig, sie haben Feingehalt

	an Gewicht	an Werth
No. 12	0.9796 ¹	0.9940
No. 14	0.9756	0.9900
No. 10	0.9676	0.9820.

¹ Die beiden letzten Stellen in dieser und den folgenden Angaben beider Reihen sind nicht genau, da dem Silber, das BEULÉ auf drei Stellen angegeben hat (0.978), das mit vier Stellen angegebene Gold (0.0016) zugerechnet ist, die beiden letzten Stellen sind also in thesi zu niedrig.

Die andern vier sinken auch an Werth:

No. 15	0.9486	0.9630
No. 13	0.9356	0.9490
No. 16	0.9336	0.9484
No. 11	0.9256	0.9400,

endlich die von HUSSEY analysirte

No. 9	0.9190	0.9450.
-----------------	--------	---------

Das grosse Schwanken in den Werthen dieser Prägungen der Classe II wird sich aus den politischen Zuständen Athens in der Zeit nach dem chremonideischen Kriege erklären.

Die drei Münzen, welche in der Tabelle zwischen beiden Classen als »Unbestimmt« aufgeführt sind, gehören wahrscheinlich der Classe II an, wenn auch die Angaben über ihre Analyse nicht erwähnen, dass sich Gold in ihnen gefunden. Wären diese Münzen nicht durch die Analyse zerstört, so könnte man, scheint es, durch die specifische Wägung feststellen, ob sie Gold enthalten. Ist dem also?

Es ist früher einer Tetradrachme Alexander's erwähnt, die HUSSEY analysirt hat, er fand in ihr

Silber	0.9673
Kupfer	0.0291
Gold	0.0036.

War, wie wir annehmen dürfen, diese Münze auf den Fuss von 17.34 Gramm ausgebracht, so hatte sie

Silber	16.7747
Kupfer	0.5049
Gold	0.0624

und wenn wir sie in dem Zustande der Abnutzung, wo sie nur noch 17.1740 Gramm wog, in Rechnung setzen, so hatte sie immer noch

Silber	16.609
Kupfer	0.503
Gold	0.002.

Nach dem Verhältniss der drei Metalle hatte diese Tetradrachme, als sie noch vollwichtig war, Feingehalt an Gewicht 16.8371, an Werth 17.3987, also etwas mehr an Werth, als wenn das volle Gewicht derselben 17.34 Gramm Silber gewesen wäre.¹

Hatte das attische Silbergeld durch seinen höheren Feingehalt eine Art Herrschaft in der hellenischen Welt gewonnen, so wurde das Alexanders bei noch höherem Feingehalt in den alt- und neu-

¹ Es mag hier daran erinnert werden, dass die Legirung der älteren römischen Denare und die des Silbergeldes Alexander's fast genau dieselbe ist. Der römische Denar hat an Feingehalt 0.9707 und dem Werthe nach 1.0012, falls in der römischen Welt der Zeit das Gold gegen Silber wie 1:10 gerechnet werden darf.

hellenischen Ländern unzweifelhaft zur herrschenden Münze; und man möchte glauben, dass Alexander seine Münzordnung eben zu diesem Zweck eingeführt hat.

Bei der grossen Schwierigkeit, die Tausende von Alexander-Tetradrachmen, die sich in den heutigen Sammlungen vorfinden, zu classificiren, würde es der Mühe werth sein, die verschiedenen Classen, die L. MÜLLER aufgestellt hat, auch nach ihrem specifischen Gewicht zu untersuchen, da gewiss nicht anzunehmen ist, dass überall bei des Königs Lebzeiten unter den sehr unabhängigen Strategen und Satrapen der weiten Lande, dann bei der raschen Zerrüttung und den Theilungen des Reichs die ursprüngliche Normirung festgehalten worden ist.

Und so findet sich folgender bemerkenswerther Umstand. Die von HUSSEY analysirte Tetradrachme nach dem specifischen Gewicht der drei Metalle in ihr berechnet, ergab nach Hrn. LEHMANN-FILHÉS Berechnung specifisches Gewicht

10.528.

Die Tetradrachme Alexander's aus der oben erwähnten Privatsammlung, ein wohl erhaltenes Stück, das der Classe IV bei L. MÜLLER angehören würde, jetzt nur noch im Gewicht von 16.6114 Gramm, ergab in der specifischen Wägung, die Hr. HOFFMANN machen liess,

10.412.

Welcher Satrap oder Dynast, welche der königlichen Freistädte sie geprägt haben mag. an dem Silber oder Gold oder an beiden hatte der Münzherr in arger Weise gespart; seine Tetradrachme war in hohem Grade unterwerthig.

Die früher erwähnte syrakusische Tetradrachme derselben Privatsammlung aus der Zeit Gelons und Hierons von noch 16.7493 Gramm Gewicht ergab specifisches Gewicht

10.4699,

und daraus wurde geschlossen, dass sie enthalte

Silber 0.939

Kupfer 0.061.

Unter den von v. RAUCH analysirten Tetradrachmen fand sich auch eine syrakusische, aus welcher Zeit ist nicht angegeben, sie enthielt

Silber 0.960.

Also in Syrakus hatte man nach jener Zeit, ob unter dem Regiment Dionys' I. oder des Timoleon oder wann immer, das Silbergeld um ein Bedeutendes verbessert; von Gold ist in v. RAUCH's Analyse nichts erwähnt.

Wann Athen von seinem alten Münzfuss von 17.464 auf die Tetradrachme zu dem von 17.34 übergegangen ist, also seine Norm

von 100:138 auf die von 100:138⁸/₉ herabgesetzt hat, ist völlig dunkel. Der früher angedeutete Versuch, aus dem dem Silber beigemischten Gold das Werthverhältniss beider Metalle zu entnehmen und in dem allmählichen Sinken des Goldwerthes eine wenigstens ungefähre Bestimmung für die chronologische Folge der so qualificirten attischen Münzen zu gewinnen, müsste erst durch weitere Untersuchungen besser gestützt sein, um eine Regel daraus entwickeln zu können.

Die in der Tabelle aufgeführten Tetradrachmen der Classe I, abgesehen von der räthselhaften unter No. 4, die ein Geringes von Gold enthielt, hatten an Silber 0.986 bis 0.983 und das specifische Gewicht der von 0.9834 (No. 3) war 10.5344.

In den sämmtlichen analysirten Münzen der Classe II fand sich Gold. Wenn es richtig ist, dass die sieben Tetradrachmen dieser Classe, deren Analyse BEULÉ giebt, das gleiche Quantum Gold 0.0016 hatten, so schien uns diese sonderbare Erscheinung erklärlich, wenn man eine gesetzliche Bestimmung, die solchen Zusatz verfügt hat, voraussetzt.

Wenn die 87 Tetradrachmen, die BEULÉ zusammenschmelzen liess (No. 8), im Durchschnitt auf das einzelne Stück ergeben:

Silber 0.966

Gold 0.002,

so ersetzte dies Gold, den Werth von 1:10 angenommen, 0.020 Silber, es hatte also der Feingehalt dieser 87 Stücke durchschnittlich

bei Gewicht 0.968 den Werth von 0.988,

also sie waren durchschnittlich noch vollwerthig.

Ebenso noch vollwerthig sind die unter No. 12, No. 14 und No. 10 angeführten. No. 12 hatte an Silber nur 0.005 weniger, als die alte No. 3 von 0.983 und fügte mit 0.0016 Gold so viel Werth hinzu, dass der Feingehalt dieser Münze 0.994 Silber wird, d. h. diese Münze übertraf, dem Werthe nach, die alte von 0.983 Silber um ein merkliches; die alte Tetradrachme hatte

vollwichtig bei 17.464 Gramm Werth 17.1671,

die neue vollwichtig bei 17.34 " " 17.2359,

die alte hatte specifisches Gewicht 10.5341,

die neue 10.535.

Vielleicht suchte man so den Tetradrachmen Alexander's nachzukommen, aber man erreichte sie nicht ganz. Wie tief andere Tetradrachmen der Classe II unter diesen Werth hinabsanken, zeigt die Tabelle.

Die Münzen von Classe I und Classe II unterscheiden sich augenfällig durch ihr Gepräge. Ob in solchen der Classe I Gold enthalten

1222 Nachträgl. Mitth. aus der Sitzung d. phil.-hist. Classe v. 21. December.

ist oder nicht, kann man, wenn man sie nicht durch die Analyse zerstören will, durch das specifische Gewicht nicht unterscheiden, falls man nicht ihren normalen Werth mit in Rechnung ziehen will, der einen zweiten sicheren Punkt für die Gleichung geben könnte; nur dass er durch eine nur bona fide geltende Annahme sicher ist.

Ob sich noch eine andere Methode, als die chemische Analyse finden lasse, festzustellen, dass in Silbermünzen Gold enthalten ist, muss noch dahingestellt bleiben. Wäre es möglich, z. B. auf dem Wege der Spectralanalyse, so würde der Punkt gefunden sein, durch specifische Wägung, zunächst für die attischen Münzen der Classe I, sichere Ergebnisse zu gewinnen.

Ausgegeben am 8. Februar.

15

SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

XXVII. XXVIII.


MIT EINER TAFEL.

8. JUNI 1882.

BERLIN 1882.

VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

IN COMMISSION IN FERD. DÜMLER'S VERLAGS-BUCHHANDLUNG
HARRWITZ UND GOSSMANN.



Anzeige.

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die „Monatsberichte der Königl. Preussischen Akademie der Wissenschaften“ zu erscheinen aufgehört, und es an deren Stelle „Sitzungsberichte“ getreten, für welche unter anderen folgende Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die Redaction der „Sitzungsberichte“.)

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-Octav regelmässig Donnerstags acht Tage nach jeder Sitzung. Die sämmtlichen zu einem Kalenderjahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungsnummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physikalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über Sitzungen der philosophisch-historischen Classe ungerade Nummern.

§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Uebersicht über die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mittheilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten überwiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört, druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehörigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte bestimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder sowie alle Nichtmitglieder haben hierzu die Vermittelung eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspondirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammtakademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mitglied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses Umfangs beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtakademie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschaltenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mittheilung wird erst begonnen, wenn die Stücke der in Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaftliche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe des betreffenden Stückes anderweitig, sei es nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausföhrung deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf beim Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungsberichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publizirt werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender Paginirung versehen und mit besonderem Verkauft den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den „Wissenschaftlichen Mittheilungen“ abgedruckten Arbeit erhält gegen Entgelt fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert zu unentgeltlicher eigener Vertheilung, abzuziehen, sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden Secretar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz führt. Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Publication und den Druck der in dem gleichen Stück erscheinenden wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenschaft heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt der geschäftlichen Theile der Sitzungsberichte verantwortlich. Für alle übrigen Theile derselben sind in jeder Richtung nur die Verfasser verantwo-

VERZEICHNISS DER »WISSENSCHAFTLICHEN MITTHEILUNGEN«

zu St. XXVII und XXVIII.

	Seite
WATTENBACH: Beiträge zur Geschichte der Mark Brandenburg aus Handschriften der Königlichen Bibliothek	587
BURMEISTER: Nothropus priscus, ein bisher unbekanntes fossiles Falthier (Taf. XI)	613

ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE

aus den Jahren 1879, 1880 und 1881.

(In Commission in FERD. DÜMLER'S Verlagsbuchhandlung.)

RAMMELSBERG: Über die chemische Natur der Meteoriten. 2. Abtheilung.	M. 3.00
ROTH: Beiträge zur Petrographie der plutonischen Gesteine. 3. Abtheilung	9.00
VIRCHOW: Beiträge zur Landeskunde der Troas	10.00
SCHOTT: Kitai und Karakitai, ein Beitrag zur Geschichte Ost- und Innerasiens	1.00
KRUGER, P.: Codicis Theodosiani fragmenta Taurinensia	5.00
CURTIUS: Das archaische Bronzerelief aus Olympia	2.50
BUSCHMANN: Die Ordinal-Zahlen der mexicanischen Sprache	2.50
FEDMANN: Über die Wiener und Heidelberger Handschrift des Otfrid	3.00
SCHRADER: Zur Kritik der Inschriften Tiglath-Pileser's II., des Asarhaddon und des Asurbanipal	3.00
DELLMANN: Zur Geschichte des Axunitischen Reichs im vierten bis sechsten Jahrhundert	2.50
SACHAU, E.: Über die Lage von Tigranokerta	5.50
HAGEN: Über Veränderung der Wasserstände in den Preussischen Strömen	1.50
VALEN: Über die Anfänge der Heroiden des Ovid	1.50
WAITZ: Über eine alte Genealogie der Welfen	0.80
SCHOTT: Über ein chinesisches Mengwerk, nebst einem Anhang linguistischer Verbesserungen zu zwei Bänden der Erdkunde Ritter's	2.00
ZELLER: Über die Messung psychischer Vorgänge	0.80
VIRCHOW: Über die Weddas von Ceylon und ihre Beziehungen zu den Nachbarstämmen	8.00
BORN: Der Tempel der Athena Polias zu Pergamon	2.00

GERLAND, ERNST: Leibnizens und Huygens' Briefwechsel mit Papin, nebst der Biographie Papin's und einigen zugehörigen Briefen und Actenstücken. Auf Kosten der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften herausgegeben. Berlin 1881	M. 13.50

Zur gefälligen Beachtung.

Die Herren Empfänger der Monatsberichte werden ersucht, falls ihnen Theile des Jahrgangs 1881 nicht zugekommen sein sollten, hiervon baldigst bei der Akademie Anzeige zu machen. Eine Berücksichtigung etwaiger Reclamationen kann nur in Aussicht gestellt werden, wenn dieselben spätestens bis zum Ende des Jahres 1882 angebracht werden.



A N Z E I G E.

Vom 1. Januar d. J. gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin, statt ihrer bisherigen »Monatsberichte«, wöchentliche »Sitzungsberichte« heraus. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Auszuge auf der zweiten Seite des Umschlages der »Sitzungsberichte« abgedruckt.

Um dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Leserkreise den ihn näher angehenden Theil des Stoffes der »Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzubieten, wurde beschlossen, einen Auszug aus diesen Berichten unter dem Titel:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN

AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN

herauszugeben. Diese Sonderausgabe wird sämtliche Arbeiten aus dem Gebiet der reinen Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und beobachtenden Naturwissenschaften in vollständigem Abdruck enthalten, welche in Sitzungen der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr fremden Verfassern mitgetheilt in die »Sitzungsberichte« aufgenommen wurden. Auch demselben Gebiet angehörige geschäftliche Berichte, Preis-Aufgaben und -Ertheilungen, Adressen, Reden und dergl. mehr, finden darin Platz. Die »Mittheilungen« erhalten besondere Paginirung, doch steht auf jeder Seite eingeklammert die entsprechende Seitenzahl der »Sitzungsberichte«, und bei dem Titel jeder Mittheilung die römische Ordnungszahl des Stückes (St.) der Berichte, dem sie entlehnt ist.

Die »Mittheilungen« erscheinen vom 1. Januar d. J. ab bis auf Weiteres in Monatsheften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Stück wird in der Regel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Personen, Gesellschaften und Instituten, welche bisher die »Monatsberichte« empfangen, steht frei, statt der vollständigen »Sitzungsberichte« fortan nur die »Mathematischen und naturwissenschaftlichen Mittheilungen aus den Sitzungsberichten« sich zuschicken zu lassen, und sie werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat so bald wie möglich Nachricht zu geben. Wegen des buchhändlerischen Bezuges der »Mittheilungen« siehe unten.

In Commission bei FERD. DÜMLER'S Verlagsbuchhandlung (HARRWITZ & GOSEMANN) in Berlin erscheinen:

SITZUNGSBERICHTE

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 12 M.

Diese an Stelle der bisherigen »Monatsberichte« der Akademie getretenen »Sitzungsberichte« erscheinen in Zwischenräumen von acht Tagen, und enthalten sämtliche zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen und wissenschaftlichen Mittheilungen, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.

Getrennt von denselben erscheinen ausserdem, ebenda in Commission:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN

AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER


KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 8 M.

Dieselben erscheinen in monatlichen Zwischenräumen und enthalten nur die geschäftlichen und die wissenschaftlichen Mittheilungen aus dem Gebiete der Mathematik wie der Naturwissenschaft im weitesten Sinne, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.

B

SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.



XXIX.

15. JUNI 1882.

BERLIN 1882.

VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

IN COMMISSION IN FERD. DÜMMLER'S VERLAGS-BUCHHANDLUNG
HARRWITZ UND GOSSMANN.

Anzeige.

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich-Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die Redaction der »Sitzungsberichte«.)

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-Octav regelmässig Donnerstags acht Tage nach jeder Sitzung. Die sämmtlichen zu einem Kalenderjahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnumsnummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physikalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über Sitzungen der philosophisch-historischen Classe ungerade Nummern.

§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Uebersicht über die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mittheilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten überwiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört, druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehörigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte bestimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder sowie alle Nichtmitglieder haben hierzu die Vermittelung eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspondirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammtakademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mitglied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtakademie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschaltenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz der Mittheilung wird erst begonnen, wenn die Stücke des Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und besonders beizugebenden Tafeln die volle erste Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaftliche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe des betreffenden Stückes anderweitig, sei es nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausfuhr deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden, wenn der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, und dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf bei Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungsberichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher Mittheilungen auch abgesondert in der Weise veröffentlicht werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender Paginirung versehen und mit besonderem Verkauf den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den »Wissenschaftlichen Mittheilungen« abgedruckten Arbeit erhält gegen Entgelt fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von noch zwei zu unentgeltlicher eigener Vertheilung, abzugeben, sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden Secretar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung führt der Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz führt. Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redaction und den Druck der in dem gleichen Stück enthaltenen wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenschaft heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt der geschäftlichen Theile der Sitzungsberichte verantwortlich. Für alle übrigen Theile derselben ist in jeder Richtung nur die Verfasser verant-

VERZEICHNISS DER »WISSENSCHAFTLICHEN MITTHEILUNGEN«

zu St. XXIX.

	Seite
TH: Zur Kenntniss der Ponza-Inseln	623
KE: Über die elektrische Neutralität des von elektrisirten Wasserflächen aufsteigenden Dampfes	635

ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE

aus den Jahren 1879, 1880 und 1881.

(In Commission in FERD. DÜMLER'S Verlagsbuchhandlung.)

WILBERG: Über die chemische Natur der Meteoriten. 2. Abtheilung	M. 3.00
RE: Beiträge zur Petrographie der plutonischen Gesteine. 3. Abtheilung	9.00
SNOW: Beiträge zur Landeskunde der Troas	10.00
OTT: Kitai und Karakitai, ein Beitrag zur Geschichte Ost- und Innerasiens	1.00
ESER, P.: Codicis Theodosiani fragmenta Taurinensia	5.00
TEUS: Das archaische Bronzerelief aus Olympia	2.50
CHMANN: Die Ordinal-Zahlen der mexicanischen Sprache	2.50
EMANN: Über die Wiener und Heidelberger Handschrift des Otfrid	3.00
BRADER: Zur Kritik der Inschriften Tiglath-Pileser's II., des Asarhaddon und des Asurbanipal	3.00
EMANN: Zur Geschichte des Axumitischen Reichs im vierten bis sechsten Jahrhundert	2.50
HAU, E.: Über die Lage von Tigranokerta	5.50
SEN: Über Veränderung der Wasserstände in den Preussischen Strömen	1.50
LEN: Über die Anfänge der Heroiden des Ovid	1.50
ITZ: Über eine alte Genealogie der Welfen	0.80
OTT: Über ein chinesisches Mengwerk, nebst einem Anhang linguistischer Verbesserungen zu zwei Bänden der Erdkunde Ritter's	2.00
KE: Über die Messung psychischer Vorgänge	0.80
SNOW: Über die Weddas von Ceylon und ihre Beziehungen zu den Nachbarstämmen	8.00
RE: Der Tempel der Athena Polias zu Pergamon	2.00

LAND, ERNST: Leibnizens und Huygens' Briefwechsel mit Papin, nebst der Biographie Papin's und einigen zugehörigen Briefen und Actenstücken. Auf Kosten der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften herausgegeben. Berlin 1881 M. 13.50

Zur gefälligen Beachtung.

Die Herren Empfänger der Monatsberichte werden ersucht, falls ihnen Theile des Jahrgangs 1881 zugekommen sein sollten, hiervon baldigst bei der Akademie Anzeige zu machen. Eine Berücksichtigung etwaiger Reclamationen kann nur in Aussicht gestellt werden, wenn dieselben spätestens bis zum des Jahres 1882 angebracht werden.

ANZEIGE.

Vom 1. Januar d. J. gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin, statt ihrer bisherigen »Monatsberichte«, wöchentliche »Sitzungsberichte« heraus. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Auszuge auf der zweiten Seite des Umschlages der »Sitzungsberichte« abgedruckt.

Um dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Leserkreise den ihm näher angehenden Theil des Stoffes der »Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzubieten, wurde beschlossen, einen Auszug aus diesen Berichten unter dem Titel:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN

herauszugeben. Diese Sonderausgabe wird sämtliche Arbeiten aus dem Gebiet der reinen Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und beobachtenden Naturwissenschaften in vollständigem Abdruck enthalten, welche in Sitzungen der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr fremden Verfassern mitgetheilt in die »Sitzungsberichte« aufgenommen wurden. Auch demselben Gebiet angehörige geschäftliche Berichte, Preis-Aufgaben und -Ertheilungen, Adressen, Reden und dergl. mehr, finden darin Platz. Die »Mittheilungen« erhalten besondere Paginirung, doch ist auf jeder Seite eingeklammert die entsprechende Seitenzahl der »Sitzungsberichte« und bei dem Titel jeder Mittheilung die römische Ordnungszahl des Stückes (St.) der Berichte, dem sie entlehnt ist.

Die »Mittheilungen« erscheinen vom 1. Januar d. J. ab bis auf Weiteres in Monatsheften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Stück wird in der Regel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Personen, Gesellschaften und Instituten, welche bisher die »Monatsberichte« empfangen, siehe frei, statt der vollständigen »Sitzungsberichte« fortan nur die »Mathematischen und naturwissenschaftlichen Mittheilungen aus den Sitzungsberichten« sich zuschicken zu lassen, und sie werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat so bald als möglich Nachricht zu geben. Wegen des buchhändlerischen Bezuges der »Mittheilungen« siehe unten.

In Commission bei FERD. DÜMLER'S Verlagsbuchhandlung (HARRWITZ & GOSSWAM) in Berlin erscheinen:

SITZUNGSBERICHTE

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN.

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 12 M.

Diese an Stelle der bisherigen »Monatsberichte« der Akademie getretenen »Sitzungsberichte« erscheinen in Zwischenräumen von acht Tagen, und enthalten sämtliche zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen und wissenschaftlichen Mittheilungen, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.

Getrennt von denselben erscheinen ausserdem, ebenda in Commission:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN


DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN.

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 8 M.

Dieselben erscheinen in monatlichen Zwischenräumen und enthalten nur die geschäftlichen und die wissenschaftlichen Mittheilungen aus dem Gebiete der Mathematik wie der Naturwissenschaft im weitesten Sinne, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.

2



SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

XXX. XXXI.

MIT EINER TAFEL.

22. JUNI 1882.

BERLIN 1882.

VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

IN COMMISSION IN FERD. DÜMLER'S VERLAGS-BUCHHANDLUNG
HARRWITZ UND GOSSMANN.

Anzeige.

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königl. Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgenden Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die Redaction der »Sitzungsberichte«.)

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-Octav regelmässig Donnerstags acht Tage nach jeder Sitzung. Die sämmtlichen zu einem Kalenderjahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungsnummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physikalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über Sitzungen der philosophisch-historischen Classe ungerade Nummern.

§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Uebersicht über die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mittheilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten überwiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört, druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehörigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte bestimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder sowie alle Nichtmitglieder haben hierzu die Vermittelung eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspondirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammtakademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mitglied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen. Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses Umfangs beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtakademie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschaltenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz der Mittheilung wird erst begonnen, wenn die Stücke des Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind, besonders beizugebenden Tafeln die volle erste Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaftliche Mittheilung darf in keinem Falle vor Ausgabe des betreffenden Stückes anderweitig, sei es nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausfüllung deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf Verlangen verschickt. Die Verfasser verbleiben auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungsberichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher Mittheilungen auch abgesondert in der Weise gedruckt werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender Paginirung versehen und mit besonderem Verkauf den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den »Wissenschaftlichen Mittheilungen« abgedruckten Arbeit erhält gegen Entgelt fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von noch zwei zu unentgeltlicher eigener Vertheilung, abzulassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden Secretar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung führt der Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz führt. Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Druckausgabe und den Druck der in dem gleichen Stück enthaltenen wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenschaft heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den geschäftlichen Theil der Sitzungsberichte verantwortlich. Für alle übrigen Theile derselben sind in jeder Richtung nur die Verfasser verant-

**VERZEICHNISS DER »WISSENSCHAFTLICHEN MITTHEILUNGEN«
zu St. XXX und XXXI.**

	Seite
KIRCHHOFF: Zur Theorie der Lichtstrahlen	641
CROW: Über den Schädel des jungen Gorilla (Taf. XII)	671
HEIMANN: Über die LUDOLPH'sche Zahl	679
ST: Die Theorie des longitudinalen Stosses cylindrischer Stäbe	683
HS: Über lineare homogene Differentialgleichungen, zwischen deren Integralen homogene Relationen höheren als ersten Grades bestehen	703

**ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE
aus den Jahren 1879, 1880 und 1881.**

(In Commission in FERD. DÜMLER's Verlagsbuchhandlung.)

HEIMANN: Über die chemische Natur der Meteoriten. 2. Abtheilung	M. 3.00
HEIMANN: Beiträge zur Petrographie der plutonischen Gesteine. 3. Abtheilung	" 9.00
CROW: Beiträge zur Landeskunde der Troas	" 10.00
ST: Kitai und Karakitai, ein Beitrag zur Geschichte Ost- und Innerasiens	" 1.00
ST: P.: Codicis Theodosiani fragmenta Taurinensia	" 5.00
ST: Das archaische Bronzerelief aus Olympia	" 2.50
HEIMANN: Die Ordinal-Zahlen der mexicanischen Sprache	" 2.50
HEIMANN: Über die Wiener und Heidelberger Handschrift des Orfrid	" 3.00
ST: Zur Kritik der Inschriften Tiglath-Pileser's II., des Asarhaddon und des Asurbanipal	" 3.00
HEIMANN: Zur Geschichte des Axumitischen Reichs im vierten bis sechsten Jahrhundert	" 2.50
ST: E.: Über die Lage von Tigranokerta	" 5.50
ST: Über Veränderung der Wasserstände in den Preussischen Strömen	" 1.50
ST: Über die Anfänge der Heroiden des Ovid	" 1.50
ST: Über eine alte Genealogie der Welfen	" 0.80
ST: Über ein chinesisches Mengwerk, nebst einem Anhang linguistischer Verbesserungen zu zwei Bänden der Erdkunde Ritter's	" 2.00
ST: Über die Messung psychischer Vorgänge	" 0.80
CROW: Über die Weddas von Ceylon und ihre Beziehungen zu den Nachbarstämmen	" 8.00
ST: Der Tempel der Athena Polias zu Pergamon	" 2.00
BLAND, ERNST: Leibnizens und Huygens' Briefwechsel mit Papin, nebst der Biographie Papin's und einigen zugehörigen Briefen und Actenstücken. Auf Kosten der Königlich Preussischen Akademie der Wissen- schaften herausgegeben. Berlin 1881 M. 13.50	

Zur gefälligen Beachtung.

*Die Herren Empfänger der Monatsberichte werden ersucht, falls ihnen Theile des Jahrgangs 1881
zugekommen sein sollten, hiervon baldigst bei der Akademie Anzeige zu machen. Eine Berücksich-
tigung etwaiger Reclamationen kann nur in Aussicht gestellt werden, wenn dieselben spätestens bis zum
des Jahres 1882 angebracht werden.*

ANZEIGE.

Vom 1. Januar d. J. gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaft Berlin, statt ihrer bisherigen »Monatsberichte«, wöchentliche »Sitzungsberichte«. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Auszuge auf der zweiten Seite Umschlages der »Sitzungsberichte« abgedruckt.

Um dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Leserkreise den ihm näher gehenden Theil des Stoffes der »Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzubieten, wurde beschlossen, einen Auszug aus diesen Berichten unter dem Titel:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNG

AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN

herauszugeben. Diese Sonderausgabe wird sämtliche Arbeiten aus dem Gebiete der reinen Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und beobachtenden Naturwissenschaften in vollständigem Abdruck enthalten, welche in Sitzungsberichten der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr fremden Verfassern mitgetheilt und in den »Sitzungsberichten« aufgenommen wurden. Auch demselben Gebiete angehörige geschäftliche Berichte, Preis-Aufgaben und -Ertheilungen, Adressen, Reden und dergl. finden darin Platz. Die »Mittheilungen« erhalten besondere Paginirung, doch ist auf jeder Seite eingeklammert die entsprechende Seitenzahl der »Sitzungsberichte« und bei dem Titel jeder Mittheilung die römische Ordnungszahl des Stückes (Seite) der »Sitzungsberichte«, dem sie entlehnt ist.

Die »Mittheilungen« erscheinen vom 1. Januar d. J. ab bis auf Weiteres in Monatsheften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Stück wird in der Regel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Personengesellschaften und Instituten, welche bisher die »Monatsberichte« empfangen, steht frei, statt der vollständigen »Sitzungsberichte« fortan nur die »Mathematischen und naturwissenschaftlichen Mittheilungen aus den Sitzungsberichten« sich zuschicken zu lassen, und sie werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat so bald als möglich Nachricht zu geben. Wegen des buchhändlerischen Bezuges der »Mittheilungen« siehe unten.

In Commission bei FERD. DÜMLER'S Verlagsbuchhandlung (HARRWITZ & GOSSE) in Berlin erscheinen:

SITZUNGSBERICHTE

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 12 M.

Diese an Stelle der bisherigen »Monatsberichte« der Akademie getretenen »Sitzungsberichte« erscheinen in Zwischenräumen von acht Tagen, und enthalten sämtliche zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen und wissenschaftlichen Mittheilungen, welche in den Sitzungsberichten der Akademie gemacht wurden.

Getrennt von denselben erscheinen ausserdem, ebenda in Commission:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN

AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 8 M.

Dieselben erscheinen in monatlichen Zwischenräumen und enthalten nur die geschäftlichen und die wissenschaftlichen Mittheilungen aus dem Gebiete der Mathematik wie der Naturwissenschaft im weitesten Sinne, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.

Anzeige.

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die „Monatsberichte der K Preussischen Akademie der Wissenschaften“ zu erscheinen aufgehört, und an deren Stelle „Sitzungsberichte“ getreten, für welche unter anderen Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die Redaction der „Sitzungsberichte“.)

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-Octav regelmässig Donnerstags acht Tage nach jeder Sitzung. Die sämmtlichen zu einem Kalenderjahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungsnummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physikalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über Sitzungen der philosophisch-historischen Classe ungerade Nummern.

§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Uebersicht über die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mittheilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten überwiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört, druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehörigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte bestimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder sowie alle Nichtmitglieder haben hierzu die Vermittelung eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspondirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammtakademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mitglied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtakademie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschaltenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satztheilung wird erst begonnen, wenn die Stücke Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig als besonders beizugebenden Tafeln die volle Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaftliche Mittheilung darf in keinem Falle ohne Angabe des betreffenden Stückes anderweitig, nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausdehnung deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden, wenn der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf Verlangen verschickt. Die Verfasser werden ersucht, auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungsberichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher Mittheilungen auch abgesondert in der Welt gedruckt werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender Paginirung versehen und mit besonderem Vermerk in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den „Wissenschaftlichen Mittheilungen“ abgedruckten Arbeit erhält unentgeltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von noch zu bestimmender unentgeltlicher eigener Vertheilung, abzugeben, sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden Secretar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung redigirt der Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz führt. Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Drucklegung und den Druck der in dem gleichen Stück enthaltenen wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenschaft heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den geschäftlichen Theil der Sitzungsberichte verantwortlich. Für alle übrigen Theile derselben ist jeder Richtung nur der Verfasser verant-

INHALTSVERZEICHNISS.

	Seite
Antrittsrede	713
ACH, Antrittsrede	717
Antrittsrede	718
Antwort auf die Antrittsrede der HHL TOBLER, WATTENBACH und DIELS	721
Antrittsrede	723
REYMOND, Antwort auf die Antrittsrede des Hrn. LANDOLT	728
der Preis. Beurtheilung der eingegangenen Bewerbungsschriften	731
" Ertheilung des Preises für 1882 an HHL NOETHER und HALPHEN	735
" Neue Preisfrage für 1884	735
der philosophisch-historischen Classe für 1885	736
der Charlotten-Stiftung für 1883.	737

ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE

aus den Jahren 1879, 1880 und 1881.

(In Commission in FERD. DÜMLER's Verlagsbuchhandlung.)

ERG: Über die chemische Natur der Meteoriten. 2. Abtheilung	M. 3.00
iträge zur Petrographie der plutonischen Gesteine. 3. Abtheilung	" 9.00
Beiträge zur Landeskunde der Troas	" 10.00
Kitai und Karakitai, ein Beitrag zur Geschichte Ost- und Innerasiens	" 1.00
P.: Codicis Theodosiani fragmenta Taurinensia	" 5.00
Das archaische Bronzerelief aus Olympia	" 2.50
n: Die Ordinal-Zahlen der mexicanischen Sprache	" 2.50
: Über die Wiener und Heidelberger Handschrift des Otfrid	" 3.00
: Zur Kritik der Inschriften Tiglath-Pileser's II., des Asarhaddon und des Asurbanipal	" 3.00
: Zur Geschichte des Axunitischen Reichs im vierten bis sechsten Jahrhundert	" 2.50
E.: Über die Lage von Tigranokerta	" 5.50
Über Veränderung der Wasserstände in den Preussischen Strömen	" 1.50
Über die Anfänge der Heroiden des Ovid	" 1.50
Über eine alte Genealogie der Welfen	" 0.80
Über ein chinesisches Mengwerk, nebst einem Anhang linguistischer Verbesserungen zu ei Bänden der Erdkunde Ritter's	" 2.00
Über die Messung psychischer Vorgänge	" 0.80
Über die Weddas von Ceylon und ihre Beziehungen zu den Nachbarstämmen	" 8.00
r Tempel der Athena Polias zu Pergamon	" 2.00

ERNST: Leibnizens und Huygens' Briefwechsel mit Papin, nebst der Biographie Papin's und einigen
gehörigen Briefen und Actenstücken. Auf Kosten der Königlich Preussischen Akademie der Wissen-
schaften herausgegeben. Berlin 1881 M. 13.50

Zur gefälligen Beachtung.

*Herren Empfänger der Monatsberichte werden ersucht, falls ihnen Theile des Jahrgangs 1881
kommen sein sollten, hiervon baldigst bei der Akademie Anzeige zu machen. Eine Berücksich-
tigung Reclamationen kann nur in Aussicht gestellt werden, wenn dieselben spätestens bis zum
Jahres 1882 angebracht werden.*



ANZEIGE.

Vom 1. Januar d. J. gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin, statt ihrer bisherigen »Monatsberichte«, wöchentliche »Sitzungsberichte«. In die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Auszuge auf der zweiten Seite des Umschlages der »Sitzungsberichte« abgedruckt.

Um dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Leserkreise den ihm näher gehenden Theil des Stoffes der »Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzustellen, wurde beschlossen, einen Auszug aus diesen Berichten unter dem Titel:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN

AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN

herauszugeben. Diese Sonderausgabe wird sämtliche Arbeiten aus dem Gebiete der reinen Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und beobachteten Naturwissenschaften in vollständigem Abdruck enthalten, welche in den Sitzungsberichten der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr fremden Verfassern mitgetheilt worden. Auch demselben Gebiete angehörige geschäftliche Berichte, Preis-Aufgaben und -Ertheilungen, Adressen, Reden und dergleichen finden darin Platz. Die »Mittheilungen« erhalten besondere Paginirung, doch ist auf jeder Seite eingeklammert die entsprechende Seitenzahl der »Sitzungsberichte« und bei dem Titel jeder Mittheilung die römische Ordnungszahl des Stückes (St.) angegeben, dem sie entlehnt ist.

Die »Mittheilungen« erscheinen vom 1. Januar d. J. ab bis auf Weiteres in Monatsheften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Heft wird in der Regel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Den Gesellschaften und Instituten, welche bisher die »Monatsberichte« empfangen, steht es frei, statt der vollständigen »Sitzungsberichte« fortan nur die »Mathematischen und naturwissenschaftlichen Mittheilungen aus den Sitzungsberichten« sich zuschicken zu lassen, und sie werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat so bald als möglich Nachricht zu geben. Wegen des buchhändlerischen Bezuges der »Mittheilungen« siehe unten.

In Commission bei FERD. DÜMLER'S Verlagsbuchhandlung (HARRWITZ & GOSWAMI) in Berlin erscheinen:

SITZUNGSBERICHTE

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 12 M.

Diese an Stelle der bisherigen »Monatsberichte« der Akademie getretenen »Sitzungsberichte« erscheinen in Zwischenräumen von acht Tagen, und enthalten sämtliche zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen und wissenschaftlichen Mittheilungen, welche in den Sitzungsberichten der Akademie gemacht wurden.

Getrennt von denselben erscheinen ausserdem, ebenda in Commission:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN

AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 8 M.

Dieselben erscheinen in monatlichen Zwischenräumen und enthalten nur die geschäftlichen und die wissenschaftlichen Mittheilungen aus dem Gebiete der Mathematik wie der Naturwissenschaft im weitesten Sinne, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.

Anzeige.

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die Redaction der »Sitzungsberichte«.)

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-Octav regelmässig Donnerstags acht Tage nach jeder Sitzung. Die sämtlichen zu einem Kalenderjahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungsnummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physikalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über Sitzungen der philosophisch-historischen Classe ungerade Nummern.

§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Uebersicht über die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mittheilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten überwiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört, druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehörigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte bestimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder sowie alle Nichtmitglieder haben hierzu die Vermittelung eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspondirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammtakademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mitglied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtakademie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschaltenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satztheilung wird erst begonnen, wenn die Schluss-Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig als besonders beizugebenden Tafeln die volle Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaftliche Mittheilung darf in keinem Falle die Ausgabe des betreffenden Stückes anderweitig, nur auszugsweise oder auch in weiterer deutscher Sprache veröffentlicht sein oder sein der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen Mittheilung diese anderweitig früher zu veröffentlichen beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf Verlangen verschickt. Die Verfasser werden auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach sich

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungsberichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher Mittheilungen auch abgesondert in der Welt veröffentlicht werden, dass dieselben mit Sondertitel und Paginirung versehen und mit besonderem Vermerk in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den wissenschaftlichen Mittheilungen abgedruckten Arbeit erhält fünfzig Sonderabdrücke mit einem Uebersichtstafel, welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von noch zu unentgeltlicher eigener Vertheilung, zu lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem vorsitzenden Secretar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung des Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz führt, derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redaction und den Druck der in dem gleichen Stücken enthaltenen wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenschaft heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den geschäftlichen Theil der Sitzungsberichte verantwortlich. Für alle übrigen Theile derselben ist jeder Richtung nur die Verfasser verantwortlich.

VERZEICHNISS DER »WISSENSCHAFTLICHEN MITTHEILUNGEN«

zu St. XXXIII.

	Seite
REMAN: Über die Messung von Wechselströmen durch Anwendung eines Galvanometers mit schräg gegen die Windungsebene gestellter Nadel	741

ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE

aus den Jahren 1879, 1880 und 1881.

(In Commission in FERD. DÜMLER'S Verlagsbuchhandlung.)

WEISSBERG: Über die chemische Natur der Meteoriten. 2. Abtheilung	M. 3.00
U: Beiträge zur Petrographie der plutonischen Gesteine. 3. Abtheilung	9.00
SNOW: Beiträge zur Landeskunde der Troas	10.00
PIIT: Kitai und Karakitai, ein Beitrag zur Geschichte Ost- und Innerasiens	1.00
ROGER, P.: Codicis Theodosiani fragmenta Taurinensia	5.00
FIOS: Das archaische Bronzerelief aus Olympia	2.50
DEMANN: Die Ordinal-Zahlen der mexicanischen Sprache	2.50
BRANN: Über die Wiener und Heidelberger Handschrift des Otfrid	3.00
BRADKE: Zur Kritik der Inschriften Tiglath-Pileser's II., des Asarhaddon und des Asurbanipal	3.00
BRANN: Zur Geschichte des Axumitischen Reichs im vierten bis sechsten Jahrhundert	2.50
RAU, E.: Über die Lage von Tigranokerta	5.50
W: Über Veränderung der Wasserstände in den Preussischen Strömen	1.50
WEN: Über die Anfänge der Heroiden des Ovid	1.50
WIZ: Über eine alte Genealogie der Welfen	0.80
WITT: Über ein chinesisches Mengwerk, nebst einem Anhang linguistischer Verbesserungen zu zwei Bänden der Erdkunde Ritter's	2.00
WIZ: Über die Messung psychischer Vorgänge	0.80
SNOW: Über die Weddas von Ceylon und ihre Beziehungen zu den Nachbarstämmen	8.00
Der Tempel der Athena Polias zu Pergamon	2.00
AND, ERNST: Leibnizens und Huygens' Briefwechsel mit Papin, nebst der Biographie Papin's und einigen zugehörigen Briefen und Actenstücken. Auf Kosten der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften herausgegeben. Berlin 1881	M. 13.50

Zur gefälligen Beachtung.

Die Herren Empfänger der Monatsberichte werden ersucht, falls ihnen Theile des Jahrgangs 1881 angekommen sein sollten, hiervon baldigst bei der Akademie Anzeige zu machen. Eine Berücksichtigung Reclamationen kann nur in Aussicht gestellt werden, wenn dieselben spätestens bis zum Ende des Jahres 1882 angebracht werden.

ANZEIGE.

Vom 1. Januar d. J. gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin, statt ihrer bisherigen »Monatsberichte«, wöchentliche »Sitzungsberichte«. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Auszuge auf der zweiten Seite des Umschlages der »Sitzungsberichte« abgedruckt.

Um dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Leserkreise den ihn näher gehenden Theil des Stoffes der »Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzubieten, wurde beschlossen, einen Auszug aus diesen Berichten unter dem Titel:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN

AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN

herauszugeben. Diese Sonderausgabe wird sämtliche Arbeiten aus dem Gebiete der reinen Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und beobachteten Naturwissenschaften in vollständigem Abdruck enthalten, welche in den Sitzungsberichten der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr fremden Verfassern mitgetheilt worden. Auch demselben Gebiete angehörige geschäftliche Berichte, Preis-Aufgaben und -Ertheilungen, Adressen, Reden und dergl. finden darin Platz. Die »Mittheilungen« erhalten besondere Paginirung, doch ist auf jeder Seite eingeklammert die entsprechende Seitenzahl der »Sitzungsberichte« und bei dem Titel jeder Mittheilung die römische Ordnungszahl des Stückes angegeben, dem sie entlehnt ist.

Die »Mittheilungen« erscheinen vom 1. Januar d. J. ab bis auf Weiteres in Heften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Heft wird in der Regel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Persönlich den Gesellschaften und Instituten, welche bisher die »Monatsberichte« empfingen, steht es frei, statt der vollständigen »Sitzungsberichte« fortan nur die »Mathematischen und naturwissenschaftlichen Mittheilungen aus den Sitzungsberichten« sich zuschicken zu lassen, und sie werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat so bald als möglich Nachricht zu geben. Wegen des buchhändlerischen Bezuges der »Mittheilungen« siehe unten.

In Commission bei FERD. DÜMLER'S Verlagsbuchhandlung (HARRWITZ & GOSSE) in Berlin erscheinen:

SITZUNGSBERICHTE

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 12 M.

Diese an Stelle der bisherigen »Monatsberichte« der Akademie getretenen »Sitzungsberichte« erscheinen in Zwischenräumen von acht Tagen, und enthalten sämtliche zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen und wissenschaftlichen Mittheilungen, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.

Getrennt von denselben erscheinen ausserdem, ebenda in Commission:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN

AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.


Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 8 M.

Dieselben erscheinen in monatlichen Zwischenräumen und enthalten nur die geschäftlichen und die wissenschaftlichen Mittheilungen aus dem Gebiete der Mathematik wie der Naturwissenschaft im weitesten Sinne, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.



SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.



XXXIV. XXXV.

13. JULI 1882.

BERLIN 1882.

VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

IN COMMISSION IN FERD. DÜMMLER'S VERLAGS-BUCHHANDLUNG
HARWITZ UND GOSSMANN.



Anzeige.

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königl. Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die Redaction der »Sitzungsberichte«.)

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-Octav regelmässig Donnerstags acht Tage nach jeder Sitzung. Die sämmtlichen zu einem Kalenderjahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungsnummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physikalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über Sitzungen der philosophisch-historischen Classe ungerade Nummern.

§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Uebersicht über die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mittheilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten überwiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört, druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehörigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte bestimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder sowie alle Nichtmitglieder haben hierzu die Vermittelung eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspondirender Mitglieder, welche direct bei der Gesamtkademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mitglied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen. Unter allen Umständen hat die Gesamtkademie oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses Umfangs beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesamtkademie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschaltenden Holzsehnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz der Mittheilung wird erst begonnen, wenn die Stücke des Text einzuschaltenden Holzsehnitte fertig sind; besonders beizugebenden Tafeln die volle erste Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaftliche Mittheilung darf in keinem Falle vor Ausgabe des betreffenden Stückes anderweitig, und nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausfertigung deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden, wenn der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, und dazu der Einwilligung der Gesamtkademie oder der betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungsberichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher Mittheilungen auch abgesondert in der Weise veröffentlicht werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender Paginirung versehen und mit besonderem Verkauf den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den »Wissenschaftlichen Mittheilungen« abgedruckten Arbeit erhält gegen Entgelt fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von noch zwei zu unentgeltlicher eigener Vertheilung, abzulassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden Secretar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung der Akademie führt der Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz führt. Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Druck- und die Vertheilung der Sitzungsberichte und den Druck der in dem gleichen Stück enthaltenen wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenschaft heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den geschäftlichen Theil der Sitzungsberichte verantwortlich. Für alle übrigen Theile derselben ist jeder Richtung nur der Verfasser verantwortlich.

ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE

aus den Jahren 1879, 1880 und 1881.

(In Commission in FERD. DÜMLER'S Verlagsbuchhandlung.)

BERG: Über die chemische Natur der Meteoriten. 2. Abtheilung	M.	3.00
Beiträge zur Petrographie der plutonischen Gesteine. 3. Abtheilung	-	9.00
: Beiträge zur Landeskunde der Troas	-	10.00
Kitai und Karakitai, ein Beitrag zur Geschichte Ost- und Innerasiens	-	1.00
, P.: Codicis Theodosiani fragmenta Taurinensia	-	5.00
Das archaische Bronzerelief aus Olympia	-	2.50
NN: Die Ordinal-Zahlen der mexicanischen Sprache	-	2.50
r: Über die Wiener und Heidelberger Handschrift des Otfrid	-	3.00
n: Zur Kritik der Inschriften Tiglath-Pileser's II., des Asarhaddon und des Asurbanipal	-	3.00
n: Zur Geschichte des Axumitischen Reichs im vierten bis sechsten Jahrhundert	-	2.50
E.: Über die Lago von Tigranokerta	-	5.50
Über Veränderung der Wasserstände in den Preussischen Strömen	-	1.50
Über die Anfänge der Heroiden des Ovid	-	1.50
Über eine alte Genealogie der Welfen	-	0.80
Über ein chinesisches Mengwerk, nebst einem Anhang linguistischer Verbesserungen zu zwei Bänden der Erdkunde Ritter's	-	2.00
Über die Messung psychischer Vorgänge	-	0.80
: Über die Weddas von Ceylon und ihre Beziehungen zu den Nachbarstämmen	-	8.00
er Tempel der Athena Polias zu Pergamon	-	2.00

, ERNST: Leibnizens und Huygens' Briefwechsel mit Papin, nebst der Biographie Papin's und einigen
gehörigen Briefen und Actenstücken. Auf Kosten der Königlich Preussischen Akademie der Wissen-
schaften herausgegeben. Berlin 1881 M. 13.50

Zur gefälligen Beachtung.

*Herren Empfänger der Monatsberichte werden ersucht, falls ihnen Theile des Jahrgangs 1881
zugesommen sein sollten, hiervon baldigst bei der Akademie Anzeige zu machen. Eine Berücksich-
tigung Reclamationen kann nur in Aussicht gestellt werden, wenn dieselben spätestens bis zum
Jahres 1882 angebracht werden.*

A N Z E I G E.

Vom 1. Januar d. J. gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin, statt ihrer bisherigen »Monatsberichte«, wöchentliche »Sitzungsberichte«. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Auszuge auf der zweiten Seite des Umschlages der »Sitzungsberichte« abgedruckt.

Um dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Leserkreise den ihm näher gehenden Theil des Stoffes der »Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzustellen, wurde beschlossen, einen Auszug aus diesen Berichten unter dem Titel:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN

herauszugeben. Diese Sonderausgabe wird sämtliche Arbeiten aus dem Gebiete der reinen Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und beobachteten Naturwissenschaften in vollständigem Abdruck enthalten, welche in den Sitzungsberichten der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr fremden Verfassern mitgetheilt worden. Auch demselben Gebiete angehörige geschäftliche Berichte, Preis-Aufgaben und -Ertheilungen, Adressen, Reden und dergleichen finden darin Platz. Die »Mittheilungen« erhalten besondere Paginirung, doch ist auf jeder Seite eingeklammert die entsprechende Seitenzahl der »Sitzungsberichte« und bei dem Titel jeder Mittheilung die römische Ordnungszahl des Stückes (S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 21



SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.



XXXVI.

20. JULI 1882.

BERLIN 1882.

VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

**IN COMMISSION IN FERD. DÜMLER'S VERLAGS-BUCHHANDLUNG
HARWITZ UND GOSSMANN.**



Anzeige.

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königl. Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die Redaction der »Sitzungsberichte«.)

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-Octav regelmässig Donnerstags acht Tage nach jeder Sitzung. Die sämmtlichen zu einem Kalenderjahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungsnummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physikalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über Sitzungen der philosophisch-historischen Classe ungerade Nummern.

§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Uebersicht über die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mittheilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten überwiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört, druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehörigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte bestimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder sowie alle Nichtmitglieder haben hierzu die Vermittelung eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspondirender Mitglieder, welche direct bei der Gesamtkademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mitglied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesamtkademie oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesamtkademie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschaltenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz der Mittheilung wird erst begonnen, wenn die Stücke des Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind, besonders beizugebenden Tafeln die volle erste Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaftliche Mittheilung darf in keinem Falle vor Ausgabe des betreffenden Stückes anderweitig, und nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausdehnung in deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden, wenn der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, und dazu der Einwilligung der Gesamtkademie oder der betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Wochen.

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungsberichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher Mittheilungen auch abgesondert in der Weise veröffentlicht werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender Paginirung versehen und mit besonderem Vermerk an den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den »Wissenschaftlichen Mittheilungen« abgedruckten Arbeit erhält fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umfange, welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von noch zu unentgeltlicher eigener Vertheilung, abzugeben, sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden Secretar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung des Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz führt, derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redaction und den Druck der in dem gleichen Stücken enthaltenen wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenschaft heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den geschäftlichen Theil der Sitzungsberichte verantwortlich. Für alle übrigen Theile derselben ist jeder Richtung nur die Verfasser verant-

VERZEICHNISS DER »WISSENSCHAFTLICHEN MITTHEILUNGEN«

zu St. XXXVI.

SK: Über die Stirnlappen des Grosshirns.	Seite 753
--	--------------

ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE

aus den Jahren 1879, 1880 und 1881.

(In Commission in FERD. DÜNNLER's Verlagsbuchhandlung.)

SMELSBURG: Über die chemische Natur der Meteoriten. 2. Abtheilung.	M. 3.00
HE: Beiträge zur Petrographie der plutonischen Gesteine. 3. Abtheilung	9.00
CHOW: Beiträge zur Landeskunde der Troas	10.00
OTT: Kitai und Karakitai, ein Beitrag zur Geschichte Ost- und Innerasiens	1.00
IEGER, P.: Codicis Theodosiani fragmenta Taurinensia	5.00
ETIUS: Das archaische Bronzerelief aus Olympia	2.50
SCHMANN: Die Ordinal-Zahlen der mexicanischen Sprache	2.50
SMANN: Über die Wiener und Heidelberger Handschrift des Otfrid	3.00
BRADER: Zur Kritik der Inschriften Tiglath-Pileser's II., des Asarhaddon und des Asurbanipal	3.00
LMANN: Zur Geschichte des Axumitischen Reichs im vierten bis sechsten Jahrhundert	2.50
SAU, E.: Über die Lage von Tigranokerta	5.50
REN: Über Veränderung der Wasserstände in den Preussischen Strömen	1.50
ELLEN: Über die Anfänge der Heroiden des Ovid	1.50
ITZ: Über eine alte Genealogie der Welfen	0.80
OTT: Über ein chinesisches Mengwerk, nebst einem Anhang linguistischer Verbesserungen zu zwei Bänden der Erdkunde Ritter's	2.00
LER: Über die Messung psychischer Vorgänge	0.80
CHOW: Über die Weddas von Ceylon und ihre Beziehungen zu den Nachbarstämmen	8.00
W: Der Tempel der Athena Polias zu Pergamon	2.00

BLAND, ERNST: Leibnizens und Huygens' Briefwechsel mit Papin, nebst der Biographie Papin's und einigen zugehörigen Briefen und Actenstücken. Auf Kosten der Königlich Preussischen Akademie der Wissen- schaften herausgegeben. Berlin 1881	M. 13.50
---	----------

Zur gefälligen Beachtung.

Die Herren Empfänger der Monatsberichte werden ersucht, falls ihnen Theile des Jahrgangs 1881
zugekommen sein sollten, hiervon baldigst bei der Akademie Anzeige zu machen. Eine Berücksich-
tigung etwaiger Reclamationen kann nur in Aussicht gestellt werden, wenn dieselben spätestens bis zum
des Jahres 1882 angebracht werden.

ANZEIGE.

Vom 1. Januar d. J. gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin, statt ihrer bisherigen »Monatsberichte«, wöchentliche »Sitzungsberichte« heraus. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Auszuge auf der zweiten Seite des Umschlages der »Sitzungsberichte« abgedruckt.

Um dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Leserkreise den ihn näher gehenden Theil des Stoffes der »Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzulegen, wurde beschlossen, einen Auszug aus diesen Berichten unter dem Titel:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN

herauszugeben. Diese Sonderausgabe wird sämtliche Arbeiten aus dem Gebiete der reinen Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und beobachteten Naturwissenschaften in vollständigem Abdruck enthalten, welche in den Sitzungsberichten der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr fremden Verfassern mitgetheilt worden. Auch demselben Gebiete angehörige geschäftliche Berichte, Preis-Aufgaben und -Ertheilungen, Adressen, Reden und dergleichen finden darin Platz. Die »Mittheilungen« erhalten besondere Paginirung, doch ist auf jeder Seite eingeklammert die entsprechende Seitenzahl der »Sitzungsberichte« und bei dem Titel jeder Mittheilung die römische Ordnungszahl des Stückes (St.) angegeben, dem sie entlehnt ist.

Die »Mittheilungen« erscheinen vom 1. Januar d. J. ab bis auf Weiteres in Monatsheften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Heft wird in der Regel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Persönlich den Gesellschaften und Instituten, welche bisher die »Monatsberichte« empfangen, steht es frei, statt der vollständigen »Sitzungsberichte« fortan nur die »Mathematischen und naturwissenschaftlichen Mittheilungen aus den Sitzungsberichten« sich zuschicken zu lassen, und sie werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat so bald als möglich Nachricht zu geben. Wegen des buchhändlerischen Bezuges der »Mittheilungen« siehe unten.

In Commission bei FERD. DÜMMLER'S Verlagsbuchhandlung (HARRWITZ & GOSS) in Berlin erscheinen:

SITZUNGSBERICHTE DER KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN.

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 12 M.

Diese an Stelle der bisherigen »Monatsberichte« der Akademie getretenen »Sitzungsberichte« erscheinen in Zwischenräumen von acht Tagen, und enthalten sämtliche zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen und wissenschaftlichen Mittheilungen, welche in den Sitzungsberichten der Akademie gemacht wurden.


Getrennt von denselben erscheinen ausserdem, ebenda in Commission:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 8 M.

Dieselben erscheinen in monatlichen Zwischenräumen und enthalten nur die geschäftlichen und die wissenschaftlichen Mittheilungen aus dem Gebiete der Mathematik wie der Naturwissenschaft im weitesten Sinne, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.



SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.



XXXVII. XXXVIII.

MIT EINER TAFEL.

27. JULI 1882.

BERLIN 1882.

VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

IN COMMISSION IN FERD. DÜMLER'S VERLAGS-BUCHHANDLUNG
HARRWITZ UND GOSSMANN.

Anzeige.

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die „Monatsberichte der Königlich-Preussischen Akademie der Wissenschaften“ zu erscheinen aufgehört, und es an deren Stelle „Sitzungsberichte“ getreten, für welche unter anderen folgende Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die Redaction der „Sitzungsberichte“.)

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-Octav **regelmässig Donnerstags acht Tage nach jeder Sitzung.** Die sämmtlichen zu einem Kalenderjahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungsnummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physikalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über Sitzungen der philosophisch-historischen Classe ungerade Nummern.

§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Uebersicht über die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mittheilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten überwiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört, druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehörigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte bestimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung **druckfertig** vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder, sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung eines ihrem Fache angehörnden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspondirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammtakademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mitglied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtakademie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschaltenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satztheilung wird erst begonnen, wenn die Stücke des Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind; besonders beizugebenden Tafeln die volle erste Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaftliche Mittheilung darf in keinem Falle vertheilt werden, wenn der Verfasser die Mittheilung dieser anderweit früher zu vertheilen beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, und dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf Verlangen verschickt. Die Verfasser werden ersucht, auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach sechs Tagen

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungsberichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher Mittheilungen auch abgesondert in der Weise veröffentlicht werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender Paginirung versehen und mit besonderem Vermerk in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den „Wissenschaftlichen Mittheilungen“ abgedruckten Arbeit erhält gegen Entgelt fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von noch zehn zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abzulassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden Secretar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung führt der Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz führt. Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redaction und den Druck der in dem gleichen Stücken enthaltenen wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenschaft heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den geschäftlichen Theil der Sitzungsberichte verantwortlich. Für alle übrigen Theile derselben ist jeder Richtung nach die Verfasser verant-

**VERZEICHNISS DER »WISSENSCHAFTLICHEN MITTHEILUNGEN«
zu St. XXXVII und XXXVIII.**

	Seite
BER: Über den Kupakshakaucikäditya des Dharmasagara, Streitschrift eines orthodoxen Jaina, vom Jahre 1573	793
IES: Über den Bau des Kopfes von Archaeopteryx	817
WECKER: Die Subdeterminanten symmetrischer Systeme	821
HOLTZ: Zur Thermodynamik chemischer Vorgänge. Zweiter Beitrag. Versuche an Chlorzink-Kalomel-Elementen	825
TERMAIER: Untersuchung über den Bau und die Function des pflanzlichen Hautgewebes (Taf. XIII)	837

ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE

aus den Jahren 1879, 1880 und 1881.

(In Commission in FERD. DÜMLER's Verlagsbuchhandlung.)

SELSBERG: Über die chemische Natur der Meteoriten. 2. Abtheilung	M. 3.00
II: Beiträge zur Petrographie der plutonischen Gesteine. 3. Abtheilung	9.00
SHOW: Beiträge zur Landeskunde der Troas	10.00
OTT: Kitai und Karakitai, ein Beitrag zur Geschichte Ost- und Innerasiens	1.00
ROGER, P.: Codicis Theodosiani fragmenta Taurinensia	5.00
RIUS: Das archaische Bronzerelief aus Olympia	2.50
REHMAN: Die Ordinal-Zahlen der mexicanischen Sprache	2.50
RIANN: Über die Wiener und Heidelberger Handschrift des Otfrid	3.00
ADDER: Zur Kritik der Inschriften Tiglath-Pileser's II., des Asarhaddon und des Asurbanipal	3.00
RIANN: Zur Geschichte des Axumitischen Reichs im vierten bis sechsten Jahrhundert	2.50
BAU, E.: Über die Lage von Tigranokerta	5.50
RI: Über Veränderung der Wasserstände in den Preussischen Strömen	1.50
LEN: Über die Anfänge der Heroiden des Ovid	1.50
RI: Über eine alte Genealogie der Welfen	0.80
RI: Über ein chinesisches Mengwerk, nebst einem Auhang linguistischer Verbesserungen zu zwei Bänden der Erdkunde Ritter's	2.00
RI: Über die Messung psychischer Vorgänge	0.80
RIOW: Über die Weddas von Ceylon und ihre Beziehungen zu den Nachbarstämmen	8.00
RI: Der Tempel der Athena Polias zu Pergamon	2.00
AND, ERNST: Leibnizens und Huygens' Briefwechsel mit Papin, nebst der Biographie Papin's und einigen zugehörigen Briefen und Actenstücken. Auf Kosten der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften herausgegeben. Berlin 1881	
	M. 13.50

Zur gefälligen Beachtung.

Die Herren Empfänger der Monatsberichte werden ersucht, falls ihnen Theile des Jahrgangs 1881 angekommen sein sollten, hiervon baldigst bei der Akademie Anzeige zu machen. Eine Berücksichtigung Reclamationen kann nur in Aussicht gestellt werden, wenn dieselben spätestens bis zum des Jahres 1882 angebracht werden.

ANZEIGE.

Vom 1. Januar d. J. gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin, statt ihrer bisherigen »Monatsberichte«, wöchentliche »Sitzungsberichte« heraus. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Auszuge auf der zweiten Seite des Umschlages der »Sitzungsberichte« abgedruckt.

Um dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Leserkreise den ihm näher gehenden Theil des Stoffes der »Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzustellen, wurde beschlossen, einen Auszug aus diesen Berichten unter dem Titel:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN

herauszugeben. Diese Sonderausgabe wird sämtliche Arbeiten aus dem Gebiete der reinen Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und beobachteten Naturwissenschaften in vollständigem Abdruck enthalten, welche in Sitzungen der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr fremden Verfassern mitgetheilt oder in »Sitzungsberichten« aufgenommen wurden. Auch demselben Gebiete angehörige geschäftliche Berichte, Preis-Aufgaben und -Ertheilungen, Adressen, Reden und dergleichen finden darin Platz. Die »Mittheilungen« erhalten besondere Paginirung, doch ist auf jeder Seite eingeklammert die entsprechende Seitenzahl der »Sitzungsberichte« und bei dem Titel jeder Mittheilung die römische Ordnungszahl des Stückes (Sitzungsberichtes, dem sie entlehnt ist).

Die »Mittheilungen« erscheinen vom 1. Januar d. J. ab bis auf Weiteres in Monatsheften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Heft wird in der Regel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Persönl. Gesellschaften und Instituten, welche bisher die »Monatsberichte« empfangen, sind frei, statt der vollständigen »Sitzungsberichte« fortan nur die »Mathematischen und naturwissenschaftlichen Mittheilungen aus den Sitzungsberichten« sich zuschicken lassen, und sie werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat so bald als möglich Nachricht zu geben. Wegen des buchhändlerischen Bezuges der »Mittheilungen« siehe unten.

In Commission bei FERD. DÜMMLER'S Verlagsbuchhandlung (HARRWITZ & GOSS) in Berlin erscheinen:

SITZUNGSBERICHTE

DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 12 M.

Diese an Stelle der bisherigen »Monatsberichte« der Akademie getretenen »Sitzungsberichte« erscheinen in Zwischenräumen von acht Tagen, und enthalten sämtliche zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen und wissenschaftlichen Mittheilungen, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.

Getrennt von denselben erscheinen ausserdem, ebenda in Commission:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 8 M.

Dieselben erscheinen in monatlichen Zwischenräumen und enthalten nur die geschäftlichen und die wissenschaftlichen Mittheilungen aus dem Gebiete der Mathematik wie der Naturwissenschaft im weitesten Sinne, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.

Anzeige.

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königl. Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die Redaction der »Sitzungsberichte«.)

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-Octav regelmässig Donnerstags acht Tage nach jeder Sitzung. Die sämmtlichen zu einem Kalenderjahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungsnummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physikalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über Sitzungen der philosophisch-historischen Classe ungerade Nummern.

§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Uebersicht über die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mittheilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten überwiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört, druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehörigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 3.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 4.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte bestimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder sowie alle Nichtmitglieder haben hierzu die Vermittelung eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspondirender Mitglieder, welche direct bei der Gesamtkademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mitglied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesamtkademie oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 5.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses Umfangs beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesamtkademie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschaltenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mittheilung wird erst begonnen, wenn die Stücke der Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche Auflage eingeliefert ist.

§ 6.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaftliche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe des betreffenden Stückes anderweitig, sei es nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausfuhr deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen Mittheilung diese anderweitig früher zu veröffentlichen beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, hat dazu der Einwilligung der Gesamtkademie oder der betreffenden Classe.

§ 7.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf bestes Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 8.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungsberichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher Mittheilungen auch abgesondert in der Weise gegeben werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender Paginirung versehen und mit besonderem Verkauf den Buchhandel gebracht werden.

§ 9.

1. Jeder Verfasser einer unter den »Wissenschaftlichen Mittheilungen« abgedruckten Arbeit erhält gegen fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert zu unentgeltlicher eigener Vertheilung, abzugeben, sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden Secretar Anzeige gemacht hat.

§ 10.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz. Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Edition und den Druck der in dem gleichen Stucke enthaltenen wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenschaft heisst er der redigirende Secretar.

§ 11.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt der wissenschaftlichen Theile der Sitzungsberichte verantwortlich. Für alle übrigen Theile derselben sind jeder Richtung nur die Verfasser verantwortlich.

§ 12.

VERZEICHNISS DER »WISSENSCHAFTLICHEN MITTHEILUNGEN«

zu St. XXVII und XXVIII.

	Seite
ATTENBACH: Beiträge zur Geschichte der Mark Brandenburg aus Handschriften der Königlichen Bibliothek	587
MEISTER: Nothropus priscus, ein bisher unbekanntes fossiles Faulthier (Taf. XI)	613

ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE

aus den Jahren 1879, 1880 und 1881.

(In Commission in FERD. DÜMMLER'S Verlagsbuchhandlung.)

MMELSBERG: Über die chemische Natur der Meteoriten. 2. Abtheilung.	M. 3.00
TH: Beiträge zur Petrographie der plutonischen Gesteine. 3. Abtheilung	9.00
CHOW: Beiträge zur Landeskunde der Troas	10.00
OTT: Kitai und Karakitai, ein Beitrag zur Geschichte Ost- und Innerasiens	1.00
UEGER, P.: Codicis Theodosiani fragmenta Taurinensia	5.00
RTIUS: Das archaische Bronzerelief aus Olympia	2.50
SCHMANN: Die Ordinal-Zahlen der mexicanischen Sprache	2.50
DMANN: Über die Wiener und Heidelberger Handschrift des Otfrid	3.00
BRADER: Zur Kritik der Inschriften Tiglath-Pileser's II., des Asarhaddon und des Asurbanipal	3.00
LMANN: Zur Geschichte des Axumitischen Reichs im vierten bis sechsten Jahrhundert	2.50
CHAU, E.: Über die Lago von Tigranokerta	5.50
GEN: Über Veränderung der Wasserstände in den Preussischen Strömen	1.50
HELEN: Über die Anfänge der Heroiden des Ovid	1.50
ITZ: Über eine alte Genealogie der Welfen	0.80
OTT: Über ein chinesisches Mengwerk, nebst einem Anhang linguistischer Verbesserungen zu zwei Bänden der Erdkunde Ritter's	2.00
LER: Über die Messung psychischer Vorgänge	0.80
CHOW: Über die Weddas von Ceylon und ihre Beziehungen zu den Nachbarstämmen	8.00
HN: Der Tempel der Athena Polias zu Pergamon	2.00
RLAND, ERNST: Leibnizens und Huygens' Briefwechsel mit Papin, nebst der Biographie Papin's und einigen zugehörigen Briefen und Actenstücken. Auf Kosten der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften herausgegeben. Berlin 1881	
	M. 13.50

Zur gefälligen Beachtung.

Die Herren Empfänger der Monatsberichte werden ersucht, falls ihnen Theile des Jahrgangs 1881 nicht zugekommen sein sollten, hiervon baldigst bei der Akademie Anzeige zu machen. Eine Berücksichtigung etwaiger Reclamationen kann nur in Aussicht gestellt werden, wenn dieselben spätestens bis zum Ende des Jahres 1882 angebracht werden.



ANZEIGE.

Vom 1. Januar d. J. gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin, statt ihrer bisherigen »Monatsberichte«, wöchentliche »Sitzungsberichte« heraus. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Auszuge auf der zweiten Seite des Umschlages der »Sitzungsberichte« abgedruckt.

Um dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Leserkreise den ihn näher angehenden Theil des Stoffes der »Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzubieten, wurde beschlossen, einen Auszug aus diesen Berichten unter dem Titel:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN

AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

**KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN**

herauszugeben. Diese Sonderausgabe wird sämtliche Arbeiten aus dem Gebiet der reinen Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und beobachtenden Naturwissenschaften in vollständigem Abdruck enthalten, welche in Sitzungen der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr fremden Verfassern mitgetheilt in die »Sitzungsberichte« aufgenommen wurden. Auch demselben Gebiet angehörige geschäftliche Berichte, Preis-Aufgaben und -Ertheilungen, Adressen, Reden und dergl. mehr, finden darin Platz. Die »Mittheilungen« erhalten besondere Paginirung, doch steht auf jeder Seite eingeklammert die entsprechende Seitenzahl der »Sitzungsberichte«, und bei dem Titel jeder Mittheilung die römische Ordnungszahl des Stückes (St.) der Berichte, dem sie entlehnt ist.

Die »Mittheilungen« erscheinen vom 1. Januar d. J. ab bis auf Weiteres in Monatsheften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Stück wird in der Regel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Personen, Gesellschaften und Instituten, welche bisher die »Monatsberichte« empfangen, steht frei, statt der vollständigen »Sitzungsberichte« fortan nur die »Mathematischen und naturwissenschaftlichen Mittheilungen aus den Sitzungsberichten« sich zuschicken zu lassen, und sie werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat so bald wie möglich Nachricht zu geben. Wegen des buchhändlerischen Bezuges der »Mittheilungen« siehe unten.

In Commission bei FERD. DÜMMLER'S Verlagsbuchhandlung (HARRWITZ & GOSSMANN) in Berlin erscheinen:

SITZUNGSBERICHTE

DER

**KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.**

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 12 *M.*

Diese an Stelle der bisherigen »Monatsberichte« der Akademie getretenen »Sitzungsberichte« erscheinen in Zwischenräumen von acht Tagen, und enthalten sämtliche zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen und wissenschaftlichen Mittheilungen, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.

Getrennt von denselben erscheinen ausserdem, ebenda in Commission:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN

AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

**KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.**

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 8 *M.*

Dieselben erscheinen in monatlichen Zwischenräumen und enthalten nur die geschäftlichen und die wissenschaftlichen Mittheilungen aus dem Gebiete der Mathematik wie der Naturwissenschaft im weitesten Sinne, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.

13




SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

XXIX.

15. JUNI 1882.



BERLIN 1882.

VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

IN COMMISSION IN FERD. DÜMMLER'S VERLAGS-BUCHHANDLUNG
HARRWITZ UND GOSSMANN.



Anzeige.

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die Redaction der »Sitzungsberichte«.)

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-Octav regelmässig Donnerstags acht Tage nach jeder Sitzung. Die sämmtlichen zu einem Kalenderjahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungsnummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physikalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über Sitzungen der philosophisch-historischen Classe ungerade Nummern.

§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Uebersicht über die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mittheilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten überwiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört, druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehörigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte bestimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder, sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspondirender Mitglieder, welche direct bei der Gesamtakademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mitglied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesamtakademie oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesamtakademie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschaltenden alle Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satztheilung wird erst begonnen, wenn die Holzschnitte fertig sind. Insbesondere beizugebenden Tafeln die volle Auflage eingeleistet ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaftliche Mittheilung darf in keinem Falle ohne die Genehmigung des betreffenden Stückes anderweitig, nur auszugsweise oder auch in weiterer deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden, wenn der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen Mittheilung diese anderweitig früher zu veröffentlichen beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich nach der Einwilligung der Gesamtakademie der betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf Verlangen verschickt. Die Verfasser werden auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungsberichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher Mittheilungen auch abgesondert in der Welt veröffentlicht werden, dass dieselben mit Sondertitel und Paginirung versehen und mit besonderem Vermerk in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den »Sitzungsberichten« abgedruckten wissenschaftlichen Mittheilung erhält fünfzig Sonderabdrücke mit einem Titel, welchem der Titel der Arbeit wiederholt.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von noch zu unentgeltlicher eigener Vertheilung zu lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem vorsitzenden Secretar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung des Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz führt. Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redaktion und den Druck der in dem gleichen Bande erscheinenden wissenschaftlichen Arbeiten; in diesem Sinne heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den geschäftlichen Theil der Sitzungsberichte verantwortlich. Für alle übrigen Theile derselben ist jeder Richtung nur die Verfasser ver-

VERZEICHNISS DER »WISSENSCHAFTLICHEN MITTHEILUNGEN«

zu St. XL. und XLI.

	Seite
Über eine neue Gattung und Art der Vipernattern <i>Dinodipsas angulifera</i> , aus Südamerica	
erzu Taf. XV)	893
HN: Untersuchungen über Reflexe	897

ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE

aus den Jahren 1879, 1880 und 1881.

(In Commission in FERD. DÜMLER's Verlagsbuchhandlung.

ERG: Über die chemische Natur der Meteoriten. 2. Abtheilung	M. 3.00
iträge zur Petrographie der plutonischen Gesteine. 3. Abtheilung	9.00
Beiträge zur Landeskunde der Troas	10.00
Kitai und Karakitai, ein Beitrag zur Geschichte Ost- und Innerasiens	1.00
P.: Codicis Theodosiani fragmenta Taurinensia	5.00
Das archaische Bronzerelief aus Olympia	2.50
M: Die Ordinal-Zahlen der mexicanischen Sprache	2.50
Über die Wiener und Heidelberger Handschrift des Otfrid	3.00
: Zur Kritik der Inschriften Tiglath-Pileser's II., des Asarhaddon und des Asurbanipal	3.00
: Zur Geschichte des Axumitischen Reichs im vierten bis sechsten Jahrhundert	2.50
E.: Über die Lage von Tigranokerta	5.50
Über Veränderung der Wasserstände in den Preussischen Strömen	1.50
Über die Anfänge der Heroiden des Ovid	1.50
Über eine alte Genealogie der Welfen	0.80
Über ein chinesisches Mengwerk, nebst einem Anhang linguistischer Verbesserungen zu	
si Bänden der Erdkunde Ritter's	2.00
Über die Messung psychischer Vorgänge	0.80
Über die Weddas von Ceylon und ihre Beziehungen zu den Nachbarstämmen	8.00
r Tempel der Athena Polias zu Pergamon	2.00

ERNST: Leibnizens und Huygens' Briefwechsel mit Papin, nebst der Biographie Papin's und einigen
gehörigen Briefen und Actenstücken. Auf Kosten der Königlich Preussischen Akademie der Wissen-
schaften herausgegeben. Berlin 1881 M. 13.50

Zur gefälligen Beachtung.

*wigen Empfänger der Monatsberichte, welche Exemplare von der Akademie direct erhalten,
sucht, falls ihnen Theile des Jahrgangs 1881 nicht zugekommen sein sollten, hiervon baldigst
Ademie Anzeige zu machen. Eine Berücksichtigung etwaiger Reclamationen kann nur in Aussicht
rden, wenn dieselben spätestens bis zum Ende des Jahres 1882 angebracht werden.*

ANZEIGE.

Vom 1. Januar d. J. gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften Berlin, statt ihrer bisherigen »Monatsberichte«, wöchentliche »Sitzungsberichte« heraus. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Auszuge auf der zweiten Seite des Umschlages der »Sitzungsberichte« abgedruckt.

Um dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Leserkreise den ihm näher gehenden Theil des Stoffes der »Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzubieten, wurde beschlossen, einen Auszug aus diesen Berichten unter dem Titel:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN

AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

**KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN**

herauszugeben. Diese Sonderausgabe wird sämtliche Arbeiten aus dem Gebiete der reinen Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und beobachteten Naturwissenschaften in vollständigem Abdruck enthalten, welche in Sitzungen der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr fremden Verfassern mitgetheilt oder in »Sitzungsberichten« aufgenommen wurden. Auch demselben Gebiete angehörige physikalische Berichte, Preis-Aufgaben und -Ertheilungen, Adressen, Reden und dergleichen finden darin Platz. Die »Mittheilungen« erhalten besondere Paginirung, doch ist auf jeder Seite eingeklammert die entsprechende Seitenzahl der »Sitzungsberichte« und bei dem Titel jeder Mittheilung die römische Ordnungszahl des Stückes (St.) angegeben, dem sie entlehnt ist.

Die »Mittheilungen« erscheinen vom 1. Januar d. J. ab bis auf Weiteres in Monatsheften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Heft wird in der Regel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Personengemeinschaften und Instituten, welche bisher die »Monatsberichte« empfangen, stehen frei, statt der vollständigen »Sitzungsberichte« fortan nur die »Mathematischen und naturwissenschaftlichen Mittheilungen aus den Sitzungsberichten« sich zuschicken zu lassen, und sie werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat so bald als möglich Nachricht zu geben. Wegen des buchhändlerischen Bezuges der »Mittheilungen« siehe unten.

In Commission bei FERD. DÜMMLER'S Verlagsbuchhandlung (HARRWITZ & GOSSWAMI) in Berlin erscheinen:

SITZUNGSBERICHTE

DER

**KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.**

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 12 M.

Diese an Stelle der bisherigen »Monatsberichte« der Akademie getretenen »Sitzungsberichte« erscheinen in Zwischenräumen von acht Tagen, und enthalten sämtliche zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen und wissenschaftlichen Mittheilungen, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.

Getrennt von denselben erscheinen ausserdem, ebenda in Commission:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN

AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

**KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.**

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 8 M.

Dieselben erscheinen in monatlichen Zwischenräumen und enthalten nur die geschäftlichen und die wissenschaftlichen Mittheilungen aus dem Gebiete der Mathematik wie der Naturwissenschaft im weitesten Sinne, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.



SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

XXX. XXXI.

MIT EINER TAFEL.

22. Juni 1882.

BERLIN 1882.

VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

IN COMMISSION IN FERD. DÜMMLER'S VERLAGS-BUCHHANDLUNG
HARRWITZ UND GOSSMANN



Anzeige.

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die Redaction der »Sitzungsberichte«.)

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-Octav regelmässig Donnerstags acht Tage nach jeder Sitzung. Die sämmtlichen zu einem Kalenderjahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungsnummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physikalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über Sitzungen der philosophisch-historischen Classe ungerade Nummern.

§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Uebersicht über die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mittheilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten überwiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört, druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehörigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte bestimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder, sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspondirender Mitglieder, welche direct bei der Gesamtakademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mitglied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesamtakademie oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesamtakademie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschaltenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Nothwendiges beschränkt werden. Der Sitzungsbereich wird erst begonnen, wenn die Mittheilung Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig besonders beizugebenden Tafeln die volle Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte Mittheilung darf in keinem Falle die Mittheilung des betreffenden Stückes anderweitig nur auszugsweise oder auch in weiterer deutscher Sprache veröffentlicht sein oder der Verfasser einer aufgenommenen Mittheilung diese anderweitig früher zu beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich mit dazu der Einwilligung der Gesamtakademie betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur Verlangen verschickt. Die Verfasser auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungsberichte können bestimmte Kategorien von Mittheilungen auch abgesondert in der Buchhandlung werden, dass dieselben mit Sondertitel und Paginirung versehen und mit besonderer Aufmerksamkeit in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den Sitzungsberichten abgedruckten Arbeit ist berechtigt fünfzig Sonderabdrücke mit einem Titel, welchem der Titel der Arbeit wiederholt.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Mittheilung gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von 50 zu unentgeltlicher eigener Vertheilung lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem Secretar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung führt der Secretar zusammen, welcher darin den Namen des Secretars, den Druck der in der Sitzung vorgelegten wissenschaftlichen Arbeiten; in die Sitzungsbereiche heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für die Mittheilung des geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwortlich. Für alle übrigen Theile derselben ist jeder Richtung nur die Verfasser verantwortlich.

VERZEICHNISS DER »WISSENSCHAFTLICHEN MITTHEILUNGEN«

zu St. XLII.

	Seite
Über LOCKYER's Dissociationstheorie	905
HOFF: Über die von Thukydides benutzten Urkunden	909

ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE

aus den Jahren 1879, 1880 und 1881.

(In Commission in FERD. DÜMLER's Verlagsbuchhandlung.

ERG: Über die chemische Natur der Meteoriten. 2. Abtheilung	M. 3.00
Beiträge zur Petrographie der plutonischen Gesteine. 3. Abtheilung	9.00
Beiträge zur Landeskunde der Troas	10.00
Kitai und Karakitai, ein Beitrag zur Geschichte Ost- und Innerasiens	1.00
P.: Codicis Theodosiani fragmenta Taurinensia	5.00
Das archaische Bronzerelief aus Olympia	2.50
K: Die Ordinal-Zahlen der mexicanischen Sprache	2.50
Über die Wiener und Heidelberger Handschrift des Otfrid	3.00
: Zur Kritik der Inschriften Tiglath-Pileser's II., des Asarhaddon und des Asurbanipal	3.00
: Zur Geschichte des Axumitischen Reichs im vierten bis sechsten Jahrhundert	2.50
E.: Über die Lage von Tigranokerta	5.50
Über Veränderung der Wasserstände in den Preussischen Strömen	1.50
Über die Anfänge der Heroiden des Ovid	1.50
Über eine alte Genealogie der Welfen	0.80
Über ein chinesisches Mengwerk, nebst einem Anhang linguistischer Verbesserungen zu den Bänden der Erdkunde Ritter's	2.00
Über die Messung psychischer Vorgänge	0.80
Über die Weddas von Ceylon und ihre Beziehungen zu den Nachbarstämmen	8.00
Der Tempel der Athena Polias zu Pergamon	2.00

ERNST: Leibnizens und Huygens' Briefwechsel mit Papin, nebst der Biographie Papin's und einigen
gehörigen Briefen und Actenstücken. Auf Kosten der Königlich Preussischen Akademie der Wis-
senschaften herausgegeben. Berlin 1881 M. 15.50

Zur gefälligen Beachtung.

*Einigen Empfänger der Monatsberichte, welche Exemplare von der Akademie direct erhalten,
müht, falls ihnen Theile des Jahrgangs 1881 nicht zugekommen sein sollten, hiervon baldigst
der Akademie Anzeige zu machen. Eine Berücksichtigung etwaiger Reclamationen kann nur in Aussicht
genommen werden, wenn dieselben spätestens bis zum Ende des Jahres 1882 angebracht werden.*

ANZEIGE.

Vom 1. Januar d. J. gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaft Berlin, statt ihrer bisherigen »Monatsberichte«, wöchentliche »Sitzungsberichte«. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Auszuge auf der zweiten Seite Umschlages der »Sitzungsberichte« abgedruckt.

Um dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Leserkreise den ihn näher gehenden Theil des Stoffes der »Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzubieten, wurde beschlossen, einen Auszug aus diesen Berichten unter dem Titel:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNG

AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN

herauszugeben. Diese Sonderausgabe wird sämtliche Arbeiten aus dem Gebiete der reinen Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und beobachteten Naturwissenschaften in vollständigem Abdruck enthalten, welche in Sitzungsberichten der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr fremden Verfassern mitgetheilt worden sind. »Sitzungsberichte« aufgenommen wurden. Auch demselben Gebiete angehörige Preis-Aufgaben und -Ertheilungen, Adressen, Reden und dergleichen finden darin Platz. Die »Mittheilungen« erhalten besondere Paginirung, doch ist auf jeder Seite eingeklammert die entsprechende Seitenzahl der »Sitzungsberichte« und bei dem Titel jeder Mittheilung die römische Ordnungszahl des Stückes (St.) der »Sitzungsberichte«, dem sie entlehnt ist.

Die »Mittheilungen« erscheinen vom 1. Januar d. J. ab bis auf Weiteres in Monatsheften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Stück wird in der Regel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Persönlich den Gesellschaften und Instituten, welche bisher die »Monatsberichte« empfangen, steht frei, statt der vollständigen »Sitzungsberichte« fortan nur die »Mathematischen und naturwissenschaftlichen Mittheilungen aus den Sitzungsberichten« sich zuschicken zu lassen, und sie werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat so bald als möglich Nachricht zu geben. Wegen des buchhändlerischen Bezuges der »Mittheilungen« siehe unten.

In Commission bei FERD. DÜMLER'S Verlagsbuchhandlung (HARRWITZ & GOSSE) in Berlin erscheinen:

SITZUNGSBERICHTE

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 12 M.

Diese an Stelle der bisherigen »Monatsberichte« der Akademie getretenen »Sitzungsberichte« erscheinen in Zwischenräumen von acht Tagen, und enthalten sämtliche zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen und wissenschaftlichen Mittheilungen, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.

Getrennt von denselben erscheinen ausserdem, ebenda in Commission:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN

AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN


DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 8 M.

Dieselben erscheinen in monatlichen Zwischenräumen und enthalten nur die mathematischen und die wissenschaftlichen Mittheilungen aus dem Gebiete der Mathematik wie der Naturwissenschaft im weitesten Sinne, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.

)



SITZUNGSBERICHTE


DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

XXXII.



29. JUNI 1882.

BERLIN 1882.

VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

IN COMMISSION IN FERD. DÜMMLER'S VERLAGS-BUCHHANDLUNG
HARRWITZ UND GOSSMANN.

Anzeige.

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die Redaction der »Sitzungsberichte«.)

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-Octav **regelmässig Donnerstags acht Tage nach jeder Sitzung**. Die sämmtlichen zu einem Kalenderjahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungsnummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physikalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über Sitzungen der philosophisch-historischen Classe ungerade Nummern.

§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Uebersicht über die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mittheilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten überwiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört, druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehörigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte bestimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung **druckfertig** vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder, sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspondirender Mitglieder, welche direct bei der Gesamtkademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mitglied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesamtkademie oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die akademischen Schriften **ordnungsmässig** zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses Umfangs beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesamtkademie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschaltenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satztheilung wird erst begonnen, wenn die Holzschnitte einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind, besonders beizugebenden Tafeln die vollständige Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaftliche Mittheilung darf in keinem Falle gabe des betreffenden Stückes anderweitig, nur auszugsweise oder auch in weiterer deutscher Sprache veröffentlicht sein oder von der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, dazu der Einwilligung der Gesamtkademie oder der betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf Verlangen verschickt. Die Verfasser werden auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungsberichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher Mittheilungen auch abgesondert in der Welt veröffentlicht werden, dass dieselben mit Sondertitel und Paginirung versehen und mit besonderem Vermerk in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den wissenschaftlichen Mittheilungen abgedruckten Arbeit erhält fünfzig Sonderabdrücke mit einem Vermerk, welchem der Titel der Arbeit wiederholt.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von 500 zu unentgeltlicher eigener Vertheilung lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem vorsitzenden Secretar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung führt der Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hat. Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Satztheilung und den Druck der in dem gleichen Band erschienenen wissenschaftlichen Arbeiten; in die Leitung heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den geschäftlichen Theil der Sitzungsberichte verantwortlich. Für alle übrigen Theile derselben ist jeder Richtung nur die Verfasser verantwortlich.

INhaltsverzeichnis der »WISSENSCHAFTLICHEN MITTHEILUNGEN«

zu St. XXXIX.

Nochmals über die Babylonische halbe Elle des Hrn. OPPERT	Seite 847
⌘: Neue Beobachtungen über den Befruchtungsact der Gattungen Achlya und Saprolegnia af. XIV)	855

ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE

aus den Jahren 1879, 1880 und 1881.

(In Commission in FERD. DÜMMLER's Verlagsbuchhandlung.

ERG: Über die chemische Natur der Meteoriten. 2. Abtheilung	M. 3.00
Beiträge zur Petrographie der plutonischen Gesteine. 3. Abtheilung	9.00
Beiträge zur Landeskunde der Troas	10.00
Kitai und Karakitai, ein Beitrag zur Geschichte Ost- und Innerasiens	1.00
P.: Codicis Theodosiani fragmenta Taurinensia	5.00
Das archaische Bronzerelief aus Olympia	2.50
⌘: Die Ordinal-Zahlen der mexicanischen Sprache	2.50
Über die Wiener und Heidelberger Handschrift des Otfrid	3.00
: Zur Kritik der Inschriften Tiglath-Pileser's II., des Asarhaddon und des Asurbanipal	3.00
: Zur Geschichte des Axumitischen Reichs im vierten bis sechsten Jahrhundert	2.50
E.: Über die Lage von Tigranokerta	5.50
Über Veränderung der Wasserstände in den Preussischen Strömen	1.50
Über die Anfänge der Heroiden des Ovid	1.50
Über eine alte Genealogie der Welfen	0.80
Über ein chinesisches Mengwerk, nebst einem Anhang linguistischer Verbesserungen zu den Bänden der Erdkunde Ritter's	2.00
Über die Messung psychischer Vorgänge	0.80
Über die Weddas von Ceylon und ihre Beziehungen zu den Nachbarstämmen	8.00
Der Tempel der Athena Polias zu Pergamon	2.00

ERNST: Leibnizens und Huygens' Briefwechsel mit Papin, nebst der Biographie Papin's und einigen
gehörigen Briefen und Actenstücken. Auf Kosten der Königlich Preussischen Akademie der Wissen-
schaften herausgegeben. Berlin 1881 M. 13.50

Zur gefälligen Beachtung.

*wichtigen Empfänger der Monatsberichte, welche Exemplare von der Akademie direct erhalten,
nicht, falls ihnen Theile des Jahrgangs 1881 nicht zugekommen sein sollten, hiervon baldigst
der Akademie Anzeige zu machen. Eine Berücksichtigung etwaiger Reclamationen kann nur in Aussicht
nehmen, wenn dieselben spätestens bis zum Ende des Jahres 1882 angebracht werden.*

ANZEIGE.

Vom 1. Januar d. J. gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin, statt ihrer bisherigen »Monatsberichte«, wöchentliche »Sitzungsberichte« heraus. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Auszuge auf der zweiten Seite des Umschlages der »Sitzungsberichte« abgedruckt.

Um dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Leserkreise den ihm näher angehenden Theil des Stoffes der »Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzubieten, wurde beschlossen, einen Auszug aus diesen Berichten unter dem Titel:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN

AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN

herauszugeben. Diese Sonderausgabe wird sämtliche Arbeiten aus dem Gebiet der reinen Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und beobachtenden Naturwissenschaften in vollständigem Abdruck enthalten, welche in Sitzungen der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr fremden Verfassern mitgetheilt in die »Sitzungsberichte« aufgenommen wurden. Auch demselben Gebiet angehörige geschäftliche Berichte, Preis-Aufgaben und -Ertheilungen, Adressen, Reden und dergl. mehr, finden darin Platz. Die »Mittheilungen« erhalten besondere Paginirung, doch steht auf jeder Seite eingeklammert die entsprechende Seitenzahl der »Sitzungsberichte« und bei dem Titel jeder Mittheilung die römische Ordnungszahl des Stückes (St.) der Berichte, dem sie entlehnt ist.

Die »Mittheilungen« erscheinen vom 1. Januar d. J. ab bis auf Weiteres in Monatsheften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Stück wird in der Regel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Personen, Gesellschaften und Instituten, welche bisher die »Monatsberichte« empfangen, steht frei, statt der vollständigen »Sitzungsberichte« fortan nur die »Mathematischen und naturwissenschaftlichen Mittheilungen aus den Sitzungsberichten« sich zuschicken zu lassen, und sie werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat so bald wie möglich Nachricht zu geben. Wegen des buchhändlerischen Bezuges der »Mittheilungen« siehe unten.

In Commission bei FERD. DÜMMLER'S Verlagsbuchhandlung (HARRWITZ & GOSSNARD) in Berlin erscheinen:

SITZUNGSBERICHTE

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 12 M.

Diese an Stelle der bisherigen »Monatsberichte« der Akademie getretenen »Sitzungsberichte« erscheinen in Zwischenräumen von acht Tagen, und enthalten sämtliche zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen und wissenschaftlichen Mittheilungen, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.

Getrennt von denselben erscheinen ausserdem, ebenda in Commission:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN

AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 8 M.

Dieselben erscheinen in monatlichen Zwischenräumen und enthalten nur die geschäftlichen und die wissenschaftlichen Mittheilungen aus dem Gebiete der Mathematik wie der Naturwissenschaft im weitesten Sinne, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.

SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

XXXIII.



MIT DEM VERZEICHNISS DER IM ZWEITEN VIERTELJAHR
EINGEGANGENEN DRUCKSCHRIFTEN.

6. JULI 1882.

BERLIN 1882.

VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

IN COMMISSION IN FERD. DÜMMLEK'S VERLAGS-BUCHHANDLUNG
HARRWITZ UND GOSSMANN.

Anzeige.

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die Redaction der »Sitzungsberichte«.)

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-Octav regelmässig Donnerstags acht Tage nach jeder Sitzung. Die sämtlichen zu einem Kalenderjahr gehörigen Stücke bilden vorläufig ein Band mit fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungsnummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physikalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über Sitzungen der philosophisch-historischen Classe ungerade Nummern.

§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Uebersicht über die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mittheilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten überwiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört, druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehörigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte bestimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder, sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspondirender Mitglieder, welche direct bei der Gesamtakademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mitglied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesamtakademie oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses Umfangs beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesamtakademie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschaltenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satztheilung wird erst begonnen, wenn die Stöcke des Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind. Besonders beizugebenden Tafeln die volle Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaftliche Mittheilung darf in keinem Falle die gabe des betreffenden Stückes anderweitig, nur auszugsweise oder auch in weiterer deutscher Sprache veröffentlicht sein oder von der Verfasser einer aufgenommenen Mittheilung diese anderweit früher zu beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich nach dazu der Einwilligung der Gesamtakademie betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf Verlangen verschickt. Die Verfasser vers auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Mittheilungen können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher Mittheilungen auch abgesondert in der Welt werden, dass dieselben mit Sondertitel und Paginirung versehen und mit besonderem in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den »wissenschaftlichen Mittheilungen« abgedruckten Arbeit erhält fünfzig Sonderabdrücke mit einem Titel, welchem der Titel der Arbeit wiederholt.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine eigenen Kosten gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von noch zu unentgeltlicher eigener Vertheilung lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem vorsitzenden Secretar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung des Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz führt. Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redaction und den Druck der in dem gleichen Band erscheinenden wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenschaft heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für die geschäftlichen Theile der Sitzungsberichte verantwortlich. Für alle übrigen Theile derselben ist jeder Richtung nur die Verfasser verantwortlich.

**VERZEICHNISS DER »WISSENSCHAFTLICHEN MITTHEILUNGEN«
zu St. XL. und XLI.**

	Seite
MUS: Über eine neue Gattung und Art der Vipernattern <i>Dinodipsas angulifera</i> , aus Südamerica (hierzu Taf. XV)	893
DELSON: Untersuchungen über Reflexe	897

ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE

aus den Jahren 1879, 1880 und 1881.

(In Commission in FERD. DÜMLER's Verlagsbuchhandlung.

MELLSBERG: Über die chemische Natur der Meteoriten. 2. Abtheilung	M. 3.00
M: Beiträge zur Petrographie der plutonischen Gesteine. 3. Abtheilung	9.00
HOW: Beiträge zur Landeskunde der Troas	10.00
OTT: Kitai und Karakitai, ein Beitrag zur Geschichte Ost- und Innerasiens	1.00
SEGER, P.: Codicis Theodosiani fragmenta Taurinensia	5.00
THUS: Das archaische Bronzerelief aus Olympia	2.50
REHMANN: Die Ordinal-Zahlen der mexicanischen Sprache	2.50
MAHN: Über die Wiener und Heidelberger Handschrift des Otfrid	3.00
RAUER: Zur Kritik der Inschriften Tiglath-Pileser's II., des Asarhaddon und des Asurbanipal	3.00
MAHN: Zur Geschichte des Axumitischen Reichs im vierten bis sechsten Jahrhundert	2.50
HAU, E.: Über die Lage von Tigranokerta	5.50
W: Über Veränderung der Wasserstände in den Preussischen Strömen	1.50
WEN: Über die Anfänge der Heroiden des Ovid	1.50
W: Über eine alte Genealogie der Welfen	0.80
ST: Über ein chinesisches Mengwerk, nebst einem Anhang linguistischer Verbesserungen zu zwei Bänden der Erdkunde Ritter's	2.00
W: Über die Messung psychischer Vorgänge	0.80
HOW: Über die Weddas von Ceylon und ihre Beziehungen zu den Nachbarstämmen	8.00
W: Der Tempel der Athena Polias zu Pergamon	2.00

HAND, ERNST: Leibnizens und Huygens' Briefwechsel mit Papin, nebst der Biographie Papin's und einigen
zugehörigen Briefen und Actenstücken. Auf Kosten der Königlich Preussischen Akademie der Wissen-
schaften herausgegeben. Berlin 1881 M. 13.50

Zur gefälligen Beachtung.

*Diejenigen Empfänger der Monatsberichte, welche Exemplare von der Akademie direct erhalten,
ersucht, falls ihnen Theile des Jahrgangs 1881 nicht zugekommen sein sollten, hiervon baldigst
der Akademie Anzeige zu machen. Eine Berücksichtigung etwaiger Reclamationen kann nur in Aussicht
genommen werden, wenn dieselben spätestens bis zum Ende des Jahres 1882 angebracht werden.*

ANZEIGE.

Vom 1. Januar d. J. gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften Berlin, statt ihrer bisherigen »Monatsberichte«, wöchentliche »Sitzungsberichte« heraus. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Auszuge auf der zweiten Seite des Umschlages der »Sitzungsberichte« abgedruckt.

Um dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Leserkreise den ihm näher gehenden Theil des Stoffes der »Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzubieten, wurde beschlossen, einen Auszug aus diesen Berichten unter dem Titel:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN

AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

**KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN**

herauszugeben. Diese Sonderausgabe wird sämtliche Arbeiten aus dem Gebiete der reinen Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und beobachteten Naturwissenschaften in vollständigem Abdruck enthalten, welche in Sitzungen der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr fremden Verfassern mitgeteilt in »Sitzungsberichte« aufgenommen wurden. Auch demselben Gebiete angehörige geschäftliche Berichte, Preis-Aufgaben und -Ertheilungen, Adressen, Reden und dergl. finden darin Platz. Die »Mittheilungen« erhalten besondere Paginirung, doch auf jeder Seite eingeklammert die entsprechende Seitenzahl der »Sitzungsberichte« und bei dem Titel jeder Mittheilung die römische Ordnungszahl des Stückes (S.) der »Sitzungsberichte«, dem sie entlehnt ist.

Die »Mittheilungen« erscheinen vom 1. Januar d. J. ab bis auf Weiteres in Monatsheften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Stück wird in der Regel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Personengesellschaften und Instituten, welche bisher die »Monatsberichte« empfangen, sind frei, statt der vollständigen »Sitzungsberichte« fortan nur die »Mathematischen und naturwissenschaftlichen Mittheilungen« aus den Sitzungsberichten« sich zuschicken lassen, und sie werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat so bald als möglich Nachricht zu geben. Wegen des buchhändlerischen Bezuges der »Mittheilungen« siehe unten.

In Commission bei FERD. DÜMLER'S Verlagsbuchhandlung (HARRWITZ & GOSSWAMI) in Berlin erscheinen:

SITZUNGSBERICHTE

DER

**KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.**

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 12 M.

Diese an Stelle der bisherigen »Monatsberichte« der Akademie getretenen »Sitzungsberichte« erscheinen in Zwischenräumen von acht Tagen, und enthalten sämtliche zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen und wissenschaftlichen Mittheilungen, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.

Getrennt von denselben erscheinen ausserdem, ebenda in Commission:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN


AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

**KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.**

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 8 M.

Dieselben erscheinen in monatlichen Zwischenräumen und enthalten nur die geschäftlichen und die wissenschaftlichen Mittheilungen aus dem Gebiete der Mathematik wie der Naturwissenschaft im weitesten Sinne, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.



SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.



XXXIV. XXXV.

13. Juli 1882.

BERLIN 1882.
VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.
IN COMMISSION IN FERD. DÜMLER'S VERLAGS-BUCHHANDLUNG
HARRWITZ UND GOSEMANN.

Anzeige.

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die „Monatsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften“ zu erscheinen aufgehört, und an deren Stelle „Sitzungsberichte“ getreten, für welche unter anderen Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die Redaction der „Sitzungsberichte“.)

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-Octav regelmässig Donnerstags acht Tage nach jeder Sitzung. Die sämtlichen zu einem Kalenderjahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungsnummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physikalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über Sitzungen der philosophisch-historischen Classe ungerade Nummern.

§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Uebersicht über die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mittheilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten überwiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört, druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehörigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte bestimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder, sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung eines ihrem Fache angehörnden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspondirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammtakademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mitglied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses Umfangs beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtakademie oder der betreffenden Classe statthalt.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschaltenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satztheilung wird erst begonnen, wenn die Stöckel-Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind, besonders beizugebenden Tafeln die volle Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaftliche Mittheilung darf in keinem Falle gabe des betreffenden Stückes anderweitig, nur auszugsweise oder auch in weiterer deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden, wenn der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen Mittheilung diese anderweit früher in der Akademie beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich und dazu der Einwilligung der Gesammtakademie betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf Verlangen verschickt. Die Verfasser werden auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungsberichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher Mittheilungen auch abgesondert in der Welt veröffentlicht werden, dass dieselben mit Sondertitel und Paginirung versehen und mit besonderem Aufsehen in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den „Sitzungsberichten“ abgedruckten wissenschaftlichen Mittheilung erhält fünfzig Sonderabdrücke mit einem Titel, welchem der Titel der Arbeit wiederholt.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von noch zu unentgeltlicher eigener Vertheilung zu lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem Secretar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung des Secretar zusammen, welcher darin den Namen der Sitzung und den Druck der in dem gleichen Sitzungsjahre erschienenen wissenschaftlichen Arbeiten; in dem Bericht heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den geschäftlichen Theil der Sitzungsberichte verantwortlich. Für alle übrigen Theile derselben ist jeder Richtung nur die Verfasser verantwortlich.

VERZEICHNISS DER »WISSENSCHAFTLICHEN MITTHEILUNGEN«

zu St. XLII.

	Seite
EL: Über LOCKYER's Dissociationstheorie	905
LRCHHOFF: Über die von Thukydides benutzten Urkunden	909

ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE

aus den Jahren 1879, 1880 und 1881.

(In Commission in FERD. DÜMLER's Verlagsbuchhandlung.

DELSEBERG: Über die chemische Natur der Meteoriten. 2. Abtheilung	M. 3.00
EL: Beiträge zur Petrographie der plutonischen Gesteine. 3. Abtheilung	9.00
ENOW: Beiträge zur Landeskunde der Troas	10.00
OTT: Kitai und Karakitai, ein Beitrag zur Geschichte Ost- und Innerasiens	1.00
ROER, P.: Codicis Theodosiani fragmenta Taurinensia	5.00
RIUS: Das archaische Bronzerelief aus Olympia	2.50
RIEMANN: Die Ordinal-Zahlen der mexicanischen Sprache	2.50
RIANN: Über die Wiener und Heidelberger Handschrift des Otfrid	3.00
RIADER: Zur Kritik der Inschriften Tiglath-Pileser's II., des Asarhaddon und des Asurbanipal	3.00
RIANN: Zur Geschichte des Axumitischen Reichs im vierten bis sechsten Jahrhundert	2.50
RIAU, E.: Über die Lage von Tigranokerta	5.50
RIEX: Über Veränderung der Wasserstände in den Preussischen Strömen	1.50
RIEN: Über die Anfänge der Heroiden des Ovid	1.50
RIEZ: Über eine alte Genealogie der Welfen	0.80
RIET: Über ein chinesisches Mengwerk, nebst einem Anhang linguistischer Verbesserungen zu zwei Bänden der Erdkunde Ritter's	2.00
RIER: Über die Messung psychischer Vorgänge	0.80
RIOW: Über die Weddas von Ceylon und ihre Beziehungen zu den Nachbarstämmen	8.00
RI: Der Tempel der Athena Polias zu Pergamon	2.00

RIAND, ERNST: Leibnizens und Huygens' Briefwechsel mit Papin, nebst der Biographie Papin's und einigen zugehörigen Briefen und Actenstücken. Auf Kosten der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften herausgegeben. Berlin 1881 M. 15.50

Zur gefälligen Beachtung.

Diejenigen Empfänger der Monatsberichte, welche Exemplare von der Akademie direct erhalten, ersucht, falls ihnen Theile des Jahrgangs 1881 nicht zugekommen sein sollten, hiervon baldigst Akademie Anzeige zu machen. Eine Berücksichtigung etwaiger Reclamationen kann nur in Aussicht werden, wenn dieselben spätestens bis zum Ende des Jahres 1882 angebracht werden.

ANZEIGE.

Vom 1. Januar d. J. gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin, statt ihrer bisherigen »Monatsberichte«, wöchentliche »Sitzungsberichte« heraus. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Auszuge auf der zweiten Seite des Umschlages der »Sitzungsberichte« abgedruckt.

Um dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Leserkreise den ihn näher interessierenden Theil des Stoffes der »Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzubieten, wurde beschlossen, einen Auszug aus diesen Berichten unter dem Titel:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN

AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN

herauszugeben. Diese Sonderausgabe wird sämtliche Arbeiten aus dem Gebiete der reinen Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und beobachtenden Naturwissenschaften in vollständigem Abdruck enthalten, welche in Sitzungen der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr fremden Verfassern mitgetheilt in die »Sitzungsberichte« aufgenommen wurden. Auch demselben Gebiete angehörige geschäftliche Berichte, Preis-Aufgaben und -Ertheilungen, Adressen, Reden und dergl. finden darin Platz. Die »Mittheilungen« erhalten besondere Paginirung, doch ist auf jeder Seite eingeklammert die entsprechende Seitenzahl der »Sitzungsberichte« und bei dem Titel jeder Mittheilung die römische Ordnungszahl des Stückes (St.) der Berichte, dem sie entlehnt ist.

Die »Mittheilungen« erscheinen vom 1. Januar d. J. ab bis auf Weiteres in Monatsheften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Stück wird in der Regel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Personen, Gesellschaften und Instituten, welche bisher die »Monatsberichte« empfangen, stehen frei, statt der vollständigen »Sitzungsberichte« fortan nur die »Mathematischen und naturwissenschaftlichen Mittheilungen aus den Sitzungsberichten« sich zuschicken lassen, und sie werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat so bald als möglich Nachricht zu geben. Wegen des buchhändlerischen Bezuges der »Mittheilungen« siehe unten.

In Commission bei FERD. DÜNNLER'S Verlagsbuchhandlung (HARRWITZ & GOSSWAM) in Berlin erscheinen:

SITZUNGSBERICHTE

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 12 M.

Diese an Stelle der bisherigen »Monatsberichte« der Akademie getretenen »Sitzungsberichte« erscheinen in Zwischenräumen von acht Tagen, und enthalten sämtliche zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen und wissenschaftlichen Mittheilungen, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.

Getrennt von denselben erscheinen ausserdem, ebenda in Commission:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN

AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN


DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 8 M.

Dieselben erscheinen in monatlichen Zwischenräumen und enthalten nur die geschäftlichen und die wissenschaftlichen Mittheilungen aus dem Gebiete der Mathematik wie der Naturwissenschaft im weitesten Sinne, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.



SITZUNGSBERICHTE

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.



XXXVI.

20. JULI 1882.

BERLIN 1882.

VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

IN COMMISSION IN FERD. DÜMMLER'S VERLAGS-BUCHHANDLUNG
HARRWITZ UND GOSSMANN.

Anzeige.

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die „Monatsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften“ zu erscheinen aufgehört, um an deren Stelle „Sitzungsberichte“ getreten, für welche unter anderen Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die Redaction der „Sitzungsberichte“.)

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-Octav **regelmässig Donnerstags acht Tage nach jeder Sitzung**. Die sämmtlichen zu einem Kalenderjahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungsnummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physikalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über Sitzungen der philosophisch-historischen Classe ungerade Nummern.

§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Uebersicht über die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mittheilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten überwiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört, druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehörigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte bestimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung **druckfertig** vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder, sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspondirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammtakademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mitglied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses Umfangs beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtakademie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschaltenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satztheilung wird erst begonnen, wenn die Satztheilung Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig, besonders beizugebenden Tafeln die volle Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaftliche Mittheilung darf in keinem Falle gabe des betreffenden Stückes anderweitig, nur auszugsweise oder auch in weiterer deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden, wenn der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich mittheilung dazu der Einwilligung der Gesammtakademie betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf Verlangen verschickt. Die Verfasser sind auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach zu

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungsberichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher Mittheilungen auch abgesondert in der Welt werden, dass dieselben mit Sondertitel und Paginirung versehen und mit besonderem Aufsehen in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den wissenschaftlichen Mittheilungen abgedruckten Arbeit erhält fünfzig Sonderabdrücke mit einem Titel, welchem der Titel der Arbeit wiederholt.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von 100 zu unentgeltlicher eigener Vertheilung lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem Secretar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung führt der Secretar zusammen, welcher darin den Namen der Sitzung und den Druck der in dem gleichem Namen wissenschaftlichen Arbeiten; in der Sitzung heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den geschäftlichen Theil der Sitzungsberichte verantwortlich. Für alle übrigen Theile derselben ist jeder Richtung nur die Verfasser verantwortlich.

VERZEICHNISS DER „WISSENSCHAFTLICHEN MITTHEILUNGEN“

zu St. XXXVI.

	Seite
SK: Über die Stirnlappen des Grosshirns.	753

ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE

aus den Jahren 1879, 1880 und 1881.

(In Commission in FERD. DÜMLER'S Verlagsbuchhandlung.)

UMELSBURG: Über die chemische Natur der Meteoriten. 2. Abtheilung.	M. 3.00
RE: Beiträge zur Petrographie der plutonischen Gesteine. 3. Abtheilung	9.00
CHOW: Beiträge zur Landeskunde der Troas	10.00
LOTT: Kitai und Karakitai, ein Beitrag zur Geschichte Ost- und Innerasiens	1.00
DEGER, P.: Codicis Theodosiani fragmenta Taurinensia	5.00
RIEUS: Das archaische Bronzerelief aus Olympia	2.50
SCHMANN: Die Ordinal-Zahlen der mexicanischen Sprache	2.50
DMANN: Über die Wiener und Heidelberger Handschrift des Otfrid	3.00
BRADER: Zur Kritik der Inschriften Tiglath-Pileser's II., des Asarhaddon und des Asurbanipal	3.00
LMANN: Zur Geschichte des Axunitischen Reichs im vierten bis sechsten Jahrhundert	2.50
HAU, E.: Über die Lage von Tigranokerta	5.50
GEN: Über Veränderung der Wasserstände in den Preussischen Strömen	1.50
ELLEN: Über die Anfänge der Heroiden des Ovid	1.50
ITZ: Über eine alte Genealogie der Welfen	0.80
LOTT: Über ein chinesisches Mengwerk, nebst einem Anhang linguistischer Verbesserungen zu zwei Bänden der Erdkunde Ritter's	2.00
LER: Über die Messung psychischer Vorgänge	0.80
CHOW: Über die Weddas von Ceylon und ihre Beziehungen zu den Nachbarstämmen	8.00
IN: Der Tempel der Athena Polias zu Pergamon	2.00

ELAND, ERNST: Leibnizens und Huygens' Briefwechsel mit Papin, nebst der Biographie Papin's und einigen zugehörigen Briefen und Actenstücken. Auf Kosten der Königlich Preussischen Akademie der Wissen- schaften herausgegeben. Berlin 1881	M. 13.50
---	----------

Zur gefälligen Beachtung.

*Die Herren Empfänger der Monatsberichte werden ersucht, falls ihnen Theile des Jahrgangs 1881
ist zugekommen sein sollten, hiervon baldigst bei der Akademie Anzeige zu machen. Eine Berücksich-
tung etwaiger Reclamationen kann nur in Aussicht gestellt werden, wenn dieselben spätestens bis zum
de des Jahres 1882 angebracht werden.*



ANZEIGE.

Vom 1. Januar d. J. gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin, statt ihrer bisherigen »Monatsberichte«, wöchentliche »Sitzungsberichte« heraus. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Auszuge auf der zweiten Seite des Umschlages der »Sitzungsberichte« abgedruckt.

Um dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Leserkreise den ihn näher interessierenden Theil des Stoffes der »Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzubieten, wurde beschlossen, einen Auszug aus diesen Berichten unter dem Titel:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN

AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN

herauszugeben. Diese Sonderausgabe wird sämtliche Arbeiten aus dem Gebiet der reinen Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und beobachtenden Naturwissenschaften in vollständigem Abdruck enthalten, welche in Sitzungen der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr fremden Verfassern mitgetheilt in die »Sitzungsberichte« aufgenommen wurden. Auch demselben Gebiet angehörige geschäftliche Berichte, Preis-Aufgaben und -Ertheilungen, Adressen, Reden und dergl. mehr finden darin Platz. Die »Mittheilungen« erhalten besondere Paginirung, doch steht auf jeder Seite eingeklammert die entsprechende Seitenzahl der »Sitzungsberichte« und bei dem Titel jeder Mittheilung die römische Ordnungszahl des Stückes (St.) der Berichte, dem sie entlehnt ist.

Die »Mittheilungen« erscheinen vom 1. Januar d. J. ab bis auf Weiteres in Monatsheften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Stück wird in der Regel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Personen, Gesellschaften und Instituten, welche bisher die »Monatsberichte« empfangen, steht es frei, statt der vollständigen »Sitzungsberichte« fortan nur die »Mathematischen und naturwissenschaftlichen Mittheilungen aus den Sitzungsberichten« sich zuschicken zu lassen, und sie werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat so bald wie möglich Nachricht zu geben. Wegen des buchhändlerischen Bezuges der »Mittheilungen« siehe unten.

In Commission bei FERD. DÜMLER's Verlagsbuchhandlung (HARRWITZ & GOSSNER) in Berlin erscheinen:

SITZUNGSBERICHTE

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 12 M.

Diese an Stelle der bisherigen »Monatsberichte« der Akademie getretenen »Sitzungsberichte« erscheinen in Zwischenräumen von acht Tagen, und enthalten sämtliche zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen und wissenschaftlichen Mittheilungen, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.

Getrennt von denselben erscheinen ausserdem, ebenda in Commission:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN


AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 8 M.

Dieselben erscheinen in monatlichen Zwischenräumen und enthalten nur die geschäftlichen und die wissenschaftlichen Mittheilungen aus dem Gebiete der Mathematik wie der Naturwissenschaft im weitesten Sinne, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.



SITZUNGSBERICHTE

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.



XXXVII. XXXVIII.

MIT EINER TAFEL.

27. JULI 1882.

BERLIN 1882.

VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

IN COMMISSION IN FERD. DÜMMLER'S VERLAGS-BUCHHANDLUNG
HARRWITZ UND GOSSMANN.

Anzeige.

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich-Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die Redaction der »Sitzungsberichte«.)

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-Octav **regelmässig Donnerstags acht Tage nach jeder Sitzung.** Die sämmtlichen zu einem Kalenderjahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungsnummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physikalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über Sitzungen der philosophisch-historischen Classe ungerade Nummern.

§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Uebersicht über die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mittheilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten überwiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört, druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehörigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte bestimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung **druckfertig** vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder, sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspondirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammtakademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mitglied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtakademie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschaltenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz und die Theilung wird erst begonnen, wenn die Stücke des Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind, besonders beizugebenden Tafeln die volle erste Auflage eingeleistet ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaftliche Mittheilung darf in keinem Falle ohne Genehmigung des betreffenden Stückes anderweitig, sei es nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausdehnung, in deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden, wenn der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen Mittheilung diese anderweitig früher zu veröffentlichen beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, und dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf Verlangen verschickt. Die Verfasser verschieben auf Er-scheinen ihrer Mittheilungen nach nicht

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungsberichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher Mittheilungen auch abgesondert in der Weise veröffentlicht werden, dass dieselben mit Sondertitel und für die Paginirung versehen und mit besonderem Vermerk in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den »Wissenschaftlichen Mittheilungen« abgedruckten Arbeit erhält gegen Entgelt fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von noch so vielen zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abdrucken zu lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden Secretar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung redigirt der Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz führt. Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Druckerei und den Druck der in dem gleichen Stücken enthaltenen wissenschaftlichen Arbeiten; in diesem Sinne heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den geschäftlichen Theil der Sitzungsberichte verantwortlich. Für alle übrigen Theile derselben ist jeder Richtung nur die Verfasser verantwortlich.

VERZEICHNISS DER »WISSENSCHAFTLICHEN MITTHEILUNGEN«

zu St. XLV.

	Seite
ERS: Über <i>Sphaeronycteris toxophyllum</i> , eine neue Gattung und Art der frugivoren blattnasigen Flederthiere, aus dem tropischen America (hierzu Taf. XVI)	987
MUS: Nachträgliches zu der Mittheilung »über die babylonische Halbelle des Hrn. OPPERT« vom 19. October d. J.	991
MARIAE VON LINGENTHAL: Zur Geschichte des Authenticum und der Epitome Novellarum des Antecessor Julianus	993

ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE

aus den Jahren 1879, 1880 und 1881.

(In Commission in FERD. DÜMMLER'S Verlagsbuchhandlung.)

MELLSBERG: Über die chemische Natur der Meteoriten. 2. Abtheilung	M. 3.00
E: Beiträge zur Petrographie der plutonischen Gesteine. 3. Abtheilung	9.00
HOW: Beiträge zur Landeskunde der Troas	10.00
ITT: Kitai und Karakitai, ein Beitrag zur Geschichte Ost- und Innerasiens	1.00
ROGER, P.: Codicis Theodosiani fragmenta Taurinensia	5.00
ROS: Das archaische Bronzerelief aus Olympia	2.50
SEMANN: Die Ordinal-Zahlen der mexicanischen Sprache	2.50
SENN: Über die Wiener und Heidelberger Handschrift des Otfrid	3.00
SEDER: Zur Kritik der Inschriften Tiglath-Pileser's II., des Asarhaddon und des Asurbanipal	3.00
SENN: Zur Geschichte des Axumitischen Reichs im vierten bis sechsten Jahrhundert	2.50
SAU, E.: Über die Lage von Tigranokerta	5.50
ST: Über Veränderung der Wasserstände in den Preussischen Strömen	1.50
SENN: Über die Anfänge der Heroiden des Ovid	1.50
SE: Über eine alte Genealogie der Welfen	0.80
ST: Über ein chinesisches Mengwerk, nebst einem Anhang linguistischer Verbesserungen zu zwei Bänden der Erdkunde Ritter's	2.00
SE: Über die Messung psychischer Vorgänge	0.80
HOW: Über die Weddas von Ceylon und ihre Beziehungen zu den Nachbarstämmen	8.00
SE: Der Tempel der Athena Polias zu Pergamon	2.00

LAND, ERNST: Leibnizens und Huygens' Briefwechsel mit Papin, nebst der Biographie Papin's und einigen zugehörigen Briefen und Actenstücken. Auf Kosten der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften herausgegeben. Berlin 1881 M. 13.50

Zur gefälligen Beachtung.

Diejenigen Empfänger der Monatsberichte, welche Exemplare von der Akademie direct erhalten, ersucht, falls ihnen Theile des Jahrgangs 1881 nicht zugekommen sein sollten, hiervon baldigst der Akademie Anzeige zu machen. Eine Berücksichtigung etwaiger Reclamationen kann nur in Aussicht genommen werden, wenn dieselben spätestens bis zum Ende des Jahres 1882 angebracht werden.

ANZEIGE.

Vom 1. Januar d. J. gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften Berlin, statt ihrer bisherigen »Monatsberichte«, wöchentliche »Sitzungsberichte« heraus. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Auszuge auf der zweiten Seite (Umschlages der »Sitzungsberichte« abgedruckt.

Um dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Leserkreise den ihn näher interessierenden Theil des Stoffes der »Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzubieten, wurde beschlossen, einen Auszug aus diesen Berichten unter dem Titel:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN

AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN

herauszugeben. Diese Sonderausgabe wird sämtliche Arbeiten aus dem Gebiete der reinen Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und beobachtenden Naturwissenschaften in vollständigem Abdruck enthalten, welche in Sitzungen der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr fremden Verfassern mitgetheilt oder in »Sitzungsberichten« aufgenommen wurden. Auch demselben Gebiete angehörige mathematische Berichte, Preis-Aufgaben und -Ertheilungen, Adressen, Reden und dergleichen finden darin Platz. Die »Mittheilungen« erhalten besondere Paginirung, doch ist auf jeder Seite eingeklammert die entsprechende Seitenzahl der »Sitzungsberichte« und bei dem Titel jeder Mittheilung die römische Ordnungszahl des Stückes (St.) angegeben, dem sie entlehnt ist.

Die »Mittheilungen« erscheinen vom 1. Januar d. J. ab bis auf Weiteres in Monatsheften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Stück wird in der Regel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Perpetuelle Bibliotheken, Gesellschaften und Instituten, welche bisher die »Monatsberichte« empfangen, sind frei, statt der vollständigen »Sitzungsberichte« fortan nur die »Mathematischen und naturwissenschaftlichen Mittheilungen aus den Sitzungsberichten« sich zuschicken zu lassen, und sie werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat so bald als möglich Nachricht zu geben. Wegen des buchhändlerischen Bezuges der »Mittheilungen« siehe unten.

In Commission bei FERD. DÜMMLER'S Verlagsbuchhandlung (HARRWITZ & GOSSE) in Berlin erscheinen:

SITZUNGSBERICHTE

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 12 M.

Diese an Stelle der bisherigen »Monatsberichte« der Akademie getretenen »Sitzungsberichte« erscheinen in Zwischenräumen von acht Tagen, und enthalten sämtliche zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen und wissenschaftlichen Mittheilungen, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.

Getrennt von denselben erscheinen ausserdem, ebenda in Commission:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN

AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER


KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 8 M.

Dieselben erscheinen in monatlichen Zwischenräumen und enthalten nur die geschäftlichen und die wissenschaftlichen Mittheilungen aus dem Gebiete der Mathematik wie der Naturwissenschaft im weitesten Sinne, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.

3

C. 5.




SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

XXXIX.

MIT EINER TAFEL.

19. OCTOBER 1882.



BERLIN 1882.
VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.
IN COMMISSION IN FERD. DÜMMLER'S VERLAGS-BUCHHANDLUNG
HARRWITZ UND GOSSMANN.

Mein Wunsch ist, die Akademie 1911 haben die Mitgliedschaft der
Preussischen Akademie der Wissenschaften zu erheben und
es sollen diese Mitgliedschaften sein, die welche unter anderen
Bestimmungen sein.

[illegible]

2. Die Besprechungen in einzelnen Fächern in Gemeinschaft mit regelmäßiger Donnerstagabend Tagung nach jeder Sitzung. Die Besprechungen in einem Klassenrat sind während dieser ersten vierzehn Tage mit dem folgenden Programm. Die einzelnen Fächer wurden in einem ersten Teil des Bandes (siehe Memorandum) beschrieben, der hier nun fortgesetzt folgende Unterrichtsgegenstände und erste Besprechungen über thematisieren der pädagogischen Bedeutung (siehe Tabelle, Seite 12). Die Besprechungen der folgenden Tage werden nach Klasse und nach Fächern.

2

1. Jeder Staatsbürger erhält ein Lebensjahr über das hinaus fortgesetzten wissenschaftlichen Unterrichts und die dafür erforderliche Ausbildung gegen von der öffentlichen Angelegenheiten.

2. Inwieweit führt die den Sitzungsbemessung über-
wiesenen minderenständigen Anwesenheit und zwar in der
Regel, wenn die in der Sitzung, als der die Sitzung ge-
wöhnlichst stattfindet, dann die, welche in der Sitzung
Sitzungen miteinleitet, in den zu diesen Sitzungen ge-
hörigen Fällen nicht stehen zu können.

2 1

2. Das Verzeichnis der eingereichten Druckschriften wird als Verzeichnis ausgegeben.

1 25

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte bestimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder, sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung eines ihrem Fache angehörigen ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. Einwendungen auswärtiger oder correspondirender Mitglieder, welche direct bei der Gesamtakademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mitglied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem zumhast geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesamtschule oder die Klasse die Aufnahme der Mittheilung in die akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 5.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten im Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesamtkademie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschaltenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Neuvergebenes Personal werden. Der Be-
stellung wird eine Erklärung vom 10. Sept.
1941 einzureichenden. Einmalige Entlohnung
für einen bestimmten Zeitraum. Die volle
Lohnzahlung wird erst im

1

Die für die Staatsgewalt bestim-
mten Mittel und die in einem Ein-
satz des betreffenden Staats unter-
nommene oder auch in einem
besonderen gewaltsamen Verfahren sein
der Verfassung einer allgemeinen
Mittelung der Interessen einer
Nationen, so dem Besonderen und
dem der Einwirkung der Gesamtheit
betreffend diese.

25

3. Arbeitszeiten überschreiten nicht
Verfahren, sondern im Verfahren wird
auf Erreichung einer Mindestmenge nach

33

1 Neben der zehnjährigen Ausbildungszeit können bestimmte Kategorien von Mitarbeitern auch absteigend in der Wertung und Bezahlung zur Sonderstufe und Pensionierung vorgesehen und aus besonderen in den Einzelhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den «
lichen Mitteilungen» abgedruckten Arbeit
zeitlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem
welchem der Titel der Arbeit wiederholt

2. Dem Verfasser steht frei, auf seiner gleichge Separatabdrücke bis zur Zahl von 100 zu unentgeltlicher eigener Vertheilung lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem Secretar Anzeige gemacht hat.

23.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung des Secretar zusammen, welcher darin den Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Ausführung und den Druck der in dem gleichen Sinne wissenschastlichen Arbeiten; in dem letzten heisst er der redigierende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den geschäftlichen Theil der Sitzungsberichte verantwortlich. Für alle übrigen Theile derselben ist jeder Richtung nur die Verfasser verantwortlich.

VERZEICHNISS DER »WISSENSCHAFTLICHEN MITTHEILUNGEN«
zu St. XLVI und XLVII.

	Seite
ITSCH: Bericht über eine Reise zur Untersuchung der in den Museen Englands und Hollands vorhandenen Torpedineen	1007
DYSEN: Zum Finanzwesen des Dionysios von Syrakus	1013

ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE

aus den Jahren 1879, 1880 und 1881.

(In Commission in FERD. DÜMMLER's Verlagsbuchhandlung.)

NIELSBERG: Über die chemische Natur der Meteoriten. 2. Abtheilung	M. 3.00
N: Beiträge zur Petrographie der plutonischen Gesteine. 3. Abtheilung	9.00
HOW: Beiträge zur Landeskunde der Troas	10.00
OTT: Kitai und Karakitai, ein Beitrag zur Geschichte Ost- und Innerasiens	1.00
BOER, P.: Codicis Theodosiani fragmenta Taurinensia	5.00
TIUS: Das archaische Bronzerelief aus Olympia	2.50
HEIMANN: Die Ordinal-Zahlen der mexicanischen Sprache	2.50
HANN: Über die Wiener und Heidelberger Handschrift des Otfrid	3.00
KADER: Zur Kritik der Inschriften Tiglath-Pileser's II., des Asarhaddon und des Asurbanipal	3.00
HANN: Zur Geschichte des Axumitischen Reichs im vierten bis sechsten Jahrhundert	2.50
BAU, E.: Über die Lage von Tigranokerta	5.50
UT: Über Veränderung der Wasserstände in den Preussischen Strömen	1.50
LEN: Über die Anfänge der Heroiden des Ovid	1.50
IZ: Über eine alte Genealogie der Welfen	0.80
UT: Über ein chinesisches Mongwerk, nebst einem Anhang linguistischer Verbesserungen zu zwei Bänden der Erdkunde Ritter's	2.00
IZ: Über die Messung psychischer Vorgänge	0.80
HOW: Über die Weddas von Ceylon und ihre Beziehungen zu den Nachbarstämmen	8.00
IZ: Der Tempel der Athena Polias zu Pergamon	2.00

AND, ERNST: Leibnizens und Huygens' Briefwechsel mit Papin, nebst der Biographie Papin's und einigen zugehörigen Briefen und Actenstücken. Auf Kosten der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften herausgegeben. Berlin 1881 M. 13.50

Zur gefälligen Beachtung.

Diejenigen Empfänger der Monatsberichte, welche Exemplare von der Akademie direct erhalten, ersucht, falls ihnen Theile des Jahrgangs 1881 nicht zugekommen sein sollten, hiervon baldigst Akademie Anzeige zu machen. Eine Berücksichtigung etwaiger Reclamationen kann nur in Aussicht werden, wenn dieselben spätestens bis zum Ende des Jahres 1882 angebracht werden.

ANZEIGE.

Vom 1. Januar d. J. gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften Berlin, statt ihrer bisherigen »Monatsberichte«, wöchentliche »Sitzungsberichte«. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Auszuge auf der zweiten Umschlages der »Sitzungsberichte« abgedruckt.

Um dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Leserkreise den ihm zugehörenden Theil des Stoffes der »Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzustellen, wurde beschlossen, einen Auszug aus diesen Berichten unter dem Titel:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN

AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN

herauszugeben. Diese Sonderausgabe wird sämmtliche Arbeiten aus dem Gebiete der reinen Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und beobachtenden Naturwissenschaften in vollständigem Abdruck enthalten, welche in den Sitzungsberichten der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr fremden Verfassern mitgetheilt worden. Auch demselben Gebiet angehörige Preis-Aufgaben und -Ertheilungen, Adressen, Reden und Vorträge finden darin Platz. Die »Mittheilungen« erhalten besondere Paginirung, und auf jeder Seite eingeklammert die entsprechende Seitenzahl der »Sitzungsberichte« und bei dem Titel jeder Mittheilung die römische Ordnungszahl des Stückes, dem sie entlehnt ist.

Die »Mittheilungen« erscheinen vom 1. Januar d. J. ab bis auf Weiteres in Heften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörende wird in der Regel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Gesellschaften und Instituten, welche bisher die »Monatsberichte« empfangen, wird frei, statt der vollständigen »Sitzungsberichte« fortan nur die »Mathematischen und naturwissenschaftlichen Mittheilungen aus den Sitzungsberichten« zu beziehen, und sie werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat so früh als möglich Nachricht zu geben. Wegen des buchhändlerischen Bezuges der Mittheilungen siehe unten.

In Commission bei FERD. DÜMLER'S Verlagsbuchhandlung (HARRWITZ & SCHMIDT) in Berlin erscheinen:

SITZUNGSBERICHTE

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 12 M.

Diese an Stelle der bisherigen »Monatsberichte« der Akademie getretenen »Sitzungsberichte« erscheinen in Zwischenräumen von acht Tagen, und enthalten sämmtliche zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen und wissenschaftlichen Mittheilungen, welche in den Sitzungsberichten der Akademie gemacht wurden.

Getrennt von denselben erscheinen ausserdem, ebenda in Commission:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN

AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 8 M.

Dieselben erscheinen in monatlichen Zwischenräumen und enthalten nur die wissenschaftlichen Mittheilungen aus dem Gebiete der Mathematik und der Naturwissenschaft im weitesten Sinne, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht

C. 5

SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

XL. XII.

MIT EINER TAFEL.

26. OCTOBER 1882.



BERLIN 1882.

VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

IN COMMISSION IN FERD. DÜMMLER'S VERLAGS-BUCHHANDLUNG
HARWITZ UND GOSSMANN.

Anzeige.

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die Redaction der »Sitzungsberichte«.)

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-Octav regelmässig Donnerstags acht Tage nach jeder Sitzung. Die sämmtlichen zu einem Kalenderjahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungsnummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physikalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über Sitzungen der philosophisch-historischen Classe ungerade Nummern.

§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Uebersicht über die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mittheilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten überwiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört, druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehörigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte bestimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder, sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspondirender Mitglieder, welche direct bei der Gesamtakademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mitglied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesamtakademie oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses Umfangs beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesamtakademie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschaltenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Nothwendiges beschränkt werden. Der Schluss theilung wird erst begonnen, wenn die für den Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig; besonders beizugebenden Tafeln die volle Auflage eingeleistet ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaftliche Mittheilung darf in keinem Falle ohne die Genehmigung des betreffenden Stückes anderweitig nur auszugsweise oder auch in weiterer deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden, wenn der Verfasser einer aufgenommenen Mittheilung diese anderweitig früher zu veröffentlichen beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich mit der Einwilligung der Gesamtakademie der betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf Verlangen verschickt. Die Verfasser von Mittheilungen, welche auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungsberichte können bestimmte Kategorien von Mittheilungen auch abgesondert in der Buchhandlung zu haben sein, wenn dieselben mit Sondertitel und Paginirung versehen und mit besonderem Aufdruck in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den in den Sitzungsberichten abgedruckten Mittheilungen giltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Titel, welchem der Titel der Arbeit wiederholt.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Mittheilung gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von 100 zu unentgeltlicher eigener Vertheilung lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem Secretar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung des Secretar zusammen, welcher darin den Namen des Verfassers, die Rubricirung der Mittheilung und den Druck der in dem gleichen Stücken enthaltenen wissenschaftlichen Arbeiten; in der Sitzung heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für die Mittheilungen der Sitzungsberichte verantwortlich. Für alle übrigen Theile der Sitzungsberichte ist jeder Richtung nur die Verfasser

ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE

aus den Jahren 1879, 1880 und 1881.

(In Commission in FERD. DÜMLER's Verlagsbuchhandlung.)

AMELSBERG: Über die chemische Natur der Meteoriten. 2. Abtheilung	M. 3.00
BE: Beiträge zur Petrographie der plutonischen Gesteine. 3. Abtheilung	9.00
CHOW: Beiträge zur Landeskunde der Troas	10.00
OTT: Kitai und Karakitai, ein Beitrag zur Geschichte Ost- und Innerasiens	1.00
JOER, P.: Codicis Theodosiani fragmenta Taurinensia	5.00
TIUS: Das archaische Bronzerelief aus Olympia	2.50
SCHMANN: Die Ordinal-Zahlen der mexicanischen Sprache	2.50
SMANN: Über die Wiener und Heidelberger Handschrift des Otfrid	3.00
RADE: Zur Kritik der Inschriften Tiglath-Pileser's II., des Asarhaddon und des Asurbanipal	3.00
SMANN: Zur Geschichte des Axumitischen Reichs im vierten bis sechsten Jahrhundert	2.50
HAU, E.: Über die Lage von Tigranokerta	5.50
SEN: Über Veränderung der Wasserstände in den Preussischen Strömen	1.50
ELEN: Über die Anfänge der Heroiden des Ovid	1.50
ITZ: Über eine alte Genealogie der Welfen	0.80
OTT: Über ein chinesisches Mengwerk, nebst einem Anhang linguistischer Verbesserungen zu zwei Bänden der Erdkunde Ritter's	2.00
LER: Über die Messung psychischer Vorgänge	0.80
CHOW: Über die Weddas von Ceylon und ihre Beziehungen zu den Nachbarstämmen	8.00
ST: Der Tempel der Athena Polias zu Pergamon	2.00

LAND, ERNST: Leibnizens und Huygens' Briefwechsel mit Papin, nebst der Biographie Papin's und einigen
zugehörigen Briefen und Actenstücken. Auf Kosten der Königlich Preussischen Akademie der Wissen-
schaften herausgegeben. Berlin 1881 M. 13.50

Zur gefälligen Beachtung.

*Diejenigen Empfänger der Monatsberichte, welche Exemplare von der Akademie direct erhalten,
ersucht, falls ihnen Theile des Jahrgangs 1881 nicht zugekommen sein sollten, hiervon baldigst
Akademie Anzeige zu machen. Eine Berücksichtigung etwaiger Reclamationen kann nur in Aussicht
werden, wenn dieselben spätestens bis zum Ende des Jahres 1882 angebracht werden.*

ZU BERLIN

herauszugeben. Diese Sonderausgabe wird sämtliche Arbeiten aus der reinen Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und in den Naturwissenschaften in vollständigem Abdruck enthalten, welche in der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr fremden Verfassern mitgetheilt worden. Auch demselben Gebiet angehörige Berichte, Preis-Aufgaben und -Ertheilungen, Adressen, Reden und finden darin Platz. Die »Mittheilungen« erhalten besondere Paginirung auf jeder Seite eingeklammert die entsprechende Seitenzahl der »Sitzungsberichte« und bei dem Titel jeder Mittheilung die römische Ordnungszahl des Stücks, dem sie entlehnt ist.

Die »Mittheilungen« erscheinen vom 1. Januar d. J. ab bis auf Weiteres in Heften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige wird in der Regel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Gesellschaften und Instituten, welche bisher die »Monatsberichte« empfingen, sind frei, statt der vollständigen »Sitzungsberichte« fortan nur die »Mathematischen und naturwissenschaftlichen Mittheilungen« aus den Sitzungsberichten zu beziehen, und sie werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat möglichst Nachricht zu geben. Wegen des buchhändlerischen Bezuges »Mittheilungen« siehe unten.

In Commission bei FERD. DÜMMLER'S Verlagsbuchhandlung (HARRWITZ) in Berlin erscheinen:

SITZUNGSBERICHTE DER KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN.


Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 12. M.

Diese an Stelle der bisherigen »Monatsberichte« der Akademie getretenen »Sitzungsberichte« erscheinen in Zwischenräumen von acht Tagen, und enthalten sämtliche zur Verfügung geeigneten geschäftlichen und wissenschaftlichen Mittheilungen, welche in der Akademie gemacht wurden.

Getrennt von denselben erscheinen ausserdem, ebenda in Commission:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN

C 5



SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

XIII.

2. NOVEMBER 1882.

BERLIN 1882.

VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

IN COMMISSION IN FERD. DÜMMLER'S VERLAGS-BUCHHANDLUNG
HARRWITZ UND GOSSMANN.

Anzeige.

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die Redaction der »Sitzungsberichte«.)

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-Octav regelmässig Donnerstags acht Tage nach jeder Sitzung. Die sämmtlichen zu einem Kalenderjahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungsnummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physikalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über Sitzungen der philosophisch-historischen Classe ungerade Nummern.

§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Uebersicht über die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mittheilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten überwiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört, druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehörigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte bestimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder, sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung eines ihrem Fache angehörnden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspondirender Mitglieder, welche direct bei der Gesamtkademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mitglied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesamtkademie oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses Umfangs beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesamtkademie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschaltenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Nothwendiges beschränkt werden. Der Schluss theilung wird erst begonnen, wenn die 36 Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig besonders beizugebenden Tafeln die volle Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmtschaftliche Mittheilung darf in keinem Fall gabe des betreffenden Stückes anderweitig nur auszugsweise oder auch in weiterer deutscher Sprache veröffentlicht sein oder von der Verfasser einer aufgenommenen Mittheilung diese anderweit früher beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich mit dazu der Einwilligung der Gesamtkademie betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur Verlangen verschickt. Die Verfasser von auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungsberichte können bestimmte Kategorien von Mittheilungen auch abgesondert in der Buchhandlung werden, dass dieselben mit Sondertiteln und Paginirung versehen und mit besonderem in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den Sitzungsberichten abgedruckten Arbeit erhält fünfzig Sonderabdrücke mit einem Titel, welchem der Titel der Arbeit wiederholt.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von 100 zu unentgeltlicher eigener Vertheilung lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem Secretar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung fasst der Secretar zusammen, welcher darin den Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redaction und den Druck der in dem gleichem nenden wissenschaftlichen Arbeiten; in der Regel heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den geschäftlichen Theil der Sitzungsberichte verantwortlich. Für alle übrigen Theile derselben ist jeder Richtung nur die Verfasser verantwortlich.

VERZEICHNISS DER »WISSENSCHAFTLICHEN MITTHEILUNGEN«

zu St. XLIX und L.

	Seite
ALLER: Über die Lehre des Aristoteles von der Ewigkeit des Geistes	1033
OMICKER: Über die Composition Abelscher Gleichungen	1059
ERBECK: Über die Phasenunterschiede elektrischer Schwingungen.	1065

ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE

aus den Jahren 1879, 1880 und 1881.

(In Commission in FERD. DÜMLER'S Verlagsbuchhandlung.)

EMELSBURG: Über die chemische Natur der Meteoriten. 2. Abtheilung.	M. 3.00
■: Beiträge zur Petrographie der plutonischen Gesteine. 3. Abtheilung	9.00
HOW: Beiträge zur Landeskunde der Troas	10.00
OTT: Kitai und Karakitai, ein Beitrag zur Geschichte Ost- und Innerasiens	1.00
ROER, P.: Codicis Theodosiani fragmenta Taurinensia	5.00
RIUS: Das archaische Bronzerelief aus Olympia	2.50
RIEMANN: Die Ordinal-Zahlen der mexicanischen Sprache	2.50
RIEMANN: Über die Wiener und Heidelberger Handschrift des Otfrid	3.00
RIEDER: Zur Kritik der Inschriften Tiglath-Pileser's II., des Asarhaddon und des Asurbanipal	3.00
RIEMANN: Zur Geschichte des Axumitischen Reichs im vierten bis sechsten Jahrhundert	2.50
RIEDER, E.: Über die Lage von Tigranokerta	5.50
RIEDER: Über Veränderung der Wasserstände in den Preussischen Strömen	1.50
RIEDER: Über die Anfänge der Heroiden des Ovid	1.50
RIEDER: Über eine alte Genealogie der Welfen	0.80
RIEDER: Über ein chinesisches Mengwerk, nebst einem Anhang linguistischer Verbesserungen zu zwei Bänden der Erdkunde Ritter's	2.00
RIEDER: Über die Messung psychischer Vorgänge	0.80
RIEDER: Über die Weddas von Ceylon und ihre Beziehungen zu den Nachbarstämmen	8.00
RIEDER: Der Tempel der Athena Polias zu Pergamon	2.00

AND, ERNST: Leibnizens und Huygens' Briefwechsel mit Papin, nebst der Biographie Papin's und einigen zugehörigen Briefen und Actenstücken. Auf Kosten der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften herausgegeben. Berlin 1881 M. 13.50

Zur gefälligen Beachtung.

Diejenigen Empfänger der Monatsberichte, welche Exemplare von der Akademie direct erhalten, ersucht, falls ihnen Theile des Jahrgangs 1881 nicht zugekommen sein sollten, hiervon baldigst der Akademie Anzeige zu machen. Eine Berücksichtigung etwaiger Reclamationen kann nur in Aussicht werden, wenn dieselben spätestens bis zum Ende des Jahres 1882 angebracht werden.

ANZEIGE.

Vom 1. Januar d. J. gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin, statt ihrer bisherigen »Monatsberichte«, wöchentliche »Sitzungsberichte«. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Auszuge auf der zweiten Seite des Umschlages der »Sitzungsberichte« abgedruckt.

Um dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Leserkreise den ihn näher gehenden Theil des Stoffes der »Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzustellen, wurde beschlossen, einen Auszug aus diesen Berichten unter dem Titel:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN

AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN

herauszugeben. Diese Sonderausgabe wird sämtliche Arbeiten aus dem Gebiete der reinen Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und beobachteten Naturwissenschaften in vollständigem Abdruck enthalten, welche in den Sitzungen der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr fremden Verfassern mitgetheilt und in den »Sitzungsberichten« aufgenommen wurden. Auch demselben Gebiete angehörige geographische Berichte, Preis-Aufgaben und -Ertheilungen, Adressen, Reden und dergl. finden darin Platz. Die »Mittheilungen« erhalten besondere Paginirung, doch ist auf jeder Seite eingeklammert die entsprechende Seitenzahl der »Sitzungsberichte« und bei dem Titel jeder Mittheilung die römische Ordnungszahl des Stückes (S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000).

Die »Mittheilungen« erscheinen vom 1. Januar d. J. ab bis auf Weiteres in 12 Hefen, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Heft wird in der Regel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Per Post an die Gesellschaften und Institute, welche bisher die »Monatsberichte« empfingen, ist es frei, statt der vollständigen »Sitzungsberichte« fortan nur die »Mathematischen und naturwissenschaftlichen Mittheilungen aus den Sitzungsberichten« sich zuschicken zu lassen, und sie werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat so bald als möglich Nachricht zu geben. Wegen des buchhändlerischen Bezuges der »Mittheilungen« siehe unten.

In Commission bei FERD. DÜNNLER's Verlagsbuchhandlung (HARRWITZ & GOSCHKE) in Berlin erscheinen:

SITZUNGSBERICHTE

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 12 M.

Diese an Stelle der bisherigen »Monatsberichte« der Akademie getretenen »Sitzungsberichte« erscheinen in Zwischenräumen von acht Tagen, und enthalten sämtliche zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen und wissenschaftlichen Mittheilungen, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.

Getrennt von denselben erscheinen ausserdem, ebenda in Commission:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN

AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 8 M.

Dieselben erscheinen in monatlichen Zwischenräumen und enthalten nur die geschäftlichen und die wissenschaftlichen Mittheilungen aus dem Gebiete der Mathematik wie der Naturwissenschaft im weitesten Sinne, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.

SITZUNGSBERICHTE

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN



AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

XLVI. XLVII.

23. NOVEMBER 1882.

BERLIN 1882.

VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

IN COMMISSION IN FERD. DÜMLER'S VERLAGS-BUCHHANDLUNG
HARRWITZ UND GOSSMANN.

Anzeige.

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich-Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die Redaction der »Sitzungsberichte«.)

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-Octav regelmässig Donnerstags acht Tage nach jeder Sitzung. Die sämtlichen zu einem Kalenderjahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungsnummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physikalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über Sitzungen der philosophisch-historischen Classe ungerade Nummern.

§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Uebersicht über die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mittheilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten überwiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört, druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehörigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte bestimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder, sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspondirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammtakademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mitglied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses Umfangs beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtakademie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschaltenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz der Mittheilung wird erst begonnen, wenn die Stiche des Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind, besonders beizugebenden Tafeln die volle erste Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaftliche Mittheilung darf in keinem Falle vor Ausgabe des betreffenden Stückes anderweitig, sei es nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausfuhr deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden, wenn der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich ansteht, dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach Ablauf

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungsberichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher Mittheilungen auch abgesondert in der Weise veröffentlicht werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender Paginirung versehen und mit besonderem Vermerk in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den »Wissenschaftlichen Mittheilungen« abgedruckten Arbeit erhält gegen Entgelt fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von noch mehr zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abzulassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden Secretar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung des Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz führt, derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redaction und den Druck der in dem gleichen Stück enthaltenen wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenschaft heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den geschäftlichen Theil der Sitzungsberichte verantwortlich. Für alle übrigen Theile derselben ist jeder Richtung nur die Verfasser verant-

**VERZEICHNISS DER »WISSENSCHAFTLICHEN MITTHEILUNGEN«
zu St. XLVI und XLVII.**

	Seite
TSCH: Bericht über eine Reise zur Untersuchung der in den Museen Englands und Hollands vorhandenen Torpedineen	1007
YSEN: Zum Finanzwesen des Dionysios von Syrakus	1013

**ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE
aus den Jahren 1879, 1880 und 1881.
(In Commission in FERD. DÜMLER's Verlagsbuchhandlung.)**

HELSBERG: Über die chemische Natur der Meteoriten. 2. Abtheilung	M. 3.00
H: Beiträge zur Petrographie der plutonischen Gesteine. 3. Abtheilung	9.00
HOW: Beiträge zur Landeskunde der Troas	10.00
MTT: Kitai und Karakitai, ein Beitrag zur Geschichte Ost- und Innerasiens	1.00
ROGER, P.: Codicis Theodosiani fragmenta Taurinensia	5.00
TIUS: Das archaische Bronzerelief aus Olympia	2.50
HEMANN: Die Ordinal-Zahlen der mexicanischen Sprache	2.50
HANN: Über die Wiener und Heidelberger Handschrift des Otfrid	3.00
LADER: Zur Kritik der Inschriften Tiglath-Pileser's II., des Asarhaddon und des Asurbanipal	3.00
HANN: Zur Geschichte des Axumitischen Reichs im vierten bis sechsten Jahrhundert	2.50
BAU, E.: Über die Lage von Tigranokerta	5.50
EN: Über Veränderung der Wasserstände in den Preussischen Strömen	1.50
EN: Über die Anfänge der Heroiden des Ovid	1.50
ITZ: Über eine alte Genealogie der Welfen	0.80
MTT: Über ein chinesisches Mengwerk, nebst einem Anhang linguistischer Verbesserungen zu zwei Bänden der Erdkunde Ritter's	2.00
ER: Über die Messung psychischer Vorgänge	0.80
HOW: Über die Weddas von Ceylon und ihre Beziehungen zu den Nachbarstämmen	8.00
ITZ: Der Tempel der Athena Polias zu Pergamon	2.00
AND, EANST: Leibnizens und Huygens' Briefwechsel mit Papin, nebst der Biographie Papin's und einigen zugehörigen Briefen und Actenstücken. Auf Kosten der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften herausgegeben. Berlin 1881	
	M. 13.50

Zur gefälligen Beachtung.

Diejenigen Empfänger der Monatsberichte, welche Exemplare von der Akademie direct erhalten, ersucht, falls ihnen Theile des Jahrgangs 1881 nicht zugekommen sein sollten, hiervon baldigst Akademie Anzeige zu machen. Eine Berücksichtigung etwaiger Reclamationen kann nur in Aussicht werden, wenn dieselben spätestens bis zum Ende des Jahres 1882 angebracht werden.

ANZEIGE.

Vom 1. Januar d. J. gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin, statt ihrer bisherigen »Monatsberichte«, wöchentliche »Sitzungsberichte« heraus. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Auszuge auf der zweiten Seite des Umschlages der »Sitzungsberichte« abgedruckt.

Um dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Leserkreise den ihn näher interessierenden Theil des Stoffes der »Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzubieten, wurde beschlossen, einen Auszug aus diesen Berichten unter dem Titel:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN

AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN

herauszugeben. Diese Sonderausgabe wird sämmtliche Arbeiten aus dem Gebiet der reinen Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und beobachtenden Naturwissenschaften in vollständigem Abdruck enthalten, welche in Sitzungen der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr fremden Verfassern mitgetheilt in den »Sitzungsberichten« aufgenommen wurden. Auch demselben Gebiet angehörige geschäftliche Berichte, Preis-Aufgaben und -Ertheilungen, Adressen, Reden und dergl. mehr finden darin Platz. Die »Mittheilungen« erhalten besondere Paginirung, doch steht auf jeder Seite eingeklammert die entsprechende Seitenzahl der »Sitzungsberichte« und bei dem Titel jeder Mittheilung die römische Ordnungszahl des Stückes (St.) der Berichte, dem sie entlehnt ist.

Die »Mittheilungen« erscheinen vom 1. Januar d. J. ab bis auf Weiteres in Monatsheften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Stück wird in der Regel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Personen, Gesellschaften und Instituten, welche bisher die »Monatsberichte« empfangen, stehen frei, statt der vollständigen »Sitzungsberichte« fortan nur die »Mathematischen und naturwissenschaftlichen Mittheilungen« aus den Sitzungsberichten sich zuschicken zu lassen, und sie werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat so bald wie möglich Nachricht zu geben. Wegen des buchhändlerischen Bezuges der »Mittheilungen« siehe unten.

In Commission bei FERD. DÜMLER'S Verlagsbuchhandlung (HARRWITZ & GOSSNER) in Berlin erscheinen:

SITZUNGSBERICHTE

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 12 M.

Diese an Stelle der bisherigen »Monatsberichte« der Akademie getretenen »Sitzungsberichte« erscheinen in Zwischenräumen von acht Tagen, und enthalten sämmtliche zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen und wissenschaftlichen Mittheilungen, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.

Getrennt von denselben erscheinen ausserdem, ebenda in Commission:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN

AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 8 M.

Dieselben erscheinen in monatlichen Zwischenräumen und enthalten nur die geschäftlichen und die wissenschaftlichen Mittheilungen aus dem Gebiete der Mathematik wie der Naturwissenschaft im weitesten Sinne, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.

IN COMMISSION IN FERD. DÜMLER'S VERLAGS-BUCHHANDLUNG
HARRWITZ UND GESSMANN.

Anzeige.

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die Redaction der »Sitzungsberichte«.)

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-Octav regelmässig Donnerstags acht Tage nach jeder Sitzung. Die sämtlichen zu einem Kalenderjahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungsnummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physikalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über Sitzungen der philosophisch-historischen Classe ungerade Nummern.

§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Uebersicht über die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mittheilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten überwiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört, druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehörigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte bestimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder, sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspondirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammtakademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mitglied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtakademie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschaltenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Notwendiges beschränkt werden. Der Satztheilung wird erst begonnen, wenn die Titel Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig und besonders beizugebenden Tafeln die volle Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte Mittheilung darf in keinem Falle gabe des betreffenden Stückes anderweitig, nur auszugsweise oder auch in weiterer deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden, wenn der Verfasser einer aufgenommenen Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, ohne die Einwilligung der Gesammtakademie oder der betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf Verlangen verschickt. Die Verfasser werden auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungsberichte können bestimmte Kategorien von Mittheilungen auch abgesondert in der Welt veröffentlicht werden, dass dieselben mit Sondertitel und Paginirung versehen und mit besonderem Vorzug in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den wissenschaftlichen Mittheilungen abgedruckten Arbeit ist berechtigt fünfzig Sonderabdrücke mit einem Uebersichtstafel, welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von noch zu unentgeltlicher eigener Vertheilung zu lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem vorsitzenden Secretar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung des Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz führt, und den Druck der in dem gleichen Sitzungsnote nennenden wissenschaftlichen Arbeiten; in diesen Sitzungen heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den geschäftlichen Theil der Sitzungsberichte verantwortlich. Für alle übrigen Theile derselben ist jeder Richtung nur die Verfasser verantwortlich.

ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE

aus den Jahren 1879, 1880 und 1881.

(In Commission in FERD. DÜMLER's Verlagsbuchhandlung.)

LSBERG: Über die chemische Natur der Meteoriten. 2. Abtheilung	ℳ 3.00
Beiträge zur Petrographie der plutonischen Gesteine. 3. Abtheilung	9.00
w: Beiträge zur Landeskunde der Troas	10.00
: Kitai und Karakitai, ein Beitrag zur Geschichte Ost- und Innerasiens	1.00
ER, P.: Codicis Theodosiani fragmenta Taurinensia	5.00
: Das archaische Bronzerelief aus Olympia	2.50
ANN: Die Ordinal-Zahlen der mexicanischen Sprache	2.50
EN: Über die Wiener und Heidelberger Handschrift des Otfrid	3.00
ER: Zur Kritik der Inschriften Tiglath-Pileser's II., des Asarhaddon und des Asurbanipal	3.00
EN: Zur Geschichte des Axumitischen Reichs im vierten bis sechsten Jahrhundert	2.50
U, E.: Über die Lage von Tigranokerta	5.50
: Über Veränderung der Wasserstände in den Preussischen Strömen	1.50
: Über die Anfänge der Heroiden des Ovid	1.50
: Über eine alte Genealogie der Welfen	0.80
: Über ein chinesisches Mengwerk, nebst einem Anhang linguistischer Verbesserungen zu zwei Bänden der Erdkunde Ritter's	2.00
: Über die Messung psychischer Vorgänge	0.80
w: Über die Weddas von Ceylon und ihre Beziehungen zu den Nachbarstämmen	8.00
Der Tempel der Athena Polias zu Pergamon	2.00

D, ERNST: Leibnizens und Huygens' Briefwechsel mit Papin, nebst der Biographie Papin's und einigen
zugehörigen Briefen und Actenstücken. Auf Kosten der Königlich Preussischen Akademie der Wissen-
schaften herausgegeben. Berlin 1881 ℳ 13.50

Zur gefälligen Beachtung.

*Jejenigen Empfänger der Monatsberichte, welche Exemplare von der Akademie direct erhalten,
ersucht, falls ihnen Theile des Jahrgangs 1881 nicht zugekommen sein sollten, hiervon baldigst
Akademie Anzeige zu machen. Eine Berücksichtigung etwaiger Reclamationen kann nur in Aussicht
werden, wenn dieselben spätestens bis zum Ende des Jahres 1882 angebracht werden.*

ANZEIGE.

Vom 1. Januar d. J. gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften Berlin, statt ihrer bisherigen »Monatsberichte«, wöchentliche »Sitzungsberichte«. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Auszuge auf der zweiten Seite Umschlages der »Sitzungsberichte« abgedruckt.

Um dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Leserkreise den ihn näher gehenden Theil des Stoffes der »Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzulegen wurde beschlossen, einen Auszug aus diesen Berichten unter dem Titel:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNG

AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN

herauszugeben. Diese Sonderausgabe wird sämtliche Arbeiten aus dem Gebiete der reinen Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und beobachteten Naturwissenschaften in vollständigem Abdruck enthalten welche in Sitzungen der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr fremden Verfassern mitgetheilt in »Sitzungsberichte« aufgenommen wurden. Auch demselben Gebiete angehörige gemeinnützliche Berichte, Preis-Aufgaben und -Ertheilungen, Adressen, Reden und dergleichen finden darin Platz. Die »Mittheilungen« erhalten besondere Paginirung, doch auf jeder Seite eingeklammert die entsprechende Seitenzahl der »Sitzungsberichte« und bei dem Titel jeder Mittheilung die römische Ordnungszahl des Stückes (St.) der »Sitzungsberichte«, dem sie entlehnt ist.

Die »Mittheilungen« erscheinen vom 1. Januar d. J. ab bis auf Weiteres in Monatsheften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Heft wird in der Regel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Für die Gesellschaften und Instituten, welche bisher die »Monatsberichte« empfangen, ist dies frei, statt der vollständigen »Sitzungsberichte« fortan nur die »Mathematischen und naturwissenschaftlichen Mittheilungen aus den Sitzungsberichten« sich zuschicken lassen, und sie werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat so bald als möglich Nachricht zu geben. Wegen des buchhändlerischen Bezuges der »Mittheilungen« siehe unten.

In Commission bei FERD. DÜMMLER'S Verlagsbuchhandlung (HARRWITZ & GOSWAMI) in Berlin erscheinen:

SITZUNGSBERICHTE

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 12 M.

Diese an Stelle der bisherigen »Monatsberichte« der Akademie getretenen »Sitzungsberichte« erscheinen in Zwischenräumen von acht Tagen, und enthalten sämtliche zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen und wissenschaftlichen Mittheilungen, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.

Getrennt von denselben erscheinen ausserdem, ebenda in Commission:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN

AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 8 M.

Dieselben erscheinen in monatlichen Zwischenräumen und enthalten nur die mathematischen und die wissenschaftlichen Mittheilungen aus dem Gebiete der Mathematik wie der Naturwissenschaft im weitesten Sinne, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.

SITZUNGSBERICHTE

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN



AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

XLVI. XLVII.

23. NOVEMBER 1882.

BERLIN 1882.

VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

IN COMMISSION IN FERD. DÜMMLER'S VERLAGS-BUCHHANDLUNG
HARRWITZ UND GOSSMANN.

Anzeige.

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der K. Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die Redaction der »Sitzungsberichte«.)

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-Octav **regelmässig Donnerstags acht Tage nach jeder Sitzung.** Die sämtlichen zu einem Kalenderjahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungsnummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physikalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über Sitzungen der philosophisch-historischen Classe ungerade Nummern.

§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Uebersicht über die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mittheilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten überwiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört, druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehörigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte bestimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder, sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspondirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammtakademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mitglied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses Umfangs beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtakademie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschaltenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satztheilung wird erst begonnen, wenn die Stiche des Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind, besonders beizugebenden Tafeln die volle Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte Mittheilung darf in keinem Falle die Ausgabe des betreffenden Stückes anderweitig, nur auszugsweise oder auch in weiterer deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden, wenn der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, oder wenn er nicht die Einwilligung der Gesammtakademie oder der betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf Verlangen verschickt. Die Verfasser von Mittheilungen, welche auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungsberichte können bestimmte Kategorien von Mittheilungen auch abgesondert in der Welt veröffentlicht werden, dass dieselben mit Sondertitel und Paginirung versehen und mit besonderem Vermerk in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den »Sitzungsberichten« abgedruckten Arbeit ist verpflichtet, fünfzig Sonderabdrücke mit einem Uebersichtstafel, auf welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird, zu liefern.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von noch zu unentgeltlicher eigener Vertheilung zu lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden Secretar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung des Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz führt, den Druck der in dem gleichen Stücken erschienenen wissenschaftlichen Arbeiten; in diesen heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den geschäftlichen Theil der Sitzungsberichte verantwortlich. Für alle übrigen Theile derselben ist jeder Richtung nur die Verfasser von

VERZEICHNISS DER »WISSENSCHAFTLICHEN MITTHEILUNGEN«

zu St. XLIX und L.

	Seite
ALLER: Über die Lehre des Aristoteles von der Ewigkeit des Geistes	1033
ONECKER: Über die Composition Abelscher Gleichungen	1059
ERBECK: Über die Phasenunterschiede elektrischer Schwingungen.	1065

ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE

aus den Jahren 1879, 1880 und 1881.

(In Commission in FERD. DÜMLER's Verlagsbuchhandlung.)

EMELSBURG: Über die chemische Natur der Meteoriten. 2. Abtheilung.	M. 3.00
W: Beiträge zur Petrographie der plutonischen Gesteine. 3. Abtheilung	9.00
SNOW: Beiträge zur Landeskunde der Troas	10.00
OTT: Kitai und Karakitai, ein Beitrag zur Geschichte Ost- und Innerasiens	1.00
TOGER, P.: Codicis Theodosiani fragmenta Taurinensia	5.00
KIUS: Das archaische Bronzerelief aus Olympia	2.50
HEIMANN: Die Ordinal-Zahlen der mexicanischen Sprache	2.50
HANN: Über die Wiener und Heidelberger Handschrift des Orfrid	3.00
RADER: Zur Kritik der Inschriften Tiglath-Pileser's II., des Asarhaddon und des Asurbanipal	3.00
HANN: Zur Geschichte des Axumitischen Reichs im vierten bis sechsten Jahrhundert	2.50
SAU, E.: Über die Lage von Tigranokerta	5.50
EN: Über Veränderung der Wasserstände in den Preussischen Strömen	1.50
EN: Über die Anfänge der Heroiden des Ovid	1.50
ET: Über eine alte Genealogie der Welfen	0.80
ET: Über ein chinesisches Mengwerk, nebst einem Anhang linguistischer Verbesserungen zu zwei Bänden der Erdkunde Ritter's	2.00
ER: Über die Messung psychischer Vorgänge	0.80
OW: Über die Weddas von Ceylon und ihre Beziehungen zu den Nachbarstämmen	8.00
Der Tempel der Athena Polias zu Pergamon	2.00

AND, ERNST: Leibnizens und Huygens' Briefwechsel mit Papin, nebst der Biographie Papin's und einigen zugehörigen Briefen und Actenstücken. Auf Kosten der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften herausgegeben. Berlin 1881 M. 13.50

Zur gefälligen Beachtung.

Diejenigen Empfänger der Monatsberichte, welche Exemplare von der Akademie direct erhalten, ersucht, falls ihnen Theile des Jahrgangs 1881 nicht zugekommen sein sollten, hiervon baldigst Akademie Anzeige zu machen. Eine Berücksichtigung etwaiger Reclamationen kann nur in Aussicht werden, wenn dieselben spätestens bis zum Ende des Jahres 1882 angebracht werden.

ANZEIGE.

Vom 1. Januar d. J. gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin, statt ihrer bisherigen »Monatsberichte«, wöchentliche »Sitzungsberichte«. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Auszuge auf der zweiten Seite des Umschlages der »Sitzungsberichte« abgedruckt.

Um dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Leserkreise den ihn näher gehenden Theil des Stoffes der »Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzustellen, wurde beschlossen, einen Auszug aus diesen Berichten unter dem Titel:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN

AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN

herauszugeben. Diese Sonderausgabe wird sämtliche Arbeiten aus dem Gebiete der reinen Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und beobachteten Naturwissenschaften in vollständigem Abdruck enthalten, welche in Sitzungsberichten der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr fremden Verfassern mitgetheilt worden. Auch demselben Gebiete angehörige geographische Berichte, Preis-Aufgaben und -Ertheilungen, Adressen, Reden und dergl. finden darin Platz. Die »Mittheilungen« erhalten besondere Paginirung, doch ist auf jeder Seite eingeklammert die entsprechende Seitenzahl der »Sitzungsberichte« und bei dem Titel jeder Mittheilung die römische Ordnungszahl des Stückes (Sitzungsberichtes, dem sie entlehnt ist).

Die »Mittheilungen« erscheinen vom 1. Januar d. J. ab bis auf Weiteres in Monatsheften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Heft wird in der Regel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Perpetuelle Abonnenten, Gesellschaften und Instituten, welche bisher die »Monatsberichte« empfingen, sind frei, statt der vollständigen »Sitzungsberichte« fortan nur die »Mathematischen und naturwissenschaftlichen Mittheilungen aus den Sitzungsberichten« sich zuschicken zu lassen, und sie werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat so bald als möglich Nachricht zu geben. Wegen des buchhändlerischen Bezuges der »Mittheilungen« siehe unten.

In Commission bei FERD. DÜMLER'S Verlagsbuchhandlung (HARRWITZ & GOSCHKE) in Berlin erscheinen:

SITZUNGSBERICHTE

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 12 M.

Diese an Stelle der bisherigen »Monatsberichte« der Akademie getretenen »Sitzungsberichte« erscheinen in Zwischenräumen von acht Tagen, und enthalten sämtliche zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen und wissenschaftlichen Mittheilungen, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.

Getrennt von denselben erscheinen ausserdem, ebenda in Commission:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN

AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 8 M.

Dieselben erscheinen in monatlichen Zwischenräumen und enthalten nur die geschäftlichen und die wissenschaftlichen Mittheilungen aus dem Gebiete der Mathematik wie der Naturwissenschaft im weitesten Sinne, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.

65.

SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.



XLVIII.

30. NOVEMBER 1882.

BERLIN 1882.

VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.
IN COMMISSION IN FERD. DÜMLER'S VERLAGS-BUCHHANDLUNG
HARROWITZ UND GOSSMANN.

Anzeige.

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königl. Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die Redaction der »Sitzungsberichte«.)

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-Octav regelmässig Donnerstags acht Tage nach jeder Sitzung. Die sämtlichen zu einem Kalenderjahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungsnummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physikalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über Sitzungen der philosophisch-historischen Classe ungerade Nummern.

§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Uebersicht über die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mittheilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten überwiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört, druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehörigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte bestimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder, sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung eines ihrem Fache angehörnden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspondirender Mitglieder, welche direct bei der Gesamtkademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mitglied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesamtkademie oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses Umfangs beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesamtkademie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschaltenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz der Mittheilung wird erst begonnen, wenn die Stücke des Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaftliche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe des betreffenden Stückes anderweitig, sei es nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausdehnung deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf dazu der Einwilligung der Gesamtkademie oder der betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf dem Verlangen verschickt. Die Verfasser verbleiben auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungsberichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher Mittheilungen auch abgesondert in der Weise gegeben werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender Paginirung versehen und mit besonderem Vermerk in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den »Wissenschaftlichen Mittheilungen« abgedruckten Arbeit erhält gegenlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umhüllchen, welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von noch zwölf zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abdrucken lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden Secretar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung des Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz führt. Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redaction und den Druck der in dem gleichen Stücken enthaltenen wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenschaft heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt der geschäftlichen Theile der Sitzungsberichte verantwortlich. Für alle übrigen Theile derselben ist in jeder Richtung nur die Verfasser verantwortlich.

**VERZEICHNISS DER »WISSENSCHAFTLICHEN MITTHEILUNGEN«
zu St. LI.**

	Seite
LIPSCHITZ: Untersuchungen über die Bestimmung von Oberflächen mit vorgeschriebenen, die Krümmungsverhältnisse betreffenden Eigenschaften	1077
HIRSCHFELD: Bericht über die Ergebnisse einer Bereisung Paphlagoniens	1089
KRABBE: Über die Beziehungen der Rindenspannung zur Bildung der Jahrringe und zur Ablenkung der Markstrahlen	1093

ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE
aus den Jahren 1879, 1880 und 1881.
(In Commission in FERD. DÜMLER's Verlagsbuchhandlung.)

RAMMELSBURG: Über die chemische Natur der Meteoriten. 2. Abtheilung	M. 3.00
ROTH: Beiträge zur Petrographie der plutonischen Gesteine. 3. Abtheilung	9.00
VIRCHOW: Beiträge zur Landeskunde der Troas	10.00
SCHOTT: Kitai und Karakitai, ein Beitrag zur Geschichte Ost- und Innerasiens	1.00
KRUEGER, P.: Codicis Theodosiani fragmenta Taurinensia	5.00
CURTJUS: Das archaische Bronzerelief aus Olympia	2.50
BUSCHMANN: Die Ordinal-Zahlen der mexicanischen Sprache	2.50
ERDMANN: Über die Wiener und Heidelberger Handschrift des Otfrid	3.00
SCHRADER: Zur Kritik der Inschriften Tiglath-Pileser's II., des Asarhaddon und des Asurbanipal	3.00
DILLMANN: Zur Geschichte des Axumitischen Reichs im vierten bis sechsten Jahrhundert	2.50
SACHAU, E.: Über die Lage von Tigranokerta	5.50
HAGEN: Über Veränderung der Wasserstände in den Preussischen Strömen	1.50
VAHLEN: Über die Anfänge der Heroiden des Ovid	1.50
WAITZ: Über eine alte Genealogie der Welfen	0.80
SCHOTT: Über ein chinesisches Mengwerk, nebst einem Anhang linguistischer Verbesserungen zu zwei Bänden der Erdkunde Ritter's	2.00
ZELLER: Über die Messung psychischer Vorgänge	0.80
VIRCHOW: Über die Weddas von Ceylon und ihre Beziehungen zu den Nachbarstämmen	8.00
BOHN: Der Tempel der Athena Polias zu Pergamon	2.00
GERLAND, ERNST: Leibnizens und Huygens' Briefwechsel mit Papin, nebst der Biographie Papin's und einigen zugehörigen Briefen und Actenstücken. Auf Kosten der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften herausgegeben. Berlin 1881	
	M. 13.50

Zur gefälligen Beachtung.

Diejenigen Empfänger der Monatsberichte, welche Exemplare von der Akademie direct erhalten, werden ersucht, falls ihnen Theile des Jahrgangs 1881 nicht zugekommen sein sollten, hiervon baldigst der Akademie Anzeige zu machen. Eine Berücksichtigung etwaiger Reclamationen kann nur in Aussicht gestellt werden, wenn dieselben spätestens bis zum Ende des Jahres 1882 angebracht werden.

ANZEIGE.

Vom 1. Januar d. J. gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin, statt ihrer bisherigen »Monatsberichte«, wöchentliche »Sitzungsberichte« heraus. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Auszuge auf der zweiten Seite des Umschlages der »Sitzungsberichte« abgedruckt.

Um dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Leserkreise den ihn näher angehenden Theil des Stoffes der »Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzubieten wurde beschlossen, einen Auszug aus diesen Berichten unter dem Titel:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN

AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN

herauszugeben. Diese Sonderausgabe wird sämtliche Arbeiten aus dem Gebiet der reinen Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und beobachtenden Naturwissenschaften in vollständigem Abdruck enthalten, welche in Sitzungen der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr fremden Verfassern mitgetheilt in die »Sitzungsberichte« aufgenommen wurden. Auch demselben Gebiet angehörige geschäftliche Berichte, Preis-Aufgaben und -Ertheilungen, Adressen, Reden und dergl. mehr, finden darin Platz. Die »Mittheilungen« erhalten besondere Paginirung, doch steht auf jeder Seite eingeklammert die entsprechende Seitenzahl der »Sitzungsberichte«, und bei dem Titel jeder Mittheilung die römische Ordnungszahl des Stückes (St.) der Berichte, dem sie entlehnt ist.

Die »Mittheilungen« erscheinen vom 1. Januar d. J. ab bis auf Weiteres in Monatsheften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Stück wird in der Regel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Personen, Gesellschaften und Instituten, welche bisher die »Monatsberichte« empfangen, steht es frei, statt der vollständigen »Sitzungsberichte« fortan nur die »Mathematischen und naturwissenschaftlichen Mittheilungen aus den Sitzungsberichten« sich zuschicken zu lassen, und sie werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat so bald wie möglich Nachricht zu geben. Wegen des buchhändlerischen Bezuges der »Mittheilungen« siehe unten.

In Commission bei FERD. DÜMLER'S Verlagsbuchhandlung (HARRWITZ & GOSSMANN) in Berlin erscheinen:

SITZUNGSBERICHTE

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 12 M.

Diese an Stelle der bisherigen »Monatsberichte« der Akademie getretenen »Sitzungsberichte« erscheinen in Zwischenräumen von acht Tagen, und enthalten sämtliche zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen und wissenschaftlichen Mittheilungen, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.

Getrennt von denselben erscheinen ausserdem, ebenda in Commission:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN

AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 8 M.

Dieselben erscheinen in monatlichen Zwischenräumen und enthalten nur die geschäftlichen und die wissenschaftlichen Mittheilungen aus dem Gebiete der Mathematik wie der Naturwissenschaft im weitesten Sinne, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.

)



SITZUNGSBERICHTE

DER


KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

XLIX. L.

7. DECEMBER 1882.



BERLIN 1882.

VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

IN COMMISSION IN FERD. DÜMLER'S VERLAGS-BUCHHANDLUNG
HARRWITZ UND GOSSMANN.



Anzeige.

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die Redaction der »Sitzungsberichte«.)

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-Octav **regelmässig Donnerstags acht Tage nach jeder Sitzung.** Die sämmtlichen zu einem Kalenderjahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungsnummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physikalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über Sitzungen der philosophisch-historischen Classe ungerade Nummern.

§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Uebersicht über die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mittheilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten überwiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört, druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehörigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte bestimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung **druckfertig** vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder, sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspondirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammtakademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mitglied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die akademischen Schriften **ordnungsmässig** zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtakademie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschaltenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satztheilung wird erst begonnen, wenn die Stücke Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind, besonders beizugebenden Tafeln die volle Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaftliche Mittheilung darf in keinem Falle die Ausgabe des betreffenden Stückes anderweitig, nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausdeutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden, wenn der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf Verlangen verschickt. Die Verfasser werden auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach sehr

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungsberichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher Mittheilungen auch abgesondert in der Welt gedruckt werden, dass dieselben mit Sondertitel und Paginirung versehen und mit besonderem Vorzug in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den »wissenschaftlichen Mittheilungen« abgedruckten Arbeit erhält fünfzig Sonderabdrücke mit einem Titel, auf welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von noch zu unentgeltlicher eigener Vertheilung zu lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem vorsitzenden Secretar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung des Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz führt. Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redaction und den Druck der in dem gleichen Sitzungshefte enthaltenen wissenschaftlichen Arbeiten; in diesem Sinne heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den geschäftlichen Theil der Sitzungsberichte verantwortlich. Für alle übrigen Theile derselben ist jeder Richtung nur die Verfasser verantwortlich.

VERZEICHNISS DER »WISSENSCHAFTLICHEN MITTHEILUNGEN«

zu St. XLIX und L.

	Seite
LER: Über die Lehre des Aristoteles von der Ewigkeit des Geistes	1033
MECKER: Über die Composition Abelscher Gleichungen	1059
BECK: Über die Phasenunterschiede elektrischer Schwingungen.	1065

ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE

aus den Jahren 1879, 1880 und 1881.

(In Commission in FERD. DÜMLER's Verlagsbuchhandlung.)

MELSBERG: Über die chemische Natur der Meteoriten. 2. Abtheilung.	M. 3.00
W: Beiträge zur Petrographie der plutonischen Gesteine. 3. Abtheilung	9.00
CHOW: Beiträge zur Landeskunde der Troas	10.00
OTT: Kitai und Karakitai, ein Beitrag zur Geschichte Ost- und Innerasiens	1.00
ROER, P.: Codicis Theodosiani fragmenta Taurinensia	5.00
STUS: Das archaische Bronzerelief aus Olympia	2.50
CHMANN: Die Ordinal-Zahlen der mexicanischen Sprache	2.50
SMANN: Über die Wiener und Heidelberger Handschrift des Otfrid	3.00
RADER: Zur Kritik der Inschriften Tiglath-Pileser's II., des Asarhaddon und des Asurbanipal	3.00
LMANN: Zur Geschichte des Axumitischen Reichs im vierten bis sechsten Jahrhundert	2.50
HAU, E.: Über die Lage von Tigranokerta	5.50
REN: Über Veränderung der Wasserstände in den Preussischen Strömen	1.50
ELN: Über die Anfänge der Heroiden des Ovid	1.50
ITZ: Über eine alte Genealogie der Welfen	0.80
OTT: Über ein chinesisches Mengwerk, nebst einem Anhang linguistischer Verbesserungen zu zwei Bänden der Erdkunde Ritter's	2.00
LER: Über die Messung psychischer Vorgänge	0.80
CHOW: Über die Weddas von Ceylon und ihre Beziehungen zu den Nachbarstämmen	8.00
W: Der Tempel der Athena Polias zu Pergamon	2.00

LAND, ERNST: Leibnizens und Huygens' Briefwechsel mit Papin, nebst der Biographie Papin's und einigen zugehörigen Briefen und Actenstücken. Auf Kosten der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften herausgegeben. Berlin 1881 M. 13.50

Zur gefälligen Beachtung.

Diejenigen Empfänger der Monatsberichte, welche Exemplare von der Akademie direct erhalten, ersucht, falls ihnen Theile des Jahrgangs 1881 nicht zugekommen sein sollten, hiervon baldigst der Akademie Anzeige zu machen. Eine Berücksichtigung etwaiger Reclamationen kann nur in Aussicht genommen werden, wenn dieselben spätestens bis zum Ende des Jahres 1882 angebracht werden.

ANZEIGE.

Vom 1. Januar d. J. gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin, statt ihrer bisherigen »Monatsberichte«, wöchentliche »Sitzungsberichte«. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Auszuge auf der zweiten Umschlagseite der »Sitzungsberichte« abgedruckt.

Um dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Leserkreise den ihm näher gehenden Theil des Stoffes der »Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzustellen, wurde beschlossen, einen Auszug aus diesen Berichten unter dem Titel:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN

AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

**KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN**

herauszugeben. Diese Sonderausgabe wird sämtliche Arbeiten aus dem Gebiete der reinen Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und beobachteten Naturwissenschaften in vollständigem Abdruck enthalten, welche in Sitzungen der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr fremden Verfassern mitgetheilt worden. Auch demselben Gebiete angehörige geographische Berichte, Preis-Aufgaben und -Ertheilungen, Adressen, Reden und dergleichen finden darin Platz. Die »Mittheilungen« erhalten besondere Paginirung, doch auf jeder Seite eingeklammert die entsprechende Seitenzahl der »Sitzungsberichte« und bei dem Titel jeder Mittheilung die römische Ordnungszahl des Stückes der »Sitzungsberichte«, dem sie entlehnt ist.

Die »Mittheilungen« erscheinen vom 1. Januar d. J. ab bis auf Weiteres in Heften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Heft wird in der Regel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Für die Gesellschaften und Institute, welche bisher die »Monatsberichte« empfangen, wird frei, statt der vollständigen »Sitzungsberichte« fortan nur die »Mathematischen und naturwissenschaftlichen Mittheilungen aus den Sitzungsberichten« sich zuschicken zu lassen, und sie werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat so bald als möglich Nachricht zu geben. Wegen des buchhändlerischen Bezuges der »Mittheilungen« siehe unten.

In Commission bei FERD. DÜMLER'S Verlagsbuchhandlung (HAREWITZ & GOEDEL) in Berlin erscheinen:

SITZUNGSBERICHTE

DER

**KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.**

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 12 M.

Diese an Stelle der bisherigen »Monatsberichte« der Akademie getretenen »Sitzungsberichte« erscheinen in Zwischenräumen von acht Tagen, und enthalten sämtliche zur Verhandlung geeigneten geschäftlichen und wissenschaftlichen Mittheilungen, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.

Getrennt von denselben erscheinen ausserdem, ebenda in Commission:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN

AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

**KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.**

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 8 M.

Dieselben erscheinen in monatlichen Zwischenräumen und enthalten nur die mathematischen und die wissenschaftlichen Mittheilungen aus dem Gebiete der Mathematik und der Naturwissenschaft im weitesten Sinne, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.


15

C. 5.

SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

LI.

14. DECEMBER 1882.



BERLIN 1882.

VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

IN COMMISSION IN FERD. DÜMMLER'S VERLAGS-BUCHHANDLUNG
HARRWITZ UND GOSSMANN.

Anzeige.

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königl. Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgenden Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die Redaction der »Sitzungsberichte«.)

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-Octav regelmässig Donnerstags acht Tage nach jeder Sitzung. Die sämmtlichen zu einem Kalenderjahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungsnummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physikalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über Sitzungen der philosophisch-historischen Classe ungerade Nummern.

§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Uebersicht über die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mittheilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten überwiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört, druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehörigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte bestimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder, sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung eines ihrem Fache angehörnden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspondirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammtakademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mitglied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtakademie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschaltenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz der Mittheilung wird erst begonnen, wenn die Stücke des Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind; besonders beizugebenden Tafeln die volle erste Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaftliche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Mittheilung des betreffenden Stückes anderweitig, sei es nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausfuhrung, in deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf der Einwilligung der Gesammtakademie oder der betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf Verlangen verschickt. Die Verfasser werden ersucht, auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen

§ 9.

1. Neben der vollständigen Angabe der Mittheilungen können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher Mittheilungen auch abgesondert in der Weise veröffentlicht werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender Paginirung versehen und mit besonderem Vermerk in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den »Wissenschaftlichen Mittheilungen« abgedruckten Arbeit erhält gegen Entgelt fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von noch weiteren zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abdrucken zu lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden Secretar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung des Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz führt. Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redaction und den Druck der in dem gleichen Stücken enthaltenen wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenschaft heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den geschäftlichen Theil der Sitzungsberichte verantwortlich. Für alle übrigen Theile derselben ist jeder Richtung nur die Verfasser verantwortlich.

VERZEICHNISS DER »WISSENSCHAFTLICHEN MITTHEILUNGEN«
zu St. LI.

	Seite
LIPSCHITZ: Untersuchungen über die Bestimmung von Oberflächen mit vorgeschriebenen, die Krümmungsverhältnisse betreffenden Eigenschaften	1077
HIRSCHFELD: Bericht über die Ergebnisse einer Bereisung Paphlagoniens	1089
KRABBE: Über die Beziehungen der Rindenspannung zur Bildung der Jahrringe und zur Ablenkung der Markstrahlen	1093

ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE

aus den Jahren 1879, 1880 und 1881.

(In Commission in FERD. DÜMLER's Verlagsbuchhandlung.)

RAMMELSBERG: Über die chemische Natur der Meteoriten. 2. Abtheilung	M. 3.00
ROTH: Beiträge zur Petrographie der plutonischen Gesteine. 3. Abtheilung	9.00
VIRCHOW: Beiträge zur Landeskunde der Troas	10.00
SCHOTT: Kitai und Karakitai, ein Beitrag zur Geschichte Ost- und Innerasiens	1.00
KRUEGER, P.: Codicis Theodosiani fragmenta Taurinensia	5.00
CURTIUS: Das archaische Bronzerelief aus Olympia	2.50
BUSCHMANN: Die Ordinal-Zahlen der mexicanischen Sprache	2.50
ERDMANN: Über die Wiener und Heidelberger Handschrift des Otfrid	3.00
SCHRADER: Zur Kritik der Inschriften Tiglath-Pileser's II., des Asarhaddon und des Asurbanipal	3.00
DILLMANN: Zur Geschichte des Axumitischen Reichs im vierten bis sechsten Jahrhundert	2.50
SACHAU, E.: Über die Lage von Tigranokerta	5.50
HAGEN: Über Veränderung der Wasserstände in den Preussischen Strömen	1.50
VAHLEN: Über die Anfänge der Heroiden des Ovid	1.50
WAITZ: Über eine alte Genealogie der Welfen	0.80
SCHOTT: Über ein chinesisches Mengwerk, nebst einem Anhang linguistischer Verbesserungen zu zwei Bänden der Erdkunde Ritter's	2.00
ZELLER: Über die Messung psychischer Vorgänge	0.80
VIRCHOW: Über die Weddas von Ceylon und ihre Beziehungen zu den Nachbarstämmen	8.00
BOHN: Der Tempel der Athena Polias zu Pergamon	2.00
GERLAND, ERNST: Leibnizens und Huygens' Briefwechsel mit Papin, nebst der Biographie Papin's und einigen zugehörigen Briefen und Actenstücken. Auf Kosten der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften herausgegeben. Berlin 1881	
	M. 13.50

Zur gefälligen Beachtung.

Diejenigen Empfänger der Monatsberichte, welche Exemplare von der Akademie direct erhalten, werden ersucht, falls ihnen Theile des Jahrgangs 1881 nicht zugekommen sein sollten, hiervon baldigst bei der Akademie Anzeige zu machen. Eine Berücksichtigung etwaiger Reclamationen kann nur in Aussicht gestellt werden, wenn dieselben spätestens bis zum Ende des Jahres 1882 angebracht werden.

ANZEIGE.

Vom 1. Januar d. J. gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin, statt ihrer bisherigen »Monatsberichte«, wöchentliche »Sitzungsberichte« heraus. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Auszuge auf der zweiten Seite des Umschlages der »Sitzungsberichte« abgedruckt.

Um dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Leserkreise den ihn näher interessierenden Theil des Stoffes der »Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzubieten, wurde beschlossen, einen Auszug aus diesen Berichten unter dem Titel:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN

AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

**KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN**

herauszugeben. Diese Sonderausgabe wird sämtliche Arbeiten aus dem Gebiete der reinen Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und beobachtenden Naturwissenschaften in vollständigem Abdruck enthalten, welche in Sitzungen der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr fremden Verfassern mitgetheilt in die »Sitzungsberichte« aufgenommen wurden. Auch demselben Gebiete angehörige geschäftliche Berichte, Preis-Aufgaben und -Ertheilungen, Adressen, Reden und dergl. mehr finden darin Platz. Die »Mittheilungen« erhalten besondere Paginirung, doch steht auf jeder Seite eingeklammert die entsprechende Seitenzahl der »Sitzungsberichte« und bei dem Titel jeder Mittheilung die römische Ordnungszahl des Stückes (St.) da, von dem sie entlehnt ist.

Die »Mittheilungen« erscheinen vom 1. Januar d. J. ab bis auf Weiteres in Monatsheften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Stück wird in der Regel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Personen, Gesellschaften und Instituten, welche bisher die »Monatsberichte« empfangen, steht es frei, statt der vollständigen »Sitzungsberichte« fortan nur die »Mathematischen und naturwissenschaftlichen Mittheilungen aus den Sitzungsberichten« sich zuschicken zu lassen, und sie werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat so bald wie möglich Nachricht zu geben. Wegen des buchhändlerischen Bezuges der »Mittheilungen« siehe unten.

In Commission bei FERD. DÜMLER'S Verlagsbuchhandlung (HARRWITZ & GOSSMAN) in Berlin erscheinen:

SITZUNGSBERICHTE

DER

**KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.**

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 12 M.

Diese an Stelle der bisherigen »Monatsberichte« der Akademie getretenen »Sitzungsberichte« erscheinen in Zwischenräumen von acht Tagen, und enthalten sämtliche zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen und wissenschaftlichen Mittheilungen, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.

Getrennt von denselben erscheinen ausserdem, ebenda in Commission:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN

AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

**KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.**

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 8 M.

Dieselben erscheinen in monatlichen Zwischenräumen und enthalten nur die geschäftlichen und die wissenschaftlichen Mittheilungen aus dem Gebiete der Mathematik wie der Naturwissenschaft im weitesten Sinne, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.

3



SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

LII. LIII.

MIT EINER TAFEL.

21. DECEMBER 1882.



BERLIN 1882.

VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

IN COMMISSION IN FERD. DÜMMLER'S VERLAGS-BUCHHANDLUNG
HARRWITZ UND GOSSMANN.



Anzeige.

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die Redaction der »Sitzungsberichte«.)

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-Octav regelmässig Donnerstags acht Tage nach jeder Sitzung. Die sämtlichen zu einem Kalenderjahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungsnummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physikalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über Sitzungen der philosophisch-historischen Classe ungerade Nummern.

§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Uebersicht über die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mittheilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten überwiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört, druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehörigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte bestimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder, sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung eines ihrem Fache angehörnden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspondirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammtakademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mitglied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses Umfangs beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtakademie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschaltenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satztheilung wird erst begonnen, wenn die Schluss-Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig und besonders beizugebenden Tafeln die volle Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmschaftliche Mittheilung darf in keinem Falle: gabe des betreffenden Stückes anderweitig, nur auszugsweise oder auch in weiterer deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen Mittheilung diese anderweitig früher zu verabsichtigen, als ihm dies gesetzlich mittheilung dazu der Einwilligung der Gesammtakademie betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf Verlangen verschickt. Die Verfasser verschieben auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungsberichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher Mittheilungen auch abgesondert in der Welt werden, dass dieselben mit Sondertitel und Paginirung versehen und mit besonderem Vermerk in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den wissenschaftlichen Mittheilungen abgedruckten Arbeit erhält fünfzig Sonderabdrücke mit einem Uebersicht, welchem der Titel der Arbeit wiederholt.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von noch zu unentgeltlicher eigener Vertheilung lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden Secretar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung des Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz führt, die Oberaufsicht über die Satztheilung und den Druck der in dem gleichen Bande erscheinenden wissenschaftlichen Arbeiten; in diesem Sinne heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für die geschäftlichen Theile der Sitzungsberichte verantwortlich. Für alle übrigen Theile derselben ist jeder Richtung nur die Verfasser verantwortlich.

**VERZEICHNISS DER »WISSENSCHAFTLICHEN MITTHEILUNGEN«
zu St. LII und LIII.**

	Seite
ERS: Über <i>Opisthoplus degener</i> , eine neue Gattung und Art der Schlangen mit ganz eigenthümlicher Bezahnung.	1147
ONECKER: Die kubischen Abelschen Gleichungen des Bereichs ($\sqrt{-31}$)	1151
EN: Über die cyklische Entwicklung und die Verwandtschaftsverhältnisse der Siphonophoren (hierzu Taf. XVII)	1155

ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE

aus den Jahren 1879, 1880 und 1881.

(In Commission in FERD. DÜMLER'S Verlagsbuchhandlung.)

IMLSBERG: Über die chemische Natur der Meteoriten. 2. Abtheilung.	M. 3.00
H: Beiträge zur Petrographie der plutonischen Gesteine. 3. Abtheilung	9.00
CHOW: Beiträge zur Landeskunde der Troas	10.00
OTT: Kitai und Karakitai, ein Beitrag zur Geschichte Ost- und Innerasiens	1.00
EGER, P.: Codicis Theodosiani fragmenta Taurinensia	5.00
TIUS: Das archaische Bronzerelief aus Olympia	2.50
CHMANN: Die Ordinal-Zahlen der mexicanischen Sprache	2.50
MANN: Über die Wiener und Heidelberger Handschrift des Otfrid	3.00
RADER: Zur Kritik der Inschriften Tiglath-Pileser's II., des Asarhaddon und des Asurbanipal	3.00
LMANN: Zur Geschichte des Axumitischen Reichs im vierten bis sechsten Jahrhundert	2.50
HAU, E.: Über die Lage von Tigranokerta	5.50
EN: Über Veränderung der Wasserstände in den Preussischen Strömen	1.50
ILEN: Über die Anfänge der Heroiden des Ovid	1.50
ITZ: Über eine alte Genealogie der Welfen	0.80
OTT: Über ein chinesisches Mengwerk, nebst einem Anhang linguistischer Verbesserungen zu zwei Bänden der Erdkunde Ritter's	2.00
LER: Über die Messung psychischer Vorgänge	0.80
CHOW: Über die Weddas von Ceylon und ihre Beziehungen zu den Nachbarstämmen	8.00
EN: Der Tempel der Athena Polias zu Pergamon	2.00

LAND, ERNST: Leibnizens und Huygens' Briefwechsel mit Papin, nebst der Biographie Papin's und einigen zugehörigen Briefen und Actenstücken. Auf Kosten der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften herausgegeben. Berlin 1881 M. 13.50

Zur gefälligen Beachtung.

Diejenigen Empfänger der Monatsberichte, welche Exemplare von der Akademie direct erhalten, den ersucht, falls ihnen Theile des Jahrgangs 1881 nicht zugekommen sein sollten, hiervon baldigst der Akademie Anzeige zu machen. Eine Berücksichtigung etwaiger Reclamationen kann nur in Aussicht genommen werden, wenn dieselben spätestens bis zum Ende des Jahres 1882 angebracht werden.

ANZEIGE.

Vom 1. Januar d. J. gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften Berlin, statt ihrer bisherigen »Monatsberichte«, wöchentliche »Sitzungsberichte« heraus. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Auszuge auf der zweiten Seite Umschlages der »Sitzungsberichte« abgedruckt.

Um dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Leserkreise den ihn näher interessierenden Theil des Stoffes der »Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzubieten, wurde beschlossen, einen Auszug aus diesen Berichten unter dem Titel:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN

AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN

herauszugeben. Diese Sonderausgabe wird sämtliche Arbeiten aus dem Gebiet der reinen Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und beobachtenden Naturwissenschaften in vollständigem Abdruck enthalten, welche in Sitzungen der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr fremden Verfassern mitgetheilt in die »Sitzungsberichte« aufgenommen wurden. Auch demselben Gebiet angehörige geschäftliche Berichte, Preis-Aufgaben und -Ertheilungen, Adressen, Reden und dergl. mehr finden darin Platz. Die »Mittheilungen« erhalten besondere Paginirung, doch steht auf jeder Seite eingeklammert die entsprechende Seitenzahl der »Sitzungsberichte« und bei dem Titel jeder Mittheilung die römische Ordnungszahl des Stückes (St.) der Berichte, dem sie entlehnt ist.

Die »Mittheilungen« erscheinen vom 1. Januar d. J. ab bis auf Weiteres in Monatsheften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Stück wird in der Regel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Personen, Gesellschaften und Instituten, welche bisher die »Monatsberichte« empfingen, steht es frei, statt der vollständigen »Sitzungsberichte« fortan nur die »Mathematischen und naturwissenschaftlichen Mittheilungen aus den Sitzungsberichten« sich zuschicken zu lassen, und sie werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat so bald wie möglich Nachricht zu geben. Wegen des buchhändlerischen Bezuges der »Mittheilungen« siehe unten.

In Commission bei FERD. DÜMMLER'S Verlagsbuchhandlung (HARRWITZ & GOSSWISS) in Berlin erscheinen:

SITZUNGSBERICHTE

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 12 M.

Diese an Stelle der bisherigen »Monatsberichte« der Akademie getretenen »Sitzungsberichte« erscheinen in Zwischenräumen von acht Tagen, und enthalten sämtliche zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen und wissenschaftlichen Mittheilungen, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.

Getrennt von denselben erscheinen ausserdem, ebenda in Commission:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN

AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 8 M.

Dieselben erscheinen in monatlichen Zwischenräumen und enthalten nur die geschäftlichen und die wissenschaftlichen Mittheilungen aus dem Gebiete der Mathematik wie der Naturwissenschaft im weitesten Sinne, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.

7

SITZUNGSBERICHTE
DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

LIV.



NACHTRÄGLICHE MITTHEILUNGEN VOM 23. NOVEMBER UND 21. DECEMBER.

BERLIN 1882.

VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

IN COMMISSION IN FERD. DÜMMLER'S VERLAGS-BUCHHANDLUNG
HARRWITZ UND GOSSMANN.

Mit diesem Stücke schliesst Jahrgang 1882 der Berichte. Er wird in zwei Theile getheilt.
Die Titel und Inhaltsverzeichnisse für beide Theile, das Verzeichniss der eingegangenen
Druckschriften, das Namens- und Sachregister für den Jahrgang folgen nach.

Anzeige.

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die „Monatsberichte der Königl. Preussischen Akademie der Wissenschaften“ zu erscheinen aufgehört, und an deren Stelle „Sitzungsberichte“ getreten, für welche unter anderen folgende Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die Redaction der „Sitzungsberichte“.)

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-Octav **regelmässig Donnerstags acht Tage nach jeder Sitzung.** Die sämmtlichen zu einem Kalenderjahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungsziffer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physikalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über Sitzungen der philosophisch-historischen Classe ungerade Nummern.

§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Uebersicht über die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mittheilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten überwiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört, druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehörigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte bestimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung **druckfertig** vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder, sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspondirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammtakademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mitglied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses Umfangs beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtakademie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschaltenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz der Mittheilung wird erst begonnen, wenn die Stücke der Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind, besonders beizugebenden Tafeln die volle erste Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaftliche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Mittheilung des betreffenden Stückes anderweitig, sei es nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausfuhrung, in deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden, wenn der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, und dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf Verlangen verschickt. Die Verfasser versichern auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungsberichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher Mittheilungen auch abgesondert in der Weise veröffentlicht werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender Paginirung versehen und mit besonderem Vermerk in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den „Wissenschaftlichen Mittheilungen“ abgedruckten Arbeit erhält gegen Entgelt fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von noch zwei zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abdrucken zu lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem vorsitzenden Secretar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung führt der Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz führt. Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redaction und den Druck der in dem gleichen Sitzungsberichte enthaltenen wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenschaft heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den geschäftlichen Theil der Sitzungsberichte verantwortlich. Für alle übrigen Theile derselben ist jeder Richtung nur die Verfasser verant-

VERZEICHNISS DER »WISSENSCHAFTLICHEN MITTHEILUNGEN zu St. LIV.

EDLER: Elohim, El (אלהים, אל)
OVSEN: Zum Münzwesen Athens

ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE

aus den Jahren 1879, 1880 und 1881.

(In Commission in FERD. DÜMMER'S Verlagsbuchhandlung.)

MMELSBURG: Über die chemische Natur der Meteoriten. 2. Abtheilung
TH: Beiträge zur Petrographie der plutonischen Gesteine. 3. Abtheilung
CHOW: Beiträge zur Landeskunde der Troas
HOTI: Kitai und Karakitai, ein Beitrag zur Geschichte Ost- und Innerasiens
UEGER, P.: Codicis Theodosiani fragmenta Taurinensia
RTIUS: Das archaische Bronzerelief aus Olympia
SCHMANN: Die Ordinal-Zahlen der mexicanischen Sprache
DMANN: Über die Wiener und Heidelberger Handschrift des Otfrid
BRADER: Zur Kritik der Inschriften Tiglath-Pileser's II., des Asarhaddon und des Asurbanipal
LMANN: Zur Geschichte des Axumitischen Reichs im vierten bis sechsten Jahrhundert
CHAU, E.: Über die Lage von Tigranokerta
GEN: Über Veränderung der Wasserstände in den Preussischen Strömen
HIEN: Über die Anfänge der Heroiden des Ovid
AITZ: Über eine alte Genealogie der Welfen
HOTT: Über ein chinesisches Mengwerk, nebst einem Anhang linguistischer Verbesserungen zu zwei Bänden der Erdkunde Ritter's
LLER: Über die Messung psychischer Vorgänge
CHOW: Über die Weddas von Ceylon und ihre Beziehungen zu den Nachbarstämmen
HN: Der Tempel der Athena Polias zu Pergamon

RLAND, ERNST: Leibnizens und Huygens' Briefwechsel mit Papin, nebst der Biographie Papin's und
zugehörigen Briefen und Actenstücken. Auf Kosten der Königlich Preussischen Akademie der
schaften herausgegeben. Berlin 1881

Zur gefälligen Beachtung.

*Diejenigen Empfänger der Sitzungsberichte oder der mathematischen und naturwissenschaftlichen
Abhandlungen, welche Exemplare von der Akademie direct erhalten, werden ersucht, falls ihnen
im Jahrgang 1882 nicht zugekommen sein sollten, hiervon baldigst bei der Akademie Anzeige zu
nehmen. Die Berücksichtigung etwaiger Reclamationen kann nur in Aussicht gestellt werden, wenn
dieselben bis zum Ende des Jahres 1883 angebracht werden.*

ANZEIGE.

Seit dem 1. Januar 1882 gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin wöchentliche »Sitzungsberichte« heraus. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Auszuge auf der zweiten Seite des Umschlages der »Sitzungsberichte« abgedruckt.

Um dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Leserkreise den ihm näher angehenden Theil des Stoffes der »Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzubieten wurde beschlossen, einen Auszug aus diesen Berichten unter dem Titel:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN

AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN

herauszugeben. Diese Sonderausgabe wird sämtliche Arbeiten aus dem Gebiet der reinen Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und beobachtenden Naturwissenschaften in vollständigem Abdruck enthalten, welche in Sitzungen der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr fremden Verfassern mitgetheilt in die »Sitzungsberichte« aufgenommen wurden. Auch demselben Gebiet angehörige geschäftliche Berichte, Preis-Aufgaben und -Ertheilungen, Adressen, Reden und dergl. mehr finden darin Platz. Die »Mittheilungen« erhalten besondere Paginirung, doch steht auf jeder Seite eingeklammert die entsprechende Seitenzahl der »Sitzungsberichte« und bei dem Titel jeder Mittheilung die römische Ordnungszahl des Stückes (St.) der Berichte, dem sie entlehnt ist.

Die »Mittheilungen« erscheinen vom 1. Januar 1882 ab bis auf Weiteres in Monatsheften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Stück wird in der Regel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Personen, Gesellschaften und Instituten, welche bisher die »Monatsberichte« empfangen, steht es frei, statt der vollständigen »Sitzungsberichte« fortan nur die »Mathematischen und naturwissenschaftlichen Mittheilungen aus den Sitzungsberichten« sich zuschicken zu lassen, und sie werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat so bald wie möglich Nachricht zu geben. Wegen des buchhändlerischen Bezuges der »Mittheilungen« siehe unten.

In Commission bei FERD. DÜMMLER'S Verlagsbuchhandlung (HARRWITZ & GOSSWAM) in Berlin erscheinen:

SITZUNGSBERICHTE

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

Jahrgang 1883. gr. 8. Geheftet. Preis 12 M.

Diese »Sitzungsberichte« erscheinen in Zwischenräumen von acht Tagen, und enthalten sämtliche zur Veröffentlichung geeigneten geschäftlichen und wissenschaftlichen Mittheilungen, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.

Getrennt von denselben erscheinen ausserdem, ebenda in Commission:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN

AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

Jahrgang 1883. gr. 8. Geheftet. Preis 8 M.

Dieselben erscheinen in monatlichen Zwischenräumen und enthalten nur die geschäftlichen und die wissenschaftlichen Mittheilungen aus dem Gebiete der Mathematik wie der Naturwissenschaft im weitesten Sinne, welche in den Sitzungen der Akademie gemacht wurden.

Der Jahrgang 1882 der »Sitzungsberichte« sowie der »Mittheilungen« ist von derselben Buchhandlung zu beziehen.







